IMP. INST. ENT.
— LIBRARY —
21 MAY 1935
SERIAL Fa. 59.
SEPARATE

Tables

des tomes I à XXV

des Bulletins

de la

Société de Pathologie Exotique

et de ses filiales

de l'Ouest-Africain et de Madagascar

BULLETINS
de la Société
DE
Pathologie Exotique

ET DE SES FILIALES

de l'Ouest-Africain et de Madagascar

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : INSTITUT PASTEUR, PARIS

TABLES DES TOMES I-XXV (1908-1932)

PARIS

MASSON & Cie, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, Boulevard Saint-Germain (6e)

Le Bulletin de la Société de Pathologie exotique paraît 10 fois par an 3 semaines après chaque séance, qui a lieu le 2e mercredi du mois, sauf en août et septembre. Il forme tous les ans un volume de 1.000 pages environ.

IMP. INST. ENT.
— LIBRARY —
21 MAY 1935
SERIAL Ent. 59
SEPARATE

TABLE

ANALYTIQUE DES MATIÈRES

(Tomes I-XXV)

DRESSÉE PAR

J. BRIDRÉ

(*Les abréviations :* (*c.*), (*fig.*), (*pl.*) *placées à la suite d'un numéro de page indiquent que l'article annoncé renferme une ou plusieurs* cartes, figures *ou* planches).

A

Abcès dû à des semences de capim (*Melinis minutiflora*), XV, 215.
— sous-dermiques et gommes ulcérées produits par le *Sporotrichum carougeaui* associé à la tuberculose, XV, 444.
— profonds observés en A. E. F., XV, 459.
— à pseudo-méningocoques, XV, 652.
— amibien du poumon gauche, XIX, 884.
— du foie. Formule hémoleucocytaire, I, 38.
— — Modifications du rythme urinaire, I, 236.
— — Inégalité pupillaire, I, 421.
— — Radiologie, I, 38 (fig.), 79 (fig.).
— — Révulsion réciproque de l'intestin et du foie dans l'hépatite dysentérique, I, 170.
— — amibien avec association de bacilles de Koch, VII, 475.
— — chez un Sénégalais, XXIV, 155.
— — Injection au lapin de pus provenant d'—, II, 567.
— — Traitement par l'émétine, VI, 426 ; XV, 537 ; XXV, 421 (fig.), 425.
— *Onchocerca volvulus* dans un — sus-pubien, XIII, 252.
— de fixation dans les accès pernicieux, XI, 179.
— — dans la peste, XV, 904.
— — dans le typhus exanthématique, II, 497 ; III, 172, 455.
Abeille. Piqûre unique déterminant des symptômes graves, XI, 859.
— Action vaccinante réciproque des venins d'— et de vipère aspic, XXV, 581.
Abyssinie. Fièvre des tiques, I, 432, 480.
— Stomoxes, I, 195.
Acanthocéphales rencontrés en Macédoine, XXI, 218.
Acanthocheilonema (Filaires du genre) chez les carnivores, V, 392 (fig.).
Acariens. Voir aussi **Tiques.**
— recueillis en Haute-Guinée, VIII, 656.

—, parasites du bétail au Congo belge, IX, 763.
— chez les rongeurs de Stanleyville (Congo belge), XXII, 661.
— des rats de Toulon, XXV, 240, 243.
— *Argas vespertilionis* au Cambodge, XXI, 328.
— *Argas persicus* et conservation du virus de la spirochétose aviaire, XIX, 419.
— et leishmanioses, VI, 755.
— et lèpre, VI, 551.
— gamaside (*Leiognatus laverani*, n. sp.) hôte du trypanosome de la chauve-souris, XIV, 542 (fig.).
— *Ophionyssus natricis*, hôte d'une hémogrégarine de la vipère lébétine, XI, 278 (fig.).
— Nouveau trombidiide : *Schöngastia salmi*, n. sp., XVI, 336 (fig.).
— *Microtrombidium* et pseudo-typhus, XVI, 105.
— cause d'érythème ortié, I, 177, 249.
— sarcoptide parasite de la vulve et du vagin, XI, 722.
— Gale démodectique du cheval, XII, 388 (fig.).
— Transmission expérimentale de *Sarcoptes scabiei*, var. *cuniculi* au cynocéphale, XIX, 899.
Acariose en Algérie, III, 39.
— due à *Pediculoïdes ventricosus* en Algérie, IX, 771.
Accès pernicieux. Hématozoaires, VI, 615.
Accidents locaux produits par des piqûres de phlébotomes, V, 511.
Acétylarsan. Voir **Arsenicaux.**
Acheilostoma moucheti, n. sp., XI, 574 (fig.).
Achondroplasie bovine, XXII, 1015.
Achromaticus mactiei, XIII, 456 (fig.).
Acné varioliforme au Sénégal, II, 434 (fig.).
Acremonium niveum, n. sp., XI, 324 (fig.).
Acridiens. Destruction du *Stauronotus maroccanus* au moyen du *Coccobacillus acridiorum*, VII, 651.
— Destruction de *Schistocerca peregrina* au moyen du *Coccobacillus acridiorum*, VIII, 629, 634, 638 ; IX, 679, 682.
— Lutte contre les — au Maroc, XII. 362.
— — — — Concours, XXIII, 887.
— La méthode de d'Hérelle en Guinée française, XV, 762.
— Lutte contre les — en Guinée française, XXIV, 147.
Acrotheca, champignon spécifique de la dermatite verruqueuse, XVII, 227 (pl.).
Actinobacillose humaine, III, 598.
Actinomyces salvati, n. sp., XV, 526.
Actinomycose humaine au Pérou, VII, 380 ; VIII, 571.
— de la face à Alger, XXI, 197 ; XXIV, 431.
— pleuro-pulmonaire en Algérie, XXIV, 85.
— en Grèce, XXI, 432 ; XXIV, 432.
— du rat à Madagascar, XV, 526, 596.
Adénites subaiguës de l'aine en Algérie, VI, 201.
— tropicale, VIII, 641.
Adénopathies iliaques primitives chez les Annamites de Cochinchine, XVII, 67 (fig.).
— — d'origine probablement amibienne chez un Européen, XVII, 629.
Adrénaline associée à la quinine et à l'émétine dans les infections doubles de paludisme et d'amibiase, XVI, 308.
— associée à l'émétine dans l'asthme compliqué d'amibiase bronchique, XVIII, 212.
Ægyptianella pullorum en Algérie, XXIV, 371.
Aérophagie, cause d'erreur de diagnostic, XXIV, 744.
Afridol violet. Voir **Benzidine** (Couleurs de).
Afrique. Voir aussi **Angola, Congo belge, Égypte, Libéria, Madagascar, Mozambique, Maurice (Ile), Ouganda, Somalie italienne, Soudan anglo-égyptien.**
— Alcoolisme, VII, 258, 362.
— Mouches piqueuses de l' — intertropicale, I, 252.
— Nématodes parasites de l'éléphant, XV, 122.
— Tabanides, II, 519.
— Détermination de l'âge des recrues. Chronologie des dents de sagesse chez les indigènes, XXIV, 595.
— centrale. Voir **Congo belge.**
— tropicale, *Id.*
— **équatoriale française.** Voir aussi **Cameroun, Congo (Moyen-), Gabon, Oubangui-Chari, Tchad.**
— — — Alcoolisme, VIII, 308.
— — — Bilharziose, VII, 693 ; XIII, 804.
— — — Blennorragie, VIII, 206.
— — — Charbon bactéridien humain, XXII, 307.
— — — Maladies chirurgicales, VIII, 341.
— — — — cutanées, VIII, 304.
— — — Dysenterie bacillaire, VIII, 303 ; XXIII, 385.
— — — Filariose, VI, 80 ; IX, 163.
— — — Goitre, IX, 165 (fig.) ; XXI, 152.
— — — Helminthiase intestinale, VIII, 301 ; XX, 743.
— — — Lambo, staphylococcie, XX, 4.
— — — Leishmaniose cutanée, IX, 136.
— — — Lèpre, VIII, 124.
— — — Paludisme, VIII, 202 ; XXV, 1062.

— — — Pian, VIII, 124.
— — — Piroplasmoses, IX, 163.
— — — Pneumococcies, XXV, 58.
— — — Pyohémies à abcès profonds, XV, 459.
— — — Rage, XXIII, 703 ; XXV, 191, 1018.
— — — Stomatites, VIII, 301.
— — — Syphilis, VIII, 204.
— — — Trypanosomiases animales, I, 331, 515 ; VII, 689 ; VIII, 197, IX, 151.
— — — — — (bovidés), XXI, 148.
— — — — — — (porcs), XXI, 152.
— — — — humaine, I, 144, 258, 261 (c.), 620 ; II, 108, 244 ; IV, 144 ; V, 2, 403 ; VI, 34 (c.) ; VII, 362 ; VIII, 138, 178, 515 (c.) ; XIII, 376 (c.) ; XV, 253 ; XVII, 234, 485, 727 ; XVIII, 5 ; XIX, 4 ; XX, 55, 460, 511, 516 ; XXI, 54, 141 ; XXIII, 331, 917 ; XXIV, 826, 834 ; XXV, 39.
— — — Tumeurs, VIII, 303.
— — — Typhose aviaire, XXIII, 353.
— — — Variole, VIII, 199.
— — — Notes de géographie médicale de la section française de délimitation avec le Cameroun, VIII, 124, 199, 301, 515
— — — Filaires, VII, 619.
— — — Microfilaires, VII, 297, 619.
— — — Insectes piqueurs, III, 754 ; VII, 688.
— — — Mouches piqueuses, I, 254 ; II, 108 ; XIII, 377.
— — — Œstrides gastricoles et cavicoles, VII, 242.
— — — Trypanosomes d'oiseaux, VII, 296.
— **du Nord.** Voir aussi **Algérie, Maroc, Tunisie.**
— — Fièvres paratyphoïdes, VI, 598.
— — Jaunisse des bovidés, XIII, 456, 779.
— — Leishmaniose canine, IV, 40.
— — Theiléiriose bovine, XXV, 136.
— — Trypanosomiases animales, XIX, 321.
— — Typhus exanthématique. Identité des virus africain et balkanique, IX, 402.
— **occidentale française.** Voir aussi **Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée française, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan français, Togo** et ancienne division : **Haut-Sénégal et Niger.**
— — — Nosologie, XIX, 380.
— — — Béribéri, XIX, 390.
— — — Bilharziose, XVI, 368, 428.
— — — Cancer, XXV, 841.
— — — Dengue, XX, 320.
— — — Diphtérie, XXV, 837.
— — — Erysipèle, XXV, 840.
— — — Fièvre catarrhale du mouton ou blue-tongue, XVIII, 215.
— — — — jaune, XIX, 237, 380, 645 ; XX, 391, 707, 858 ; XXI, 70 ; XXV, 834.
— — — — ondulante, III, 490.
— — — — récurrente, XVIII, 679 ; XIX, 386.
— — — Filarioses, V, 438 ; VIII, 4.
— — — Ictères infectieux chez des tirailleurs de l'— à Gabès, XV, 348.
— — — Lèpre, XXIV, 708 ; XXV, 818.
— — — Luxations chez les indigènes, XVIII, 293.
— — — Malformations génitales, XVII, 333, 335.
— — — Méningite cérébro-spinale, XIX, 388.
— — — Œil (Affections de l'—), VIII, 404, 557.
— — — Oreillons, XXV, 837.
— — — Paludisme, XVI, 281, 368, 428 ; XVIII, 32 ; XIX, 388, 507 ; XXV, 842.
— — — Pelade, XVI, 428.
— — — Peste, XIX, 383 ; XXV, 796, 837.
— — — Pian, XX, 209.
— — — Piroplasmose de l'âne, V, 806.
— — — Pneumococcies, XIX, 388.
— — — Rachitisme, XVI, 428.
— — — Rage, XX, 404 ; XXIII, 167, 857, 888 ; XXIV, 154.
— — — — et oulou-fato, XXII, 635.
— — — Syphilis, XIX, 389 ; XX, 209 ; XXV, 841.
— — — Tétanos, XXV, 818, 840.
— — — Trypanosomiases animales, III, 377 ; V, 204, 544.
— — — — humaine, XIX, 389.
— — — Tuberculose, XIX, 389 ; XXIII, 533.
— — — — B. C. G., chez les nourrissons noirs, XVIII, 431.
— — — Tumeurs. Voir Cancer.
— — — Varicelle, XXV, 837.
— — — Variole, XIX, 385.
— — — Arthropodes recueillis en Haute-Guinée, VIII, 656.
— — — Chéromyies, VIII, 462 ; IX, 242.
— — — Insectes piqueurs, III, 754 ; IV, 396, 544 ; V, 204.
— — — Phlébotomes, VI, 124, 126.
— — — Stomoxydes. Biologie, IV, 544.
— — — Ver de Guinée, VIII, 4.
— — — Greffes animales, XVIII, 355.
— — — Recherche de la nicotine dans les vins, XIX, 951.
— — — Assistance des aliénés européens, XXI, 411.
— — — — — — indigènes, XXI, 335.
— — — Caisse de secours dans les villages, XIX, 943.
— — — Société médico-chirurgicale de l'— filiale de la Société de Pathologie exotique, XV, 283, 353.
— — — — Vœux sur la prophylaxie du paludisme, XVI, 368, 428.
— **orientale.** Affections intestinales parasitaires, XII, 141.

— — Affections des voies respiratoires, XII, 147.
— — Béribéri, XII, 156 (fig.).
— — Coccidiose du bétail, III, 293, 429.
— — Dysenterie bacillaire, XII, 141.
— — Fièvre récurrente, X, 786 ; XII, 154.
— — — typhoïdes, XII, 155.
— — Méningite cérébro-spinale épidémique, XII, 149.
— — Paludisme, VI, 639 ; XII, 137.
— — Pneumococcies, XII, 147.
— — Theilérioses, XVII, 637.
— — Observations médicales sur les troupes coloniales belges, XII, 139.
— — Chéromyies, XII, 106.
— — Diptères piqueurs, XVIII, 465.
— — Œstre du mouton, XVI, 17.
— **du Sud.** Anaplasmose, III, 135.
— — — du mouton, XVII, 651.
— — Trypanosomiase humaine, V, 26.
— — Trypanosome nouveau, II, 392.
— — Relation d'un voyage dans les colonies portugaises, XVII, 195.
Agalaxie contagieuse des chèvres en Algérie, X, 575, 677.
Agama colonorum parasité par les phlébotomes, VII, 83.
— — Filaire et microfilaire, VII, 121 (fig.).
Agglutination (Réaction d') dans le diagnostic des trypanosomiases, V, 611.
— et désagglutination des hématies dans la trypanosomiase humaine, X, 392.
— (Auto-) des hématies dans la piroplasmose canine, IV, 370.
— — — dans la spirochétose, III, 425.
— — — dans la trypanosomiase humaine, III, 438 ; V, 686 ; XX, 737.
— (Pseudo-) des hématies dans quelques affections à parasites sanguicoles, X, 484.
— des vibrions, XXIV, 907, 909.
Agouti et leishmaniose américaine, VI, 752.
Agramonte (Aristides). Éloge, XXIV, 625.
Agriculture au Chili, XIX, 168.
Ainhum à Bahia, IV, 692.
— à Bamako, IV, 364 ; VIII, 570.
— au Maroc, XXV, 322.
— au Ouadaï, VII, 525.
— chez une femme marocaine, XVII, 482 (fig.).
— Anatomie pathologique et pathogénie, VII, 371.
— Lésions osseuses, XV, 350 (pl.).
— — — ostéolyse, XXV, 323.
— et lèpre, XV, 648 (pl.).
— de la jambe ou syphilis ? XVIII, 470, 474.
Ailanthus globulosa dans la dysenterie, I, 77, 307.
Alastrim. Deux cas à Brazzaville, XII, 489.
— dans un détachement de tirailleurs sénégalais, XXI, 87.
— Exanthèmes à forme d'— dans la région de Tulear (Madagascar), XXIII, 346.
— et variole, IV, 35, 37 ; VI, 549 ; XVI, 676.
Albanie. Paludisme, X, 707, 804 ; XI, 470 (c.) ; XII, 266 ; XVIII, 320.
— Anophèles de Goritza, XI, 481.
— Moustiques en Basse- —, XII, 266.
— — des confins albano-macédoniens, XI, 492, 494, 496, 498, 500.
Albuminurie dans le paludisme, XXIII, 959.
Alcool dans le béribéri, III, 9.
Alcoolisme en Afrique, VII, 258, 362.
— en Algérie, dans la population scolaire indigène, IX, 773.
— aux colonies, II, 330, 345, 452 ; III, 175, 207, 287, 685.
— — Lettre du Ministre des Colonies, IV, 177.
— au Congo, II, 336 ; VIII, 308.
— à la Côte d'Ivoire, II, 337, V, 855.
— au Maroc, V, 747, 777 ; VI, 1, 5, 290.
— en Nouvelle-Calédonie, II, 334 ; III, 175.
— Analyse d'échantillons de spiritueux venant de Grand-Bassam, VII, 136, 137.
Alep (Bouton d'). Voir **Leishmaniose cutanée.**
Alépol. Voir **Chaulmoogra.**
Aleurisma apiospermum, agent d'un mycétome du pied, XIV, 285 (pl.) ; XVI, 755.
Alexine. Action de quelques substances médicamenteuses sur l'— du sérum, VII, 626.
Algérie. Voir aussi **Afrique du Nord.**
— Acariose, III, 39 ; IX, 771.
— Actinomycose, XXI, 197 ; XXIV, 85, 431.
— *Ægyptianella pullorum*, XXIV, 371.
— Agalaxie contagieuse, X, 575, 677.
— Alcoolisme, IX, 773.
— Anaplasmose ovine, XVII, 784.
— Ankylostomiase, III, 449.
— Blastomycose, XIX, 586 (fig.).
— Boukhchem, XIII, 841.
— Chancre mou, III, 39.
— Charbon bactéridien, V, 306 ; IX, 79.
— Choléra, V, 790, 792.
— Clavelée, VII, 506.
— Coccidiose des voies biliaires d'un lézard, XXIII, 186.
— Conjonctivites, VI, 634 ; VII, 18, 424 ; VIII, 67 ; X, 521 ; XI, 578.
— Debab, I, 22, 25 ; III, 478 ; VIII, 68, 70 ; IX, 480 ; XI, 368.
— Distomatose humaine, XXII, 673.
— Éléphantiasis streptococcique, V, 57.
— Épithélioma, VI, 133.

— Fièvre bilieuse hémoglobinurique du bœuf, XII, 108, 202.
— — ondulante, I, 18, 62, 193 ; IV, 94, 106 ; VI, 672 ; IX, 351 ; XXII, 412.
— — récurrente, I, 174 ; IV, 435, 438, 440 ; VIII, 67 ; IX, 479 ; X, 532, 692.
— Filariose, I, 472.
— Gingivites, II, 282.
— Goitre, V, 122 (c., pl.), 299 (c.) ; IX, 344, 345.
— Infantilisme, XI, 839.
— Jaunisse des bovidés, XII, 108, 202 ; XIII, 456.
— — et piroplasmoses, XIII, 779.
— Leishmaniose canine, III, 510 ; V, 89, 93 (pl.) ; XVII, 360.
— — cutanée, II, 88, 298, 388, 548 ; XV, 440 ; XVI, 92 ; XVII, 886 ; XVIII, 249, 485.
— — — chez le chien, XVII, 360.
— — interne, IV, 346, 554 ; V, 93 ; VII, 42 ; IX, 694 ; XVII, 778.
— Lèpre, I, 173, 383, 594 ; II, 341 ; III, 59 ; XI, 433 ; XII, 64 ; XIV, 15.
— Mélanodermie, VII, 216.
— Mycétomes, XIV, 285, 337 ; XV, 379 ; XVIII, 755 ; XX, 11, 502 (fig.).
— Myiases, VI, 487.
— — cutanée, XVI, 415.
— Nodosités juxta-articulaires, XIII, 738.
— Ophtalmies. Voir aussi Conjonctivites.
— — Lutte contre les —, X, 486 ; XI, 304.
— Paludisme, I, 248, 346, 437, 534 ; II, 38, 162 ; III, 6, 474 ; VII, 418 ; VIII, 67 ; IX, 470, 504 ; X, 548 ; XI, 839 ; XII, 504 ; XVIII, 30, 546, 554 ; XIX, 96, 185 ; XXV, 133.
— Parasitisme intestinal, VII, 301 ; IX, 795.
— — — et paludisme chronique des enfants indigènes, XVIII, 546.
— Pellagre, I, 383 ; VI, 198.
— Peste, I, 111, 367 ; III, 59 ; IV, 549 ; XXII, 193, 200.
— — porcine, V, 581.
— Piroplasmoses bovines, VI, 648, 662 ; VII, 699 ; XIII, 779, XVI, 6, 23 ; XVIII, 721 ; XXI, 846.
— — équines, VI, 571.
— — ovines. Voir aussi Anaplasmoses.
— — — XV, 789 ; XX, 71 ; XVII, 122, 784 ; XVIII, 140 (fig.).
— Rhinosclérome, II, 66.
— Spirochétose aviaire, XIX, 419.
— — canine, XVIII, 702.
— — humaine, XVI, 392.
— Sporotrichose humaine, XXV, 297.
— Syphilis, III, 59.
— Teignes, VII, 554 ; XI, 350 ; XXI, 729 ; XXII, 60, 299 ; XXIII, 170, 363 ; XXIV, 177 ; XXV, 101, 694.
— Trypanosomiases animales. Voir aussi Debab.
— — — V, 274 ; XVII, 131.
— — — naturelle du chien, XV, 549.
— Tuberculose, I, 337 ; VIII, 250, 425 ; IX, 425 ; X, 860 ; XII, 353, 589 ; XXI, 493.
— Tumeurs. Voir aussi Épithélioma, Mycétomes.
— — I, 593 ; VI, 133, 714 ; XII, 184.
— Typhus exanthématique, II, 342.
— Ulcération récidivante des lèvres, XII, 214.
— Ulcère phagédénique, I, 303.
— Mœurs et médecine des Touareg de l'Ahaggar, XXIV, 4.
— Tatouages, I, 383.
— Acridiens. Destruction, VII, 651 ; VIII, 634 ; IX, 679.
— Anophélines dans le Sud-Oranais, III, 471.
— Bacilles para-dysentériques isolés en —, X, 438.
— — pseudo-dysentériques et affections intestinales, IX, 204.
— *Bullinus contortus*, XVIII, 267.
— Champignons des teignes, VII, 554.
— Hémogrégarines des bovidés, XI, 274.
— — du chien, V, 16.
— — des sauriens, I, 301, 595 ; II, 506.
— — de *vipera lebetina*, XI, 278.
— Invertébrés du Sud-Oranais, III, 481.
— Moustiques. Voir aussi Anophélines.
— — I, 172, 437 ; III, 471.
— — du Sud-Constantinois, VII, 418.
— Mammifères du Sud-Oranais, III, 481.
— Oiseaux du Sud-Oranais, III, 481.
— *Ornithodorus marocanus* dans le Sud-Oranais, XXII, 436.
— — — Répartition géographique, XXII, 436.
— — *savignii*, XVI, 741.
— *Pediculoïdes ventricosus*, I, 177 ; III, 39 ; IX, 771.
— Phlébotomes, V, 511, 780 ; VII, 660 ; IX, 486 ; X, 564 (fig.) ; XI, 791.
— — et bouton d'Orient, XV, 80.
— Puces des rats, I, 113 (c., fig.), 367.
— Rats. Espèces et variétés, I, 111.
— Spirochètes des rats, XI, 337.
— Tiques. Voir aussi *Ornithodorus*.
— — XXI, 520 (fig.).
— *Trypanosoma theileri*, IV, 40.
— Éosinophilie chez les indigènes du Sud-Oranais, III, 476.
— Importation en France des moutons d'— et préservation contre la clavelée, VII, 506.
— Exploration scientifique du Sud-Constantinois, VII, 416 (c., fig., pl.).
— Laboratoire de Beni-Abbès. Fonctionnement, VIII, 66 ; IX, 469.
— Quinine. Réglementation de la délivrance, I, 534.
— Troupes noires, III, 114, 209, 289, 346, 409.

Aliénés à Dakar en 1931, XXV, 820.

Alimentation naturelle de l'homme, XVIII, 368.
— Déséquilibre de l'— dans les pays exotiques, XXIV, 421.
— Rôle des phosphates naturels dans l'étiologie du darmous du mouton, XXIV, 848 (fig.).
— et béribéri. Voir **Béribéri.**
— et huile de palme purifiée, XXV, 965, 967.
Allemagne. Etat sanitaire dans un camp de prisonniers, VIII, 547.
— *Toxoplasma canis*, IV, 617.
Allocution de M. Laveran, Président, I, 1 ; II, 1 ; III, 1 ; IV, 3 ; V, 7, 163 ; VI, 3, VII, 4, 649 ; VIII, 5 ; IX, 1 ; X, 4 ; XI, 4, 777 ; XII, 3.
— — Président sortant, XIII, 1.
— de M. Calmette, Président, XIII, 6, 621 ; XIV, 1 ; XV, 1 ; XVI, 1.
— — Président sortant, XVII, 1.
— de M. Mesnil, Président, XVII, 4 ; XVIII, 1 ; XIX, 1 ; XX, 1.
— — Président sortant, XXI, 2.
— — à Constantine, XXIII, 886.
— de M. Marchoux, Président, XXI, 5 ; XXII, 2 ; XXIII, 2 ; XXIV, 2.
— — Président sortant, XXV, 1.
— de M. Brumpt, Président, XXV, 4.
— de M. C. Mathis, Président de la Société médico-chirurgicale de l'Ouest-Africain, XVIII, 106 ; XIX, 63, 375 ; XX, 88, 1020 ; XXI, 67 ; XXII, 729 ; XXIII, 100.
— de M. Heckenroth, Vice-Président de la Soc. médico-chirurgicale de l'Ouest-Africain, XVII, 273.
— de M. le Médecin-Inspecteur Général Lasnet à la Soc. —, XIX, 65, 378.
— — Président d'honneur de la Soc. —, XX, 1022.
— de M. le Colonel-Médecin A. Damas-Mora à la Soc. —, XIX, 376.
— de M. Sorel, XX, 1021.
— de M. A. Pettit, XX, 1024.
— de M. Thiroux, Président d'honneur de la Soc. des Sciences médicales de Madagascar, XXI, 267.
— de M. Rencurel, Vice-Président de la Soc. —, XXI, 268.
Altitude. Influence sur le paludisme, II, 572.
Ambocepteurs et arsénobenzol, VII, 633.
Amérique du Nord. Voir aussi **Saint-Pierre et Miquelon, Terre-Neuve.**
— — Microfilaire d'un oiseau (*Merganser serrator*) de Terre-Neuve, Anticosti, Saint-Pierre et Miquelon, XIII, 652 (fig.).
— **centrale.** Voir **Antilles, Costa-Rica. Guatemala, Panama.**
— **du Sud.** Voir aussi **Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Guyane, Paraguay, Pérou, Venezuela.**
— — *Cellia*, XVII, 132.
— — Leishmaniose, IX, 215.
Amiana et éruption hansénoïde, XXIV, 166.
Amibes. Voir aussi *Lœschia.*
— en Annam, VI, 678.
— dans le papier annamite, I, 297.
— dans les selles à la Côte d'Ivoire, IV, 117.
— intestinales au Gabon, XV, 574.
— Cultures, II, 247, 370, 568 (fig.) ; V, 135, 180 (fig.) ; VI, 149 ; XVIII, 121, 517 ; XXII, 768.
— — Transport, XXV, 207, 211.
— cultivables parasites de l'intestin de l'homme. Forme culturale dans l'intestin. Classification, XV, 229 (fig.).
— Latence prolongée. Porteurs d'—, II, 78.
— dans quelques diarrhées et dysenteries rebelles, IX, 293.
— Rôle parasitaire et rôle pathogène d'une petite —, VI, 560.
— et chytridinées, XVIII, 18 (fig.).
— et phagédénisme cutané, V, 216, 799.
— et toxémie intestinale, XVIII, 179
— de la bouche et hématophagie, XXIII, 177.
— de la bouche des singes, XXIII, 711.
— des crachats et — des urines chez le même malade, XIX, 92.
— iodophiles chez le porc en France, XIV, 321 (fig.).
— non iodophiles chez les porcs en France, XV, 390 (fig.).
— Abcès extra-péritonéal dû aux — et simulant l'appendicite, XVIII, 704.
— des plantes à latex, XV, 197, 287 (fig.), 393 (fig.), 399 (fig.), 784 (fig.).
— — inoculables au chat, XV, 931.
— — déterminant expérimentalement des abcès du foie chez la souris blanche, XVI, 162 (fig.).
— Action du latex, XVI, 261.
— de la dysenterie, I, 104 ; II, 78 ; V, 135, 216, 468 ; VI, 313, 413, 424, 491, 614.
— — Diagnostic, VI, 149.
— dysentériques et bacille dysentérique, V, 263, 468 ; VI, 679.
— — L'— est-elle bien la cause de la dysenterie ? XI, 837.
— — humaine. Eclosion des kystes et premier stade de l'— chez le chat, X, 834.
— — Recherche du fer chez l'— hématophage, XXI, 369.
— — et émétine. Phénomène biologique, VIII, 573.
— — Histolyse par l'émétine, X, 445.
— intestinales des selles. Coloration, XII, 71.
— — de l'homme. Kystes, X, 799.
— — — Le supposé chromidium des kystes des ent., X, 536, 791, 799, 866.
— — — Enclaves kystiques des ent., XI, 66.
— — — Schizogonie des ent., X, 311.

— — du rat, XII, 635.
— — des singes, XX, 19.
— et émétine, VI, 313.
— Abcès hépatiques amibiens guéris par l'émétine, XV, 537.
— émétino-résistantes, XIII, 115.
— *Amœba coli* et émétine, X, 539.
— *limax* (*Vahlkampfia*, n. gen.) dans l'intestin humain, V, 135 (pl.).
— *Entamœba belostomæ* n. sp., XV, 132 (fig.).
— — *coli* à Petrograde pendant les épidémies de 1919, 1921, XVIII, 186.
— — *cuniculi* n. sp., XII, 631.
— — *dispar*. Individualité, XIX, 399.
— — *dysenteriæ*. Kystes à plus de quatre noyaux (?), X, 165, 799 (fig.).
— — — Essais de culture, XXII, 768.
— — — chez le cobaye. Caractères de l'infection, XI, 23.
— — — chez le rat, XII, 635.
— — — XIII, 112.
— — *gingivalis*, var. *simiæ*, nov. var., XXIII, 712 (fig.).
— — *histolytica*. Morphologie et valeur diagnostique de l'infection rectale des chats, X, 13 (fig.).
— — *phagocytoïdes* = *Endolimax phagocytoïdes*, XV, 229.
— — *ranarum*. Kystes gamogoniques et schizogoniques, XI, 47.
— — *tenuis*, XII, 628.
Amibiase au Congo belge (Ouellé), VIII, 742.
— à la Guyane française, IX, 396 ; XXII, 571.
— au Soudan français, XVII, 944.
— Valeur diagnostique de l'infection rectale des chats, X, 13.
— Rôle des mouches dans la dispersion, XI, 166.
— latente. Porteurs d'amibes, II, 78.
— Meilleur traitement actuel, X, 23.
— et émétine, VII, 142, 303, 405, 659 ; VIII, 332 ; IX, 325 ; X, 23 ; XVI, 263 ; XIX, 176 ; XXI, 883 ; XXV, 421, 425.
— et novarsénobenzol, IX, 325, 510.
— et stovarsol, XVII, 535.
— associée au paludisme, XVI, 304.
— — Traitement, X, 329.
— bronchique, XVIII, 553.
— — guérie par l'émétine, XIX, 176.
— cérébrale, XXI, 231.
— généralisée, XIX, 88.
— hépatique à l'Armée d'Orient, X, 611.
— — — Forme fruste, X, 17.
— — autochtone en France. Abcès du lobe gauche, X, 696.
— — primitive. Forme fruste, XVI, 241.
— — Hémorragies intestinales et hématémèses, symptômes d'hépatite suppurée, XI, 800.
— — et émétine, XXV, 421 (fig.), 425.
— — Association de bacilles de Koch, VII, 475.
— intestinale en Annam, XIII, 602.
— — au Cameroun, XII, 252.
— — en Grèce (Salonique en 1918), XIII, 112.
— — à la Martinique, IV, 393.
— — en Russie, X, 125.
— — Diarrhée noire, VI, 567.
— — chronique. Diagnostic, IX, 125.
— — chez l'enfant. Signe précoce, XXV, 947 (fig.).
— — chez le chien, XIII, 161.
— — Epizootie chez le cobaye paraissant due à l'—, XI, 163.
— — du cobaye à *Entamœba dysenteriæ*, XI, 23.
— — du cobaye à *Entamœba dysenteriæ*. Réalisation expérimentale, X, 794.
— — Traitement par l'iodure double d'émétine et de bismuth, X, 247.
— — — par le Yatrène, XXI, 842.
— — émétine et novarsénobenzol, IX, 325.
— — Prophylaxie par l'ipéca total glutinisé, X, 868.
— pulmonaire. Abcès amibien du poumon gauche, XIX, 884.
— — compliquant une bronchite chronique, XVII, 21.
— — Fistule entéro-pulmonaire, XX, 213.
— urinaire, XVIII, 478.
— — en Egypte, XVII, 816.
— — Cystite amibienne, XI, 685 ; XXIII, 457, 458.
— — et amibes des crachats. Expérimentation sur le chat, XIX, 92.
— — Troubles uréo-génitaux guéris par l'émétine, XXI, 883.
Amiphène dans la dysenterie amibienne, XXIV, 28.
Amœba chlorodonis, n. sp., XV, 393 (fig.).
— *lactucæ*, n. sp., XV, 784 (fig.).
Anaérobies (Microbes) des plaies de guerre au Maroc, XIX, 106.
Anaphylaxie. II, 163.
— Nécrotuberculose et sensibilisation par bacilles tuberculeux morts, I, 420.
— et hémoglobinuries, V, 521 ; VII, 509, 549.
— et trypanosomes, IV, 671.
— à la quinine. Variations suivant la voie d'absorption, XIII, 394.
— — Anti- et désensibilisation, XIII, 556.
— locale à l'émétine, XV, 680.
Anaplasma des hématies de mammifères ; signification, VII, 580.
— *argentinum*, XIII, 453 (fig.) ; XIV, 449.
— — et — algérien, XXI, 378.
— — Passages chez le mouton, XVII, 642, 647.
— *centrale*, XIII, 453.
— *marginale*, n. g., n. sp., III, 135 ; VI, 573 ; XIII, 499 (fig.).
— — Modifications subies par le pas-

sage du bœuf au buffle, XXIV, 820.
— *ovis*, n. sp., XVII, 784.
Anaplasmes, piroplasmes et grains chromatiques, XII, 558.
— Isolement et recherche par inoculation du sang suspect au mouton et à la chèvre, XII, 774.
— Évolution dans le sang des bovidés, XIII, 19.
— des bovidés et leurs hôtes vecteurs, XIII, 416.
Anaplasmoses en Afrique du Sud, III, 135.
— en Indochine, XXIV, 104.
— au Turkestan, X, 310.
— en Turquie, X, 723.
— bovine. Inoculation de *An. argentinum* à plusieurs espèces animales. Réceptivité des moutons et des chèvres, XII, 774.
— — et *Boophilus decoloratus*, III, 137.
— — Inoculation au mouton, XVII, 295, 639, 642, 647.
— — Vaccination des bovidés par un anaplasme atténué dans l'organisme de la chèvre et du mouton, XII, 765.
— — Vaccination des bovidés par inoculation de sang de mouton et de chèvre infectés par passages successifs, XIV, 449.
— — Traitement par le « 205 Bayer », XV, 619.
— — au Chili, XVII, 639.
— — en Russie, XXI, 642.
— — du *Bos brachycerus* d'Angola, XVI, 167.
— — chez les zébus à Madagascar, XXIV, 969.
— — et helminthiase, XXV, 175.
— des chèvres en Russie, XXIII, 382.
— du mouton dans l'Afrique du Sud, XVII, 651.
— — en Algérie, XVII, 784.
— — au Piémont et en Sardaigne, X, 143.
— — en Russie, XXII, 423.
Anémie et ankylostomiase, II, 97.
— grave traitée par la ventriculine, XXIV, 473.
— — Traitement par le foie de veau, XXV, 789.
— pernicieuse paludéenne, XXIV, 912.
— de type pernicieux accompagnant une splénomégalie tuberculeuse primitive, XXIII, 16 (fig.).
— spléniques infantiles de cause inconnue, VII, 480 ; IX, 128.
— tropicales. Injections d'oxygène, VI, 130, 276 (fig.).
— progressive des bovidés de Cochinchine, XVI, 575.
— des équidés au Maroc. Étude clinique et expérimentale, XVI, 525, 634.
— pernicieuse du cheval au Maroc. Persistance du virus chez les animaux guéris, XVI, 300.
Anencéphalie. Photographie d'un cas, XXV, 797.
Ânes. Lait d'ânesse dans l'alimentation des nourrissons malades au Sénégal, XVIII, 507.
— Blastomycose oculaire, XVI, 478 ; XVII, 543, 545, 551 (pl.) ; XVIII, 124 (fig.), 127, 231.
— Diarrhée cholériforme, I, 240.
— *Gastrophilus asinus* au Congo belge, IX, 763.
— Microfilaires au Turkestan, IX, 220 (fig.).
— Mycétome du poumon, VIII, 11.
— Nuttaliose au Turkestan, X, 310.
— — en Turquie, X, 723.
— Piroplasmose en A. O. F., V, 806.
— — Réceptivité à *P. caballi*, XIX, 546.
— Trypanosomiases, I, 272, 522 ; III, 478 ; VII, 187.
Anesthésie. Accident mortel de rachi-, XVIII, 294.
Anévrisme de l'aorte abdominale, XVI, 149 ; XXV, 1108.
d'Anfreville de la Salle. Éloge, XXV, 186.
Angine de Vincent, XVIII, 304.
— — Épidémie, XIV, 631 ; XVI, 236.
— — Traitement par le stovarsol, XVII, 530.
— **pesteuse,** XXIV, 164.
Angola. Anaplasmose du *Bos brachycerus*, XVI, 167.
Anguille. Absence de kyste de Carini, VI, 271.
Anguillule intestinale de Cochinchine, VI, 262.
— — de l'homme au Sénégal, XIII, 588.
— parasites de l'homme en Guyane, XIV, 124.
— stercorale chez les singes, I, 181.
— dans l'urine, IX, 533.
Anguillulose en Cochinchine, VIII, 208, 245 ; IX, 15.
— Considérations cliniques, XVIII, 826.
Ankylostome à la Guadeloupe, VII, 71.
— Importance des papilles cervicales, XIII, 539.
— Larves d'— réalisant une tuberculose latente par leur passage dans le parenchyme pulmonaire, XXII, 26.
Ankylostomiase en Algérie, III, 449.
— en Annam, VI, 343 ; XIII, 599.
— au Cameroun (Douala), XI, 751 ; XII, 244.
— en Chine occidentale, VI, 704.
— en Cochinchine, III, 315.
— en Colombie, II, 603.
— à la Grande-Comore, VI, 435.
— à la Côte d'Ivoire, III, 742, 745 ; IV, 117.
— en Géorgie, XIX, 891.
— en Haute-Guinée, V, 843.
— en Guyane française, II, 443, 448, 423 ; IX, 397 ; XIII, 603 ; XIV, 89.

— en Indochine, III, 32, 315.
— à la Martinique, III, 27, 30 ; IV, 391.
— en Nouvelle-Calédonie, V, 192.
— à Panama, IV, 334.
— en Tunisie, particulièrement chez les géophages, I, 600.
— en Turquie, XVIII, 265.
— et géophagie, XII, 322.
— Diagnostic, XII, 92.
— Anémie avec fragilité globulaire et ictère hémolytique, II, 97.
— Résistance globulaire, X, 177.
— maligne, II, 418.
— des mineurs, III, 59.
— Recherches cliniques et expérimentales, I, 229.
— Thérapeutique et prophylaxie, XVI, 98.
— Traitement par la chrysémine, XXII, 23.
— — par le tétrachlorure de carbone, XVII, 147 ; XIX, 719.
— — Observations relatives au —, XV, 127.
— Moyens d'empêcher l'infestation du sol par les larves d'ankylostomes, XVII, 303.
— et béribéri, III, 18, 315, 742.
— — en Guyane française, XIII, 603.
— Traité de Looss, VII, 463.
— du chien, III, 58.
Ankylostomum duodenale et *Necator americanus*, XIV, 89, 159.
Annam. Voir aussi **Indochine.**
— Ankylostomiase, VI, 343 ; XIII, 599.
— Blastocystose, XIII, 602.
— Bouffissure, XIX, 207, 302.
— Charbon symptomatique, XIII, 98.
— Clavelée, XXIII, 804.
— Coccidiose intestinale humaine, XIX, 95.
— — des ruminants, XIV, 380.
— Diarrhées, XIII, 60.
— Distomatose, II, 488 ; XIII, 601.
— Dysenterie amibienne, VI, 678 ; XIII, 602.
— Filariose des bovins, V, 109, 115, 623.
— — du chien, IV, 478, 485 ; V, 622 ; VI, 89.
— — du porc, V, 623.
— Helminthiase, II, 488.
— — du porc, IV, 693.
— Méningite cérébro-spinale, XVI, 712.
— Mycose. Rhizopus pathogène de l'homme, VII, 430.
— Myiase (Naso-), XVII, 375.
— Nodosités juxta-articulaires, XIII, 554.
— Paludisme, I, 539 ; IV, 631 ; VI, 730 ; XV, 674 ; XVI, 361 ; XIX, 335, 845 ; XXI, 26 ; XXIV, 724.
— Parasitisme intestinal, VI, 343 ; XIII, 596.
— Peste, X, 41.
— Piroplasmose équine, IV, 39 ; X, 871.
— Sparganose oculaire, XIII, 215.
— Spirochétose bovine, III, 73.
— Trachome, XVI, 299.
— Tuberculose, IV, 550 ; V, 234.
— Typhus exanthématique, XX, 318.
— — (Pseudo-), XVI, 105.
— Enquête épidémiologique et entomologique à Yaback, XIX, 845.
— Moustiques, XIX, 472, 703, 851 ; XXIII, 763.
— Protozoaires dans le papier annamite, I, 297.
— Hygiène, XVI, 361.
— Eaux bicarbonatées sodiques, III, 549.
Annamites (Tirailleurs). Traitement de la pneumonie par les injections intraveineuses d'or colloïdal, IX, 275.
— de Cochinchine. Pathologie, XVII, 434.
— — Adénopathies iliaques primitives, XVII, 67 (fig.).
— — Tension artérielle et viscosité sanguine dans le béribéri, XVIII, 475.
Anniversaire. 25e — de la chaire magistrale du Professeur Miguel Conto à Rio de Janeiro, XIX, 321.
— 25e — de la Société de Pathologie exotique, XXV, 187, 861, 1014.
Anophèles. Voir aussi **Moustiques,** *Pyretophorus.*
— d'Abkasie (Géorgie), XVIII, 341.
— de Goritza (Basse-Albanie), XI, 481.
— en Argentine. Mœurs et conditions de gîtes dans la ville de Famailla (Tucuman), XIV, 506 (pl.).
— de Tchentou (Chine), I, 227.
— en Cochinchine, XIX, 806.
— — Répartition annuelle, XXV, 920.
— au Congo belge, XX, 181, 185 ; XXV, 886.
— de la Corse, XVIII, 635.
— — Gîtes, XIV, 707.
— dans le delta du Danube, XX, 801 (c.).
— en France, dans les Ardennes, XIII, 75.
— — dans l'arrondissement de Bergerac. Répartition des gîtes, XII, 332.
— — à Bordeaux, III, 663.
— — dans la Basse-Normandie, XVIII, 659.
— — dans la XVIIe région (Toulouse). Répartition des gîtes, XII, 779.
— du Katanga, XX, 181, 185.
— en Russie. Revision, XIX, 896.
— au Sénégal, à Dakar en 1931, XXV, 809.
— dans le Sud-Oranais, III, 471.
— à Lataquié (Syrie septentrionale), XVII, 653.
— au Tonkin, III, 632 ; XXV, 976.
— — (à Chapa), XXV, 245.
— — Gîtes larvaires types, XXV, 639 (pl.).
— brésilien nouveau, II, 163.
— Faune anophélienne d'altitude, XXV, 770.

— Écologie. Rôle du calcium, XXIII, 34.
— — Rôle de la réaction du milieu, XXIII, 38.
— Relation entre la biologie et la constitution physico-chimique des tourbières et le stationnement des larves d'—, XX, 192, 271, 811.
— Influence des vents sur les larves, IV, 326.
— Concurrence larvaire et peuplements anophéliens, XXV, 428 (fig.).
— Durée larvaire, XXIV, 923.
— dans l'eau salée, I, 172.
— Salinité des gîtes et variations de taille des —, XX, 371.
— Plankton des gîtes et variations de taille des —, XX, 375.
— Signification du nombre relatif des mâles dans les abris des — adultes, XX, 124.
— Races zoophiles, XV, 36.
— Déviation anophélienne par les peuplements humains et animaux, XVIII, 728.
— Étude comparée des substances larvicides, XXIII, 402, 797.
— Infection expérimentale de larves par champignons entomophytes, XXIII, 1025.
— Flagellé et trématodes parasites, XI, 546.
— et paludisme, I, 437 ; XVI, 86, 481, 485.
— — dans la région d'Amsterdam. Fréquence saisonnière des — impaludés, XV, 116.
— — au Cambodge oriental, XXV, 920.
— — dans la région de Chaudoc (Cochinchine), XIX, 306.
— — en Cochinchine, XXV, 920.
— — en France, XV, 30, 36.
— — — en Haute-Alsace, XI, 848.
— — — en Argonne, XII, 23.
— — — en Savoie. Adaptation zoophile des —, XIV, 564.
— — en Macédoine en 1916, X, 323, 890.
— — La différenciation des races zootropiques d'— et la régression spontanée du paludisme, XIV, 577.
— — Infection palustre chez l'—. Indice sporozoïtique, XIV, 702 (c.).
— — Réceptivité des — d'Indochine au paludisme du Tonkin, XXIV, 949, 958 (fig.).
Anopheles aitkenii, XXV, 781 (fig.).
— *bifurcatus* en Argonne, XII, 28, 30.
— — capturé dans la Côte-d'Or, X, 679.
— — Répartition des gîtes, XII, 178.
— *chaudoyei*, XII, 53, 182.
— — Larve, XI, 291, 549.
— *gigas*, var. *baileyi*, XXV, 775 (fig.).
— *harwari* en Cochinchine, XXII, 283.
— *hyrcanus* en Cochinchine. Répartition annuelle, 920.
— *jeyporiensis* var. au Tonkin, XXIV, 958 (fig.).
— *lindesaii*, XXV, 771 (fig.).
— *maculipennis* en Argonne, XII, 28, 30.
— — capturé à Paris, IX, 203.
— — Biologie, XXIII, 795.
— — Indice maxillaire, XXIII, 43, 47.
— — Armature maxillaire en pays paludéen, XV, 29, 36.
— — Adaptation zoophile. Différenciation maxillaire et fécondité, XXIV, 203 (fig.), 229 (fig.).
— — Zoophilie de l'— en Ukraine, XXI, 322.
— — Répartition des gîtes, XII, 178.
— — Modes d'hibernation, XVIII, 405.
— — Hibernation et semi-hibernation, XXIII, 836 (fig.).
— — Variations trophiques et biologiques des peuplements, XXV, 755.
— — Réaction actuelle du milieu dans l'écologie des —, XXII, 584 (fig.).
— — Origine des variations de taille de l'— dans les Pays-Bas, XX, 366.
— — Nourriture des larves en rapport avec le problème de la variété *atroparvus*, XXI, 551, 687, 797.
— — var. *atroparvus*, n. var., XX, 389.
— — — Hibernation, XXIII, 846.
— — Infection de mammifères par *Crithidia fasciculata* d'—, VII, 605 (fig.).
— *minimus*. Infection saisonnière au Tonkin, XXV, 977.
— *nigripes* en Abasie (Géorgie), XIX, 337.
— — en France, XI, 669, 676, 726, 728.
— — — en Argonne, XII, 28, 30.
— — (*plumbeus*). Biologie. Comportement larvaire, XXV, 763 (pl.).
— (*Lophoscelomyia*) *annandalei*, var. *djajasanensis*, n. var., XIX, 804.
Anophélinés au Maroc, X, 605.
— transmettant l'infection palustre au Tonkin, II, 577 ; III, 632.
— Nouveau genre brésilien, II, 162.
— Nouveau type larvaire du groupe, XI, 669, 676.
— *Bironella gracilis*. Description et biologie, XV, 305.
— *Cellia* sud-américaines, XVII, 132.
— *Myzomyia aconitus*, vecteur du paludisme en Cochinchine, XXIV, 554 ; XXV, 920.
— — *karwari* en Cochinchine, XXII, 283.
— — *ludlowi* et *M. rossi*. Rapports XV, 120.
— — *minimus* en Cochinchine, XXIV, 554 ; XXV, 920.
— *Neocellia maculata* en Cochinchine, XIX, 679, 703.
— *Pyretophorus atheniensis*, XXIV, 129 (fig.).
— *chaudoyei*, XI, 291, 549 ; XII, 53, 182.
— — *costalis* au Congo, X, 705.
Anoplocephala manubriata, n. sp. de l'éléphant d'Asie, VII, 80 (fig.).

Anticorps immunisant les spirilles *in vitro*, III, 353.
— immunisant les trypanosomes, III, 368.
— chez les animaux trypanosomés, VI, 699.
Antilles. Voir aussi **Guadeloupe, Martinique, Porto-Rico.**
— Alcoolisme, II, 334.
— Bilharziose, VII, 367.
— Eléphantiasis, I, 473.
— Filariose, VII, 368.
— Lèpre, III, 412.
— Lymphangite endémique des pays chauds, I, 473.
— Myiases, VII, 367.
— Pellagre, VII, 367
— Pian, VII, 367.
— Photographies concernant les maladies exotiques des —, VII, 367.
Antilope. Œstrides, VIII, 453.
— Parasites sanguicoles, XXII, 651 (fig.).
— Larve de porocéphale, VII, 502.
— de l'Ouellé. Infection à *Theileria mutans*, IX, 95.
Antimoine. Voir aussi **Émétique, Luargol.**
— dans la bilharziose, XV, 695.
— dans la fièvre récurrente, I, 613.
— dans la spirochétose des poules, I, 613.
— dans la syphilis, I, 613.
— Suspensions huileuses (Métoléine) dans les trypanosomiases, VIII, 28.
— (Oxyde d') dans la leishmaniose américaine, X, 381 ; XI, 372.
— colloïdal dans la lèpre, XX, 774.
— — dans la trypanosomiase humaine, XIII, 27.
— (Sels d') dans la dracunculose, XV, 809 ; XX, 395.
— — dans la leishmaniose interne, XVII, 477, 778.
— — Stibyl dans la leishmaniose interne, XVIII, 669 (c.).
— — (Sulfure d') dans la trypanosomiase des chevaux, XI, 448.
— — Kermès dans la dracunculose, XX, 395.
— — — dans la lèpre, XVII, 761.
— — dans les trypanosomiases animales, XX, 541.
— — Antimosan dans le paludisme, XIX, 182.
— — — dans la theilériose bovine, XXV, 136.
— — — dans la trypanosomiase humaine, XIX, 688.
— — — et stibényl dans le granulome vénérien, XXI, 361.
— — *Smalarina cremonese* dans le paludisme, XIX, 431
— — Stibosan ou « 471 » dans la trypanosomiase humaine, XIX, 193.
— Stibényl et antimosan dans le granulome vénérien, XXI, 361.
— Action de quelques composés organiques sur l'infection à *Trypanosoma congolense*, XXV, 68.
— Composés organiques dans le surra expérimental, XXV, 354.
— — — associés au 205 Bayer-309 Fourneau contre *Tryp. congolense*, XXV, 71.
— — — — — — dans le surra expérimental, XXV, 354.
Antivirus Besredka dans une infection utérine, XXII, 497.
— — dans une pyodermite rebelle, XXII, 731.
Apiroplasmine. Voir **Arsenicaux.**
Apocynées. Flagellose, XV, 109.
— Flagellé parasite d'*Acocanthera venenata*, XVIII, 251 (fig.).
Appendicite chez un noir, XXIII, 996.
— du gorille, I, 556 (fig.).
— et helminthiase, II, 606.
Aprocta crassa, n. sp., III, 152.
— *matronensis*, n. sp., III, 154.
Arachnides. Voir aussi **Acariens, Linguatules.**
— Récolte du venin, VII, 520.
— Propriétés hémolytiques, fermentatives et toxiques des extraits d'araignée, XI, 217.
— de la région de Tadla (Maroc), XIX, 560.
— *Glyptocranium gasteracanthoïdes*, araignée venimeuse du Pérou. Étude du venin, XI, 136 (fig.).
— *Latrodectus mactans* ou « Lucacha », araignée du Pérou. Étude clinique et expérimentale de l'action du venin, XII, 702.
Archives des Instituts Pasteur d'Indochine, XVIII, 602
Argan. Toxicité du tourteau, XXII, 341.
Argasinés. Voir aussi *Ornithodorus*.
Argas americanus, échantillons, I, 317.
— — dans la fièvre récurrente, II, 117, 245.
— *persicus* dans la fièvre récurrente, I, 175.
— — dans la lèpre, IV, 246.
— — et spirochétose des poules, II, 285, 288, 292 ; XIX, 419.
— — en Russie d'Europe, V, 39, 120.
— — et peste aviaire, V, 165.
— *vespertilionis* au Cambodge, XXI, 328.
— et spirochètes, V, 63, 796.
Argent. Électrargol et collargol dans la peste pulmonaire, XXI, 600.
— Protargol dans la piroplasmose bovine, XIX, 41, 789.
— (Sels d') dans la babésiellose bovine, XIX, 14, 16, 34, 41, 887 ; XX, 595.
— — dans la lèpre, XX, 58.
— — Ichtargan dans la coccidiose des bovidés, XX, 588.
— — — dans la piroplasmose bovine, XVIII, 51 ; XIX, 14, 16.
— — — — — (babésiellose), XXIV, 939.

Argentine (République). Fièvre jaune, XXV, 862.
— — ondulante, XXV, 145.
— Anophèles, XIV, 506.
— (Société). Quatrième réunion, XXI, 603.
Armée d'Orient. Amibiase, X, 611.
— — hépatique, X, 17.
— Dysenteries à Salonique en 1918, XIII, 141.
— Grippe, XI, 738.
— Leishmaniose cutanée, XI, 57, 59.
— Paludisme, X, 184, 208, 217, 421, 450, 886, 923 ; XI, 456, 470, 483 (c.) ; 641, 759 ; XII, 266 ; XXV, 389.
— Peste bubonique, XIII, 209.
— Ixodes parasites des animaux domestiques à Mytilène, XIII, 260.
— Moustiques, XI, 729.
— — Culicides récoltés par la mission antipaludique en 1918, XIII, 117.
— Remarques sur les hémo-cultures pratiquées au laboratoire de bactériologie de l'— de juin à décembre 1917, XI, 154.
Armillifer armillatus. Embryon et formes larvaires, XVI, 340 (fig., pl.).
— *brumpti*, n. sp., linguatulidé de Madagascar, XV, 565.
Arneth (Image d') dans le béribéri et le scorbut, IV, 320.
— — et formule leucocytaire dans la bilharziose, V, 396.
— — dans la leishmaniose infantile, VI, 498.
Arrhénal. Voir **Arsenicaux.**
Arsanilate. Voir **Arsenicaux.**
Arsenic. Voir aussi **Arsenicaux.**
— Elimination par les urines et par les fèces, II, 140, 625.
— Sort de l'— dans la circulation générale, II, 405.
— dans la piroplasmose canine, IV, 291.
— Suspensions huileuses (Métoléine) dans les trypanosomiases, VIII, 28.
— colloïdal (Ionoïde d'—) dans le paludisme, XIII, 504.
Arsenicaux. Voir aussi **Arséno-benzènes, Orpiment.**
— Bains contre la gale des animaux domestiques, XIII, 186.
— larvicides dans la lutte contre les moustiques, XIX, 292 ; XXI, 655.
— — Vert de Paris, XX, 123 ; XXI, 109.
— — Vert de Schweinfurt, XXIII, 413.
— dans les trypanosomiases. Mécanisme d'action, II, 45.
— Rôle du glutathion dans la production du Trypanotoxyl, XXI, 676.
— Echecs de l'action trypanocide, XXIV, 660.
— Arséno-résistance, XXII, 201, 540 ; XXIII, 291, 461 ; XXV, 271, 279, 280.
— Intoxication chez le cheval, XXV, 381.
— divers dans le pian, XXI, 400.
— — dans la spirochétose bronchiale, XXI, 622.
— — dans la trypanosomiase des chevaux du Maroc, XI, 448.
— Solution de Löffler (acide arsénieux) dans les trypanosomiases animales, II, 409.
— — dans la trypanosomiase humaine, I, 504 ; III, 386.
— ***Acétylarsan*** dans la bronchite sanglante (spirochétose bronchiale), XXIII, 296.
— — dans la dysenterie amibienne et d'autres affections à protozoaires, XIX, 399.
— — dans la fièvre récurrente, XXI, 113.
— — dans le pian, XIX, 416 ; XX, 211 ; XXI, 745.
— — dans la syphilis, XX, 210.
— — chez les nourrissons de Tananarive, XXII, 753.
— ***Apiroplasmine*** dans la piroplasmose bovine, XIX, 15, 18.
— ***Arrhénal*** dans la babésiellose bovine, XIX, 14, 554 ; XX, 595.
— — dans le paludisme, XIX, 283.
— — dans les piroplasmoses bovines, XIX, 14, 554.
— — associé à la quinine dans le paludisme, XIV, 109.
— — Isotonie des solutions, XIX, 584.
— ***Arséniate de soude*** : Ionothérapie à l'— dans la lèpre, XX, 62.
— ***Arsanilate*** dans les trypanosomiases bovines, XXII, 385.
— et arséno-argentiques (composés) dans le surra, VII, 200.
— ***Arsénophénylglycine*** dans la leishmaniose interne, II, 457 ; III, 717.
— — dans les trypanosomiases animales ou expérimentales, II, 402, 403 ; III, 732 ; IV, 403 ; VI, 588 ; VII, 201, 593.
— — dans la trypanosomiase humaine, II, 222 ; IV, 441, 449.
— ***Atoxyl*** dans la dysenterie amibienne, V, 565.
— — dans la fièvre récurrente, VI, 68.
— — dans la filariose, VI, 457.
— — dans les leishmanioses, II, 458.
— — dans le paludisme, I, 539.
— — dans les piroplasmoses, IV, 39.
— — dans les spirochétoses des poules, XXII, 764 ; XXV, 132.
— — dans les trypanosomiases animales ou expérimentales, I, 28, 210, 508, 647 ; II, 45 ; V, 387 ; VI, 184 ; VII, 200, 711 ; VIII, 37, 339, 188, 189 ; XXII, 668.
— — — — (Dourine), XVIII, 55.
— — — — (Infections à *Tr. congolense*), XII, 514.
— — dans la trypanosomiase humaine, I, 28, 210, 569, 620, 624 ;

II, 314 ; III, 333, 642 ; VI, 184 ; VIII, 188, 189, 711, 752 ; XIII, 366, 370, 379, 483 ; XVII, 79, 179, 289, 369, 425, 432, 491 ; XIX, 316, 463 ; XX, 55, 511, 883 ; XXI, 144 ; XXII, 482, 487, 779 ; XXIII, 340 ; XXIV, 7 ; XXV, 271, 279, 280.
— — Sérum atoxylé dans la trypanosomiase humaine, XV, 63.
— — dans la prophylaxie de la trypanosomiase humaine, VIII, 178.
— — — — Résultats, XIV, 238, 422.
— — Influence du traitement à l'— sur la natalité infantile parmi les trypanosomés, VIII, 752.
— — et atoxyl glycinamide dans les trypanosomiases animales, XIII, 581.
— — associé à l'émétique dans la trypanosomiase humaine, I, 510, 569 ; II, 312 ; III, 333, 642.
— — associé à l'émétique d'aniline dans la trypanosomiase humaine, III, 194, 228.
— — associé au novarsénobenzol dans la trypanosomiase humaine, XIV, 326.
— — associé à l'orpiment dans la trypanosomiase humaine, I, 500, 508, 617 ; II, 45 ; III, 333, 642 ; IV, 310.
— — associé au « 189 » dans la trypanosomiase humaine, XV, 729.
— — associé au 205 Bayer et à l'émétique dans la trypanosomiase humaine, XVIII, 312.
— — et troubles oculaires, VII, 715 ; XV, 144.
— — et arséno-résistance des trypanosomes, XXV, 271, 279, 280.
— ***Halarsine*** dans les trypanosomiases animales, XX, 535.
— ***Hectine*** dans la leishmaniose interne, VI, 496.
— ***Novatoxyl*** dans la trypanosomiase humaine, XXII, 431.
— ***Orsanine*** = « 270 » F.
— ***Soamine*** dans la méningite cérébro-spinale, XI, 783.
— ***Stovarsol*** dans l'amibiase généralisée, XIX, 90.
— — dans l'angine de Vincent, XVII, 330.
— — dans la blastocystose, XXI, 760.
— — dans la bronchite fétide, XVII, 533.
— — dans la distomatose, XXI, 222.
— — dans la dysenterie amibienne, XVI, 79, 557 ; XVII, 119, 555.
— — dans l'entérite à *Trichomonas*, XVIII, 647.
— — dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XXI, 636.
— — dans la lambliose, XVI, 325.
— — dans le paludisme, XIX, 96, 180, 284 ; XX, 331.
— — — à *Pl. vivax*, XIX, 389.
— — — chronique à *Pl. vivax*, XVIII, 554.
— — — — à *Pl. vivax* et mixte (*Pl. vivax* et *Pl. præcox*), XIX, 96.
— — dans le pian, XVI, 635 ; XVII, 100 ; XVIII, 437, 661 ; XX, 841 ; XXI, 674, 744.
— — contre les protozoaires intestinaux, XXII, 583.
— — dans la spirochétose bronchiale, XXI, 622.
— — — *eurygyrata*, XVII, 861.
— — dans la spirochétose des poules, XXII, 765.
— — dans la trypanosomiase humaine, XVII, 214.
— — sodique préventif des trypanosomiases, XIX, 744.
— — dans la toxémie intestinale à protozoaires, XVIII, 136, 140, 182.
— — dans l'ulcère phagédénique, XVII, 531 ; XVIII, 433 (fig.), 501 ; XXIII, 488.
— — associé à la quinine et au « 710 » Fourneau dans le paludisme, XXIV, 378.
— — cause d'un érythème toxique, XVII, 630, 725.
— — Posologie, XVIII, 661.
— — Vœu relatif à l'emploi du —, XVII, 622.
— ***Stovarsolate de quinine.*** Voir Quinine.
— ***Sulfure (Tri)*** d'arsenic colloïdal dans la trypanosomiase humaine, XV, 60.
— ***Tréparsol*** dans le paludisme, XIX, 284.
— — dans la spirochétose bronchiale, XIX, 262.
— — dans l'ulcère phagédénique, XVIII, 434.
— ***Tryparsamide*** dans la trypanosomiase humaine, XV, 802 ; XVI, 606 ; XVII, 692 ; XVIII, 645, 775 ; XIX, 8, 271, 463 ; XX, 689, 875 ; XXI, 143, 214 ; XXII, 484, 485, 781 ; XXIII, 950 ; XXIV, 9, 528, 530, 533, 657 ; XXV, 261.
— — préventive dans les trypanosomiases, XIX, 739 ; XXIV, 557.
— — et arséno-résistance dans la trypanosomiase humaine, XXII, 201, 540 ; XXIII, 291, 461 ; XXV, 261, 279, 280.
— — associée au 205 B.-309 F. dans la trypanosomiase humaine, XXV, 900.
— Tryponarsyl = Tryparsamide belge.
— Trypoxyl = Atoxyl.
— ***« 189 » F.*** dans le pian, XV, 528, 607 ; XVII, 95, 96, 99.
— — dans la syphilis, XV, 607.
— — dans la trypanosomiase humaine, XV, 729, 797.
— — dans les ulcères phagédéniques, XV, 607.
— ***« 192 » F.*** préventif dans les trypanosomiases, XIX, 743.

— « *269* » *F.* dans la trypanosomiase humaine, XXI, 646.
— « *270* » *F.* (= Orsanine), désinfectant intestinal, XXIII, 933.
— — dans la trypanosomiase humaine, XXIII, 339 ; XXIV, 10, 533 ; XXV, 252, 261, 902.
— — Formule rectifiée, XXIV, 168.
— « *417* » *F.* dans la trypanosomiase humaine, XXI, 646.
— « *2754* » *Hœchst* dans les trypanosomiases animales, XX, 734.
— — dans la trypanosomiase humaine, XX, 734.
Arsénobenzènes. Emploi dans les colonies, XXIV, 266, 369, 394, 434, 639.
— dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XIX, 685.
— — — à spirochètes, XIX, 345.
— — récurrente, XV, 330.
— dans les nodosités juxta-articulaires, XV, 488.
— dans le pian, XV, 489 ; XVI, 580 ; XXI, 400, 674, 745.
— dans la spirochétose bronchiale, XXI, 622.
— — des oiseaux, XVI, 582.
— dans la syphilis, XVI, 430.
— dans la trypanosomiase humaine, XV, 60, 63.
— Dérivés du diamino- dans les trypanosomiases, VII, 593, 595.
— — — O_1 et OK dans les trypanosomiases, VIII, 31, 32.
— — — — dans la trypanosomiase humaine, VIII, 74, 169.
— ***Arsénobenzol*** = Salvarsan = 606.
— — dans la bilharziose, IV, 45.
— — dans la dracunculose, XII, 730.
— — dans la dysenterie amibienne, XII, 632.
— — dans la fièvre récurrente, IV, 440 ; V, 339 ; VI, 68, 532 ; XIII, 62.
— — — — expérimentale, IV, 141, 440 ; V, 320 (pl.), 524.
— — dans l'hémato-hémoglobinurie quinique, XIV, 78.
— — dans les leishmanioses, VI, 624.
— — dans la — américaine, XIII, 239.
— — dans la — cutanée, IV, 185 ; VI, 624 ; VII, 36, 46.
— — dans la — interne, III, 717 ; IV, 187.
— — dans la lèpre, V, 784 ; VI, 415.
— — dans la lymphangite épizootique, IV, 380, 384.
— — dans le paludisme, III, 708 ; XIII, 175, 264, 502.
— — dans le pian, IV, 563 ; VI, 14, 243 ; VIII, 582 ; XII, 412.
— — — (en lavement), VI, 308.
— — dans la piroplasmose canine, IV, 291.
— — dans la spirochétose humaine, XII, 375.
— — — — bronchiale, XIX, 236.
— — dans la syphilis, III, 537 ; IV, 563 ; VI, 14, 102, 137 ; VIII, 582.
— — dans les trypanosomiases animales ou expérimentales, III, 526 ; IV, 141, 185, 472, 476 ; VI, 699 ; VII, 201.
— — — — (chevaux du Maroc), XI, 448 (c.).
— — — — (chevaux et mulets : *Tr. dimorphon*), XIII, 243.
— — et production d'anticorps chez des animaux trypanosomés, VI, 699.
— — dans la trypanosomiase humaine, VI, 272.
— — dans l'ulcère phagédénique, VI, 243 ; XI, 616.
— — en pommade, III, 618.
— — Administration par voie buccale, VI, 20.
— — Conservation des solutions, III, 616.
— — Décomposition, III, 616.
— — et ambocepteurs, VII, 633.
— — Action sur le pouvoir alexique du sérum, VII, 626.
— — associé à la quinine dans l'infantilisme palustre, XI, 691.
— — Discussion sur l'emploi, VI, 239.
— — Rapport sur l'emploi, VI, 384.
— — argentique dans la piroplasmose bovine, XIX, 14, 34.
— — cuprique et son sel sodique dans la trypanosomiase humaine, VI, 632 ; VIII, 582 ; IX, 13 ; XII, 680.
— — — — — — Durée de la stérilisation sanguine, IX, 13.
— — — — Action sur les *Tr. congolense* et *cazalboui*, IX, 236.
— — — — dans le pian, VIII, 582 ; XXV, 871.
— — — — dans la syphilis, VIII, 582.
— ***Novarsénobenzol*** = Néosalvarsan = 914.
— — dans l'amibiase, IX, 325, 510.
— — dans l'anaplasmose, XVII, 641.
— — dans la dracunculose, XVII, 147.
— — dans les entérorragies rebelles, XIX, 903.
— — dans la kagaminetsu, fièvre endémique, XVII, 828.
— — dans la leishmaniose cutanée, VII, 36.
— — dans les nodosités juxta-articulaires, XIII, 548, 554.
— — dans le pian, IX, 760 (fig.) ; XVII, 95, 96 ; XVIII, 451 (fig.) ; XXI, 400, 674, 745 ; XXII, 386 ; XXV, 871.
— — dans la spirochétose bronchiale, XVII, 177 ; XIX, 262 ; XXI, 624.
— — dans la syphilis, XVIII, 248.
— — — associée à la trypanosomiase, XVII, 181.
— — dans les trypanosomiases, VIII, 37.
— — dans la trypanosomiase équine du Soudan (tahaga), XXII, 664.
— — — humaine, VI, 591 ; IX, 13 ; XVII, 181, 368 ; XIX, 316.

— — — — en injections intrarachidiennes, VII, 63, 257.
— — dans l'ulcère phagédénique, XXIII, 487.
— — dans quelques affections au Congo belge, IX, 760 (fig.).
— — adjuvant de traitements chimiques ou sériques, XXII, 166.
— — associé à l'atoxyl dans la trypanosomiase humaine, XIII, 370, 379 ; XIV, 326.
— — associé au 205 B. dans la trypanosomiase humaine, XVIII, 312.
— — associé à l'urotropine dans la syphilis nerveuse, XXIV, 588.
— — Accidents, XII, 340.
— — Insuffisance hépatique et ictère après une série d'injections, XVI, 146.
— — Durée de la stérilisation sanguine chez les trypanosomés, IX, 13.
— ***Eparséno*** dans les leishmanioses, XIX, 331.
— — dans la lèpre, XVII, 603 ; XVIII, 90, 514 ; XIX, 456, 779 ; XX, 774.
— — Action sur *Microfilaria bancrofti*, XVI, 126.
— ***Galyl*** dans les affections oculaires, VIII, 404.
— — dans la dysenterie amibienne, X, 277.
— dans la fièvre récurrente, VII, 101.
— — dans la lymphangite épizootique, XIII, 641.
— — dans la microfilariose des oiseaux, XIII, 654.
— — dans les trypanosomiases, VI, 502 ; VIII, 37.
— — dans la trypanosomiase humaine, VII, 160, 640.
— ***Luargol*** dans la fièvre récurrente, XIV, 633.
— — dans la lambliose, XIV, 652.
— — dans la piroplasmose bovine, XIX, 14.
— — (Dissodo-). Expérimentation, XIV, 640.
— — — et arsolan contre le bacille de Pfeiffer et le pneumocoque, XIV, 630.
— ***Ludyl*** dnas la fièvre récurrente, VII, 101.
— — dans les maladies oculaires, VIII, 404.
— — dans les trypanosomiases, VIII, 37.
— — dans la trypanosomiase humaine, VII, 160, 640.
— ***O*** (Produit) dans les trypanosomiases animales expérimentales, XIII, 581.
— ***Oarsan*** dans la trypanosomiase des chevaux du Maroc, XII, 220.
— ***Sulfarsénol*** dans la filariose, XVIII, 632.
— — dans le paludisme, XXII, 1010.
— — dans le pian, XVII, 96 ; XXII, 386.
— — dans le surra équin expérimental, XXI, 849.
— — chez les nourrissons à Tananarive, XXII, 753.
— — adjuvant de traitements chimiques ou sériques, XXII, 166.
— — associé au « 309 » F. dans la prévention du surra équin, XXIII, 569.
— — associé au « 309 » F. dans les infections à *Tryp. cazalbout* et *Tryp. brucei*, XXIV, 667.
— ***Sulfo-tréparsan*** chez les nourrissons à Tananarive, XXII, 753.
— ***5 : 5' arséno-2 : 2'-thiolbenzimînazol*** associé au 205 B.-309 F. dans l'infection expérimentale des souris à *Tryp. congolense*, XXV, 570.
Arsénobenzol. Voir **Arsénobenzènes.**
Arsénophénylglycine. Voir **Arsenicaux.**
Artérite d'origine palustre et gangrène, XI, 28.
Arthrite du genou d'origine dysentérique, X, 10.
— puriformes dans la dracunculose, XXIII, 1020.
Arthropodes. Voir aussi **Arachnides, Insectes.**
— dans la lèpre, IV, 239.
Arvicanthis. Trypanosomes, VIII, 80.
Ascarides cause d'appendicite, II, 606.
— à la Guadeloupe, VII, 71.
— à Panama, IV, 334.
— chez les Arabes du Tell algérien, VII, 303.
— du *Python sebæ*, III, 94, 96.
Ascaridia rhodaini, n. sp., XV, 125.
Ascaridiose. Cas mortel à Madagascar, V, 842.
— Syndrome pseudo-tétanique, XXII, 747.
— à forme typhoïde, XVI, 598.
Ascaris filaria, III, 95.
— *lumbricoïdes*, VI, 343, 455, 704.
— *oculata*, III, 96.
Asclépiadacées. Flagellé d'*Araujia angustifolia*, IX, 357 ; XVI, 682 (fig.).
— Flagellose ou leptomoniase, XV, 149.
Arpergillus nidulans, VIII, 11.
— agent d'un mycose en Tunisie, XVII, 343, 345 (fig.).
Asphyxie locale des extrémités d'origine paludéenne et éosinophilie, V, 342.
— par le manioc insuffisamment sec, XXI, 879.
Association internationale pour la destruction des rats, VII, 174.
Asthme compliqué d'amibiase bronchique, XVII, 211.
— Fréquence de l'— à Tanger, XVIII, 421.
Atébrine dans le paludisme, XXV, 874, 878.
— — des oiseaux, XXV, 875.

Athenæ noctua. Leucocytozoon d'—, VI, 428.
Atoxyl. Voir **Arsenicaux**.
Atropine (Sulfate d') dans le tétanos, XXII, 227.
— — associé à la sérothérapie dans le tétanos, XIX, 66 ; XXI, 694, 698 ; XXII, 227.
Attachement (Réaction d') dans les infections à *Tryp. gambiense* et à *Tryp. rhodesiense*, V, 220.
— — — à *Tryp. gambiense*, VI, 445.
Attaques épileptoïdes dans la trypanosomiase humaine, II, 314.
Aubert (P.). Éloge, XVIII, 225.
Auchméromyies. Biologie, VI, 128 ; VIII, 2.
— parasites hémophages de l'homme et du porc, IX, 768.
— en Afrique occidentale française, VIII, 462 ; IX, 242.
— au Congo, VIII, 459 (fig.), 593.
— en Haute-Guinée, VIII, 659.
Audain (Léon), Éloge, XXIII, 885.
Audiau (Fr.). Éloge, VI, 238.
Avortement provoqué pour bassin vicié chez une naine, XXII, 732 (fig.).
Azoospermie essentielle congénitale au Maroc, XVIII, 784.
Azotémie dans le paludisme, XVII, 282 ; XXIII, 962.

B

Babesiella ovis en Algérie, XVII, 122.
— — Comparaison avec *Piroplasma* (s. str.) *ovis*, n. sp., XVIII, 140 (fig.).
Babésiélloses. Voir **Piroplasmoses**.
Bacilles acido-résistants. Formes d'involution, V, 13.
— — cultivés dans la lèpre et dans l'ozène, IV, 89.
— anthracoïde se rapprochant du — de la peste, IV, 98.
— du côlon, I, 548.
— diphtérique. Procédé de culture simple, VI, 303.
— (Diplo-) de Morax, VII, 19, 424.
— dysentérique. Action sur la mannite, III, 20.
— — et amibes, V, 263, 468 ; VI, 413.
— d'Eberth, I, 548.
— fusiforme de Vincent dans les gingivites, II, 282.
— de la lèpre dans les ganglions superficiels, V, 466, 569, 698, 773 ; VI, 607.
— — dans les ganglions de personnes saines, V, 698, 773 ; VII, 365.
— — dans le mucus nasal, IV, 609.
— — — vaginal, II, 200.
— — dans l'uréthrite, VII, 557.
— — Dissémination par la mouche domestique, V, 860.
— — Transmission, VI, 551.
— — en boules, V, 13.
— — Commission d'étude, V, 774.
— de la sprue, VII, 268.
— du tétanos. Culture, VI, 605.
— de Weeks, VII, 19, 424.
Bacillurie provoquée dans la lèpre, V, 784.
Bacillus abortus. Pouvoir pathogène sur le rat et la souris, XVII, 465.
— — Protéine de — dans le traitement de la fièvre ondulante, XXII, 130.
— *asthenogenes* dans une fièvre de cause inconnue en Cochinchine, XV, 577.
— — Action sur les aliments, XVI, 743.
— — Action sur les corps phosphorés organiques, XVII, 153.
— — Fermentation du contenu stomacal dans la maladie expérimentale chez le porcelet, XVII, 382.
— — Avitaminose et infection dans la maladie expérimentale du porcelet, XVIII, 63.
— — et béribéri. Déviation du complément, XIX, 575.
— *duboscqi*, n. sp. dans l'intestin de *Golunda campanæ*, V, 703 (fig.).
— *flagellatus*, XVIII, 303.
— *glutinosus* (Pseudo-myiase à), XI, 321.
— *ledanteci* = *B. fusiformis*, XX, 151.
— *pessimus*, n. sp., coccobacille pseudo-pesteux, XV, 862.
— *septicus meningitidis*, n. sp., XIV, 31.
— *typhi murium* et dératisation. XXIII, 442.
Bactéricide (Pouvoir) du sang dans le nagana expérimental, I, 136.
Bactéridie charbonneuse et moutons algériens, V, 336.
Bactéries amylozymes dans les fèces béribériques, III, 63, 352.
— — Isolement, III, 63, 122.
— et trypanosomiases, III, 83.
Bactériophage. Action protectrice de certains sérums normaux, XXV, 397.
— de la pasteurella aviaire, XX, 345.
— dans le traitement de la peste, XXIII, 648, 936, 943 ; XXV, 677.
— antipesteux chez l'homme, XXV, 672.
— — chez l'homme, le cobaye et la souris, XXV, 437.
Balantidiose. Traitement par la santonine, XX, 741.
Balantidium coli, IV, 394 ; VI, 615.
— — Culture, XXIII, 780.
— — au Cambodge, XVIII, 64.
— — en France. Traitement, XI, 588.
— — aux Indes néerlandaises, XII, 639.
— — au Pérou (Arequipa), XVII, 906.
— — en Russie (Pétrograde), XVIII, 191.
— — au Soudan français, XVII, 944.

Baléri. Voir **Trypanosomiases animales.**
Balfour (Corps de) du sang de la poule, XXII, 316.
— (Andrew). Éloge, XXIV, 169.
Ballote dans l'alimentation de l'homme au Maroc, XXIV, 463.
Bambous. Action pathogène d'un champignon parasite de *Arundinaria alpina* en Afrique centrale, XIII, 486.
Bananes et granulations dans les selles, I, 35.
Banga, affection hystériforme de l'Ouellé (Congo belge), VIII, 743.
Barbone en Cochinchine, XVI, 426.
— et bactériophage, XXII, 245.
Barrois (Th.), Éloge, XIII, 743.
Bartonella bacilliformis agent de la verruga péruvienne, XXII, 352.
— *coccoïde* agent de la verruga, XX, 559.
— *muris*. Présentation d'une micrographie, XXII, 531.
— — Différenciation immunologique de deux races, XXII, 771.
— — *ratti* = *Grahamella muris ratti*, XXIII, 471, 473 (pl.).
— des rats splénectomisés de Stanleyville (Congo belge), XXIII, 464, 914.
Bartonellose des chiens en Russie, XXIV, 471.
— et prémunition, XXIII, 173.
Batraciens. Venin muqueux de la peau, VI, 190.
— Venins cutanés de *Spelerpes fuscus*, XI, 108.
— Récolte du venin, VII, 519.
— Sécrétion cutanée muqueuse. Propriétés vaccinantes contre le virus rabique, VIII, 730.
— Résistance au virus rabique. Mécanisme, VIII, 13.
— Cycle évolutif des opalines, VIII, 397.
— *Entamœba ranarum* chez les têtards de *Rana esculenta*, XI, 47.
— Hémogrégarines, IV, 446 ; V, 73.
— — de crapauds à la Guyane, XI, 788.
— — du crapaud (*Bufo agua*), XXIII, 372.
— — (*H. cayennensis*) du crapaud (*Bufo marinus*), XI, 687.
— Flagellés de — à Aréquipa, XVIII, 58 (fig.).
— Filaires, IX, 137.
— — du crapaud, IX, 133 (fig.).
— — et microfilaire du crapaud (*Bufo marinus*), XI, 182.
— conservateurs et propagateurs de flagelloses intestinales de l'homme, XVIII, 521.
Beauperthuy (Daniel de) et transmission de la fièvre jaune, II, 5.
Bécasse. Leucocytozoon, V, 19.
Bec de lièvre double. Opération ; guérison, XXII, 747.
Bellot (G.), Éloge, XXIII, 1.
Benzidine (Couleurs de). Afridol violet dans la trypanosomiase humaine, II, 54.
Béribéri en Afrique occidentale française, XIX, 390.
— en Afrique orientale parmi les troupes belges, XII, 156 (fig.).
— au Cameroun, IX, 588.
— en Chine (Setchouan), XIV, 666.
— en Cochinchine, XVII, 451 ; XVIII, 475 ; XIX, 575 ; XX, 30.
— — Étiologie, XIX, 620.
— — (Province de Tanan). Épidémie, XXII, 982.
— — (hôpital indigène de Cholon), XX, 33.
— au Congo belge (Bokola), VII, 402.
— — (vallée de Lukuga), XI, 239.
— à la Côte d'Ivoire, III, 742.
— en France (Granville) dans un bataillon malgache, XVII, 896.
— en Guyane française et ankylostomiase, XIII, 603.
— aux Indes néerlandaises, IV, 258.
— en Italie méridionale, VIII, 218.
— à Madagascar, III, 751.
— en Mauritanie, III, 745.
— à La Réunion, III, 131.
— Étiologie, III, 13, 63, 65, 122, 123, 128 ; V, 125, 334 ; VI, 195 ; X, 123 ; XIII, 196.
— et avitaminose, XIII, 196 ; XV, 476.
— et *Bacillus asthenogenes*, XVI, 743 ; XVII, 153, 382.
— Fermentation du contenu stomacal, XVII, 382.
— Avitaminose et infection dans la maladie expérimentale du porcelet due au *Bacillus asthenogenes*, XVIII, 65.
— expérimental, III, 118 ; XIII, 191.
— — du singe, III, 116.
— Diagnostic, II, 517 ; III, 8.
— Réaction de déviation du complément, XIX, 575.
— Examen radioscopique du cœur, XX, 131 (pl.).
— Hématologie, IV, 315, 320.
— Les œdèmes, XX, 30.
— Rein et fonctions rénales, XX, 39.
— Tension artérielle et viscosité sanguine, XVIII, 475.
— Troubles de la circulation et de la respiration, XX, 132.
— Troubles et lésions du cœur, XX, 127, 136.
— Troubles du métabolisme, XXII, 970.
— Troubles du métabolisme de l'azote et du chlore, XVIII, 735, 739.
— Pigment vert dans les organes des sujets morts, I, 425.
— Contagion, V, 514.
— Traitement, III, 15, 123.
— Rôle protecteur du son, III, 15, 123 ; IV, 498.

— Lettre du Ministre des Colonies, III, 285.
— Rapport et conclusions d'une Commission, IV, 575, 604, 656.
— Épidémie de polynévrite palustre simulant le — au Cambodge, IX, 634.
— Plaquette, IV, 653.
Bertrand (L.-E.), Éloge, XII, 123.
Big-head. Voir **Ostéoporose.**
Bettencourt (A.). Éloge, XXIII, 133.
Bile. Action sur les trypanosomes, VI, 24.
Bilharzies. Échantillons, I, 317.
— et cancer, XXIII, 136.
— Les porteurs de — (*Sch. mansoni*), à la Guadeloupe, VII, 75.
Bilharziose. Enquête relative aux foyers européens, XXIII, 731.
— en Afrique équatoriale française, XIII, 804.
— — occidentale française, XVI, 368, 428.
— aux Antilles, VII, 367.
— au Cameroun, XI, 755.
— en Chine, XVIII, 364.
— en Cochinchine, III, 315.
— au Congo belge (Ouellé), VIII, 742.
— — *Schistosomum hæmatobium*, XIII, 28.
— en Corse (troupes sénégalaises), XX, 206.
— au Dahomey, V, 837.
— en Égypte, XVII, 812 ; XXII, 10.
— en France. Recherches sur la transmission. Essais d'infection de mollusques autochtones, XI, 854.
— au Gabon, XVI, 559.
— à la Guadeloupe, VII, 75.
— en Guinée française (Kouroussa), V, 504.
— — — (région militaire), IX, 739.
— intestinale à la Guyane française, IX, 401.
— — *Schistosomum mansoni* à la Guyane française, X, 464.
— dans le Haut-Sénégal et le Haut-Niger, I, 430.
— intestinale à Madagascar (Hauts Plateaux), XXI, 380, 435.
— — *Schistosomum mansoni* à Madagascar, XI, 34 ; XIV, 229, 247, 328.
— au Maroc. Épidémiologie comparée du foyer tunisien de Gafsa et du foyer de Marrakech, XV, 632.
— — et au Portugal, XVI, 491.
— — inexistante à Tanger, XIX, 487.
— à la Martinique, I, 280 ; III, 26, 29, 30 ; IV, 392.
— et *Planorbis dufourii* au Portugal, XV, 805.
— au Portugal et au Maroc, XVI, 491.
— — XX, 350.
— au Sénégal (Casamance), V, 837.
— — infantile à Dakar, XVI, 276.
— — vésicale et intestinale, XVI, 141.
— — Mission d'études, XVI, 368, 428.
— au Soudan français, XVII, 720, 833 ; XVIII, 458.
— en Syrie (Damas), XV, 695.
— au Tchad (Moyen-Chari), VIII, 604.
— — — Fort-Archambault, VII, 693.
— — (Ouadaï), VII, 526.
— au Togo, XVIII, 592 (c.).
— en Tunisie, II, 486, 612 ; III, 446, 532 ; IV, 627, 684 ; VI, 259 ; XVI, 18 ; XVII, 35 ; XX, 23.
— au Vénézuéla, XIV, 382.
— Étiologie, VIII, 621.
— et *Bullinus contortus*, XV, 208, 632 (fig.).
— — Infestation de — par les œufs de *Schistosoma hæmatobium*, XXI, 8.
— et mollusques, XVIII, 267.
— et *Planorbis metidjensis*, XV, 632.
— Procédé de recherche des œufs de *Schistosoma mansoni*, XIV, 328.
— Œufs de *Schistosoma mansoni* dans les selles d'individus sains cliniquement, XIV, 229, 328.
— Formule leucocytaire et image d'Arneth, V, 396.
— Insuffisance rénale, XVI, 564.
— Infection double mixte par *Sch. mansoni* et *Sch. hæmatobium* chez un dysentérique amibien, XVIII, 458.
— intestinale à *Sch. hæmatobium*, XXV, 829.
— Localisation appendiculaire, XI, 297.
— à forme de tuberculose intestinale, XVIII, 653.
— et tumeurs, XI, 710.
— Tumeur bilharzienne, XXIV, 499.
— vésicale, I, 280.
— — Évaluation de la quantité de sang rendue par l'urine, XVI, 63.
— — Double infestation par *Sch. hæmatobium* et *Sch. mansoni*, XIV, 567 ; XXI, 771, 772, 773.
— Essais de transmission, VI, 202 ; XI, 854.
— Traitement de l'hématurie, VII, 722.
— — de la — vésicale par l'antimoine, XV, 695.
— — des — par l'émétine en injections sous-cutanées, XXII, 168.
— — — par l'émétique en injections intraveineuses, XIV, 299.
— — de la — intestinale par l'émétique en lavements, XX, 285.
— et 606, IV, 45.
— Ouvrage de Looss, VII, 366.
Billet (A.). Éloge, VIII, 352.
Bisab. Voir **Oseille de Guinée.**
Bismuth. Bi 36 dans le pian, XXI, 745.
— Rôle du glutathion dans la production du bismoxyl, XXI, 676.
— associé au « 309 » F. dans le surra, XXII, 669.
— Sels de — dans la fièvre récurrente, XVI, 272.
— — dans la lambliose, XVI, 737.

— — dans le pian, XVII, 97, 100, 502 ; XX, 6.
— — dans la spirochétose bronchiale, XVII, 177.
— — — *eurygyrata*, XVII, 861.
— — dans les trypanosomiases, XX, 587.
— — dans la trypanosomiase humaine, XV, 692.
— — dans l'ulcère phagédénique, XIX, 115.
— Biquinyl, bismuthyl et bidrathyl, XXI, 746.
— Bisantol dans les trypanosomiases animales, XX, 541.
— Trépol dans le paludisme, XV, 534.
— — dans la syphilis, XV, 364.
— Néotrépol dans l'ulcère phagédénique, XXIII, 488.
— — associé au « 309 » F. dans la prévention du surra équin, XXIII, 369.
— Iodure double de — et de quinine dans la leishmaniose américaine, XVIII, 634.
Blanchard (Raphaël). Éloge, XII, 155.
Blastocystis, XVI, 326.
— au Cameroun, XII, 256.
— *enterocola*, V, 136 ; VI, 679.
— *hominis* et autres, V, 725.
— — cause d'entérites, XXI, 755.
— — à Pétrograde pendant les épidémies de 1919, 1921, XVIII, 183.
— — Rôle pathogène, XVIII, 130, 132, 179.
Blastocystose en Annam, XIII, 602.
— Caractères, XVIII, 130, 132.
Blastomycose humaine en Bolivie, VIII, 90 ; IX, 21.
— — à la Côte d'Ivoire, IX, 414.
— — au Pérou, VIII, 90 ; IX, 21, 756.
— — en Tunisie, IV, 366 ; VI, 556.
— — généralisée à *Coccidioïdes immitis*, VIII, 712 (pl.).
— — chez une femme indigène d'Alger, XIX, 586 (fig.).
— — Dermatite chéloïdienne, XIX, 876 (fig.) ; XX, 323.
— — à placards multiples végétants verruqueux ou pustulo-ulcérés, XXII, 142 (fig.).
— des équidés. Traitement, IX, 73.
— — oculaire de l'âne. Note clinique, XVII, 543.
— — — Inoculabilité, XVII, 545.
— — — Anatomie pathologique, XVII, 551 (pl.).
— — des voies lacrymales chez les ânes de la région de Fez, XVI, 478.
— — — Isolement de l'agent pathogène, XVIII, 124 (fig.), 127.
— (Chromo-). Voir **Dermatite verruqueuse.**
Blatte orientale. Flagellé nouveau de *Periplaneta orientalis*, XIII, 145 (fig.), 331.
— — Spirochète, XV, 331.
Blennorragie en Afrique équatoriale, VIII, 206.
— Résultats comparatifs du même traitement chez les Blancs et les Noirs, XI, 438.
Blépharoplaste absent dans le *Trypanosoma brucei*, IV, 233, 273.
Blessures de guerre pendant la campagne du Cameroun, IX, 587.
— de la région sterno-cléido-mastoïdienne par hameçon, XV, 861.
— de harnachement aux colonies. Pyothérapie, X, 901.
Bleu de méthylène. Voir **Chimiothérapie.**
Bolivie. Blastomycose humaine, VIII, 90 ; IX, 21.
Boophilus decoloratus et anaplasmose, III, 137.
Bordet et Gengou (Réaction de). Voir **Réaction** de déviation du complément.
Bordet-Wassermann (Réaction de). Voir **Réaction** de déviation du complément.
Borel (F.). Éloge, IX, 548.
Botelho (Réaction de). Voir **Réaction** de —.
Bothridium pythoni, III, 94.
Bouffissure d'Annam, XIX, 207 (fig.).
— — Pathogénie, XIX, 302.
Boukhchem, maladie enzootique des chiens kabyles, XIII, 811.
Bouilliez (M.). Éloge, XVI, 465.
Boulay (André). Éloge, XXIII, 851.
Bourgelatia diducta, n. g., n. sp., strongylidé du porc, XII, 324.
Bourret (G.). Éloge, X, 374.
Bousa, bière indigène d'Égypte. Étude bactériologique, XXI, 537.
Bouton d'Alep, de **Biskra,** de **Delhi,** de **Gafsa,** d'**Orient.** Voir **Leishmaniose cutanée.**
Bovidés. Voir aussi **Buffon.**
— Achondroplasie à Madagascar, XXII, 1015.
— Anaplasmose, III, 135 ; VI, 573 ; X, 310 ; XVII, 295 ; XXV, 175.
— — du *Bos brachycerus* d'Angola, XVI, 167.
— en Indochine, XXIV, 104.
— en Russie, XXI, 642.
— — Évolution des anaplasmes dans le sang des —, XIII, 19.
— — Vaccination, XII, 765 ; XIV, 449.
— Anémie pernicieuse en Cochinchine, XVI, 575.
— Coccidiose, III, 429 ; X, 446 ; XIX, 427 ; XX, 588.
— — dans le Sud-Annam, XIV, 380.
— — dans le Caucase du Nord, XXII, 71.
— — chez le bison, XXII, 641.
— — du zébu, XXIV, 644.
— Corps étrangers dans le rumen, XXIII, 867.

— Cysticercose en Guinée française, XXI, 99.
— Dermatose contagieuse, VIII, 354 ; IX, 290.
— — — et gale démodectique, X, 117.
— Echinococcose, XXIII, 871.
— Fièvre bilieuse hémoglobinurique en Algérie, XII, 108.
— Filaires, V, 115.
— Fœtus opodyme de vache, XXIV, 743.
— — Rétention anormale, XXIV, 250.
— Gale psoroptique, XXIII, 873.
— Helminthes en Guinée française, XIII, 179.
— Helminthiase, XXV, 175.
— Hémocytozoaires en Transcaucasie, XIV, 652.
— Hémoglobinurie, III, 73 ; XII, 108 ; XX, 413.
— Hémogrégariniennes (Formes) dans le sang et le tissu ganglionnaire des — d'Algérie, XI, 274.
— Maladie par carence de phosphore, XX, 947.
— Microfilaires, VII, 188.
— — au Turkestan, X, 104.
— Nématodes d'un — à Java, XI, 705.
— Onchocercose aortique, X, 459.
— Pasteurellose, XIX, 853.
— Peste bovine, XXIV, 789.
— — Infection inapparente, XXII, 239.
— — Vaccination, XII, 487 ; XIII, 338 ; XIV, 361 ; XXIV, 789.
— Piroplasmes chez les — de la Chaouia, VIII, 643.
— — du bœuf. Transmission au buffle, XXIV, 820.
— Piroplasmoses. Voir aussi Theilériose.
— — I, 234 ; II, 120 ; VI, 618, 622 ; VII, 699 ; IX, 95 ; XV, 295 ; XVI, 6, 30, 60 ; XVIII, 48, 50, 51, 721 ; XIX, 14, 16, 18, 532, 548, 550, 554, 887 ; XX, 64.
— — et hôtes vecteurs, XIII, 416.
— — en Algérie. Infection des — importés pendant l'hiver, VII, 699.
— — au Congo belge (Ouellé), IX, 95.
— — au Maroc, XIV, 116.
— — en Turquie, XXIV, 817.
— — du zébu, XXIV, 656.
— — Vaccination, XXI, 371.
— Spirochétose, III, 73.
— — au Brésil, XII, 748.
— Theilériose sud-africaine transmise par inoculation de sang, XXI, 121.
— — Traitement, XXV, 136.
— — au Turkestan, X, 310.
— — du zébu, XXV, 1049.
— Tiques au Turkestan, X, 298.
— Trypanosomes non pathogènes (*Tr. theileri*), IV, 40, 112, 191, 309, 377, 378, 536 ; V, 281, 603, 725 ; VI, 433, 434.
— Trypanosomiases, I, 272, 352, 515, 522, 573 ; II, 65 ; III, 551 ; VIII, 197 ; IX, 95 ; XIII, 303 ; XIX, 435, 747.
— — au Congo belge (Katanga) Nagana, XXII, 381.
— — — — (Ouellé), IX, 95.
— — à la Guadeloupe, XXII, 246.
— — à la Guyane française, XII, 258.
— — à la Martinique, XXII, 246.
— — au Paraguay. Mal de Caderas, XXV, 590.
— — au Vénézuéla, XIII, 303.
— — — réservoirs du surra d'Indochine, I, 575 ; II, 65.
— — Traitement par les composés du bismuth, XVI, 587.
— — — du nagana par le « 309 » Fourneau, XXI, 148.
— Tuberculose à l'abattoir de Bamako, XVIII, 687.
— — — de Dakar, XV, 356, 868, XVI, 207, 381.
— — en Cochinchine, XXV, 1026.
— — du zébu à Madagascar, XXII, 757.
— Tumeurs chez une génisse de race zébu, X, 182.
— Elevage au Katanga, XXII, 141, 377.
Bradycardie. Un cas de maladie de Stocke-Adams, XXV, 840.
Brault (J.). Eloge, IX, 753.
Brésil. Ainhum, IV, 692.
— Alastrim, VI, 549.
— Cachexie osseuse des équidés, IX, 600.
— Chagas (Maladie de). Voir Trypanosomiase humaine brésilienne.
— Charbon symptomatique, II, 162.
— Dermatite verruqueuse, XVII, 227 (pl.).
— Diarrhée infantile, III, 47.
— Encéphalo-myélite pseudo-épizootique du cheval, IX, 557.
— Engasgo (Mal d'), VI, 47.
— Gale démodectique du cheval. Contagion à l'homme, IX, 576.
— Helminthiase intestinale ; trichocéphalose, X, 932.
— Leishmaniose cutanée américaine, II, 232 (fig.), 235 ; IV, 289 (pl.) ; V, 176, 411 ; VI, 732.
— Méningo-encéphalo-myélite des poules, IX, 561.
— Mycoses, XXI, 419.
— — (Oto-) à *Sterigmatocystis hortai*, n. sp., X, 383 (fig.).
— Paludisme, I, 292 ; II, 163.
— Peste, II, 162.
— Pian, II, 459 ; X, 863 ; XXI, 387.
— Pseudo-rage ou paralysie bulbaire infectieuse, V, 576.
— Spirochétose bronchiale, XIII, 500.
— Toxoplasmose canine, VI, 681.
— Trypanosomiases animales, IV, 191.
— — humaine brésilienne, II, 304, 454 ; IV, 467 ; VII, 289.
— Zymonématose, V, 313.
— Hématozoaires des lézards, V, 592 (fig.).
— Hémocytozoaires des oiseaux, IX, 258, 259.

— Hémoparasites, IX, 247.
— *Leptospira ictero-hemorragiæ* chez les rats de Saint-Paul, XIII, 561.
— *Leucocytozoon* d'une chouette (*Scops brasiliensis*), XIII, 506.
— Microfilaires des oiseaux, IX, 247.
— Moustiques, II, 162, 163.
— *Phlebotomus brumpti*, n. sp., dans l'État de Saint-Paul, XIII, 659 (fig.).
— Réduvide nouveau de l'Amazone, XII, 611 (fig.).
— Tiques, II, 163.
— Triatomes. Distribution dans l'État de Saint-Paul, VII, 292.
— *Toxoplasma cuniculi*, IV, 518, 721.
— Toxoplasmes des oiseaux, IX, 262.
— Trypanosomes d'oiseaux, VII, 395 ; IX, 255.
— Conférence sur les affections parasitaires, XVIII, 123.
Brimont (E.). Éloge, III, 205.
Broden (A.). Éloge, XXIII, 2.
Bronchite amibienne, XVII, 211, 233.
— fétide à association fuso-spirillaire. Traitement par le stovarsol, XVII, 533.
— sanglante. Voir **Spirochétose** bronchiale.
Bruce (David.). Éloge, XXIV, 871.
de Brun. Éloge, XXIV, 873.
Buba = *Framboesia tropica* = pian, II, 245, 459.
— ou *framboesia*, leishmaniose, V, 176, 486.
— *braziliana*, IV, 291 ; V, 411.
— — (Étiologie), VI, 752.
— du Paraguay, leishmaniose américaine, VI, 210 (pl.).
Bubon du chancre mou. Traitement par l'acide phénique pur, XIX, 314.
— climatérique, III, 59, 755 (pl.) ; X, 724.
— à *Nocardia*, XII, 60.
— pesteux cervico-parotidiens, VI, 660.
— d'origine staphylococcique, XI, 137.
Buffard (Michel). Éloge, II, 561.
Bufflon. Exanthèmes de la variole et de la vaccine chez le —, VI, 488.
Bulletin de la Société d'Hygiène de la Martinique, V, 572.
Bullinus contortus dans l'oasis de Biskra (Algérie), XVIII, 267.
— et *Planorbis* en Tunisie, XV, 954 (c.).
Bunostomiens. Helminthes du groupe, III, 311.

C

Cabiais, réservoirs du virus de Caderas, III, 524.
Cachexie osseuse des équidés au Brésil, IX, 600.
— paludéenne. Traitement, VII, 678.
Cages à animaux de laboratoire. Utilisation des tonneaux, XV, 420 (fig.).
Caisses de secours pour les indigènes, XIX, 943.
Cajeput (Huile de) préventive contre la piqûre des glossines, XIX, 701.
Calcium. Rôle du — dans l'écologie des anophèles, XXIII, 34.
— (Chlorure de —) dans la fièvre hémoglobinurique, I, 406.
— — contre l'intolérance quinique, II, 269.
— — dans la lèpre, XXII, 11.
Calculs préputiaux multiples, XXII, 623.
— salivaire de la glande sublinguale, XVI, 601.
— urinaires chez les Malgaches. Constitution chimique, XXIV, 416.
— (Pseudo-) intestinaux d'origine végétale, I, 35.
Calfat. Résistance aux chlorhydrates d'émétine et de quinine, VI, 642.
Caloncoba (Huiles de). Action sur les bacilles acido-résistants, XXIII, 767.
Camail. Éloge, XXIV, 624.
Camallanus (Genre) = *Cucullanus*, Auct, VIII, 446.
Cambodge. Hygiène et pathologie des indigènes, XVI, 225.
— Mélioïdiose, XXIII, 436.
— Parasitisme intestinal, XXIII, 790.
— Peste, IV, 220 ; VIII, 54 ; XVI, 668 ; XVII, 39 ; XVIII, 630 ; XXI, 497.
— — Insectivore réservoir du virus, VIII, 54.
— — Musaraigne réservoir du virus, XVI, 158.
— Tuberculose. Essais de vaccination des nourrissons, XVIII, 379.
— Tumeurs, I, 51.
— Anophèles et paludisme. XXV, 920.
— *Argas vespertilionis*, XXI, 328.
— Parasites intestinaux, XVIII, 61.
— Rats et puces à Pnom-Penh. Étude zoologique, XVII, 372.
Caméléon de Madagascar. Filaire et microfilaire, VII, 70, 173.
Cameroun. Voir aussi **Afrique équatoriale française.**
— Aperçu médical sur la campagne militaire 1914-1916, IX, 584.
— Organisation médicale allemande, XII, 331.
— Amibiase, XII, 252.
— Béribéri, IX, 588.
— Bilharziose, XI, 755.
— Dysenterie amibienne, IX, 589 ; XI, 754.
— Éléphantiasis, XI, 749.
— Fièvre bilieuse hémoglobinurique, IX, 589.
— — typhoïde, IX, 589.
— Filarioses, XI, 748 ; XII, 35.
— Gale, XI, 758.
— Goundou, XII, 416.
— Helminthiase, IX, 590.
— Lèpre, IX, 590 ; XII, 613 ; XVI, 193, 231, 253.

— Paludisme, IX, 590 ; XI, 286, 744 ; XXII, 555.
— Maladies parasitaires à Douala, XI, 744.
— Parasitisme intestinal, XI, 749 ; XII, 244.
— — vulvo-vaginal par un acarien sarcoptide, XI, 722.
— Pian, XII, 411.
— Pneumococcies pendant la campagne, IX, 590.
— Syphilis, XII, 407 (fig.).
— Tétanos pendant la campagne, IX, 587.
— Trypanosomiases animales, XI, 746.
— — humaine, IX, 303, 590 ; XI, 744 ; XV, 830 ; XVII, 523 ; XVIII, 5, 6, 762 ; XXII, 473.
— — — Lutte contre la — 1913-1914, IX, 303.
— Tumeurs, XV, 956 (fig.).
— Ulcère phagédénique pendant la campagne, IX, 590.
— Vaccine. Récolte du vaccin sur génisse et vaccin sec, XI, 593.
— — Préparation du vaccin à Douala, XI, 733.
— Acariens et insectes parasites de la peau à Douala, XI, 758.
— Alimentation de Douala en eau potable, XII, 492.
— Les « enfants rouges », XXV, 46.
Campagnol. Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *Tr. duttoni*, VII, 530.
— Theiléiriose, X, 99.
— Flagellé du — indigène *Microtus arvalis*, XIV, 710 (fig.).
— *Grahamella*, spirochète et trypanosome de *Microtus arvalis*, XIV, 569.
Canaques. Lèpre. Traitement par l'huile de chaulmoogra, VII, 535.
Cancer. Voir **Tumeurs.**
Cannabisme. Trois cas avec psychose consécutive, XVIII, 788.
Caoutchouc. Conservation, VI, 280.
Capim. Abcès dû aux semences, XV, 215 (fig.).
Cap-Vert (Archipel du). Myiase oculaire de l'Ile de Sal, XII, 736.
Caratés. Voir **Dyschromie.**
Carnassiers. Typhus des — de ménagerie, XXV, 1015.
Cartes de la maladie du sommeil, III, 58.
Casamance. Voir **Sénégal.**
Castellani (Potion de) dans le pian, XVII, 580.
Cazalbou (L.). Éloge, XIII, 12.
Cellules conjonctives et *Leishmania*, II, 26.
— hépatiques parasitées par *Hæmogregarina pallida*, I, 598.
— — hôtes des *Leucocytozoon*, V, 77.
189 Fourneau. Voir **Arsenicaux.**
192 Fourneau. Voir **Arsenicaux.**
Cénure. Voir **Cestodes.**
Céphalo-rachidien (Liquide). Dosage des albumines, XXII, 337, 679 ; XXIII, 383.
— — Taux des chlorures et du sucre dans la trypanosomiase humaine, XXIII, 640.
— — dans la trypanosomiase humaine, I, 129, 496 ; II, 472 ; XXII, 962 ; XXIII, 640 ; XXIV, 658 ; XXV, 347, 340.
— — Persistance des trypanosomes dans le — de mulets atteints de nagana, XII, 17.
— — Virulence dans le typhus exanthématique, IX, 319.
— — et réaction de Weil-Félix dans le typhus exanthématique, XII, 592.
— — Présence du spirochète de la fièvre récurrente, VII, 472.
Cephalosporium doukourei, n. sp., XI, 328.
— *lecanii*, champignon parasite de la cochenille *Aspidiotus destructor*, XXIV, 146.
Ceratopogon et lèpre, II, 175.
Cercopithecus. Voir **Singes.**
Cérébraux (Accidents) dans le paludisme, V, 713 ; VI, 615.
— — dans la trypanosomiase humaine, I, 569 ; II, 400 ; III, 486 ; VII, 714.
Cestodes. Voir aussi **Ténias.** Cycle évolutif, IX, 578.
— rares chez l'homme, XXII, 114, 330.
— des Arabes du Tell algérien, VII, 301.
— au Cambodge, XVIII, 64.
— au Cameroun, XII, 244.
— en Cochinchine, XVII, 580.
— en Guinée française. Classification et utilisation des viandes ladres, XXI, 99.
— en Macédoine, XXI, 216 (fig.).
— à Madagascar, chez le malgache en Emyrne, XXII, 391.
— de l'éléphant d'Asie, VII, 78.
— Botriocéphales. Larves, XX, 921.
— *Diphyllobothrium mansoni*, XX, 226.
— — *ranarum*, XX, 931.
— du genre *Mesocestoides* Vaillant, 973 (fig.).
— Sparganoses humaines et animales au Tonkin, XIX, 802.
— — oculaire en Annam, XIII, 601.
— *Raillietina celebensis* et *R. baeri*. Caractères différentiels, XXII, 675.
— Tæniasis en Annam, XIII, 601.
— Tænias des ansériformes, XV, 46 (fig.).
— *Tænia crassicollis*, cause de cancer chez les rats, XVII, 853.
— *Davainea madagascariensis*. Description de la tête, IX, 413.
— *Hymenolepis*. Développement direct dans les villosités intestinales d'un hérisson, XIV, 386 (fig.).
— — *nana*, XII, 228 (fig.).
— — — chez les Arabes du Tell algérien, VII, 301.

— — *parvula*. Développement larvaire chez *Herpobdella octoculata* (hirudinée), XV, 46 (fig.).
— Cénure nouveau du bonnet chinois, XII, 223.
— — de la gerbille à pieds velus, VIII, 173 (fig.).
— Cysticercoïdes d'*Hemidactylus turcicus*, XIV, 20.
— — de *Tarentola mauritanica* du chat, XIII, 687.
— Cysticercose bovine à Madagascar, XXI, 272.
— Enkystement d'une cercaire chez un turbellarié d'eau douce (*Dendrocœlium lacteum*), XIII, 182 (fig.).
Chacal infecté de leishmaniose, V, 721.
— infecté par *Piroplasma gibsoni*, III, 57, 115, 274.
— Infection naturelle par *Spirochæta hispanicum*, var. *marocanum*, XXV, 944.
— infecté par *Pulex irritans*, var. *fulvus*, XXV, 960.
Chagas (Maladie de). Voir **Trypanosomiase humaine américaine.**
Chaleur. Action sur les miracidia de *Schistosoma hæmatobium*, III, 534.
— lumineuse et diarrhée de Cochinchine, IV, 155.
Chalmers (A.-J.). Éloge, XIII, 762.
Chameaux. Gale, XII, 94 (fig.) ; XIII, 29, 548.
— Leishmaniose cutanée. Hypothèse du réservoir de virus, XIII, 511.
— Microfilaires au Turkestan, VII, 188 ; IX, 222.
— Myiase cavitaire, IX, 483.
— Theilériose au Turkestan, X, 308.
— Tiques au Turkestan, X, 298.
— *Trypanosoma berberum* du debab. Infection expérimentale, XIII, 521.
— Trypanosome du debab, XXIV, 112.
— Trypanosomiase, I, 22, 25 ; III, 478 ; VII, 187 ; VIII, 68 ; IX, 230, 480 ; XI, 568 ; XVII, 130.
— — des — russes, XVI, 314.
— — des — du Turkestan et de l'Oural, XIV, 637, 638, 652.
— — Debad. Mortalité, XI, 568.
— — — Immunité, XII, 86.
— — — — et hérédité, XIII, 525.
— — — Passage de la mère au fœtus, XII, 177.
— — — Infection expérimentale, XIII, 521.
— — — du Sud-Oranais, IX, 480.
— Leucocytes, XIX, 385.
Champignons. *Aspergillus* d'un mycétome du poumon chez l'âne, VIII, 11.
— *Coccidioïdes immitis*. Infection généralisée, VIII, 712.
— *Monilia balcanica*. Production d'anticorps, XI, 820.
— *Rhizopus* pathogène de l'homme, VII, 430.
— Entomophyte parasite des fourmis, XIX, 815 (fig.).
— — Essais d'infection de culicides par quelques —, XXIII, 1025 (fig.).
— parasite des bambous en Afrique centrale. Action pathogène, XIII, 486.
— Parasite de la lymphangite épizootique. Nature mycosique, VII, 464.
— — — Culture, X, 274.
— Mycoses gommeuses à la Côte d'Ivoire, XI, 306.
— Cause d'une pseudo-tuberculose, III, 488.
— des teignes en Algérie : à Alger, VII, 554.
— — — dans les agglomérations européennes, XXIII, 363.
— — — dans la grande Kabylie, XXIII, 170.
— Conservation et envoi de cultures de — inférieurs, II, 60.
Chancre mou en Algérie, III, 59.
— — au Congo, VIII, 207.
— — Traitement par les attouchements à l'acide phénique, XIX, 314.
Chantemesse (André). Éloge, XII, 121.
Chappa. Un cas en Mozambique, VI, 351 (fig.).
Charançon. Larve de —, pseudo-parasite intestinal, X, 385.
Charbon bactéridien humain en Afrique équatoriale française, XXII, 307.
— — chez les moutons algériens, V, 336.
— — dans la région de Constantine, IX, 79.
— — au Maroc, XII, 126.
— — — chez le porc, XIV, 359.
— — — Prophylaxie, XIII, 14.
— — chez un ours, XIX, 518.
— — Oiseaux rapaces porteurs de germes, XIX, 519.
— — Vaccination. Cuti-, XVII, 765.
— — — intradermique, XVII, 467, 767 ; XVIII, 16, 243.
— — — — en un temps, XIX, 499.
— — — — — Durée de l'immunité, XXI, 294.
— — — — de la chèvre, XX, 208.
— — — — en Guinée française, XIX, 864.
— **symptomatique** en Annam, XIII, 98.
— — au Brésil, II, 162.
— — Diagnostic expérimental par ensemencement de la moelle osseuse, XIX, 515.
Chat. Gastro-entérite infectieuse, XXV, 1015.
— Infection par *Leishmania infantum*, VI, 110.
— — par *Lœschia tetragena*, VI, 678.
— Tænias du — et cysticercoïdes de *Tarentola mauritanica*, XIII, 687.
— — — d'*Hemidactylus turcicus*, XIV, 20.
— Tuberculose pulmonaire, XXIV, 861.

— adulte réceptif à *Tryp. congolense*, XXV, 21, 23.
— Microfilaire du — domestique dans le Sud-Tunisien, XI, 371.
Chaulmoogra (Huile de). Principe actif, XVII, 108 ; XXII, 308 ; XXIV, 778.
— — par injections intramusculaires, XVI, 227, 234.
— — par injections intraveineuses, X, 684 ; XIII, 490.
— — dans la lèpre, IV, 48 ; VII, 535 ; X, 684 ; XII, 406 ; XIII, 490 ; XVI, 227, 234 ; XIX, 399 ; XX, 710, 773, 953.
— — irradiée ou additionnée d'ergostérine irradiée, XXII, 739.
— — Produits à base d'— dans la lèpre, XVIII, 90.
— — Collobiase d'— dans la lèpre, XXV, 405, 410, 514.
— — Éthers éthyliques de —. Hyrganol dans la lèpre, XIX, 441 ; XX, 776 ; XXI, 831 ; XXIV, 457.
— — — Mode simplifié de préparation, XVI, 151.
— — — dans la lèpre du rat, XXV, 970, 973.
— — Savon d'— dans la lèpre, XIV, 520.
— — — (Alépol), dans la lèpre, XXII, 17, 153.
— — Savon total d'— dans la lèpre, XXIV, 770, 780.
— — Solution de chaulmoograte de soude pour injections intraveineuses, XXIV, 772.
— — dans le trachome, XIX, 57.
— — tirée d'*Hydnocarpus wightiana*, XX, 710.
Chauve-souris. Les roussettes africaines, animaux de laboratoire, XV, 212 (fig.).
— La roussette *Cynonycteris stramínea*, animal de laboratoire, X, 731.
— et paludisme (erratum), XI, 152.
— — Essais de transmission à la roussette, X, 704.
— animal réactif de la peste, XVI, 78.
— *Plasmodium epomophori*, n. sp., parasite des roussettes épaulières, XIX, 828 (fig.).
— *Plasmodium* d'*Epomophorus franqueti*, VIII, 729.
— — de *Nycteris hispida* au Congo belge, XIX, 780 (fig.).
— Réceptivité des roussettes épaulières au spirochète de Dutton, XVI, 729.
— Non-réceptivité de la roussette *Eidolon helvon* vis-à-vis du spirochète de Dutton, XV, 220.
— Réceptivité de la roussette *Cynonycteris stramínea* aux trypanosomes africains, IX, 234.
— Réceptivité des roussettes épaulières *Epomophorus wahlbergi haldemani* et *Ep. pusillus* aux *Tryp. gambiense* et *congolense*, XV, 246.
— Trypanosome de *Nycteris hispida* au Congo belge, XVI, 639.
Chéloïdes géantes chez une négresse, X, 39 (pl.).
— — chez un indigène du Dahomey, X, 814 (fig.).
— — et *Molluscum fibrosum*, XI, 712 ; XII, 188 (pl.).
Chenopodium. Huile de — dans l'ankylostomiase, XVI, 98.
— Essence de — anthelminthique, XXII, 582.
— *ambrosioïdes*, anthelminthique, XXIV, 168.
Chéromyies de l'Afrique occidentale française, VIII, 462 ; IX, 242.
— — orientale, XI, 106.
— — tropicale, IX, 768.
Chevaux. Affection non classée au Maroc, XIV, 222.
— Anaplasmose au Turkestan, X, 341.
— Anémie pernicieuse, XVI, 300, 525, 634.
— Dentition anormale chez un — de Madagascar, XXII, 1013.
— Dermite granuleuse, VIII, 362, 695.
— Diarrhée cholériforme, I, 240.
— Dourine, XIX, 325, 328.
— — Diagnostic expérimental, XIII, 518.
— — Persistance des germes pathogènes chez des — cliniquement guéris, XIII, 515.
— Encéphalo-myélite pseudo-épizootique, IX, 537.
— Gale démodectique, XII, 388 (fig.).
— — — Contagion à l'homme, IX, 576.
— Helminthes en Guinée française, XIII, 178.
— Hémocytozoaires en Transcaucasie, XIV, 632.
— Intoxication arsenicale, XXV, 381.
— Lymphangite épizootique, III, 450 ; VIII, 248 ; XVII, 540.
— — — Cryptocoques dans le tube digestif d'un — lymphangiteux, XIV, 66 (fig.).
— Microfilaires, VII, 189 ; IX, 482.
— Nuttaliose au Turkestan, X, 303.
— Ostéopathie, V, 549, 643, 697.
— Ostéoporose en Nouvelle-Calédonie, XIII, 262.
— Parasites endoglobulaires ; affections causées au Maroc, XI, 26.
— Peste (*Horse sickness*) au Congo belge, IX, 423.
— Piroplasmose. Voir aussi Nuttaliose.
— — en Afrique mineure, XIII, 460.
— — dans le Sud-Annam, X, 871.
— — au Turkestan, X, 303.
— — vraie, XXV, 18.
— Spirochétose au Maroc, XI, 261.
— Teignes, VI, 300.
— Tiques au Turkestan, X, 298.

— Trypanosomiases. Voir aussi Dourine.
— — I, 272, 354, 518, 521 ; III, 377, 379, 381, 478 ; VIII, 68, 115, 433, 503, 561, 576, 646 ; IX, 130 ; X, 253, 501, 850.
— — Infection par *Tryp. dimorphon*, XIII, 241.
— — Surra. Chimiothérapie préventive, XXIII, 368.
— — Tahaga chez les — du Niger saharien, XXII, 662.
— — au Maroc. Etude expérimentale, X, 253 ; XI, 448, 556 ; XII, 220 ; XXIV, 112.
Chevreuil. Piroplasmose du *Cervulus muntjac* (con-mang annamite), XVI, 41.
Chèvres. Agalaxie contagieuse, X, 575, 677.
— Anaplasmose en Russie, XXIII, 382.
— Charbon bactéridien. Vaccination intradermique, XX, 208.
— Coccidiose, III, 429.
— — dans le Sud-Annam, XIV, 380.
— — et parasitisme latent de *Eimeria arloingi*, XII, 298.
— Cryptocoques pathogènes dans les ganglions des chevreaux goitreux, XIV, 199.
— d'Égypte. Digestion du papier, XXII, 81.
— Fièvre ondulante, I, 62, 193 ; II, 191 ; III, 490 ; IX, 86 ; X, 376.
— — — en Corse, V, 566, 657 ; VI, 603, 673.
— Helminthiase à la Guyane française, IX, 402.
— Méningite cérébro-spinale, XIII, 497.
— Otacariose au Congo belge, IX, 763.
— Piroplasmose au Congo belge (Ouellé), IX, 95.
— — au Turkestan, X, 305.
— Trypanosomiases, I, 353, 523 ; III, 376 ; V, 31.
— — de l'Ouellé (Congo belge), IX, 95.
— — Nagana de l'Ouganda, VI, 685.
— — Surra, V, 31.
— — L'immunité acquise est-elle héréditaire ? VII, 724.
— — Sensibilité à *Tryp. rhodesiense*, V, 30, 103 (pl.).
— — Infection expérimentale par *Tryp. gambiense*, IV, 619.
— Variole, XX, 583 (fig.).
Chiens. Affection non décrite observée au Maroc, XII, 132 (pl.).
— Anaplasmose, X, 311.
— Asphyxie d'origine traumatique, XXV, 175.
— « Bouckhchem », maladie enzootique des — kabyles, XIII, 811.
— Coccidie nouvelle chez *Canis lagopus*, XXII, 640.
— Cysticercose à Madagascar, XXIII, 877.
— Dysenterie amibienne, XIII, 161.
— Egagropile chez un chien mort de rage, XXV, 175.
— *Filaria immitis*, V, 731 ; VI, 89.
— Filariose, IV, 478, 485.
— — sous-cutanée, V, 622 ; VI, 89.
— — Microfilaires, X, 102.
— Helminthes en Guinée française, XIII, 180.
— Hémocytozoaires en Transcaucasie, XIV, 652.
— Hémogrégarine, V, 16.
— *Herpetomonas* de la puce du — et sa culture, XII, 310 (fig.).
— Infection expérimentale à l'aide de culture d'*Herpetomonas* d'insectes, XIII, 569.
— Kératite fréquente chez les — infectés par *Tryp. marocanum*, XI, 375.
— Lambliose en Russie, XXII, 80.
— *Leishmania infantum*. Infection par les cultures, V, 355, 722 ; VI, 477.
— — *tropica*. Sensibilité aux inoculations, IV, 134 ; VII, 697 ; IX, 265.
— Leishmaniose dans la région de Marseille, XXV, 1040.
— Leishmaniose cutanée spontanée au Turkestan, VII, 186 ; VIII, 502.
— — — — XVII, 360 ; XXII, 252 ; XXV, 1036.
— — interne, III, 510 ; IV, 40, 178, 452 ; V, 88, 89, 93, 351, 595 ; VI, 117, 165, 432, 578, 579, 683 ; VII, 7, 41, 173, 185, 193, 479, 481, 484 ; VIII, 162, 488 ; IX, 202, 302, 696, 697 ; X, 386.
— — généralisée chez un — au Maroc, XXV, 225.
— — Conservation du virus dans les laboratoires, XVI, 171.
— — et tuberculose associées, IX, 429.
— et leishmaniose interne humaine, I, 188, 602 ; II, 458, 584 ; IV, 538 ; V, 93 ; VI, 575.
— *Leptomonas* de la puce du —, XII, 313.
— Leucocytogrégarine, X, 281.
— Paralysie mortelle au cours d'un traitement antirabique prolongé, XVI, 599.
— Piroplasmose, VI, 499 ; IX, 108.
— — dans l'Ouellé, IX, 108.
— — Transmission par le *Dermacentor reticulatus*, XII, 631, 634 (fig.).
— Rage. Paralysie mortelle au cours du traitement prolongé, XVI, 599.
— — en Afrique équatoriale française, XXIII, 703 ; XXV, 191.
— — en Afrique occidentale française, XIV, 6.
— — au Sénégal, III, 351 ; XIII, 16.
— — — Symptômes rabiformes sur des — à Dakar, XVII, 325.
— — au Soudan français, XIV, 368.
— Spirochétose, XVIII, 702 (fig.).
— Spiroptères, XXV, 372.
— Stomoxes, transmetteurs du debab, XVI, 168.
— Tiques. *Dermacentor reticulatus*

transmetteur de la piroplasmose du —, XII, 651, 654 (fig.).
— *Trypanosoma dimorphon* dans la Haute-Volta noire, V, 278.
— — *marocanum*. Infection spontanée, XIII, 23, 234.
— — — Fréquence de la kératite chez les — infectés, XI, 375.
— Trypanosomiases, I, 272, 353, 524 ; V, 278 ; VIII, 70 ; XI, 375 ; XIII, 23, 234 ; XV, 549.
— — Debab naturel transmis par les stomoxes, XVI, 168.
— *Toxoplasma cuniculi*. Infection, IV, 518, 721.
— — *gondii*. Infection, VI, 294, 460.
— Toxoplasmose, III, 359 ; IV, 518, 647 ; VI, 294, 464 ; X, 377.
— Ulcère phagédénique, XX, 548.
Chili. Anaplasmose, XVII, 639.
— Entéqué, XIX, 133, 174.
— *Ornithodorus megnini*, XVIII, 408.
— Typhiques et paratyphiques (Affections), XV, 5.
— Élevage et agriculture, XIX, 168.
Chilomastix du chimpanzé et du macaque, XIX, 794 (fig.).
— (*Tetramitus*) *mesnili*, V, 495 (pl.), 725 ; XI, 370 ; XIV, 556.
— — Rôle pathogène, XVIII, 137, 179.
— — à Pétrograd (1919-1921), XVIII, 187.
— — dans l'utérus après l'accouchement, XVIII, 258.
Chimiothérapie. Voir aussi **Amiphène, Antimoine, Argent, Arsenic, Arsenicaux, Arsénobenzènes, Atébrine, Benzidine, Bismuth, Calcium, Cuivre, Emétine, Iode, Mercure, Or, Perchlorure, Phosphore, Plasmoquine, Quinine, Salicylate, Trypanobleu, Trypanroth, Tryparosane, Trypasafrol, Yatrène.**
— Acide chlorhydrique dans la diarrhée de Cochinchine, IV, 162.
— Amino-alcools nouveaux dans le paludisme, XX, 488.
— Bleu de méthylène dans la fièvre hémoglobinurique, XIV, 80.
— — dans les mycoses à *Saccharomyces granulatus*, XV, 53.
— — dans le paludisme, I, 292.
— Fléolate de sodium dans la lèpre murine, XXIII, 268.
— Gonacrine = Trypaflavine dans les affections à gonocoques, XXI, 487.
— — dans la blennorragie. Réaction violente, XXI, 713.
— — dans la diarrhée cholériforme, XXIV, 783 ; XXV, 196.
— — dans la peste, XXI, 598.
— Lipol dans la lèpre, XX, 773.
— Méthoxyphénylhydnocarpate dans la lèpre murine, XXIII, 271.
— Molybdate d'ammonium dans la lèpre du rat, XXV, 970, 974.
— Pirobleu dans les piroplasmoses, XXIII, 506.
— Tétrachlorure de carbone dans le parasitisme intestinal, XX, 743.
— Tribromométaxylénol dans la lèpre murine, XXIII, 269.
— 205 Bayer = 309 Fourneau = moranyl = naganol dans les anaplasmoses, XV, 613.
— — dans les piroplasmoses, XV, 613.
— — dans les trypanosomiases, XV, 613 ; XVIII, 410, 453.
— — — bovines, XIX, 614, 692, 838 ; XXII, 776.
— — — : dourine, XIX, 328 ; XX, 414.
— — — : nagana, XXI, 148.
— — — : — expérimental, XXIII, 630 ; XXIV, 311.
— — — : surra, XXIII, 395.
— — — : — du chien, XIX, 759 ; XX, 222.
— — — : — équin, XXIII, 369 ; XXIV, 563, 840.
— — — — (prévention), XXV, 893.
— — dans la trypanosomiase humaine, XVIII, 312, 641 ; XX, 460 ; XXIII, 461 ; XXV, 898.
— — — — (prévention), XXII, 487, 872, 879 ; XXIII, 491 ; XXIV, 557 ; XXV, 347.
— — — arséno-résistante, XXIV, 374.
— — Pouvoir protecteur du sérum sanguin vis-à-vis de *Tryp. gambiense* après injection de —, XIX, 838.
— — dans la trypanosomiase expérimentale à *Tr. brucei* de la souris, XXIV, 311.
— — — — à *Tr. congolense*, XXV, 65.
— — associé à l'arsenic dans le surra, XXIII, 393.
— — — à l'arsénobenzène 5 dans la trypanosomiase à *Tr. congolense*, XXV, 570.
— — — aux composés d'antimoine dans le surra, XXV, 354.
— — — — dans la trypanosomiase à *Tr. congolense*, XXV, 71.
— — — au bismuth dans le surra, XXII, 669 ; XXIII, 393.
— — — au sulfarsénol dans le surra, XXI, 849.
— — — à la tryparsamide dans la trypanosomiase humaine, XXV, 900.
— 541, 580, 581, 579 A, 579 B, 579 C dans la lèpre murine, XXIII, 269, 270, 271, 272.
— 664 Fourneau dans la malaria expérimentale, XXIV, 93.
— 710 et 574 associés ou non à la quinine et au quiniostovarsol dans le paludisme, XXV, 1074.
— Isotonie des solutions pour —, XIX, 584.
— des filarioses, XVI, 126.
— prophylactique de la maladie du sommeil, XIX, 463, 838.

— par voie buccale avec l'arsenic. Traité, XXI, 85.
Chimpanzé. Voir aussi **Singes.**
— Helminthiase, I, 181.
— Dysenterie amibienne spontanée chez le *Troglodytes niger*, XVII, 771.
— Infusoire nouveau, parasite, V, 499.
— Méningite cérébro-spinale, II, 202.
— Nématode du genre *Hepaticola*, XXI, 221.
— Noma dû à *B. perfringens*, XXIV, 787.
— Paratyphoïde, II, 11.
— Peste, XXIV, 140.
— Éléments présentant les caractères d'un protozoaire sanguicole, XX, 597, 705.
— Inoculation du paludisme, XIII, 713.
— Réceptivité au virus amaryl, XXV, 190, 191.
Chine. Voir aussi **Mandchourie.**
— Béribéri au Setchouen, XIV, 666.
— Cécité. Causes, XXIV, 255, 419.
— Champignons. Espèces nouvelles de dermatophytes, XV, 888 (fig.).
— Choléra, XXI, 295.
— Dengue, XXI, 647.
— Dysenterie amibienne, I, 307 ; V, 468.
— — bacillaire, V, 468.
— — mixte, V, 468.
— Fièvre récurrente, IV, 510 ; XII, 621.
— — — au Setchouen, XIII, 38.
— — typhoïde, I, 180.
— Goitre, IX, 414.
— Leishmaniose interne, XVIII, 364, 669.
— Méningite cérébro-spinale au Setchouen, XII, 356.
— Paludisme et moustiques au Petchili, VII, 110.
— Parasitisme hépatique, VI, 704.
— — intestinal, II, 606 ; VI, 704.
— Peste, V, 303.
— Pseudo-tuberculose mycosique, III, 488.
— Scarlatine, XVI, 760, 767.
— Schistosomiase, XVIII, 364.
— Syphilis, XXIV, 259.
— Tokelau, XVIII, 648 (fig.).
— Trachome au Setchouen, XI, 815 ; XXIV, 257.
— Ulcère phagédénique au Setchouen, VII, 469.
— Variole. Variolisation au Setchouen, XIV, 93.
— Xérosis, XXIV, 260.
— Moustiques, I, 227 ; III, 155.
— Puce chique. Nouvelle espèce, XVIII, 399.
— Tricocéphalidé du rat, XVII, 658.
— Immunité supposée des sloughis aux venins de scorpion et de vipère et au virus rabique, XIX, 438.
— Médecine et hygiène modernes, XXV, 282, 315.
Chirurgie des canaques, I, 582, 593.
— des indigènes d'Algérie, I, 588.
Chirurgicales (Maladies) en A. E. F., VIII, 311.
Chlore dans la lutte contre la fièvre jaune, XXIII, 202.
Chlorhydrique (Acide). Voir **Chimiothérapie.**
Chloromyxum clupeidæ, XXIII, 185 (fig.).
Chloropicrine dans la lutte contre la peste, XVI, 602.
Chlorurémie dans le paludisme, XXIII, 962.
Choléra à Constantinople et en Thrace, 1910-1913, VII, 313 (c., fig., pl.).
— — chez les réfugiés russes de Crimée, XIV, 192.
— en Chine du Nord, au camp de l'arsenal de l'Est, XXI, 295.
— en Inde française (établissement de Karikal), XX, 708.
— aux Indes néerlandaises. Prophylaxie, XVII, 703.
— à Java, V, 3.
— en Macédoine pendant la guerre gréco-bulgare, VII, 447.
— à Madère, IV, 358 (c.).
— à Marseille (asile Saint-Pierre), V, 294.
— en Oranie, V, 790, 792.
— à Saint-Pétersbourg, II, 276.
— dans les Pouilles, III, 636.
— en Roumanie. Vibrions isolés dans une épidémie, V, 265.
— au Sénégal (N'Diank), V, 753.
— Porteurs de vibrions, VI, 306.
— Nouveau milieu de culture, VIII, 52.
— Instruction pour le prélèvement. Envoi et examen des fèces, VIII, 98.
— Transmission aux singes, VI, 482.
— Toxine et antitoxine, VI, 409.
— Vaccination préventive, VIII, 17.
— Traitement par la gonacrine, XXV, 196.
— et dysenterie amibienne, VIII, 641.
— et typhus exanthématique, XIII, 277.
— Nouvelles recherches sur la toxine cholérique, I, 32.
— aviaire et bactériophage, XXII, 245.
Choline dans le liquide céphalo-rachidien des trypanosomés, I, 496.
— Chlorhydrate de — dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XXV, 215.
Choniangium, n. gen., VII, 207.
Chopra et Gupta (Réaction de). Voir **Réaction** de —.
Chrysémine, solution alcoolique de pyréthrine, dans l'ankylostomiase, XXII, 23.
Chrysomyia. Larves de — dans l'intestin humain, V, 508 (pl.).
— *dux*, cause d'une nasomyiase, XVII, 375.

— *megacephala*, V, 737.
Chylurie hydatique au Maroc, XI, 452.
Chytridinées parasites des amibes de l'homme, XVIII, 19 (fig.).
Cils composés dans les cultures amibiennes, II, 568.
Cimex boueti. Évolution de *Tryp. cruzi* chez —, V, 360.
— — VIII, 657.
— *lectularius*. Évolution de *Tryp. cruzi* chez —, V, 360.
— — Transmission de *Tryp. cruzi* par —, VI, 172.
— — Évolution de *Tryp. lewisi*, *duttoni*, *blanchardi* chez —, VI, 167.
— *rotundatus*. Transmission de *Tryp. cruzi* par —, VI, 173.
Cinchonidine dans le paludisme, XIX, 185.
Cinchonine dans le paludisme, XIX, 185.
— — Action comparée avec celle de la quinine et du quinetum, XVIII, 770.
5 : 5′ arséno-2 : 2′ thiolbenziminazol. Voir **Arsénobenzènes. 541, 580, 581, 579 A, 579 B, 579 C.** Voir **Chimiothérapie.**
Cirrhose hépatique dans les schistosomiases humaines, II, 538.
Civette. Piroplasmose au Sénégal, XIII, 649.
— (*Viverra civetta*) sensible à l'herpès, XXIV, 145.
Cladosporium wernecki. Polymorphisme, XV, 381 (fig.).
Clavelée. Importation en France des moutons algériens et protection du troupeau métropolitain, VII, 506.
— en Indochine, XXIII, 804.
Climatologie de Casablanca, XII, 525.
Climatothérapie dans le paludisme, XXIII, 820.
Clonorchiase. Cas grave traité par l'émétique, XIV, 161.
Clonorchis sinensis, I, 219.
Clou de Biskra, de **Gafsa,** etc. Voir **Leishmaniose cutanée.**
Cobaye. Amibiase intestinale. Épizootie paraissant due à une —, XI, 163.
— Infection par *Entamœba dysenteriæ*, XI, 23.
— inoculé de Favus, VI, 301.
— Flagellés, XIV, 559.
— Infection à l'aide de cultures d'*Herpetomonas* d'insectes, XIII, 573.
— — par *Leishmania infantum*, VI, 110.
— — par *Schizotrypanum cruzi*, V, 598.
— — par *Toxoplasma gondii*, VI, 461.
— Inoculation de sang et d'urine de jauneux, XX, 1023.
— Kystes de Carini. Rareté chez les — de Paris, VII, 271.
— Sensibilité aux *Tryp. lewisi* et *duttoni*, VII, 533.
— Spirochète dans le sang, V, 589.
— Sporozoaire. Formes schizogoniques, XXII, 323 (fig.).
— Toxoplasmose, IX, 435.
— et typhus exanthématique. Conservation du virus, IX, 342.
Cobboldia (Genre). Ponte, VIII, 278.
Coçar (Peste de) ou pseudo-rage au Brésil, V, 576.
Cocaïne et ver de Guinée, I, 560.
Coccidie. Voir aussi *Coccidium*, *Cyclospora*, *Eimeria*, *Isospora*.
— de l'intestin d'un hémiptère, IV, 616.
— des poules en Russie, XXIII, 714.
— du zébu, XXIV, 644.
— des petits ruminants en Tunisie, XXV, 710 (fig.).
Coccidioïdes immitis, VIII, 712 (pl.).
Coccidiose des animaux domestiques en Russie, XIX, 262, 263, 266, 427.
— du bétail dans l'Est africain, III, 293, 429.
— du bison, XXII, 641.
— intestinale du bœuf en Piémont, X, 446.
— des bovidés en Russie. Traitement par l'ichtargan, XX, 588.
— des bovidés et des moutons dans le Caucase du Nord, XXII, 71.
— de la chèvre et parasitisme latent de *Eimeria arloingi*, XII, 298.
— du daim, XXV, 1048.
— des ruminants dans le Sud-Annam, XIV, 380.
— des félins, XXII, 640, 641.
— du hibou, XXV, 1045.
— du lapin. Dualité. Prophylaxie, XVIII, 363.
— — Pseudo-tubercules du foie, XVIII, 633.
— — en Russie. Rôle du suc gastrique dans l'immunité naturelle, XIX, 266.
— — — Durée de maturation des oocystes des glandes lymphatiques, XIX, 269.
— des oies en Russie, XXV, 1044.
— du porc en France, XIV, 645 (fig.) ; XV, 160.
— — en Russie, XIX, 263 ; XX, 215, 588.
— — sauvage, XXV, 1046.
— de la poule. Formule leucocytaire, XXII, 767.
— des reptiles : chez deux crotales, XII, 11.
— — de la couleuvre à collier, XVII, 871 (fig.).
— — d'un lézard (*Acanthodactylus scutellatus*), XXIII, 186.
— — des voies biliaires d'un lézard, XVI, 408.
— — des serpents, XIV, 82.
— — des voies biliaires d'un serpent (*Tropidonotrus natrix*, var. *persa*), XVIII, 23 (fig.).
— — de *vipera berus*, XVII, 868 (fig.).

— — intestinale de la salamandre noire, XX, 964.
— — — des serpents, XVIII, 707.
— — — de la vipère aspic, XVI, 637 ; XVII, 559 ; XVIII, 707.
— et peste bovine, XIV, 380.
— associée à la peste bovine au Tchad, XVII, 198.
— humaine. Trois cas autochtones d'infection à *Isospora hominis* à Java, XV, 137.
— — intestinale à *Isospora*, XIII, 785.
— — — à *Isospora belli*, XVIII, 570.
— — — à *Isospora belli* à Huê (Annam), XIX, 95.
Coccidium acanthodactyli, n. sp., XXIII, 186.
— *cerastis* = *Eimeria cerastis*, XIV, 82.
— *persicum*, XVIII, 23.
— *scinci*, n. sp., XVI, 408.
Coccobacillus acridiorum pour la destruction de *Stauronotus maroccanus*, VII, 651.
— *bizantinus* utilisé pour le sérodiagnostic du typhus exanthématique, XIV, 142.
Cochinchine. Voir aussi **Indochine.**
— Adénopathies iliaques primitives chez les Annamites, XVII, 67 (fig.).
— Anémie pernicieuse des bovidés, XVI, 575.
— Ankylostomiase, III, 315.
— *Bacillus asthenogenes* dans une fièvre de cause inconnue, XV, 577.
— Béribéri, XVII, 451 ; XVIII, 475 ; XIX, 575, 620 ; XX, 30, 33 ; XXII, 982.
— Bilharziose, III, 315.
— Coccidiose intestinale à *Isospora belli*, XVIII, 570.
— Diarrhée chronique, IX, 715.
— Diarrhée de — (Sprue), XI, 18.
— Distomatose, I, 216.
— Dysenterie amibienne, V, 263 ; VI, 413 ; IX, 709.
— — bacillaire, V, 263 ; VI, 413 ; VIII, 720 ; IX, 710.
— — mixte (amœbo-bacillaire), IX, 719.
— Dysenteries et parasitisme intestinal, IX, 15.
— Encéphalite léthargique, XVI, 399.
— Fièvre de cause inconnue, XIII, 104.
— — — Isolement du *B. asthenogenes*, XV, 577.
— — fluviale du Japon, XXIV, 678.
— — ictéro-hémorragique, XXIV, 440.
— — typhoïde. Formes septicémiques pures, XVII, 163.
— Filariose, I, 369, 563 ; II, 6 ; XVII, 397, 404.
— Helminthiase, XVII, 577.
— — du porc, VI, 41.
— Maladies intestinales, III, 459.
— Mélioïdiose, XXIII, 273.
— Paludisme, III, 626 ; XVII, 799 ; XIX, 677, 841 ; XX, 52, 427, 974, 994 ; XXI, 342.
— — et anophèles, XIX, 806.
— — et *Anopheles aconitus*, XXIV, 554.
— — et constitution du sol, XIX, 935.
— Parasitisme intestinal, VIII, 208, 245 ; IX, 125.
— — — et dysenteries, IX, 15.
— Pasteurellose aviaire, XX, 315.
— — bovine, XVI, 425 ; XXII, 245.
— Peste, XVII, 39.
— — bovine, XVI, 425 ; XXIV, 74.
— Syphilis. Manifestations nerveuses. Tabès, XIX, 81.
— — nerveuse, XX, 116.
— — chez les Annamites, XVII, 453.
— Sprue. Voir Diarrhée de —.
— Tétanos ombilical, XXII, 6.
— Trypanosomiases animales, V, 371 ; XVI, 425.
— Tuberculose chez les Annamites, XVII, 446.
— — Vaccination des nourrissons, XVIII, 379.
— — bovine, XXV, 1026.
— Tumeurs, XVIII, 495.
— — malignes, XIX, 569 (pl.).
— Typhus exanthématique, XXIV, 302, 678.
— Anguillule intestinale, VI, 262.
— *Gastrodiscus hominis*, IV, 488.
— *Hymenolepis nana*, XVIII, 722.
— Moustiques, IV, 395 ; XIX, 472, 703, 806 ; XXIII, 763.
— — *Anopheles aconitus*, XXIV, 554.
— — *Myzomyia karwari*, XXII, 253.
— — — *minimus*, XXIV, 554.
— — *Neocellia maculata*, XIX, 679, 703.
— — Anophèles. Répartition annuelle, XXV, 920.
— — — et paludisme, XIX, 806 ; XXIV, 554 ; XXV, 920.
— — Culicides, XX, 23 (fig.).
— Démographie et hygiène à Saïgon, IV, 69.
— Eaux de boisson à Saïgon, III, 459 ; IV, 347, 734.
— Enquête épidémiologique et entomologique à la plantation de Gia-Nhan, XIX, 677.
— Épidémiologie animale, XVI, 425.
— Mortalité infantile, XX, 52.
— Pathologie annamite, XVII, 434.
— Ration alimentaire du travailleur indigène, XIX, 905.
— Institut Pasteur de Saïgon. Situation actuelle, XIII, 714.
Cocotier. Traitement de la peste du —, XXIV, 146.
Cœnurus ramosus, n. sp., XII, 223 (fig.).
Cœur. Mort subite par paralysie des centres nerveux du —, X, 774.
— Troubles et lésions dans le béribéri, XX, 127, 136.

— Examen radioscopique dans le béribéri, XX, 131 (pl.).
Coléoptères produisant une dermatite vésiculeuse, VIII, 587 (fig.).
Colibacille et fièvre typhoïde, I, 548.
Colites à *Tetramitus* et à *Trichomonas*, V, 725 (fig.).
— de l'homme dues aux protozoaires, XIV, 548.
Colloïdothérapie dans la peste, XV, 903.
Colombie. Ankylostomiase, II, 603.
— Fièvre récurrente, II, 117.
— Pian, II, 245.
Coloration rapide au Giemsa, IV, 230.
— — pour recherches hématologiques, XIX, 723.
— des cryptocoques pathogènes, XVII, 547.
— des entamibes intestinales des selles, XII, 71.
— des *Leishmania*, XVIII, 541 (pl.).
— de l'hématozoaire du paludisme, X, 540 ; XI, 440.
— de sang paludéen en goutte épaisse, X, 702.
— des protozoaires, XXIII, 787, 789.
— hématologiques. Procédé de préparation d'un éosinate de bleu Borrel, XIII, 205.
— Nouvel éosinate de méthylène, XIII, 207.
— panoptique. Préparation d'un éosinate de méthylène, XVIII, 464.
— Bleu au permanganate de potasse, XI, 870.
Colpoda steini, XIV, 553.
Commission du béribéri, III, 135 ; IV, 575, 604, 656.
— des eaux de Saïgon, III, 464 ; IV, 347.
— des élections, III, 487.
— de la lèpre, III, 416 ; IV, 9, 70 ; V, 774.
— de défense des Colonies contre les maladies contagieuses, IV, 649, 650.
— de la maladie du sommeil, III, 597 ; IV, 8.
— — — Rapport général, XXIV, 757.
— de l'opium en Indochine, VI, 296.
— pour l'emploi du 606 aux colonies, VI, 241.
— du 25e anniversaire de la Société de Pathologie exotique, XXV, 187, 1014.
Comores (Iles). Filariose, III, 145.
— — à Mohéli, XI, 62.
— Gale à Mohéli, XI, 62.
— Lèpre, VII, 91.
— — à Mohéli, XI, 61.
— Mycétomes à Mohéli, XI, 62.
— Nodosités juxta-articulaires à Mohéli, XI, 62.
— Paludisme à la Grande-, XXI, 39, 132.
— — à Mohéli, XI, 61.
— Parasitisme intestinal, VI, 455.
— Pian à Mohéli, XI, 62.
— Syphilis à Mohéli, XI, 62.
— Tétanos à Mohéli, XI, 62.
— Tuberculose à Mohéli, XI, 62.
— Ulcère phagédénique à Mohéli, XI, 62.
— Enquête sanitaire à la Grande-, XXI, 35, 132.
— Maladies endémiques à Mohéli, XI, 61.
Complément (Déviation du). Voir **Réaction** de —.
Compsomyia macellaria (Lucilie bouchère). Échantillon de larve, I, 318.
Conférence. Deuxième — de la lèpre, II, 4.
— Troisième — de la lèpre, XVII, 619.
— internationale de la tuberculose à Trinidad, VI, 290.
— — pour l'enfance africaine (Genève), XXIV, 170.
Congo belge. Amibiase dans l'Ouellé, VIII, 742.
— — Amibiase hépatique, XVI, 241.
— — Banga de l'Ouellé, VIII, 743.
— — Béribéri, VII, 402.
— — — dans la vallée de Lukuga, XI, 239.
— — Bilharziose, VIII, 742 ; XIII, 28.
— — Dermatose contagieuse des bovidés, VIII, 354.
— — Dermite granuleuse des équidés, VIII, 362.
— — — ulcéreuse des équidés, IX, 675.
— — Dermo-épidermite papuleuse, XXI, 383 (fig.).
— — Distomatose des primates, VI, 256.
— — Dysenterie bacillaire. Épidémie au Mayombe, XVIII, 532.
— — *East coast fever*. Cas suspects, X, 172.
— Éléphantiasis, VIII, 740 ; IX, 306 ; X, 365.
— — Epizootie de gorets, VIII, 360.
— — Fièvre bilieuse hémoglobinurique et spirochètes, XVII, 291.
— — — récurrente, VIII, 745.
— — — typhoïde au Stanley Pool, XXI, 776.
— — Filariose. Kystes à filaires dans l'Ouellé, VIII, 740.
— — Goitre, VIII, 739.
— — Gynécologiques (cas) chez les Noirs, XXIII, 205.
— — *Heartwater* des moutons, XI, 427.
— — Lèpre au Nepoko, XII, 396.
— — Méningite cérébro-spinale, XI, 779 ; XVIII, 241.
— — Myiases, IX, 763 ; X, 467, 472.
— — — intestinale de l'homme, V, 508.
— — Onchocercose humaine. Répartition, XIII, 848.
— — Ostéoporose, XII, 238.

— — Paludisme congénital. Recherches, XX, 339.
— — — chez les enfants d'Angumu, XXV, 885.
— — Peste du cheval (*Horse-sickness*), XI, 423.
— — Pian, IX, 760 (pl.).
— — Pigmentation. Maladie de dé- chez un indigène, XI, 867.
— — Piroplasmoses, II, 120 ; IX, 100 ; X, 172.
— — Syphilis, VIII, 570.
— — Trypanosomiases animales, V, 45, 281, 608, 819 ; VIII, 561 ; IX, 95 ; X, 113.
— — — — du porc, XXV, 906 (fig.).
— — — — et glossines du Bas-Katanga, V, 45, 281, 608.
— — — — Trypanosome d'un chéiroptère insectivore, XVI, 659 (fig.).
— — — humaine, V, 2 ; VIII, 752 ; IX, 38 ; X, 115, 398 ; XII, 394, 671, 798 ; XVII, 76, 485.
— — Tuberculose, VIII, 739 ; XXIII, 279, 283.
— — — à Léopoldville, VI, 55.
— — Tumeurs chez les Noirs, XII, 567 ; XIX, 564 (fig.) ; XXIII, 205.
— — — Gliome du cerveau chez un nègre, XIII, 34.
— — Traitement de quelques affections (pian, etc.), IX, 760 (fig.).
— — Arthropodes piqueurs parasites du bétail, IX, 763.
— — Auchméromyies, VIII, 459, 593.
— — Champignons des bambous, XIII, 486.
— — — parasite des fourmis, XIX, 818.
— — Diptères. Larve parasite cuticole de l'éléphant d'Afrique, XVII, 86.
— — — hématophages, XXIII, 987.
— — Filaires, XXIV, 882 ; XXV, 889.
— — — Voir aussi *Onchocerca*.
— — *Gastrodiscus ægyptiacus*, XI, 396.
— — Hématozoaires. Voir aussi *Plasmodium*.
— — — de petits mammifères, VIII, 726.
— — — *Bartonella* et *Grahamella* des rats splénectomisés de Stanleyville, XXIII, 464, 944.
— — *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 198, 528.
— — Mouches piqueuses, I, 252 ; V, 45, 281, 608 ; VIII, 463.
— — — — *Glossina morsitans* autour d'Elisabethville, XX, 78 (c.).
— — — — — — Foyer au Bas-Ouellé, XIX, 197.
— — — — — — — Recul devant l'occupation européenne au Katanga, XIX, 222 (c.).
— — — — — *palpalis*. Pupes à 1.500 mètres de l'eau, XV, 23.
— — — — Glossines, VIII, 463.
— — Moustiques, XX, 170, 185.
— — Nématodes parasites, XI, 82.
— — Œstrides, VIII, 452, 687, 765 ; IX, 763.
— — *Onchocerca volvulus* et éléphantiasis dans le Haut-Ouellé, X, 365.
— — Parasites externes des rongeurs, XXII, 661.
— — — sanguicoles des rongeurs, XXII, 657.
— — *Plasmodium* d'une chauve-souris insectivore, XIX, 780 (fig.).
— — — *epomophori*, parasite des roussettes épaulières, XIX, 828 (fig.).
— — *Schistosomum hæmatobium*, XIII, 28.
— — Spirochètes dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XVII, 291.
— — Tiques. *Ornithodorus moubata*, XII, 517.
— — Toxoplasme du lapin, IX, 432.
— — Trypanosomides d'*Hæmatopota*, VI, 182 (fig.).
— — Inspections médicales dans l'Ituri, XII, 394.
— — Passeports médicaux, IV, 433.
— — Pathologie indigène, VIII, 734.
— — Mission de Kisantu, VIII, 560.
— — — R. P. Strong 1926-1927, XXIV, 5.
— — Élevage bovin au Katanga, XXII, 141, 377.
— **(Moyen-) français.** Voir aussi **Afrique équatoriale française.**
— — Alastrim, XII, 489.
— — Alcoolisme, II, 336.
— — Bilharziose, I, 280.
— — Chancre mou, VIII, 207.
— — Charbon bactéridien, XXII, 307.
— — Dysenterie bacillaire, XXIV, 267.
— — Fièvre bilieuse hémoglobinurique. Spirochètes, XV, 699.
— — — rouge congolaise, XX, 779.
— — — typhoïde, XXIV, 902.
— — — — (para-), XXIV, 518.
— — Ictères infectieux, XV, 385.
— — Kystes hydatiques, XVI, 144.
— — Névrite périphérique, III, 251.
— — Onchocercose, XIV, 717 (pl.) ; XV, 303 (fig.).
— — Paludisme, XX, 722.
— — Parasitisme intestinal, XIX, 714.
— — Pseudo-dengue. Voir Fièvre rouge congolaise.
— — Spirochétose humaine, VI, 559 ; XI, 359 ; XII, 497 ; XVI, 184.
— — — — et *Ornithodorus moubata*, XI, 833.
— — — — à Brazzaville. Symptomatologie, diagnostic et traitement, XII, 372.
— — — — et tiques dans le bassin du —, XII, 290.
— — Trypanosomiases animales, II, 209 ; XII, 431.
— — — humaine, III, 529, 561, 593, 604 ; IV, 144, 699 ; V, 284, 403 ; VI, 444 ; VIII, 372 ; XII, 416 ; XIII, 376 (c.), 817, 830 ; XVII, 234, 729 ; XX, 516 ; XXIV, 5.

— — Trypanosomiase humaine. Fonctionnement d'un secteur de prophylaxie, XIII, 376 (c.).
— — — — Enquête démographique et état actuel de la trypanosomiase au pays Bangala, XIII, 830.
— — — — Évolution et état actuel, XIV, 405.
— — Tuberculose. Vaccination à Brazzaville, XXIV, 173.
— — Typhose aviaire, XXIII, 353.
— — Ulcère phagédénique, I, 339.
— — Variole. Emploi du vaccin sec, VII, 17.
— — Microfilaires, II, 208.
— — Mouches piqueuses, III, 529 ; XIII, 377.
— — Moustiques, XIII, 377.
— — — Gîtes à larves à Brazzaville, XXI, 768.
— — *Porocephalus armillatus*, parasite d'un phacochère dans la région de la Sangha, XIII, 659.
— — Spirochètes et ictères épidémiques, XV, 385.
— — Trypanosomes d'animaux divers, II, 204, 209.
Congrès d'agronomie coloniale, III, 206.
— (16e) international de médecine à Budapest, I, 449.
— de la dengue, XXIII, 798.
— national italien des études coloniales, XXIV, 170.
— national du froid, V, 333, 453, 567.
— international des industries frigorifiques, I, 9.
— d'hygiène et de démographie, V, 1.
— international d'hygiène et de santé publiques à Gand (1927), XX, 3.
— international d'hygiène méditerranéenne (Premier), XXV, 513.
— des médecins aliénistes, III, 417 ; V, 1, 54.
— (Premier) de l'Association internationale de médecine tropicale de l'Extrême-Orient, II, 343.
— (Deuxième) de l'Association internationale de médecine tropicale de l'Extrême-Orient et béribéri, V, 334.
— (Troisième) de l'Association internationale de médecine tropicale de l'Extrême-Orient, VII, 10.
— (Cinquième) de l'Association internationale de médecine tropicale de l'Extrême-Orient, XVII, 725.
— international de médecine tropicale (Deuxième), Amsterdam, 1932, XXIV, 629.
— international de médecine tropicale et d'hygiène, Le Caire, 1928, XXI, 86 ; XXIII, 684.
— international des sciences médicales, Londres, V, 53 ; VI, 546.
— de la mutualité coloniale, III, 485.
— international du paludisme (Deuxième), Alger, 1930, XXIV, 626.
— international de pathologie comparée, V, 365.
— des Sociétés savantes à Paris, VI, 544.
Conjonctive. Inoculation accidentelle de bouton d'Orient, X, 1.
Conjonctives (Cellules) et *Leishmania*, II, 26.
Conjonctivites. Voir aussi **Ophtalmie.**
— en Algérie, X, 521 ; XI, 578.
— — à Alger. Étude microbiologique, VII, 18.
— — à Beni-Abbès, VIII, 67.
— — dans le Sahara constantinois, VII, 424.
— au Soudan français, XVII, 716.
— à Tanger, XVII, 925.
— folliculaire à Madagascar, XXIII, 255.
— granuleuse au Nord-Annam, XVI, 299.
— — en Chine, XXIV, 257.
— — — au Setchouen, XI, 815.
— — à la Côte d'Ivoire, XXIV, 410.
— — au Maroc, XIX, 49.
— — au Ouadaï, VII, 524.
— — dans le Sahara constantinois, VII, 424.
— — des régions sahariennes, VI, 634.
— — des travailleurs coloniaux, X, 269, 373.
— — Monographie, XXIII, 136.
— — Intradermo-réaction. Diagnostic. Prophylaxie, XVI, 718.
— — Traitement, XVII, 591, 716 ; XIX, 49.
— infectieuse de Parinaud et fièvre exanthématique, XXIV, 76.
— — et tiques, XXIV, 76.
— phlycténulaire et pédiculose, XIII, 645.
Conjugaisons intraglobulaires dans le paludisme, III, 498.
Conor (A.). Éloge, VII, 260.
Conorhines. Distribution dans l'État de Saint-Paul, VII, 292 (c.).
Conorhinus transmettant un trypanosome à l'homme, II, 304.
— *megistus*. Biologie, V, 22 (fig.).
— — Déjections de — infectant les souris et les rats de *Schizotrypanum cruzi*, V, 261 ; VI, 173.
— — Évolution de *Schizotryp. cruzi* chez —, V, 360 ; VI, 173.
Conseil (E.). Éloge, XXIII, 683.
Conserves alimentaires. Indications et salubrité, XXIV, 421.
Conservation par le froid, III, 173.
Contagion du béribéri, V, 514.
— de la lèpre, I, 288.
— de la tuberculose à Hué, IV, 550.
Contribution volontaire de la Société médico-chirurgicale de l'Ouest-Africain, XIX, 498.
Coprologie en pratique médicale. Traité, XXII, 629.
Copromastix prowazeki, XI, 372.
Corbeau. *Leucocytozoon*, VI, 520.

Cordylobia. Larves parasites du genre —, I, 597.
— *anthropophaga*, IV, 687 ; XI, 759.
— *rodhaini*, VI, 330.
Cornée. Inoculation de trypanosomes dans la —, II, 261 ; V, 723.
Corps en anneau dans le paludisme, II, 235.
— en demi-lune et en pessaire dans le paludisme, I, 201, 251.
— en pessaire, VI, 615 (fig.).
— étranger du pharynx (poisson vivant), V, 41.
— étrangers du tube digestif, XXV, 380.
Corse. Bilharziose parmi les troupes sénégalaises, XX, 206.
— Distomatose hépatique à *Fasciola hepatica* chez l'homme, XXIV, 46.
— Fièvre ondulante, III, 773, 783, 785 ; V, 566, 657 ; VI, 601, 673 ; XXV, 863.
— — à pappataci, V, 710.
— Paludisme, VII, 366 ; XV, 935, 936 ; XVI, 485 ; XXIV, 811.
— — Observations sur le —, XIV, 340, 654, 685 (c.) ; XV, 683.
— — et situation économique, XV, 92 (fig.).
— *Aedes* (*Stegomyia*) *argenteus*, XVIII, 723.
— Anophèles des hautes régions. Présence d'*A. bifurcatus* et d'*A. plumbeus*, XVIII, 655.
— — Gîtes, XIV, 707.
— *Bullinus contortus*, hôte intermédiaire de *Schistosomum hæmatobium*, XV, 208.
— Hématozoaires d'oiseaux, II, 268 ; VI, 515.
— Hémogrégarine de l'homme, XV, 193.
— Microfilaires d'oiseaux, VI, 518.
— Phlébotomes, V, 710, 780 ; VI, 637.
— Vœu au sujet de l'assainissement, XV, 3.
Costa-Rica. Pian, XVIII, 450 (fig.) ; XXI, 667.
Côte d'Ivoire. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Alcoolisme, II, 337 ; V, 855.
— Ankylostomiase, III, 742, 745 ; IV, 117.
— Béribéri, III, 742.
— Blastomycose, IX, 414.
— Fièvre jaune, VII, 552 ; XXIII, 891, 898.
— Goundou, X, 480.
— Lèpre, VII, 559.
— Myiase à *Chrysomyia bezzianum*, XXII, 48.
— — (Pseudo-), X, 725.
— Mycoses gommeuses, XI, 306.
— Œil (Affections de l'), XXIV, 406.
— Paludisme, IV, 108.
— Parasitisme intestinal, IV, 117.
— Peste, XXIII, 891.
— Pied de Madura, VI, 485.
— Piroplasmose bovine, I, 234.
— Pyomyosites, XVI, 710.
— Spirochétose ressemblant à la fièvre jaune, XVI, 238.
— Sprue, XXIII, 709.
— Trypanosomiases animales, IX, 176.
— — — Fonctionnement du service de prophylaxie, VII, 152.
— — humaine, V, 157 ; IX, 168 ; XIV, 326 ; XXIII, 922.
— Tuberculose, V, 855 ; XXIII, 549, 777 ; XXV, 679.
— — zoogléique, IX, 416.
— Ver de Cayor, IV, 687.
— — de Guinée, IV, 206.
— *Chrysomyia megacephala*. Larves cuticoles, V, 737.
— Glossines, V, 157 ; IX, 178 ; X, 37.
— Porocéphales chez les noirs, XII, 92.
— Trypanosomes des muridés, VIII, 80.
— Alimentation en eau potable de la presqu'île d'Abidjan, XIX, 244.
— Hygiène, III, 118, 317, 785, 794 ; V, 150 ; VI, 645.
— Laboratoire de Grand-Bassam. Présentation de photographies, IX, 413.
— Deux années de pratique ophtalmologique, XXIV, 406.
— Protection sanitaire de la main-d'œuvre indigène, XVIII, 439.
— Parc vaccinogène de Bouaké. Fonctionnement, VII, 246 (fig.).
Couleuvres. Voir aussi **Serpents.**
— Propriétés antirabiques et antivenimeuses, XX, 986.
Crabes. Trous de —, gîtes à larves de moustiques, XXII, 175.
Cragg (F. W.). Eloge, XVII, 421.
Crânes trépanés par des Canaques, I, 593.
Crassicauda crassicauda, nématode d'un dauphin *Tursiops tursio*, XXIV, 198 (fig.).
Craw-craw. Caractères, X, 808.
— et dermo-épidermite microbienne. Analogies. Traitement, X, 137.
— ou gale filarienne, XV, 815.
— — Origine dans les kystes sous-cutanés à *Onchocerca volvulus*, XIII, 305, 530, 535.
— — Évolution, XIV, 211.
— — et parasites hématophages, XVII, 409.
— et *leishmania*, X, 806.
— et leishmaniose, IV, 180.
Crénothérapie dans le paludisme, XXIII, 820.
Créosote dans la dysenterie amibienne, I, 68 ; II, 29.
Crespin (J.). Eloge, XIII, 762.
Crésyl. Désinfection stégomycide, V, 561, 627.
— Destruction des larves de moustiques, VI, 646.
— Destruction des poux, VIII, 280.
Crète. « *Tick paralisis* » observée sur des moutons de la région de Sitia, XVII, 378.

Cricetomys gambianus. Hémogrégarine de —, VIII, 728 (fig.).
Crime magico-religieux, XXV, 818.
Crimée. Insectes nuisibles aux plantes médicinales, XIV, 164 (fig.).
— Lutte épidémique chez les réfugiés russes de —, XIV, 187.
Crithidia fasciculata et *melophagi*. Infection de mammifères, VI, 605.
— *oxycareni* n. sp., XV, 113 (fig.).
— parasite des *Stegomyia fasciata*, VI, 708.
Crithidiennes (Formes) de *Trypanosoma rotatorium* se transformant en trypanosomes, IV, 534.
Crocidura murina, réservoir de la peste au Cambodge, VIII, 54.
Crocodiles. Voir aussi **Reptiles.**
— Hémogrégarine, VII, 490.
Crossophorus collaris, ascaride parasite des damans, XIV, 390 (fig.).
Cruz (Oswaldo). Éloge, X, 163.
Cryptococcus americanus, parasite de la blastomycose américaine, XXII, 40.
— *mirandei*, n. sp., XVII, 545.
— — Isolement, XVIII, 124 (fig.).
— — Étude biologique, XVIII, 231.
— *montpellieri*, n. sp., XIX, 586 (fig.).
Cryptocoques dans le tube digestif d'un cheval atteint de lymphangite épizootique, XIV, 66 (fig.).
— de la lymphangite épizootique du cheval. Isolement, XVII, 540.
— — — Coloration, XVII, 547.
— agent d'une dermatite ulcéreuse à la Guyane française, XIV, 335.
— pathogènes dans les ganglions de chevreaux goitreux, XIV, 199.
Cucullanus = *Camallanus*, VIII, 446.
Cuivre (Sels de) dans la lèpre, XX, 58.
Culex à Dakar en 1931, XXV, 813.
— — et dengue, XXV, 815.
— *fatigans*, IV, 27.
— *geniculatus*. Larves de — et larves de culicinés pourvues d'un long siphon, IX, 438 (fig.).
— *hortensis*, XX, 449 (fig.).
— — Caractères distinctifs des larves de — et de *C. apicalis*, XX, 609 (fig.).
— *pipiens*. Autogenèse, XXIV, 384.
— — Biologie, II, 425.
— — Races biologiques, XXV, 1053.
— — Conditions de reproduction pendant la période hivernale, XXII, 549.
— — Race physiologique suractive, XXIII, 196 (fig.).
— — Influence de la température et de la nutrition larvaire sur le développement de —, XXV, 577.
— — Intoxications d'encombrement chez les larves vivant en milieu non renouvelé, XXIII, 978.
— — Infection expérimentale par champignons entomophytes, XXIII, 1025 (fig.).
— — et filariose, XVII, 405.
Culicidés. Voir **Moustiques.**
Culicoïdes hostilissimus, Ien-Ien de Fernando-Po, XXIV, 672 (fig.).
Cultures d'amibes dysentériques, XVIII, 121.
— du bacille tétanique, VI, 605.
— de cryptocoques, XVIII, 124 (fig.), 127.
— du — de la lymphangite épizootique, VIII, 49, 59.
— de flagellés, très anciennes, XVII, 32.
— — (*Herpetomonas ctenopsyllæ*), VIII, 266.
— de *leishmania*, IV, 286.
— de protozoaires, XVIII, 260, 261.
— du vibrion cholérique (milieu sodoglycériné), VIII, 52.
— (Hémo-) des bacilles typhique et paratyphiques au laboratoire de l'Armée d'Orient, XI, 154.
— — Race de *M. paramelitensis* isolée par —, XII, 173.
— — dans la peste bubonique, XIII, 209.
— (Milieu de). Dispositif permettant de contrôler automatiquement la production d'indol, XI, 868.
— maraîchère, agent de dissémination de la dysenterie, VI, 678.
Cutanés. Symptômes — dans la trypanosomiase humaine, VI, 628.
— Maladies — au Congo, VIII, 304.
Cuticoles (Parasites animaux) sous les tropiques, I, 383.
— — Larves du genre *Cordylobia*, I, 597.
Cutiréaction à la tuberculine, IV, 550 ; V, 234, 852, 855.
— — chez les jeunes noirs à Stanleyville (Congo belge), XXIII, 279.
Cycle évolutif de *Trypanosoma cruzi*, V, 360.
— — de quelques trypanosomes, VI, 167.
— — des trypanosomides dans l'hôte invertébré, V, 365.
Cyclite dans la trypanosomiase humaine, I, 398.
Cyclophyllidea trouvés chez l'homme, XXII, 120.
Cyclospora babaulti, n. sp., XVII, 868 (fig.).
— *tropidonoti*, n. sp., XVII, 871 (fig.).
— *viperæ*, n. sp., XVI, 637 (fig.) ; XVII, 339 ; XVIII, 707.
Cyclops et ver de Guinée, VI, 281 ; XI, 338 ; XIII, 234.
Cylicostomose ou cachexie osseuse des équidés du Brésil, IX, 600.
Cylicostomum pileatum, n. sp., VII, 208.
Cynocéphale atteint de goundou, I, 293 ; II, 216.
Cysticercose du chien, XXIII, 877.
— humaine, XXII, 624.
— du porc, XXIII, 880.

Cystite amibienne en Grèce, XI, 685.
— — aiguë, XXIII, 457.

D

Dacaga, maladie contagieuse de l'Oubangui-Chari, XI, 862.
Dahomey. Voir aussi **Afrique occidentale française, Haut-Sénégal et Niger** (Ancienne colonie du).
— Alcoolisme, II, 336.
— Bilharziose, V, 837.
— Chéloïdes géantes, X, 814.
— Fièvre jaune, V, 648 ; XI, 553 ; XXV, 834.
— Leishmaniose cutanée, VI, 624 ; VII, 46.
— Lèpre, XXIV, 585.
— Paludisme, XII, 304 ; XXI, 323 ; XXIII, 106.
— Parasitisme intestinal, XXIII, 859.
— Piroplasmose bovine, V, 482.
— Rage canine, XIV, 6.
— — humaine, I, 524.
— Trypanosomiases animales, I, 519 ; III, 551.
— — humaine, I, 524.
— Vaccination antivariolique et vaccine, XIV, 26.
— Indice *Aedinæ* à Cotonou, XXIV, 292.
— Insectes piqueurs, I, 254 ; II, 129 ; III, 559 ; IV, 122.
— *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 198.
— Moustiques. Lutte antilarvaire dans une zone inondée, XXI, 323.
— Rats. Destruction, XVIII, 396.
— Enquête démographique dans le Bas-, XXIV, 604.
Daman, animal d'expériences, XXIV, 503.
— Ascaride (*Crossophorus collaris*) parasite des —, XIV, 390.
Darling (Samuel). Eloge, XVIII, 443.
Darmous du mouton. Étiologie, XXIV, 848 (fig.).
Davainea madagascariensis. Structure de la tête, IX, 413.
Debab. Voir **Trypanosomiases animales.**
Delhi (Bouton de). Voir **Leishmaniose cutanée.**
Démence. Episode démentiel dans le paludisme à *Pl. præcox*, XXV, 307.
Démission de M. Chatin, IV, 373.
Demodex dans la lèpre, IV, 246.
— Dermatose et gale à — chez les bovidés, X, 117.
Démographie et hygiène de la ville de Saïgon, IV, 69.
— de Casablanca, XII, 525.
— aux îles Loyalty, VII, 598.
— enquête au pays Kabré (Nord-Togo), XXV, 986.
Dendrophis pictus. Propriétés venimeuses de la sécrétion parotidienne, X, 474.
Dendromys sp. ? Trypanosome, VIII, 726 (fig.).
Dengue en Afrique occidentale française, XX, 320.
— hivernale en Chine du Nord, XXI, 617.
— en Grèce, XXII, 272.
— — ictérogène à l'île de Syra, XXV, 552.
— au Sénégal (Dakar), XX, 92.
— — — Spirochète rencontré dans un cas de —, XIX, 860.
— — (Saint-Louis), XXII, 228.
— au Soudan, XIX, 881 ; XXI, 577.
— à Tunis, XX, 703.
— en Turquie (Trébizonde), X, 724.
— Étiologie, XIV, 198, 447 ; XXI, 200 ; XXII, 275, 449.
— Recherches urologiques, XXI, 92.
— Constatation de spirochètes dans le sang, XIV, 198 ; XIX, 860.
— et *stegomyia*, IV. 26.
— et fièvre jaune. Rapports étiologiques, XXII, 538 ; XXIII, 155.
— et fièvre à phlébotomes, IX, 778 ; XXII, 288, 419.
— et fièvre rouge congolaise, XXI, 18, 583.
— (Pseudo-) ou fièvre rouge congolaise, XX, 779.
— compliquée d'ictère, XXI, 748 ; XXV, 552.
— Complications : orchite et ovarite, XX, 402.
— Syndrome exanthématique au cours d'une épidémie, XXV, 7.
— Recherches expérimentales, XXII, 22, 68.
— Transmission expérimentale, XXI, 525.
— Prophylaxie, XXIII, 797.
Dents barrées, XXIII, 530.
— Dystrophie dentaire (darmous) du mouton, XXIV, 848 (fig.).
— Laquage des — en Indochine, V, 401.
— Soins des — au Maroc, XXIII, 58, 263.
Dépigmentation chez l'homme à La Réunion, IV, 227 (pl.).
Dercum (Maladie de) chez une indigène marocaine, XVIII, 246 (fig.).
Dermanyssus gallinæ hirundinis, VIII, 657.
Dermatite. Voir aussi **Dermatose, Dermite, Dermo-épidermite.**
— ulcéreuse de nature mycosique à la Guyane française, XIV, 354.
— vésiculeuse causée par un coléoptère, VIII, 587 (fig., pl.).
— verruqueuse ; mycose à *Phyalophora* et à *Arotheca*, XVII. 227 (fig.).
— — aux Indes néerlandaises, XXIII, 765.

— du Soudan due à la plante *Haplophyllium tuberculatum*, X, 542.
Dermatococcus congolensis, n. sp., IX, 675.
Dermatophylus congolensis, n. sp., VIII, 334 ; IX, 290.
— *lagrangei*, n. sp., XVIII, 399 (fig.).
Dermatose contagieuse des bovidés, VIII, 354.
— — — Étude du *Dermatophilus congolensis*, IX, 290.
— prurigineuse due aux papillons saturnides du genre *Hylesia*, XI, 104.
— et gale démodectique des bovidés, X, 117.
Dermite dyschromique marginée d'origine filarienne, XVIII, 316 (fig.).
— granuleuse des équidés, VIII, 362, 695 (fig.) ; X, 726.
— — — Étiologie et traitement, XI, 575.
— ulcéreuse des équidés au Congo belge, IX, 675, 678.
Dermocoque et éléphantiasis, VI, 667.
Dermo-épidermite microbienne et craw-craw, X, 137.
— papuleuse épidémique au Bas-Congo, XXI, 383 (fig.).
Désinfection des lettres, II, 327.
— Type de cabine-étuve pour infirmerie indigène, XII, 535.
Dessiccation. Action sur l'œuf de *Schistosomum hæmatobium*, III, 533.
— du vaccin pour les pays chauds, IV, 283, 345.
205 Bayer. Voir **Chimiothérapie.**
269 Fourneau. Voir **Arsenicaux.**
270 Fourneau. Voir **Arsenicaux.**
2754 Hœchst. Voir **Arsenicaux.**
Déviation du complément. Voir **Réaction de —.**
Diabète sucré chez un noir d'Afrique, XXI, 701.
Diagnostic des *Amœba hystolytica*, VI, 183.
— des trypanosomiases, V, 611 ; VIII, 112.
— (Xéno-) des trypanosomiases par l'emploi de l'hôte invertébré, VII, 706.
Diarrhée en Annam, XIII, 602.
— Étiologie de quelques — rebelles, IX, 293, 709.
— cholériforme. Traitement par la trypaflavine, XXIV, 783 ; XXV, 196.
— de Cochinchine (— chroniques des pays chauds, sprue). Étiologie. Vaccinothérapie, VII, 268.
— — chez un Européen à la Côte d'Ivoire, XXIII, 709.
— — en Géorgie, XIX, 201.
— — et blastomycose, I, 342.
— — et *Lamblia*, II, 93.
— — Diagnostic, XIII, 384.
— — et mycologie du canal intestinal à Porto-Rico, XXII, 58.
— — et sprue, I, 344.
— — Traitement, I, 345.
— — — photothermique, IV, 155.
— — — par l'héliothérapie et la thermothérapie, XI, 18.
— — — par l'acide chlorhydrique, IV, 162.
— — — à l'iode, XXII, 916.
— — Revue des travaux récents, XXII, 998.
— dysentériforme à Dakar, XXV, 670.
— — mycosique à *Monilia*, XXII, 11.
— à flagellés, XIII, 116.
— — à *Trichomonas* au Maroc, XVII, 128.
— infantiles à Rio-de-Janeiro, III, 47.
— — à coccobacilles, XVI, 708.
— noire, VI, 567.
— cholériforme des équidés soudanais, I, 240.
Dicrocœliidé, parasite des primates, VI, 256 (pl.).
Dictyostelium mucoroïdes coexistant avec une entamibe chez un singe, V, 180.
Dieudonné (Milieu de) pour l'isolement des vibrions cholériques, V, 267 ; VI, 483.
Différenciation des trypanosomiases, VIII, 112.
Digitale (Empreinte) pour passeports, IV, 433.
Diphtérie à Dakar, XXV, 669, 796, 837.
— à Tananarive, XXII, 748.
— Réaction de Schick chez le malgache des Hauts-Plateaux, XXIII, 1000.
— Reviviscence du virus au bout d'un an, I, 179.
Diplopylidium monoophoroïdes, n. sp., XXI, 252.
Diptères. Voir aussi **Insectes, Mouches, Moustiques, Œstres, Phlébotomes, Puces, Simulies, Taons.**
— Larves du genre *Cordylobia*, I, 597.
— piqueurs, III, 754.
— vulnérants du Vénézuéla, IV, 573.
Dipylidium. Considérations sur le genre, XX, 434 ; XXI, 239.
— *caninum.* Cycle évolutif, IX, 578.
— *carracidoi*, n. sp., XXI, 242, 249 (fig.).
— (*Progynopylidium monoophorum*), XXI, 246.
— *porimamillanum*, n. sp., XXI, 241, 247 (fig.).
Dirofilaria repens, V, 732 ; VI, 93, 593, 690.
Discomyces maduræ, V, 707 ; VI, 296.
— *carougeaui*, VI, 711.
Dispensaire antipaludique du Gouvernement militaire de Paris, XII, 549.
Dispharagus spiralis columbæ, III, 38.
Distinctions honorifiques, XVI, 465.

Distoma subflavum = *Encyclometra subflava*, XVII, 572.
Distomatose en Annam, XIII, 601.
— hépatique. Formule leucocytaire, I, 54.
— — chez les indigènes du Tonkin et du Nord-Annam, II, 488.
— — au Tonkin, I, 220.
— — — Extrême rareté chez l'homme ; fréquence chez le porc, IV, 200.
— — à *Clonorchis sinensis*, XXV, 147.
— — humaine à *Fasciola hepatica*, d'origine algérienne, XXII, 673.
— — — — en Corse, XXIV, 46.
— — — à *Opistorchis* au Laos, XXII, 331.
— humaine en Algérie. Effets du stovarsol, XXI, 222.
— — au Vénézuéla, XIV, 382.
— *Fasciolopsis buski* en Cochinchine, I, 216.
— — — au Tonkin, IV, 200.
— Tubage duodénal, XXIV, 286, 670 ; XXV, 147.
— Traitement, XXV, 147.
— des moutons à Madagascar, XXII, 521, 525.
Distomes. Voir aussi **Douve**, *Opistorchis*.
— parasites des primates au Congo belge, VI, 256 (fig.).
Dourine. Voir **Trypanosomiases animales.**
Douve hépatique à Tchentou, VI, 704.
— oculaire de la poule, III, 245.
Dracunculose. Voir aussi **Ver de Guinée.**
— et urticaire, I, 309, 330.
— Arthrites puriformes dans la —, XXIII, 1020.
— Cure arsénobenzolée, XII, 730.
Dracunculus dahomensis, III, 94.
Dragonneau. Voir **Ver de Guinée.**
Dumas (R.). Éloge, XXIII, 351.
Dupuy (J.). Éloge, XIV, 446.
Dyé (L.). Éloge, XXIII, 134.
Dyschromie mycosique. Parasite. Traitement, XXIV, 215.
Dysenterie. Émanations toxiques des selles, I, 358, 384.
— Étiologie des — rebelles, IX, 293.
— Entérites simulant les —, XVII, 128, 367, 557.
— **amibienne.** Voir aussi **Amibiase.**
— — en Annam, VI, 678.
— — au Cameroun pendant la campagne, IX, 589.
— — — (Douala), XI, 754.
— — en Cochinchine (Saïgon), V, 263 ; VI, 413 ; IX, 709.
— — en Égypte, XXII, 8.
— — en Espagne, X, 904.
— — (?) en France, dans un cantonnement de la Somme, X, 442.
— — en Guyane française, IX, 396.
— — à Madagascar, XX, 465.
— — au Maroc, XXI, 94, 444.
— — en Russie, X, 125.
— — au Sénégal (Dakar), XVI, 457.
— — au Tchad (Ouadaï), VII, 525.
— — en Tunisie, VI, 316.
— — L'amibe dysentérique est-elle bien la cause de la —, XI, 837.
— — Les amibes, I, 104 (fig.).
— — Cytologie des selles, XXII, 424.
— — et choléra, VIII, 641.
— — et cystite amibienne, XVIII, 478.
— — Péricardite au cours de la —, XXI, 753.
— — et pseudo-pycnose des neutrophiles, XXIV, 469.
— — Infection double mixte par *Schistosomum mansoni* et *Sch. hæmatobium* chez un malade atteint de —, XVIII, 438.
— — Réflexe cutané abdominal, XXV, 951.
— — chez le chien, XIII, 161.
— — spontanée chez le chimpanzé, XVII, 771.
— — chronique. Sérothérapie, XXII, 156.
— — Traitement par l'acétylarsan, XIX, 399.
— — — par l'amiphène, XXIV, 28.
— — — par l'atoxyl en lavements, V, 565.
— — — par les chytridinées parasites des amibes, XVIII, 18.
— — — par la créosote, I, 68 ; II, 29.
— — — par l'émétine, VI, 313, 424, 491, 564, 609, 716, 723 ; VII, 142, 303, 405 ; X, 23 ; XIX, 672.
— — — par l'émétine et le salvarsan, XII, 632.
— — — par le galyl, X, 277.
— — — par l'iodure double d'émétine et de bismuth, X, 247.
— — — par l'ipéca désémétinisé, IV, 322.
— — — par le kho-sam, I, 72, 77.
— — — par le salvarsan et l'émétine, XII, 632.
— — — par le stovarsol, XVI, 79, 557 ; XVII, 119, 555.
— — — par le sucre en lavements, V, 846.
— — — par le vernis du Japon, I, 77, 307.
— — — par le Yatrène, XXI, 367.
— **bacillaire** en Afrique équatoriale française, VIII, 303 ; XXIII, 385.
— — — — Bacilles dysentériques et pseudo-dysentériques, XXIII, 387.
— — en Afrique orientale parmi les troupes coloniales belges, XII, 141.
— — en Cochinchine, VI, 413 ; IX, 709.
— — — à Saïgon, V, 263 ; VIII, 720.
— — au Congo, VIII, 303 ;
— — — (Brazzaville, 1930), XXIV, 267.
— — au Congo belge (Mayombe), XVIII, 532.
— — en Égypte, XXII, 10.
— — à Madagascar, XX, 465 ; XXI, 709.

— — — à Tananarive, XXIII, 428, 429, 433.
— — — (Sud-Ouest), XXV, 374.
— — — Sondage épidémiologique par la séro-agglutination, XXIV, 612.
— — au Maroc, XXI, 447.
— — au Pérou. Première constatation à Arequipa, XI, 268.
— — Cytologie des selles, XXII, 424.
— — Diagnostic, XXIV, 505.
— — Arthrite du genou, X, 10.
— — chez les Macaques, II, 17, 20.
— — Sérothérapie, XXI, 16.
— — Traitement, XXIV, 505.
— — et émétine, VI, 723 ; VII, 140.
— **mixte** (amœbo-bacillaire), XIII, 117.
— — en Cochinchine (Saïgon), V, 263.
— — — IX, 709.
— — à la Guyane française, IX, 396.
— — à Shangaï, V, 468.
— — et émétine, VII, 140, 405.
— amœbo-spirillaire, VI, 424.
— bactériennes en Égypte, XXII, 10.
— balantidienne. Un cas en France. Traitement, XI, 558.
— bilharzienne. *Schistosomum mansoni* à Madagascar, XI, 34.
— à flagellé nouveau, VII, 571.
— à *Giardia*, XVII, 367.
— à *Trichomonas*, VI, 120, 425 ; XVII, 128, 367, 557.
— indochinoises et parasitisme intestinal, VIII, 208 ; IX, 15.
— paludéenne, I, 224.
— diverses à Madagascar. Syndromes dysentériques guéris par le traitement anthelminthique, XVI, 330.
— — à Salonique en 1918, XIII, 111.
— rouge, coccidiose intestinale du bœuf en Piémont, X, 446.
Dysentériques (Bacilles para) isolés en Algérie, X, 438.
— (Bacilles pseudo). Rôle dans les infections intestinales en Algérie, IX, 204.
Dysplasie périostale, XVII, 514.
Dyspnée tropicale, II, 438.

E

Eaux. Action sur les œufs de *Schistosomum hæmatobium*, III, 532.
— de boisson. Indice parasitaire comme mesure de leur pureté, IX, 795.
— — Pureté et parasitisme intestinal, XIV, 85.
— — de Cayenne, IX, 391.
— — de Douala, XII, 192.
— — de Nouméa (Javellisation), XXI, 663.
— — à Saïgon, III, 459 ; IV, 347, 434.
— d'égout et méthode d'épuration en Indochine, IV, 330.
— de mer. Vibrions cholériques isolés de l'—, VI, 9.
— Protozoaires (*Prowazekia Ninæ-Kohl-Yakimoff* et *Uronema caudatum*) dans les — de la Néva, XV, 12.
— bicarbonatées sodiques en Annam, III, 549.
— d'Encausse. Effets sur les paludéens, XXIII, 833.
— — Influence de la cure sur le chimisme sanguin, XXIV, 222.
— de Vichy. Effets sur les coloniaux, XXIII, 854.
— oxygénée. Conservation du perborate de soude, XXIV, 621.
Echinococcose en Grèce, XXIV, 49.
— à Madagascar, XXIV, 972.
— en Syrie, XX, 1004.
— du poumon du bœuf, XXIII, 871.
Eclampsie infantile et paludisme, XI, 560.
Ectoparasites des rats, II, 323.
Écureuil volant. *Trypanosoma denysi*, parasite de l'—, V, 608 ; VI, 182.
Édentés. Piroplasme et microfilaire de *Bradypus tridactylus*, X, 173.
— Microfilaire de *Dasypus* sp. ? et de *Myrmecophaga jubata*, XI, 394.
— Plasmodie du fourmilier *Manes pentadactyla*, XXI, 205.
Egagropile chez un chien mort de rage, XXV, 175.
Égypte. Amibiase, XVI, 263.
— Bilharziose, XVII, 812 ; XXII, 10.
— Dysenterie amibienne, XXII, 8.
— — bacillaire, XXII, 10.
— Fièvre catarrhale des ovins et des caprins, II, 154.
— — ondulante, I, 476, 544.
— Filariose, XVII, 815.
— Hématurie, XVII, 811.
— Leishmaniose cutanée. II. 628.
— — interne chez les indigènes et splénomégalie, XV, 843.
— Maladie nouvelle des poules, à virus filtrable, XXII, 64.
— Voyage médical, XXIII, 265.
— Chèvres mangeuses de papier, XXII, 81.
— Étude bactériologique de la « bousa », bière indigène, XXI, 537.
Eimeria arloingi. Parasitisme latent et coccidiose de la chèvre au Maroc, XII, 298.
— *brumpti*, n. sp., XIV, 645 (fig.) ; XV, 160.
— *cerastis*, XIV, 82.
— *crotalæ*, n. sp., XII, 12.
— *cystis felleæ*, XIV, 83.
— *deblieckí* = *E. suis* = *E. brumpti*, XV, 160.
— *mesnili*, n. sp., XXII, 640.
— *nina-kohl-yakimovi*. Étude expérimentale, XXV, 715.
— *novowenyoni*, n. sp., XXII, 640.
— *yakimovi*, n. sp., XXII, 69.
— *zamenis*, n. sp., XIV, 83.
— *zurnabadensis*, n. sp., XXIV, 645.
Élections. I, 10, 63, 191, 381, 391 ; II, 274, 344, 562 ; III, 7, 694 ; IV, 69 ;

V, 162, 573, 775 ; VI, 2, 105, 239, 384, 479, 546, 597, 658 ; VII, 3, 175, 370, 551 ; VIII, 565, 711 ; IX, 550, 754 ; X, 680, 859 ; XI, 682 ; XII, 289, 477, 721, 722 ; XIII, 13, 97, 158, 393, 639, 763 ; XIV, 626 ; XV, 103, 778 ; XVI, 70, 157, 389, 633 ; XVII, 9, 423, 726 ; XVIII, 513, 677 ; 693 ; XIX, 74, 167, 258, 321, 397, 498, 514 ; XX, 3, 206, 449, 946 ; XXI, 8, 86, 419, 606, 708, 829 ; XXII, 57, 230, 297, 398, 532, 886 ; XXIII, 265, 559, 685, 1003 ; XXIV, 59, 73, 254, 517, 881 ; XXV, 97, 281, 1013, 1108.
— Ajournement de l'— du Président, IV, 654.
Électricité. Accident mortel causé par le courant alternatif de 110 volts, XXIII, 345.
Éléphant d'Afrique. Larve de diptère parasite, XVII, 86 (fig.).
— — Nématodes parasites, XV, 122.
— — Œstrides, VIII, 765.
— d'Asie. Helminthes, VII, 78, 129, 206 ; VIII, 117.
Éléphantiasis en Algérie (— streptococciques), V, 57 (pl.).
— au Cameroun (Douala), XI, 749.
— au Congo belge (Ouellé) et *Onchocerca volvulus*, VIII, 740 ; IX, 305, 365 ; X, 365.
— en Guinée (région militaire) et *Onchocerca volvulus*, X, 155.
— à Madagascar (Sud et Sud-Est), XXI, 722.
— au Maroc, XVI, 422, 494.
— au Sénégal, V, 625.
— au Soudan français et onchocercose, XXII, 499 (pl.), 503.
— *arabum* aux îles Wallis et théorie filarienne, III, 401, 609.
— Étiologie, II, 353 ; III, 401.
— et filaires, V, 624 ; VI, 80, 663 ; VIII, 740 ; IX, 305 ; X, 155, 365.
— Observations microbiologiques, V, 59.
— et lymphangite endémique des pays chauds, I, 383, 473.
— et éosinophilie, III, 609.
— chirurgical, V, 625.
— du pied simulant un pied de Madura, V, 56 (pl.).
— du scrotum, V, 625 (pl.).
— de la verge, XI, 714.
— de la vulve, II, 8.
— Traitement palliatif, I, 285 (fig.).
— — par le perchlorure de fer, II, 360.
— — par le sérum antistreptococcique, II, 362 (fig.).
Élevage au Chili, XIX, 168.
— au Katanga, XXII, 141, 377.
Elmassian (M.). Éloge, VII, 3.
Emberiza cirlus. *Leucocytozoon* de —, V, 85.
Émétine dans les abcès du foie, VI, 426, 716, 723 ; VII, 142.
— dans les adénopathies primitives, XVII, 67.
— et amibiase, X, 23 ; XVI, 263, 308 ; XVII, 212 ; XIX, 176, 672.
— — (abcès amibiens), XV, 537.
— dans l'amibiase hépatique, VI, 564, 726 ; VII, 142, 311, 659 ; XXV, 421.
— et *amœba coli*, X, 539.
— dans la cystite amibienne, XVIII, 478.
— et dysenterie amibienne, VI, 313, 425, 491, 564 ; VII, 142, 303, 405, 659 ; VIII, 332 ; IX, 325 ; XII, 632.
— — amœbo-bacillaire, VI, 424 ; VII, 140, 405.
— et histolyse des amibes dysentériques, X, 445.
— et dysenterie bacillaire, VII, 140, 405.
— dans les bilharzioses, XVI, 562 ; XVII, 722 ; XXII, 168.
— dans les hémorroïdes, XI, 401.
— dans l'hépatite suppurée, XXV, 837.
— dans la leishmaniose cutanée, XIII, 290.
— dans le parasitisme intestinal, XI, 401.
— dans la prostatite aiguë, XI, 401.
— et syphilis, VI, 424.
— et troubles uro-génitaux. Guérison, XXI, 883.
— (Chlorhydrate d'—). Toxicité chez l'homme, XII, 521.
— (Iodure double d'—) et de bismuth et amibiase intestinale, X, 247.
— Anaphylaxie locale, XV, 680.
— Intoxication, XI, 405.
— Doses limites pour le calfat, VI, 642.
Émétique dans les bilharzioses, XIV, 299 ; XVI, 560, 564 ; XVII, 722.
— — en lavements dans la b. intestinale, XX, 285.
— dans la clonorchiase, XIV, 161.
— dans la dracunculose, XVI, 566 ; XX, 285.
— dans la fièvre récurrente, XVI, 303.
— dans la filariose, III, 202 ; VI, 457.
— dans le *granuloma venereum*, XXI, 361 ; XXII, 21, 148 (fig.).
— dans la leishmaniose américaine, VII, 277 ; X, 34 (pl.) ; XIII, 239.
— — cutanée, XI, 564.
— — interne, VIII, 63 ; X, 762.
— dans le paludisme, X, 287.
— dans le pian, X, 863 ; XVII, 95.
— dans les spirochétoses et en particulier la syphilis, I, 613.
— dans les trypanosomiases animales et expérimentales. Mode d'action et d'administration, IX, 813.
— — — I, 44, 212, 527 ; VI, 539 ; VIII, 339, 348 ; XIII, 583.
— — — bovines, II, 125 ; III, 233 ; VI, 539 ; VIII, 339, 348 ; XII, 514 ; XXII, 385.
— — — des chevaux du Maroc, XI, 448.
— — — dans le tahaga, XXII, 664.

— dans les trypanosomiases animales. Action protectrice et immunisante du sérum des animaux trypanosomés traités, VII, 670.
— — — Action protectrice et immunisante du sérum des animaux trypanosomés traités, VII, 670.
— — humaine, I, 569 ; II, 308 ; III, 642 ; XV, 60, 741 ; XVII, 79, 179, 492.
— — — (— huileux), XI, 379.
— dans l'ulcère phagédénique, XXV, 333.
— associé à un extrait d'organes dans la dracunculose, XVII, 846.
— — à l'atoxyl dans la trypanosomiase humaine, I, 510, 569 ; II, 312 ; III, 333, 642.
— — à l'atoxyl et au 205 Bayer dans la trypanosomiase humaine, XVIII, 312.
— d'aniline associé à l'atoxyl chez les malades trypanosomés avancés, III, 194, 228.
— Action sur le pouvoir alexique du sérum, VII, 626.
— Accidents d'intoxication, II, 317.
Empoisonnement par les poissons, II, 214.
Empreinte digitale pour passeports, IV, 433.
Enanthiotamnose, VII, 90.
Encéphale. Gliome du cerveau chez un nègre, XIII, 34.
— Embolie de *Piroplasma canis* dans les capillaires, XII, 651.
Encéphalite léthargique. Deux cas autochtones à Madagascar, XXI, 347.
— — en Cochinchine, XVI, 399.
— épidémique à forme myoclonique chez un Européen à Dakar, XVII, 275.
Encéphalo-myélite pseudo-épizootique du cheval, IX, 557.
Encyclometra subflava = Distoma subflavum, XVII, 572 (fig.).
Endermophyton indicum, n. sp., XVI, 114 (pl.).
— *tropicale*, n. sp., XVI, 113 (fig., pl.).
Endocardite à entérocoque, XXII, 690.
— maligne à streptocoque, XXV, 668.
Endomyces molardi, n. sp., XV, 341.
Enfance (Première) à Cayenne, XX, 991.
Enfants rouges du Cameroun, XXV, 46.
Engasgo (Mal d'—), VI, 47.
Entamœba. Voir **Amibes.**
Entéqué des bovins du Chili, XIX, 133, 174.
Entérites dysentériformes. Séquelles chirurgicales, XVIII, 828.
— — Traitement par la santonine, XXII, 227.
Entérocoques. Septicémie à —, XXII, 690.
— Isolement et culture, XXII, 693.
Enteromonas hominis, X, 756 (fig.) ; XI, 371.
Entomologie médicale. Traité, VII, 259.
Envenimation au Congo, VIII, 310.
Enzootie inédite sur les ovins et caprins en Égypte, II, 154.
Eosinophiles. Variations de nombre dans la fièvre récurrente, XIII, 68.
— Diminution dans les spirochétoses, XII, 497, 621.
Eosinophilie dans la dysenterie amibienne, II, 31.
— et *Filaria loa*, IV, 205.
— et filariose, XII, 46 ; XXII, 325.
— dans la filariose et l'éléphantiasis, III, 609.
— dans les helminthiasès, I, 459, 463.
— locale dans le larbish, X, 294.
— — dans la maladie de Raynaud, V, 342.
— et parasitisme intestinal, XXIII, 195, 792.
— parmi les habitants du Sud-Oranais, III, 476.
Eparséno. Voir **Arsénobenzènes.**
Épervier. *Leucocytozoon*, V, 18.
Eperythrozoon coccoïdes, microbe du sang de souris splénectomisées, XXII, 531.
Épidémiologie du choléra en Turquie, VII, 313.
— du paludisme, VII, 25.
— de la tuberculose en Annam, V, 234.
— — au Sénégal, VI, 11.
— Traité, XVIII, 298.
Epidermophyton du singe, V, 60 (fig., pl.).
Epileptoïdes (Attaques) dans la trypanosomiase humaine, II, 314.
Epistaxis, signe de spirochétose chez les bovidés, III, 73.
Épithélioma. Voir **Tumeurs.**
Épuration des eaux d'égout en Indochine, IV, 330.
Équidés. Voir aussi **Anes, Chevaux, Mules, Mulets.**
— Anémie infectieuse, XVI, 525.
— Cachexie osseuse au Brésil, IX, 600.
— Dermite granuleuse, X, 724.
— — — Étiologie et traitement, XI, 575.
— — ulcéreuse au Congo belge, IX, 675.
— Filarioses, V, 623.
— Habronémoses, XIV, 471.
— Lymphangite épizootique, XIII, 158.
— — ulcéreuse, XII, 9.
— Mélioïdiose, XXIII, 210 (pl.).
— Piroplasmoses des — de l'Ouellé, IX, 95.
— Peste en Somalie italienne, XII, 485.
— Trypanosomiases, III, 380, 478 ; IX, 95.
— — à *Tr. dimorphon*, XIII, 241.
— — Nagana. Symptômes nerveux et persistance de trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien, XII, 17.

— — dans l'Ouellé, IX, 95.
— — au Vénézuéla, XIII, 297.
— *Gastrodiscus ægyptiacus* au Congo belge, XI, 397.
— Helminthes en Haute-Guinée française, XIII, 178.
— Microfilaires au Turkestan, IX, 220, 222.
Errata, III, 794 ; IV, 721 ; VI, 241, 376 ; VIII, 555 ; XI, 152 ; XII, 120 ; XV, 99, 188, 1001 ; XVI, 385, 630, 701 ; XVII, 520, 850 ; XVIII, 119, 574 ; XIX, 256, 317 ; XX, 204, 705, 830 ; XXI, 274, 351, 416, 884 ; XXII, 880 ; XXIV, 168.
Érysipèle du littoral, onchocercose humaine au Guatemala, XII, 442.
— Traitement par applications locales de sérum antistreptococcique, XXV, 840.
Érythème cholérique, VII, 338 (fig.).
— circiné dans la trypanosomiase humaine, I, 570 ; II, 532 ; III, 728.
— ortié d'origine acarienne chez un Algérien, I, 177.
— noueux et lèpre, IV, 278.
Espagne. Dysenterie tropicale, X, 904.
— Leishmaniose cutanée contractée en —, XIII, 235.
— Peste, XVII, 20.
— Sodoku, XXIII, 266.
Espundia du Pérou. Description, IV, 489.
— — = Bouba = Leishmaniose, V, 176, 411, 486.
— — et blastomycose, XXII, 40.
Eucalyptus (Essence d'—). Destruction des poux, VIII, 378.
Euphorbes parasitées par *Leptomonas davidi*, II, 344 ; IV, 198, 461, 464, 532, 626, 669 ; VI, 292.
— Flagellose, XIII, 796 ; XV, 149, 166, 205, 408 ; XX, 14.
— — Insectes propagateurs, XII, 513 ; XIV, 148.
— — Flagellés parasites, XVIII, 251 (fig.), 257.
— Protozoaire d'*Euphorbia cereiformis* ; sa culture, XVI, 642 (fig.).
— Spirochètes, XXIV, 809 (fig.).
— Spirochétose des punaises des — et du latex, XIV, 205 (fig.).
— Trypanosome dans le latex d'*Euphorbia nereifolia* et *E. cœrulescens*, XV, 18 (fig.), 299 (fig.).
— Action du latex sur différents trypanosomes, XVI, 41.
— Cultures de flagellés dans des latex divers, XVI, 41.
— — Cultures des trypanosomes des —, XV, 301.
— Inoculation de différents protozoaires,, XV, 792 (fig.).
— — de flagellés d'insectes dans le latex des —, XVI, 646.
— Existence de l'*Euphorbia thymifolia* dans le cercle des Doukkala (Maroc), XIII, 13.
Eurytrema brumpti, n. sp., V, 833.
Évacuation des matières usées à Dakar, XIX, 944.
Évolution de *Trypanosoma cruzi* chez divers ectoparasites, V, 360.
— comparée des trypanosomes chez les glossines, VI, 435 (fig.).
Exanthèmes de la variole et de la vaccine, VI, 488.

F

Fasciolopsis. Voir **Distomatose.**
Favus du cheval à Madagascar, VI, 300 (pl.).
Fèces. Prélèvement, envoi et examen pour la recherche du vibrion cholérique, VIII, 98.
Félidés. Voir aussi **Chat, Léopard.**
— Helminthes en Haute-Guinée française, XIII, 180.
— Strongylidé vivant dans les kystes intestinaux d'un léopard, XI, 86 (fig.).
— Kystes de la paroi intestinale causés par un nématode chez un léopard, XI, 573.
— Coccidiose du lion, XXII, 641.
— — du tigre, XXII, 640.
Férule. Toxicité pour le lapin et le porc, XIX, 22.
Fibrolysine dans l'éléphantiasis, I, 285.
Fibromes. Voir **Tumeurs.**
Fibro-molluscum. Voir *Molluscum.*
Ficus. Voir aussi **Figuiers.**
— *glabrata* dans l'ankylostomiase, II, 603.
— Latex parasiticide des —, V, 453.
Fièvre asthéno-myalgique de cause inconnue en Cochinchine, XIII, 104.
— — — Isolement du *Bacillus asthenogenes*, XV, 577.
— non classée à hématozoaire flagellé nouveau, XII, 80.
— simulant le paludisme en Nouvelle-Calédonie, VII, 133.
— continues (typhoïde, etc.) à la Guyane, IX, 391.
— **aphteuse** au Maroc. Médication toni-cardiaque, XIII, 726.
— — au Tchad, XVII, 205.
— — Essais de vaccination, XIV, 523.
— **bilieuse hémoglobinurique** au Cameroun, pendant la campagne, IX, 589.
— — — au Congo belge, XVII, 291.
— — — en Palestine, VII, 512.
— — — à la Réunion, IV, 118.
— — — au Sénégal (Dakar), XIII, 677.
— — — Étiologie et prophylaxie, VII, 509, 512, 549.
— — — Pathogénie, XVII, 218 ; XXIV, 473 ; XXV, 494, 735, 747.
— — — Rôle des facteurs d'agression, XXV, 741.
— — — Rôle du facteur hypocholestérinémie, XXV, 736.

— — — Action du froid, XIX, 69.
— — — et paludisme, IV, 301, 303 ; X, 206 ; XVIII, 289, 715.
— — — Présence de spirochètes dans le sang de malades européens, XV, 699 ; XVI, 297, 726 ; XVII, 291.
— — — Spirochètes et pseudo-spirochètes, XVI, 726.
— — — à spirochètes. Considérations cliniques, pathogéniques et thérapeutiques, XIX, 345.
— — — Résistance globulaire, IX, 647 ; XXV, 498.
— — — Cholestérinémie, XXV, 502, 737, 833.
— — — Hypercholestérinémie provoquée, XXV, 505, 509.
— — — et syndrome de Raynaud, XIX, 680.
— — — Observations cliniques, XXV, 831.
— — — Traitement, I, 406 ; III, 106 ; X, 342 ; XXII, 739 ; XXV, 494, 735, 747.
— — — — autohémothérapique, XIII, 336.
— — — — par le chlorhydrate de choline, XXV, 215.
— — — — par le cyanure de mercure, XIII, 35 ; XIV, 226.
— — — — Opothérapie rénale, VIII, 119.
— — — — par le sérum polycitraté Normet, XXIII, 999.
— — — et quinine, III, 104 ; VIII, 397 ; XVIII, 289.
— — — de nature paludéenne traitée par le stovarsol, XXI, 636.
— — — du bœuf d'Algérie, maladie distincte des piroplasmoses, XII, 108.
— — — — Pathogénie, XII, 202.
— **exanthématique (ou boutonneuse).** Voir aussi **Typhus endémique.**
— — à Brest, XXV, 109, 283.
— — d'été au Maroc, XXII, 712.
— — en Tunisie, III, 492, 759.
— — méditerranéenne et conjonctivite infectieuse de Parinaud, XXIV, 76.
— — Inoculation intra-oculaire accidentelle par le sang d'une tique, XXIII, 889.
— — Réceptivité du rat blanc et de la gerbille, XXV, 106.
— — fièvre indéterminée, XXII, 88.
— — (typho-). Classification, XXIII, 152, 889.
— — Dénomination, XXV, 934.
— **catarrhale** du mouton (blue-tongue) en A. O. F., XVIII, 245.
— **endémique** ou lymphadénite généralisée : Kagamimetsu, XVII, 819.
— **fluviale** du Japon et typhus exanthématique, XXIV, 678.
— **ictéro-hémorragique.** Voir **Spirochétose.**
— — en Cochinchine, XXIV, 440.
— **indéterminées,** XXII, 88.
— — au Ouadaï, VII, 526.
— **inflammatoire** et — jaune, I, 530, 630, 642.
— **jaune** en Afrique occidentale française, XIX, 237, 242, 380, 645 ; XX, 391, 707, 858 ; XXI, 70.
— — en Argentine, XXV, 862.
— — à la Côte d'Ivoire, XXIII, 891, 898.
— — — chez un indigène, VII, 552.
— — au Dahomey, V, 648.
— — — (Porto-Novo), XI, 553.
— — — Mission d'enquête, XXV, 834.
— — au Libéria, XVIII, 746.
— — à la Martinique, I, 530, 630.
— — — Chronologie des épidémies, I, 630.
— — au Niger. Mission d'enquête, XXV, 834.
— — au Sénégal en 1912, XX, 197, 286, 295.
— — — (Dakar, 1927), XXI, 503, 509, 808.
— — — XXII, 184, 369, 793.
— — — en 1927. Épidémiologie, XXII, 260, 397.
— — au Soudan (Bamako), I, 412 ; XIX, 604.
— — à Saint-Nazaire, I, 528 ; II, 151.
— — Rôle des moustiques. Notice sur Beauperthuy, II, 5.
— — Nature infectieuse et transmission par les insectes, VIII, 467.
— — et indice *Stegomyia*, XXI, 325.
— — Transmission par les déjections de l'*Aedes ægypti*, XXII, 403.
— — Voies de propagation, IV, 103.
— — et dengue, XXI, 748 ; XXIII, 155.
— — — Rapports étiologiques, XXII, 538.
— — et *leptospira*, XXII, 401.
— — et paludisme, XXII, 462.
— — et empoisonnement par le phosphore, XXV, 853.
— — Symptômes de début et diagnostic prophylactique, XXII, 447, 529.
— — — important : l'excitation, XXII, 743.
— — des enfants, XXII, 184.
— — Cas légers, XXIII, 161.
— — bénigne. Contagion, III, 165.
— — Analyse des urines et pronostic, XXII, 793.
— — Vieux documents sur l'examen des urines, XXV, 535.
— — Diminution du complément, XXII, 406.
— — et albuminurie, XXII, 464, 529, 793.
— — Préparations de *Paraplasma flavigenum*, VIII, 562.
— — Recherches expérimentales, XXII, 398.
— — Infections expérimentales, XXII, 400.
— — Identité des virus africain et brésilien, XXII, 401.
— — Inoculation au cobaye, XX, 1025.

— — Adaptation du virus à la souris blanche, XXV, 113, 533.
— — Réceptivité du chimpanzé, XXV, 190, 191.
— — Inoculation du virus murin au singe, XXV, 866.
— — Histopathologie, XXII, 403.
— — Prophylaxie, II, 151 ; III, 785 ; IV, 103 ; V, 150, 556, 561, 627, 633, 637, 739 ; VI, 43, 205, 645 ; XX, 299, 707, 833, 858.
— — — Protection sanitaire maritime, II, 151.
— — — en A. O. F., XXI, 70.
— — — Mesures de protection à Bassam, III, 785.
— — — en Corse, V, 566.
— — — Protection du Maroc, VIII, 732.
— — — Vœux, XX, 299, 838.
— — — Emploi des hypochlorites, XXIII, 202.
— — — Désinfection des immeubles, XXI, 808.
— — Traitement par le sérum de Noguchi, XIX, 651 ; XX, 391 ; XXII, 814.
— — et sérum de Pettit, XXV, 362.
— — Vaccination, XIX, 651 ; XXII, 402, 811.
— **de Malte** ou **méditerranéenne.** Voir **Fièvre ondulante.**
— **ondulante** en Afrique occidentale française, III, 490.
— en Algérie, I, 18 ; IV, 94, 106 ; VI, 672.
— — — Importation des chèvres en Algérie et en Tunisie ; vœu, I, 62, 193.
— — — Absence d'infection sur les moutons algériens, XXII, 412.
— — — Épidémie dans le département d'Oran en 1915, IX, 331.
— — en Argentine, XXV, 145.
— — dans l'Ariège, IV, 92.
— — en Corse, III, 773, 783, 785 ; V, 566, 637 ; VI, 601, 673 ; XXV, 863.
— — au Maroc, VI, 668.
— — — (Mazagan), IX, 207.
— — à Marseille, II, 364.
— — au Pérou, V, 434.
— — en Russie, V, 868.
— — en Tripolitaine, III, 511 ; V, 850.
— — en Tunisie. Importation des chèvres ; vœu, I, 62, 193.
— — — Déclaration obligatoire, X, 1.
— — — Enquête sur les chèvres laitières, II, 191 ; IX, 86 ; X, 376.
— — au Turkestan russe, XVI, 227.
— — Rôle de l'eau de boisson dans la transmission, XXV, 865.
— — et paludisme, IV, 106.
— — Lactoréaction, I, 19.
— — Séro-diagnostic. Chauffage du sérum, XII, 171.
— — — Causes d'erreur et précautions nécessaires, XVII, 110.
— — Troubles rénaux et hématurie, IV, 94.
— — Évolution simultanée de la — et du paludisme, IV, 106.
— — Phlébite, XXV, 864.
— — Race de *M. paramelitensis* isolée par hémoculture, XII, 173.
— — Infection paramélitensique chez l'homme et les animaux, XIV, 197.
— — Animaux réactifs et réservoirs de virus, XVII, 465.
— — et lait, IX, 285.
— — Traitement par la protéine de *B. abortus*, XXII, 150.
— — — par la quinine, I, 476, 544.
— — Traité, XIV, 257.
— **de l'Oroya** = verruga, XX, 790.
— **à pappataci** ou — **à phlébotomes** en Corse, V, 710.
— — — Répartition des phlébotomes, V, 780.
— — en Syrie, XX, 251.
— — et dengue, IX, 778 ; XXII, 288, 419.
— — Étiologie, XIV, 447.
— — Étude clinique et expérimentale, XX, 231.
— **récurrente** en Afrique occidentale française, XVIII, 679 ; XIX, 386.
— — — orientale parmi les troupes belges, X, 786 ; XII, 154.
— — en Algérie (Alger), IV, 435, 438, 440.
— — — à Béni-Abbès, VIII, 67 ; IX, 479.
— — dans l'Ariège, IV, 92.
— — en Chine (Setchouen), IV, 510 ; XII, 621 ; XIII, 38.
— — en Colombie, II, 117.
— — au Congo belge (Ouellé), VIII, 745.
— — à Madagascar, IV, 509 ; V, 268 ; VI, 146 (c.), 523 ; IX, 688 ; XIII, 63.
— — au Maroc, VII, 382, 865.
— — — à Tanger, VI, 599.
— — — Étude clinique et expérimentale, XXII, 818.
— — en Nouvelle-Calédonie, XIX, 529.
— — au Sénégal, XIII, 678 ; XIV, 460.
— — — (Dakar), XX, 441, 700.
— — au Soudan, XV, 320 ; XVI, 159.
— — au Tonkin, III, 75, 422.
— — en Tripolitaine, IV, 369, 613 ; V, 830.
— — en Tunisie, IV, 613, 658.
— — en Turquie (Constantinople) chez les réfugiés de Crimée, XIV, 191.
— — Étude du spirochète. VII, 565.
— — Présence du spirochète dans quelques liquides et excreta de l'organisme, VII, 472.
— — Présence du spirochète dans le sang entre les accès fébriles, XVI, 272.
— — et mouches, IV, 276.
— — et poux, I, 174 ; XVIII, 97.
— — Identité, à Dakar, du spirochète

des rats, du sp. de la musaraigne et du sp. de la —, XXI, 472.
— — Identité du spirochète de la fièvre des tiques et du sp. de la — à Dakar, XXI, 585.
— — Réservoir du virus marocain, XXII, 861.
— — Courbe thermique constantinopolitaine, XXII, 904.
— — Altérations globulaires, XIII, 63.
— — Formule leucocytaire, XII, 621 ; XIII, 63 ; XVII, 115 ; XXIII, 697.
— — Diagnostic *post-mortem* par la ponction hépatique, XVII, 475.
— — et ictère, XIV, 466, 632.
— — et typhus exanthématique, XIII, 272.
— — et abcès de la rate, XIX, 421.
— — atténuée chez les enfants indigènes algériens, XVI, 392.
— — Délire et réactions psychomotrices chez l'indigène algérien, X, 532, 692.
— — Manifestation méningée, XVI, 394.
— — Formes pulmonaires, XX, 716.
— — Passage de la mère au fœtus, XXII, 848.
— — Association avec le paludisme (Fièvre spirochéto-plasmodique des Serbes), X, 827.
— — expérimentale. Phase nerveuse, XXIV, 804.
— — Immunisation des spirochètes, III, 353.
— — Inoculation du *Sp. berbera* à quelques animaux, XIV, 144.
— — Réceptivité des animaux de laboratoire, XX, 826.
— — Sensibilité de la souris blanche au sp. de la — du Tonkin, III, 75.
— — Réceptivité de la souris grise, XVIII, 680.
— — Immunité conférée à la souris grise, XX, 1038.
— — Immunité conférée au macaque par le sp. de la — du Tonkin, III, 422.
— — expérimentale du rat. Durée de l'immunité, VI, 107, 242.
— — — — Mode d'action du salvarsan, V, 320.
— — Prophylaxie, XXII, 858.
— — Traitement, XXII, 859.
— — — par l'acétylarsan, XXI, 113.
— — — par l'arrhénal, VI, 532.
— — — par l'atoxyl, VI, 68.
— — — par l'olarsol, VII, 473, 569.
— — — par l'arsénobenzol, IV, 141, 440 ; V, 320, 339 ; VI, 532.
— — — — (nov-), V, 476 ; VII, 569.
— — — par le galyl et le ludyl, VII, 101.
— — — par le luargol, XIV, 633.
— — — par l'émétique, XVI, 303.
— — Récurrentothérapie par le spirochète marocain, XXII, 852.
— — **africaine** ou — **des tiques** en Abyssinie, I, 432, 480.
— — — au Sénégal (Dakar), XXV, 13, 362, 368.
— — — Abcès de la rate, XIX, 421.
— — — et ornithodore, X, 222 ; XV, 220 ; XXV, 13.
— — — Formule leucocytaire, XV, 220.
— — — Non-réceptivité de la rousette, XV, 220.
— — — Transmission à la souris et au cobaye, XXV, 15.
— — — expérimental. Rôle négatif des poux, VI, 106.
— — — Traitement par le 606, IV, 141.
— — soudanaise. Essais de transmission aux animaux de laboratoire, XVI, 159.
— **rouge.** Voir **Dengue.**
— **rouge congolaise,** pseudo-dengue, XX, 779.
— — — et dengue, XXI, 18, 583.
— **des tiques.** Voir **Fièvre récurrente africaine.**
— **de trois jours.** Voir **Fièvre à phlébotomes.**
— **typhoïde** en Afrique orientale allemande parmi les troupes belges, XII, 155.
— — en Allemagne dans un camp de prisonniers, VIII, 547.
— — à l'Armée d'Orient. Hémocultures, XI, 154.
— — au Cameroun pendant la campagne, IX, 589.
— — en Cochinchine (Saïgon). Fréquence des formes septicémiques pures, XVII, 163.
— — au Congo (Brazzaville), XXIV, 902.
— — au Congo belge (Stanley Pool), XXI, 776.
— — à la Guyane française, IX, 391.
— — dans l'Inde, I, 548 ; II, 5, 20.
— — à Madagascar, chez le malgache en Emyrne, XV, 675 ; XXII, 50.
— — au Maroc (Mazagan), XX, 481, 576 ; XXV, 447, 461, 626.
— — au Sénégal (Tiaroye), XXV, 1109.
— — et paludisme. Difficulté du diagnostic différentiel, XII, 504.
— — — XXV, 634.
— — Signes septicémiques, XXV, 462.
— — — gastro-intestinaux, XXV, 478.
— — Complications et associations, XXV, 626.
— — compliquée d'ictère franc, XX, 576.
— — — Méningite suppurée chez un Malgache porteur biliaire de germes, XI, 264.
— — et myiase, I, 374.
— — et parasitisme intestinal, XXV, 632.
— — Ordonnance chinoise, I, 180.

— — Vaccinothérapie au vaccin sensibilisé, XIX, 175.
— — Vaccination, XX, 44.
— — — (Vœu), XX, 706.
— — du chimpanzé, II, 11.
— — (para-) en Afrique du Nord, VI, 598.
— — — à l'Armée d'Orient. Hémocultures, XI, 154.
— — — au Congo ; à Brazzaville chez un nourrisson, XXIV, 518.
— — — dans l'Inde, I, 548 ; II, 5, 20.
— — — au Maroc, XX, 481 ; XXV, 447, 461.
— — — Signes septicémiques, XXV, 462.
— — — — gastro-intestinaux, XXV, 478.
— — — chez un nourrisson vacciné au B. C. G., XXIII, 116.
— — — à paratyphique A chez un nourrisson à Brazzaville, XXIV, 518.
— — — Vaccination, XX, 44.
— — — — (Vœu), XX, 706.
— — — du chimpanzé, II, 11 (fig.).
Figuiers. Voir aussi *Ficus*.
— Amibe des — de la région parisienne, XV, 287 (fig.).
— — et flagellés d'un — exotique (*Ficus parietalis*), XV, 399 (fig.).
— Flagellé de *Ficus benjamina*, XVI, 650 (fig.).
— de l'Erythrée. Flagellé du latex, XXIV, 843 (fig.).
Filaires de l'Afrique tropicale : rôle pathogène et relations allergiques, XXIV, 882.
— aux Comores, III, 143.
— d'Indochine, I, 369, 563 ; III, 142 ; V, 622.
— à la Martinique, VI, 663.
— en Nouvelle-Calédonie, III, 737 ; IV, 202.
— aux îles Wallis, III, 138, 401, 609.
— et moustiques, VI, 93.
— de Bancroft et thrombo-lymphite du canal thoracique, XV, 412.
— et craw-craw, XIII, 305, 314 (pl.), 530, 535.
— provoquant des kystes fibreux, III, 88.
— Porteurs de kystes filariens et de nodosités juxta-articulaires au pays Toma, X, 150.
— Kystes d'*Onchocerca volvulus* au Soudan français, VIII, 655.
— **de Médine.** Voir aussi **Ver de Guinée.**
— — Calcification, XVIII, 318 (fig.).
— — calcifiée, cellules géantes de corps étrangers. Infiltration embryonnaire et sclérose, XVII, 788.
— *Setaria labiato-papillosa* au niveau du hile du foie et dans les veines sus-hépatiques, XXIII, 867.
— d'*Agama colonorum*, VII, 121.
— de batraciens, IX, 137.
— — du crapaud dans la région du Chari, IX, 133.
— des bovins annamites, V, 115, 623.
— d'un caméléon à Madagascar, VII, 70, 175.
— des chevaux dans le Sud-Oranais, VIII, 68.
— du chien en Annam, IV, 478, 485 ; VI, 89.
— — à Calcutta, V, 731.
— des équidés et dermite granuleuse, X, 726.
— du gecko, I, 372 (fig.).
— de l'*Hyæna crocuta*, IV, 629.
— d'une mouette, IV, 525.
— des oiseaux rapaces, IX, 364.
— de l'outarde, III, 152.
— d'un passereau, IV, 526.
— de l'œil de la poule en Annam, V, 624.
— péritonéales des carnivores et le genre *Achanthocheilonema*, V, 392.
— — des porcins, IV, 386, 482, 487.
— Essais de culture *in vivo* d'embryons, XXI, 316.
— (Micro-) du sang des indigènes en Afrique équatoriale française, VI, 80.
— — du sang des indigènes en Afrique occidentale française, V, 438 (c.).
— — au Gabon, XV, 575.
— — humaines aux îles Wallis, III, 138.
— — dans un placard dyschromique accompagnant une hydarthrose du genou, XVIII, 527, 529.
— — des ânes, chameaux et mulets au Turkestan, IX, 220, 222.
— — des bovidés au Turkestan, X, 104.
— — des chiens au Turkestan, X, 102.
— — des grenouilles, X, 105.
— — animales à la Guyane française, XI, 392.
— — chez une antilope, II, 208 ; XXII, 652 (fig.).
— — du chat dans le Sud Tunisien, XI, 571.
— — du cheval dans le Sahara oranais, IX, 482.
— — d'oiseaux du Brésil, IX, 247.
— — — au Congo, II, 208.
— — — en Grèce, II, 268.
— — — de la Guyane, XI, 128.
— — — du Sénégal, X, 106.
— — — (du chardonneret (*Carduelis carduelis*)), XVI, 125 (fig.).
— — — (d'hirondelles), XVI, 12, 122 (fig.).
— — — (d'un rapace diurne au Soudan), XI, 31.
— — des vertébrés au Paraguay, IX, 363.
— — et *F. loa* au Cameroun, XII, 37.
— — et *F. volvulus* au Cameroun, XII, 48.
— — et filaire du crapaud (*Bufo marinus*), XI, 182.
Filaria bancrofti, II, 319 ; III, 399, 401,

737, 738 ; IV, 202 ; V, 438, 618, 624 ; VI, 81, 357, 664 ; IX, 183 ; XV, 412.
— — à la Guadeloupe, VII, 125.
— — à la Martinique, II, 319.
— *buski*, VI, 41.
— *chelidonis*, n. sp., XVI, 122 (fig.).
— *columbi*, XI, 182.
— *demarquayi*, VI, 666.
— *diurna*, III, 309, 613.
— *immitis*, III, 738 ; VI, 89.
— — à Calcutta, V, 731.
— *irritans*, VIII, 362, 695 (fig.).
— *loa*, III, 208, 309 ; IV, 203 (pl.), 710 ; V, 438, 506, 618 ; VI, 81 ; IX, 163 ; XII, 37.
— — au Congo, VII, 619.
— — Développement et morphologie des embryons, VII, 710.
— *mansoni*, III, 670.
— *medinensis*, IV, 206.
— — Formule leucocytaire, VII, 192.
— — au Ouadaï, VII, 525.
— *mesnili*, n. sp., I, 372 (fig.).
— *nocturna* en Cochinchine, I, 563 ; II, 6.
— — au Tonkin, II, 144.
— *ozouxi*, II, 544.
— *perstans* en Afrique équatoriale française, IX, 160.
— — en Afrique occidentale française, V, 438, 618.
— — en Afrique du Nord, I, 472 ; III, 407 ; VI, 81, 457.
— — — (Tunisie), IV, 47.
— *poeli*, V, 115.
— (*Onchocerca*) *volvulus*, III, 88, 91, 93 ; VI, 81, 84, 712 ; XII, 48.
— — — Recherches diverses, IX, 186.
— — — Rôle pathogène, IX, 305.
— — — et éléphantiasis, VIII, 740 ; X, 155, 365.
— — — et nodosités juxta-articulaires, X, 150, 369.
— (*Micro-*) *guillemeti*, n. sp., XIII, 653 (fig.).
— — *hetgesi*, n. sp., XI, 394.
— — *kerandeli*, X, 176.
— — *legeri*, n. sp., parasite d'un oiseau (*Merganser serrator*) vivant dans les régions froides, XIII, 652.
— — *perstans* au Cameroun, XII, 44.
— — *savourei*, n. sp., XI, 394.
— — *veronesii*, n. sp., XVI, 124.
Filariose humaine aux Antilles, VII, 367.
— — au Cameroun (Douala), XI, 748 ; XII, 35.
— — en Cochinchine, I, 369, 563 ; II, 6 ; XVII, 397.
— — — Épidémiologie, XVII, 405.
— — aux Comores, III, 145.
— — — (Mohéli), XI, 62.
— — à la nouvelle frontière Congo-Cameroun, VII, 619.
— — en Égypte, XVII, 815.
— — au Gabon occidental, XXV, 167.
— — — Accidents, XXV, 234.
— — en Guyane française, IX, 464.
— — dans le Haut-Sénégal et Niger, V, 618.
— — en Indochine, I, 369.
— — — du Nord, III, 142.
— — au Maroc. Rareté à Tanger, XIX, 487.
— — à la Martinique, II, 319.
— — en Nouvelle-Calédonie, III, 737.
— — — chez un Européen, XVIII, 631.
— — dans l'Oubangui-Chari, VI, 80.
— — au Tchad (Moyen-Chari), IX, 163.
— — — (Ouadaï), VII, 525.
— — au Tonkin, II, 144, 483.
— — aux îles Wallis, III, 138, 401.
— — de Bancroft à la Guyane française et manifestations lymphatexiques, X, 896.
— — — — Remarques hématologiques et cliniques, XIII, 248.
— — à *Microfilaria bancrofti*, III, 399.
— Mode de transmission, XX, 446.
— Eosinophilie, III, 609 ; XII, 46.
— Clinique et parasitologie, XXII, 325.
— Kystes fibreux provoqués par les filaires, III, 88, 91, 93.
— et œdème de Calabar, XX, 977.
— et éléphantiasis, XII, 48.
— à *F. loa*, III, 309.
— — Cas d'une durée de quatorze années, IX, 436.
— — Traitement, XXV, 690, 693.
— Traitement par l'émétique d'aniline, III, 202, 407, 615.
— Chimiothérapie, XVI, 122.
— animales de l'Annam central, V, 622.
— et athérome aortique du buffle et du bœuf, V, 109.
— Onchocercose aortique bovine dans le Haut-Sénégal et Niger, X, 459.
— du chien, VI, 89 (fig.).
— des oiseaux dans le Haut-Sénégal et Niger, VI, 359.
— — en Russie centrale, VI, 592.
— (Micro) du charognard. Essai de traitement, XIII, 654.
Filariidés. Classification, IV, 386.
Filet à papillons contre les moustiques, III, 437.
Film cinématographique sur l'A. E. F., XXV, 100.
Filtration du virus de la peste porcine, V, 781.
Finlay (Carlos J.). Éloge, VIII, 562.
Firket (J.). Éloge, XXI, 827.
Fistule stercorale de la région inguinale droite chez un noir, IX, 310.
Fixateur de Noguchi pour les spirochètes utilisé pour les flagellés, XVIII, 305.
Flagelle des trypanosomes, III, 366.
Flagellés des batraciens, XVIII, 58 (fig.).
— des bélostomes, XV, 134 (fig.).
— de la blatte orientale, XIII, 145 (fig.).
— des culicides, XIII, 138 (fig.).

— — *Crithidia fasciculata*, parasite des anophèles, XI, 546.
— — de *Stegomyia fasciata*, VI, 708.
— de la trompe des glossines, I, 564.
— de lygœide, XV, 113 (fig.).
— des muscides, XIII, 141 (fig.).
— des phlébotomes, XIII, 143 (fig.).
— de la puce du chien (trypanosomide), culture, XII, 310 (fig.), 313.
— de la punaise du chou. Inoculation aux jeunes souris, XVI, 319.
— nouveau de *Rhodnius prolixus*, XIII, 527 (fig.).
— de quelques insectes et production d'infections chez la souris, XII, 665.
— des reptiles, XVIII, 58 (fig.).
— d'invertébrés. Infection de mammifères, VII, 605 (fig.).
— — Pluralité des espèces parasitant le tube digestif, X, 811.
— dans les sangsues, I, 568.
— intestinaux de l'homme en Annam, XIII, 602.
— — — *Lamblia intestinalis* au Cameroun (Douala), XI, 754.
— — — au Gabon, XV, 574.
— — — à la Guyane, XI, 368.
— — — à Madagascar, XX, 466.
— — — au Maroc, XIX, 353.
— — — en Russie, XIV, 546, 548, 555, 556, 557.
— — — à Salonique en 1918, XIII, 116.
— — — conservés et propagés par les batraciens, XVIII, 521.
— — — État amibien de *Chilomastix mesnili*, XV, 135.
— — — *Enteromonas hominis* chez un officier anglais, XV, 756.
— — — Relations entre *Enteromonas hominis* de Fonseca 1915 et *Tricercomonas intestinalis* Wenyon et O'Connor 1917, XXII, 645.
— — — nouveau dans une dysenterie, VII, 571.
— — — Genre *Pentatrichomonas* = *Hexamastix*, VIII, 574.
— — des animaux de laboratoire, XIV, 558.
— — du campagnol indigène, XIV, 710 (fig.).
— — des singes, XX, 19.
— — du type *Herpetomonas* du *Chamæleon vulgaris* et leurs cultures et — du type *Herpetomonas* de Chalcides = *Gongylus ocellatus* et *Tarentola mauritanica*, XIV, 641.
— de la famille des *Tetramidæ*, parasite fréquent des plaies à caractère phagédénique, XIV, 208.
— Infection naturelle de la souris par les — de la puce *Ctenopsylla musculi*, XV, 405.
— nouveau des plantes, *Leptomonas elmassiani*, IX, 356.
— des plantes à latex, XVI, 655 (fig.).
— d'une apocynée (*Acocanthera venenata*), XVIII, 231 (fig.).
— nouveau (*Herpetomonas funtumiæ*) de deux apocynées, XV, 109 (fig.).
— particulier d'une asclépiadacée (*Arauja angustifolia*), XVI, 652 (fig.).
— des euphorbiacées, XVIII, 251 (fig.), 257.
— des euphorbes. Extension géographique du *Leptomonas davidi* dans l'Est de la France, XX, 14.
— — Morphologie, XX, 15.
— — Protozoaire d'*Euphorbia cereiformis* devenant — dans les cultures, XVI, 642 (fig.).
— d'une urticacée (*Ficus benjamina*), XVI, 650 (fig.).
— — exotique (*Ficus parietalis*), XV, 399 (fig.).
— — un figuier de l'Erythrée, XXIV, 843 (fig.).
— Coloration des — intestinaux, XIII, 205, 206.
— Culture, XV, 161 (fig.), 551 (fig.).
— — dans les latex divers, XVI, 41, 256 (fig.), 642 (fig.).
— — anciennes, XVII, 32.
— — Procédés de fixation, XVIII, 305.
Flagellose des apocynées, XV, 109 (fig.), 198.
— des asclépiadacées, XV, 149.
— des euphorbes, XIII, 796 : XV, 149, 197, 205, 408.
— — dans l'Est de la France, XX, 14.
— — Insectes propagateurs, XIV, 148.
— — Agent transmetteur, XV, 166, 205.
— des urticacées, XV, 399 (fig.).
Fléolate de soude. Voir **Chimiothérapie.**
Floculation. Méthode de Vernes. Voir **Réaction** de Vernes.
Flore intestinale du *Stegomyia* adulte, VI, 708.
Fly-tox, produit insecticide à base de pétrole et de pyrèthre, XIX, 901.
Foie. Aspect rare mais normal, XXI, 881.
— Abcès. Diagnostic par la formule leucocytaire, XVI, 693.
— — amibien avec bacilles de Koch, VII, 475.
— Adénomes de la vésicule biliaire causés par un nématode chez un rongeur, XI, 574.
— Amibiase hépatique primitive (forme fruste), XVI, 241.
— Bunostomien pathogène parasite de la vésicule biliaire d'un rongeur africain, XI, 93.
— Cancer primitif, XVII, 508.
— Coccidiose des voies biliaires de la couleuvre, XVIII, 23 (fig.).
— Insuffisance hépatique avec ictère à la suite d'injections de novarsénobenzol, XVI, 146.
— Larves de porocéphales dans le — d'un tirailleur noir, XI, 262.
— Lésions sur des moutons de Madagascar, XXII, 525.

— Nécrose chez un pigeon, XXV, 175.
— dans les schistosomiases humaines, II, 538.
— Urobilinurie dans les congestions hépatiques d'origine palustre, VII, 596.
— Abcès expérimentaux déterminés chez les souris blanches par inoculation de latex parasités, XVI, 162 (fig.).
— Procédé de palpation, XXII, 553.
— Ponction, moyen de dépistage de la peste, XVI, 501.
— — *post-mortem* pour le dépistage de la peste, XVIII, 603.
— — — pour le dépistage de la fièvre récurrente, XVII, 475.
Formaline ou trioxyméthylène. Poudre de —, larvicide efficace dans la lutte contre les moustiques, XIX, 287.
Formes aflagellées dans l'évolution de *Trypanosoma undulans*, V, 99.
— flagellées dans le *Toxoplasma cuniculi*, VI, 318 (fig.).
Formol, agent destructeur des mouches, I, 610.
— gélification. Voir **Réaction** de —.
Formules hémoleucocytaire et **leucocytaire.** Voir **Hémoleucocytaire** (Formule) et **Leucocytaire** (Formule).
Fracture de l'aileron gauche du sacrum avec diastasis de la symphyse pubienne, XV, 770
— de la base du crâne, XIX, 499.
— du calcaneum, XXII, 388.
— du radius. Radiographie, XXII, 747.
— du fémur, XXIII, 115.
— du radius chez une gazelle, XXI, 821.
Frambœsia tropica au Brésil. Voir **Pian.**
França (Carlos). Éloge, XIX, 665.
Fringilla petronia. Leucocytozoon de —, VI, 519.
Froid. Influence sur les tiques, I, 451.
— Congrès international des industries frigorifiques, I, 9.
Fusiforme (Bacille). Priorité de la découverte, VII, 262, 266, 376, 471.
Fuso-spirochétienne (Association). Formes cliniques, XX, 145.
— — Vaccinothérapie, XVIII, 380.
— — chez le chien, XX, 548.
— — chez les singes, XXIV, 142.
— Stomatite épidermique, XIX, 5.

G

Gabon. Voir aussi **Afrique équatoriale française.**
— Alcoolisme. Pétition des Européens pour la prohibition de l'alcool, VII, 259.
— Affections pyogènes, XXIV, 734.
— Bilharzioses, XVI, 539.
— Dysenterie amibienne, XXIV, 733.
— Filarioses, XXV, 167, 234.
— Larbisch, XVI, 665 (fig.).
— Leishmaniose interne infantile, XIII, 173.
— Paludisme, XXIV, 733.
— Parasitisme intestinal, XV, 574.
— Troubles du sympathique, XXIV, 736.
— Trypanosomiase humaine, XVII, 179, 749 ; XX, 512.
— État sanitaire des Européens, XXIV, 731.
— Essai du « 189 » dans le pian, la syphilis, les ulcères phagédéniques, XV, 607.
— — dans la trypanosomiase humaine, XV, 729.
Gale à Douala (Cameroun), XI, 758.
— à Mohéli (Comores), XI, 62.
— des animaux domestiques. Lutte contre la — aux colonies, XIII, 186.
— démodectique du cheval, XII, 388 (fig.).
— — — Contagion à l'homme, IX, 576.
— — et dermatose des bovidés, X, 117.
— du dromadaire, XII, 94 (fig.) ; XIII, 29, 545.
— — chez l'homme, XII, 98.
— filarienne. Voir **Craw-craw.**
— psoroptique du bœuf, XXIII, 873.
Galcodes olivieri. Innocuité au Maroc, XVIII, 781.
Galoncus perniciosus, XI, 574.
Galyl. Voir **Arsénobenzènes.**
Gambie (Haute). Trypanosomes et glossines, V, 204.
Gamètes dans le *Toxoplasma cuniculi*, VI, 318.
Gambusia, poisson larvivore dans la prophylaxie du paludisme, XXIII, 56, 129, 419.
— dans la prophylaxie de la dengue, XXIII, 801.
Ganglions dans la lèpre. Présence du bacille, V, 466, 569, 698, 773 ; VI, 607 ; VII, 365.
— pesteux. Conservation, I, 547.
— dans la trypanosomiase humaine, I, 128, 221 ; II, 264, 397, 472.
— suppurés dans la trypanosomiase humaine, V, 187.
— — avec pus stérile, VI, 202.
Gangrène de la bouche et du nez dans la leishmaniose infantile, V, 270.
— de la lèvre supérieure et association fuso-spirochétienne, XVI, 719 (pl.).
— du pied et de la jambe d'origine palustre, XI, 28.
— gazeuse chez les blessés du Maroc, XIX, 107.
— symétrique des extrémités dans le paludisme à *Pl. præcox*, XXV, 307.
Gastrodiscus ægyptiacus, XI, 396.
— *hominis* en Cochinchine, IV, 488.

— *polymastos* chez les équidés du Soudan, VI, 261.
Gastro-entérite infectieuse des chats, XXV, 1015.
Gaté-Papacostas (Réaction de). Voir **Réaction** de —. Formol-gélification.
Gazelle. Fracture du radius, XXI, 821.
Geai. Leucocytozoon, V, 17.
Gecko. Nouvelle microfilaire, I, 372.
Gedoelst (L.). Eloge, XX, 205.
Genette. Infestation massive naturelle par les larves de porocéphales, XV, 621 (pl.).
— sensible à l'herpès, XXIV, 145.
Génito-urinaires (Maladies), au Congo, VIII, 307.
Géographie médicale des colonies françaises, I, 594.
— — de l'Ouadaï, VII, 522.
Géophagie, cause de l'helminthiase en Tunisie, I, 600.
— et ankylostomiase, XII, 322.
— au Maroc, XVII, 149.
Géorgie. Ankylostomiase, XIX, 891.
— Paludisme, XVIII, 327, 383, 389 ; XIX, 100 ; XX, 153.
— Parasitisme intestinal, XIX, 205.
— Sprue, XIX, 201.
— Anophèles d'Abkasie, XVIII, 341.
— *Anopheles nigripes*, XIX, 337.
— Hibernation des anophèles et des *Stegomyia* en Abasie, XIX, 480.
Gerbille. Infection par *Leishmania tropica*, VIII, 680.
— — par *Trypanosoma gambiense*, VIII, 780.
— Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 531.
— Sensibilité à la fièvre boutonneuse, XXV, 106.
— à pieds velus. Cénure, VIII, 173 (fig.).
Gerboise. Toxoplasmose expérimentale, VIII, 58.
— inoculées de *Trypanosoma lewisi*, V, 826.
— Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 532.
Germanine. Voir **Chimiothérapie.**
Giard. Eloge, I, 447.
Giardia du campagnol indigène, XIV, 710.
— Variations tinctoriales et métabolisme de l'amidon chez —, XVII, 889.
— *intestinalis* au Cameroun, XII, 256.
— — à la Martinique, IV, 395.
— — à Pétrograd, XVIII, 189.
— — Cycle évolutif, II, 93 (fig.).
— — Variations tinctoriales et morphologiques, XVI, 323 (fig.).
— — Habitat chez l'homme, XVI, 589, 633, 735.
— — et toxémie intestinale, XVIII, 179.
Giardies dans diarrhées et dysenteries rebelles, IX, 293.
Giemsa. Coloration rapide au colorant de —, IV, 230.
Gingivites chez les Kabyles, II, 282.
Girafe. Hippobosque parasite, XVIII, 466 (fig.).
Gîtes à larves de *Stegomyia*, I, 454 ; II, 106, 425 ; III, 785.
— pièges contre les culicides, III, 455 ; VI, 513.
Givral, insecticide, XXII, 681.
Gland doux. Voir **Ballote.**
Globules rouges. Voir **Hématies.**
Globuline du sérum au cours des schistosomiases, XXV, 149.
Glossina longipalpis et *morsitans*, III, 794.
— *morsitans*. Présentation d'un exemplaire vivant, VII, 2.
— — transmettant la souma et le baléri, IV, 539.
— — et *Trypanosoma gambiense*, V, 762.
— *palpalis* au Congo français, III, 529.
— — à Koulikoro (Soudan français), V, 828.
— — au Sénégal (Saint-Louis),
— — Répartition géographique, III, 59.
— — Echantillons de larves et de pupes, I, 450.
— — Biologie, I, 253.
— — et souma, II, 399 ; IV, 539.
— — Expériences de transmission des trypanosomes par les —, III, 599.
— *tachinoïdes* et souma, IV, 539.
Glossines de l'Afrique équatoriale française, II, 108 ; XIII, 377.
— au Congo belge, I, 252 ; V, 45, 281.
— — — Dispersion, VIII, 463.
— — — autour d'Elisabethville, XX, 78.
— — — dans la région de l'Ouellé, IX, 38.
— — — du groupe *morsitans* dans le Bas-Ouellé, XIX, 197.
— à la Côte d'Ivoire, V, 157 ; X, 37.
— — Pouvoir infectant, IX, 176.
— au Dahomey, II, 129 ; III, 559.
— en Haute-Guinée, VIII, 657.
— de l'Oubangui-Chari, XIII, 360.
— au Sénégal, III, 239.
— — Zones à —, IX, 802.
— — Petite Côte et Bas Saloum, VIII, 130.
— — Haute-Gambie et Casamance, V, 204.
— au Tchad, dans la région de Fort-Archambault, VII, 688, 692.
— Variations géographiques, VI, 347.
— Identité des conditions géo-botaniques des gîtes à pupes de diverses espèces, XII, 234.
— Présence de pupes de *Gl. palpalis* à 1.500 mètres de l'eau, XV, 23.
— Elevage dans un laboratoire d'Europe, VIII, 34.
— Histoire d'un élevage de *Gl. morsitans* à l'Institut Pasteur, X, 629.
— se nourrissant aux dépens d'invertébrés, IV, 544.
— Lutte contre les —, XIII, 483.

— Recul de *Gl. morsitans* devant l'occupation européenne au Katanga, XIX, 222.
— infectées et inflammation de la piqûre, I, 402.
— Infection de la trompe, I, 564 ; II, 599 ; III, 599.
— et trypanosomes. Relations bi-géographiques, VI, 28.
— — Évolution des trypanosomes chez les —, VI, 435.
— — Rôle de la membrane péritrophique dans l'évolution du tryp. du crocodile, XXV, 575.
— — dans la souma, I, 333, 390 ; II, 599.
— — Expériences de transmission des trypanosomes par les —, III, 599, 722 ; IV, 539 ; V, 204.
— et trypanosomiases animales du Bas Katanga, V, 45, 281.
— Hémogrégarine, VI, 226.
— parasitée ? par des larves de sarcophagides, XII, 104.
Glossite épidémique au Sénégal, XVIII, 501 (pl.), 586 (fig.) ; XXV, 1110.
Glucose dans le liquide céphalo-rachidien des trypanosomés, I, 496.
Glutathion dans la production du trypanotoxyl et du bismoxyl, XXI, 676.
Glycérine pour conserver les ganglions pesteux, I, 547.
Glyptocranium gasteracanthoïdes, araignée venimeuse du Pérou. Étude du venin, XI, 136.
Gnathostome. Lésions produites par le — dans l'intestin, II, 104 (fig.).
Gnathostomose humaine. Œdème ambulant siamois dû à *Gn. spinigerum*, XV, 854 (pl.).
Gœdelstia paradoxa, n. sp., VIII, 453.
Gœzia (Genre), VIII, 270.
Goitre en Afrique équatoriale ; Moyen-Chari, VII, 693 ; IX, 165 (fig.).
— — — à Koumra, XXI, 152.
— en Algérie. Distribution géographique, V, 122 (c., pl.), 299 (c.).
— — Étiologie, IX, 344, 345.
— en Chine, au Yunnan, et répartition des eaux minérales, IX, 414.
— au Congo belge (Ouellé), VIII, 739.
— à Madagascar. Énucléation endocapsulaire, XXIII, 342 (pl.).
— parenchymateux. Thyroïdectomie ; guérison, XVI, 429 (pl.).
— chez des chevreaux. Présence d'un cryptocoque pathogène dans les ganglions, XIV, 199 (fig.).
Golgi (G.). Éloge, XIX, 73.
Golunda campanæ, porteur de *Bacillus duboscqi*, V, 703.
— — Sensibilité aux trypanosomes des muridés, VIII, 80.
Goménol. Voir **Niaouli.**
Gonacrine. Voir **Chimiothérapie.**
Gonderia. Voir *Theileria.*
Gonocoque dans les conjonctivites, VII, 19, 424.
— Arthrite à — chez une jeune femme malgache, XXI, 486 (fig.).
— Traitement des affections à — par la gonacrine, XXI, 487.
Gorgas (W. C.). Éloge, XIII, 476.
Goudron de coloquinte dans le traitement de la gale du dromadaire, XIII, 29.
— arabe ou guétran dans le traitement de la gale du dromadaire, XIII, 545.
Goundou au Cameroun, XII, 416.
— à la Côte d'Ivoire, X, 480.
— Origine pianique, XVIII, 4.
— et pian, XIII, 315.
— Structure des tumeurs paranasales, XVII, 863 (fig.).
— Présentation de photographies et d'un squelette d'un cas généralisé, XII, 586.
— Étude histo-pathologique, IV, 210.
— chez les singes, IV, 130 ; XXIII, 478.
— — chez le cynocéphale, I, 295 (fig.) ; II, 216 (fig.).
— — Ostéite hypertrophique chez *Cercocebus*, XXII, 948.
Gouzien (Paul). Éloge, XX, 301, 449.
Grahamella chez les rongeurs du Caucase, X, 98.
— — de Stanleyville (Congo belge), XXII, 639.
— chez les rats splénectomisés de Stanleyville, XXIII, 464 (pl.), 914.
— dans les hématies de *Mus maurus*, VI, 247.
— *microti*, n. sp., XIV, 572 (fig.).
— *muris-ratti* = *Bartonella muris-ratti*, XXIII, 471, (pl.), 473.
— *musculi*, n. sp., XIII, 408.
— *rhesi*, n. sp., XV, 679.
— *talpæ*, IV, 514 (fig.), 660.
Graham-Smith (Corps de). Nature, VII, 240 (pl.).
— — dans les hématies de *Mus decumanus*, VIII, 103.
Grains rouges. Mycétome à —, V, 585.
— — et grains noirs des mycétomes, VI, 294.
— chromatiques, piroplasmes et anaplasmes, XII, 558.
Grall (Ch.). Éloge, XVII, 521.
Granuloma venereum dans la tribu des Marandinois (Nouvelle-Guinée hollandaise), XXI, 354.
Granulome inguino-scrotal à forme d'ulcère rubanné, XXII, 19.
— péri-anal en plaques, XXII, 148 (fig.).
Granules de Leishman, V, 796.
— de *Spirochæta duttoni*, XII, 595.
Grassi (B.). Éloge, XVIII, 361.
Grèce. Voir aussi **Hydra.**
— Actinomycose, XXI, 432 ; XXIV, 432.

— Amibiase intestinale à Salonique en 1918, XIII, 112.
— Cystite amibienne, XI, 685.
— Dengue, XXII, 272.
— — et spirochétose. Épidémie de l'île de Syra, XXV, 352.
— Echinococcose, XXIV, 49.
— Leishmaniose cutanée, II, 257 ; IV, 454 (pl.), 667 ; V, 489.
— — interne, II, 261 ; V, 489 ; IX, 10, 74.
— — — infantile, IV, 179, 664 ; VI, 114, 430.
— — canine, IV, 178 ; V, 88 ; VI, 117 ; IX, 302.
— Piroplasmose bovine, IV, 179 ; V, 87.
— — du cheval, XXV, 889.
— Spirochétose ictéro-hémorragique à l'île de Syra, XXV, 411, 352, 1058.
— — des poules, XVIII, 701 (fig.).
— Variole des chèvres, XX, 583.
— Flagellés intestinaux (Salonique, 1918), XIII, 116.
— Hémocytozoaires, II, 268.
— Microfilaires, II, 268.
— Moucherons, XXIV, 287 (fig.).
— Moustiques, XXIV, 122 (fig.).
— Phlébotomes, XXIV, 287 (fig.).
— Spirochètes des rats d'égout, XXV, 411.
— Tiques de Mytilène, XIII, 260.
— Trypanosomes d'oiseaux, II, 268.
Greffes animales en Afrique occidentale française, XVIII, 335.
Gregarina blattarum, XIII, 332.
Grenouille. Absence de kystes de Carini, VII, 271.
— Microfilaires au Turkestan, X, 105.
Grippe. Épidémie à l'Armée d'Orient, XI, 738.
Grossesse et quinine, III, 629.
— et trypanosomiase humaine, II, 477, 479 ; VIII, 578.
Guadeloupe. Voir aussi **Antilles.**
— Porteurs de bilharzies, VII, 75.
— Helminthiase intestinale, VII, 71.
— Paludisme, XXV, 211.
— Parasitisme intestinal, XXII, 671.
— Pian, XXI, 430.
— Spirochétose ictéro-hémorragique, XXV, 304.
— Trypanosomiase bovine, XIX, 435 ; XXII, 668.
— Fréquence de *Filaria bancrofti*, VII, 125.
— Poissons larvivores, XXV, 248.
— Examens microbiologiques à Pointe-à-Pitre, VI, 357.
Guatemala. Onchocercose humaine produisant la cécité et l'érysipèle du littoral, XII, 442.
— Typhus exanthématique, XXV, 49, 57.
Guignard(L.). Éloge, XXI, 185.
Guillet (René). Éloge, XX, 824.
Guinée française. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— — Ankylostomiase, V, 843.
— — Bilharziose, V, 504 ; IX, 739.
— — Charbon bactéridien, XIX, 499, 864.
— — Cysticercose bovine, XXI, 99.
— — Éléphantiasis, X, 155.
— — Kystes filariens et nodosités juxta-articulaires (Porteurs de), X, 150.
— — Méningite cérébro-spinale à Kindia, IX, 331.
— — Myiases, VIII, 658.
— — — nasale, XV, 416.
— — Paludisme, XVI, 496.
— — — Indice endémique, XV, 497.
— — Parasitisme intestinal par les nématodes, X, 560.
— — Peste du cocotier, XXIV, 146.
— — Pian, X, 90.
— — Rage, XXIV, 145.
— — Rouget nouveau, VI, 202.
— — Syngamose, XXIV, 146.
— — Tuberculose, III, 21 ; XXIII, 546.
— — — Cuti-réaction à la tuberculine, XV, 334.
— — Trypanosomiase animale (du porc), XIII, 792.
— — — humaine, V, 614 ; IX, 231 ; XXIV, 146.
— — Typhose aviaire, XXIV, 146.
— — Acariens, VIII, 656.
— — Acridiens. Destruction, XV, 762.
— — Faune helminthologique, XIII, 176.
— — Insectes piqueurs, I, 254 ; VIII, 657.
— — Protozoaires sanguicoles et intestinaux, VI, 612.
— — Laboratoire Pasteur de Kindia, XVII, 10 (fig.).
— — Pastoria, centre de recherches biologiques et d'élevage de singes, XXIV, 131.
— **portugaise.** Paludisme, XX, 280.
— — Trypanosomiase humaine, XIX, 313.
Guyane anglaise. Pian, XXI, 430.
— **française.** Alcoolisme, II, 334.
— — Amibiase, IX, 396 ; XXII, 571.
— — Ankylostomiase, II, 413, 418, 423 ; IX, 397 ; XIV, 89.
— — — et béribéri, XIII, 603.
— — Béribéri et ankylostomiase, XIII, 603.
— — Bilharziose, IX, 401.
— — Dermatomycoses, XIV, 354.
— — Dysenterie amibienne, IX, 396.
— — — bacillaire, IX, 396.
— — Fièvres continues et les eaux de Cayenne, IX, 391.
— — Filariose, IX, 464.
— — — de Bancroft, X, 896 ; XIII, 248.
— — Helminthiase, II, 423 ; IX, 397 ; X, 557.
— — — animales, IX, 402.
— — Leishmaniose américaine, IX, 467.

— — Leishmaniose cutanée, II, 587.
— — Lèpre, IX, 449 ; X, 733 ; XI, 793 ; XX, 306, 311, 489, 623, 771.
— — — des muridés, XII, 169.
— — — Maladie analogue à la — chez la sarigue, XXIV, 637.
— — Lymphangite endémique, X, 896, 900.
— — Paludisme, IX, 376 ; X, 749 ; XIX, 213, 280.
— — — Documents hématologiques, XI, 67.
— — Papillonite, XXV, 1099, 1106.
— — Parasitisme intestinal, X, 557 ; XXII, 568.
— — — — chez les enfants, XIV, 85.
— — Pian, X, 528 ; XXI, 428.
— — Spirochétose bronchiale, XVI, 476.
— — Syphilis, IX, 467 ; XI, 784.
— — Tuberculose, IX, 466 ; X, 778.
— — Trypanosomiase des bovidés, XII, 258.
— — Pathologie, IX, 376, 449.
— — Salubrité et réglementations sanitaires, XIII, 199.
— — Anguillules parasites de l'homme, XIV, 124.
— — Existence d'*Ankylostomum duodenale* à côté de *Necator americanus*, XIV, 89.
— — Flagellés intestinaux de l'homme, XI, 368.
— — Hématozoaire flagellé nouveau dans une pyrexie cliniquement non classée, XII, 80.
— — — endoglobulaire d'une anatidée, X, 699.
— — Hémogrégarines de crapauds, XI, 687, 788.
— — Microfilaires animales, XI, 392.
— — — de *Bradypus tridactylus*, X, 173.
— — Moustiques, IX, 383.
— — — Faune culicidienne, XI, 397.
— — Nématodes (Œufs de —) indéterminés trouvés dans les matières fécales, XIV, 155.
— — Parasites sanguicoles d'oiseaux, XI, 124.
— — Piroplasme de *Bradypus tridactylus*, X, 173.
— — Plasmodium de *Iguana nudicollis*, X, 95.
— — *Schistosomum mansoni*, X, 464.
— — Stéphanure des porcs, XIV, 219.
— — Toxoplasme d'un singe, IX, 467.
— — Utilisation rationnelle de la main-d'œuvre pénale, XIV, 258.
— — Première enfance à Cayenne, XX, 991.
— — Laboratoire de Cayenne. Examens, IX, 468.
— **hollandaise.** Leishmaniose cutanée, XVII, 293.
— — Pian, XXI, 430.
— — Moustiques, XIX, 166.
Gyrostigma. Ponte, VIII, 275.

H

Habitation. L'— indigène à Dakar, XIX, 141.
Habronema megastoma. Cycle évolutif et parasitisme chez la mouche, XIV, 471.
— *microstomum.* Evolution chez le stomoxe, XV, 572.
— *muscæ*, XI, 575.
— — Evolution chez la mouche domestique, XV, 572.
Habronèmes d'équidés. Transmission par les mouches, XV, 978 (fig.).
Hæbronémose cutanée = dermite granuleuse, VIII, 695.
— des équidés. La mouche domestique, agent vecteur, XIV, 471.
Hæmamœba tenuis et *liothricis* du *Liothryx luteus*, VII, 21.
Hæmatopota. Trypanosomides intestinaux d'— au Congo belge, VI, 182.
— *perturbans.* Transmission de *Trypanosoma cazalboui*, IX, 569.
Hæmocytozoon brasiliense, VI, 156, 333 (fig.), 377 (fig.).
— — = *Herpetomonas brasiliensis*, VI, 377.
Hæmogregarina agamæ, n. sp., II, 511 (fig.).
— *aguai*, n. sp., XXIII, 375.
— *akodoni*, VIII, 166 (fig.).
— *arvalis*, XIV, 569 (fig.).
— *bagensis*, parasite de *Clemmys leprosa*, II, 377 (fig.).
— *blanchardi* = *H. cynomolgi*, n. sp., XIII, 165, 394.
— *brendæ* dans le sang d'un colubridé, *Psammofis sibilans*, XIV, 451 (fig.).
— *bruneti* de *Cinixis homeana*, XII, 16.
— *caïmani*, n. sp., II, 471 (fig.).
— *canis* en Algérie, V, 16.
— *capsensis*, parasite de *Acanthodactylus pardalis* et *A. scutellatus*, II, 513.
— *capsulata*, n. sp., parasite de *Crotales terrificus*, XXIV, 192.
— *carchariasi*, n. sp., I, 148 (fig.).
— *carpionis*, n. sp., XVI, 354 (fig.).
— *cayennensis*, n. sp., XI, 687.
— *cenchridis*, n. sp., parasite d'un serpent boïdé, XXIV, 187.
— *chelodinæ*, n. sp., II, 379.
— *curvirostris*, parasite de *Lacerta ocellata*, II, 295.
— *cynomolgi*, n. sp., XIII, 165, 394.
— *darlingi*, n. sp., XI, 788.
— *elliptica*, n. sp., dans le sang d'un enfant, XV, 193 (fig.).
— *equatorialis*, n. sp., XVI, 403 (fig.).
— *gobionis*, n. sp., XVI, 353.
— *heteronucleata*, n. sp., parasite de *Leptodactylus pentadactylus*, II, 469 (fig.).
— *inexpectata*, n. sp., deuxième type d'*H.* humaine, XII, 76 (fig.).

— *lacertæ*, II, 295 (fig.).
— *laverani*, n. sp., XVI, 355 (fig.).
— *pallida*, n. sp., parasite du *Psammodromus algirus*, I, 595.
— *percæ*, n. sp., XVI, 355 (fig.).
— *pettiti*. Formes de reproduction, VI, 327 (fig.).
— *psammodromi*, II, 509 (fig.).
— *romani*, n. sp., parasite de *Crotales terrificus*, XXIV, 191.
— *rotundata*, V, 16.
— *salimbenii*, n. sp. du *Tupinambis nigropunctatus*, XII, 217.
— *schaudinni*, n. sp., parasite de *Lacerta ocellata*, I, 301 ; II, 295.
— *sergentium*, parasite de *Gongylus ocellatus*, II, 512 (fig.).
— *seurati*. Formes de multiplication, XVIII, 393 (fig.).
— *tonkinensis*, n. sp., XI, 687.
— *trionyxis*, IV, 522 (fig.).
— *varani*, II, 506 (fig.).
Hæmoproteus (*Halteridium*) au Congo, II, 207.
— d'oiseaux au Brésil, IX, 258.
— — de la Guyane, XI, 127.
— — du Haut-Sénégal et Niger, VII, 493 ; XI, 443.
— — d'Italie, XVI, 118.
— — au Tonkin, III, 704.
— chez les hirondelles, XVI, 12, 119.
— d'une mouette, IV, 524.
— du pigeon, II, 163.
— chez le pinson, VI, 518.
— de *Melierax gabar*, V, 74.
— *chelidonis* chez *Chelidon urbica*. Stades probables de développement chez la puce *Ceratophyllus hirundinis*, XV, 13.
— *columbæ*. Évolution spontanée de l'infection chez le pigeon, XV, 787.
— — Sporogonie, XVII, 605 (fig.).
— — Prémunition, XIX, 532.
— *danilewsky* chez *Cathartes aura*, V, 71.
— — Infection et moyens de défense des oiseaux, V, 171.
— *noctuæ*, VI, 428.
— *oryzivoræ*. Parthénogénèse des macrogamètes, XVII, 287.
Hæmostrongylus du léopard, VI, 451 (fig.).
Halarsine. Voir **Arsenicaux.**
Halteridium. Voir *Hæmoproteus*.
Hansen (Arnauer). Éloge, V, 164.
— (Bacille de). Voir **Bacille** de la lèpre.
Haplophyllum tuberculatum et dermatite soudanaise, X, 512.
Haute-Volta. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Helminthiase, XXIII, 727.
— Paludisme, XXI, 207, 309.
— — Indice endémique, XVI, 383, 556.
— — Indice splénique des enfants, XV, 765.
— — et ver de Guinée, XVII, 104.
— Rage, XXIII, 702, 857.
— Trypanosomiase du chien, V, 278.
— Tuberculose, XXIII, 544.
— Phlébotomes à Ouagadougou, XX, 342.
Haut-Sénégal et Niger (Ancienne colonie du). Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Aïnhum, IV, 364 ; VIII, 570.
— Alcoolisme, II, 337.
— Bilharziose, I, 430.
— Fièvre jaune, I, 412.
— Filariose humaine, V, 618.
— — des oiseaux, VI, 359.
— Helminthiase intestinale et eau du Niger, X, 730.
— Leishmaniose cutanée, IV, 180.
— Méningites à Bamako, X, 568.
— Onchocercose aortique bovine, X, 459.
— Paludisme, II, 34, 84 ; VII, 181.
— — Méningites paludéennes, X, 569 ; XI, 694.
— Pyomyosite chez les indigènes de la région de Bamako, XI, 822.
— Spirochétose des poules, II, 288.
— Trypanosomiases animales, I, 333.
— — humaine, I, 273 ; V, 828.
— Tumeurs. Mélano-sarcome de la choroïde chez une fillette bambara, XI, 36 (fig.).
— — Myxo-sarcome chez un bambara. IX, 702.
— *Hæmoproteus* d'oiseaux, VII, 497 ; XI, 443.
— Hématozoaires de reptiles, VII, 488.
— *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 626.
— *Leucocytozoon* d'oiseaux, VII, 391.
— *Plasmodium* d'un passereau, IV, 526.
— Trypanosomes d'oiseaux, VII, 493.
— — d'un lézard, VII, 491.
— Création du centre vaccinogène de Tombouctou, XI, 300.
Heartwater des ruminants et peste du cheval, XI, 426.
— Transmission par injection intrajugulaire d'une émulsion de tiques, XIX, 725.
Hectine. Voir **Arsenicaux.**
Helicops. Propriétés venimeuses de la salive parotidienne, IX, 369.
Héliothérapie marine dans le traitement de la diarrhée chronique des pays chauds, XI, 18.
— Traitement des ulcères et fistules, XXII, 1013.
Helminthes du Gabon, XV, 574.
— de la Haute-Guinée française, XIII, 176.
— à Madagascar, V, 842.
— Lombricose à Douala (Cameroun), XI, 753.
— *Tænia saginata* à Douala, XI, 753.
— de l'éléphant d'Asie, VII, 78 (fig.), 129 (fig.), 206 (fig.) ; VIII, 117.
— du porc en Cochinchine, VI, 41.
— du *Python sebæ*, III, 94.

— du groupe des bunostomiens, III, 311.
— Ouvrage de Looss, VII, 366.
Helminthiases. Voir aussi **Anguillulose, Ankylostomiase, Ascaridiose, Bilharziose, Strongylose.**
— en Annam, II, 488.
— en Chine, II, 606 ; VI, 704.
— à Madagascar, III, 752.
— au Tonkin, II, 488 ; III, 32 ; IV, 200, 342.
— en Tunisie, particulièrement chez les géophages, I, 600.
— intestinale en A. E. F., XX, 743.
— — au Cameroun, IX, 590.
— — en Cochinchine, VIII, 208, 245 ; XVII, 577.
— — au Congo, VIII, 301.
— — à la Guadeloupe, VII, 71.
— — à la Guyane française, II, 423 ; IX, 397.
— — — — à Cayenne, XXII, 568.
— — — — — Prophylaxie et traitement, XXII, 581.
— — en Haute-Volta chez les Lobis, XXIII, 727.
— — à Madagascar, XIV, 247.
— — — chez le Malgache, XXI, 868.
— — — chez le Malgache en Emyrne, XXII, 390.
— — et eau du Niger, X, 730.
— — chez 300 fous, IV, 334.
— — Entéro-tricocéphalose et tricocéphalose appendiculaire, X, 932.
— — cause d'appendicite, II, 606.
— et éosinophilie, I, 459, 463.
— animale à la Guyane française, IX, 402.
— et anaplasmose chez le bœuf, XXV, 175.
— du chimpanzé et des singes inférieurs, I, 181 (fig.).
— du porc en Annam, IV, 693.
— chez la poule. Formule leucocytaire, XXII, 766.
— Traitement, XXII, 388.
Helminthologie. Traité, XXII, 297.
— médicale et vétérinaire. Manuel, XXIII, 764.
Heloderma suspectum tué par morsure de *Vipera aspis*, IV, 631, 721.
Hémadipsines (Sangsues terrestres). Monographie, X, 640.
Hématies. Auto-agglutination dans la piroplasmose canine, IV, 370.
— — dans la spirochétose, III, 425.
— — dans la trypanosomiase humaine, III, 438, 442 ; V, 686.
— — et désagglutination dans la trypanosomiase humaine, X, 392.
— Hémolyse et agglutination par les extraits d'araignées, XI, 217.
— Pseudo-agglutination dans quelques affections à parasites sanguicoles, X, 484.
— et ankylostomiase, I, 229.
— Résistance globulaire dans l'ankylostomiase, X, 177.
— — — dans quelques cas de paludisme, de fièvre hémoglobinurique et de maladie du sommeil, IX, 647.
— — — abaissée dans la piroplasmose, IV, 520.
— Altérations dans la fièvre récurrente, XIII, 63, 70.
— — dans le paludisme, I, 201 (fig.), 251 ; II, 235 ; X, 542 ; XII, 73.
— — Genèse des stigmates globulaires dans le paludisme, X, 841.
— — A propos des macules dans la tierce maligne, XI, 366.
— des mammifères. Étude des « marginal points », VII, 580.
— de la taupe, parasités par *Grahamella talpæ*, IV, 514.
Hématologie du béribéri et du scorbut, IV, 315, 320.
Hématolyse des vibrions cholériques, XXIV, 907.
Hématophagie de larves de mouches, VII, 2, 77, 591.
Hématozoaires. Voir aussi **Hémocytozoaires, Spirochètes, Trypanosomes,** etc.
— en A. E. F., II, 204 ; VII, 296.
— de lézards au Brésil, V, 592 (fig.).
— des oiseaux au Brésil, IX, 247.
— d'oiseaux de la Corse, II, 268 ; VI, 515.
— — du Haut-Sénégal et Niger, VII, 493.
— d'un passereau, IV, 526.
— d'un rapace diurne (*Melierax gabar*), V, 74.
— des reptiles du Haut-Sénégal et Niger, VII, 488 (fig.).
— Flagellé nouveau dans une pyrexie cliniquement non classée, XII, 80.
— Variété nouvelle de l'— de Laveran, VII, 385.
— du paludisme. Action de la quinine, VI, 336.
Hématurie en Égypte, XVII, 841.
— dite essentielle à Tanger, XX, 989.
— avec présence d'un parasite amibiforme dans les urines, XXII, 158.
— dans la bilharziose. Traitement, VII, 722.
— — vésicale. Évaluation de la quantité de sang rendue par l'urine, XVI, 63.
— dans la fièvre ondulante, IV, 94.
— au cours des épizooties de piroplasmose, XIX, 686.
— Organisme voisin de *Sergentella hominis* trouvé dans un cas d'—, XXI, 515 (fig.).
— Traitement par le bleu de méthylène, XIV, 80.
— quinique. Traitement par le novarsénobenzol, XIV, 78.
Hémiptères. Voir aussi **Insectes, Poux, Réduvidés.**
— des euphorbes parasitées, VI, 292.

— *Ctenocephalus agilis*, vecteur de *Leptomonas davidi*, XII, 513.
— parasité par une coccidie, IV, 616.
Hémocytozoaires. Voir aussi *Hæmoproteus*, **Hémogrégarines**, *Leucocytozoon*, *Plasmodium*.
— Position systématique, VIII, 241.
— des animaux domestiques en Crimée, XX, 418.
— — — en Transcaucasie, XIV, 652.
— chez la chauve-souris, VIII, 729.
— du gecko, XIV, 323 (fig.).
— chez les oiseaux en Grèce, II, 268.
— d'oiseaux d'Italie, XVI, 118.
— chez les oiseaux du Tonkin, III, 504, 704.
— parasites des jeunes oiseaux, VIII, 77, 591.
— non pigmenté d'une anatidée, X, 699.
— d'un oiseau (*Hypolcis hypoleis*), XVII, 884 (fig.).
— Protéosomes des oiseaux du Brésil, IX, 259.
— *Ægyptianella pullorum* chez les poules en Algérie, XXIV, 371.
— d'une tanche, XVI, 440 (fig.).
— chez les singes, XXIV, 143.
— — Réveil d'une infection, I, 187.
— Coloration, XIII, 205, 206.
— Prémunition, XIX, 532.
Hémoglobinurie et anaphylaxie, V, 521 ; VII, 509, 549.
— Pathogénie dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XXIV, 473.
— au cours de la babésiellose bovine, XX, 415.
— et spirochétose des bovidés, III, 73.
— Traitement par le bleu de méthylène, XIV, 80.
— et quininothérapie, XVIII, 289, 590.
— quinique. Traitement par le novarsénobenzol, XIV, 78.
— Crises gastriques sans —. Simulation, XVIII, 786.
Hémogrégarines. Voir aussi *Hæmogregarina*.
— Recherches des kystes de multiplication, II, 513.
— Schizogonie *in vitro*, XI, 171.
— de l'homme, XV, 193 (fig.), 936 (fig.), 943 ; XVI, 403 (pl.).
— des batraciens du Tonkin, IV, 448.
— — du crapaud (*Bufo agua*), XXIII, 372.
— — — (*Bufo marinus*), V, 73 ; XI, 687.
— — des crapauds à la Guyane française, XI, 788.
— des bovidés d'Algérie. Formes hémogrégariniennes dans le sang et dans le tissu ganglionnaire, XI, 274.
— du chien, V, 16.
— des oiseaux au Brésil, IX, 262.
— — de la sarcelle (*Querquedula crecca*), XVI, 125.
— des poissons d'eau douce de France, XVI, 353.
— — du requin, I, 148.
— des reptiles, V, 72.
— — de Beni-Abbès (Algérie), IX, 485.
— — au Tonkin, IV, 446.
— — sauriens, I, 301, 595 ; II, 506.
— — du crocodile, VI, 327.
— — de *Crocodilus niloticus*, VII, 488.
— — de divers lézards, VI, 231.
— — d'*Ameiva surinamensis*, V, 592.
— — d'*Iguana tuberculata*, V, 72.
— — d'un iguanidé *Tropidurus torquatus*, XIII, 783.
— — de *Lacerta ocellata*, var. *pater*, V, 347.
— — de *Lachesis alternatus*, VI, 330 (fig.).
— — de *Phyllodactylus gerrhopygus*, X, 873.
— — de *Varanus niloticus* et *crocodilus niloticus*, VII, 488.
— — d'une couleuvre *Boodon fuliginosus*, VII, 575.
— — de *Vipera lebetina* d'Algérie. Début de l'évolution chez un acarien, XI, 278 (fig.).
— — de la tortue, IV, 446, 522 ; VI, 231.
— de rongeurs : *Mus norvegicus*, V, 72.
— — *Crycetomis gambianus*, VIII, 728 (fig.).
— de singes : *Macacus cynomolgus*, XIII, 163 (fig.).
— chez une tsé-tsé, VI, 226.
— des vertébrés au Paraguay, IX, 362.
— intraleucocytaire d'un poisson, X, 99.
— — d'un saurien *Tupinambis nigropunctatus*, X, 283.
— — *Leucocytogregarina canis* au Turkestan, X, 282.
— — — *musculi* à Pétrograd, X, 100.
Hémogrégarinidés. Position systématique, VIII, 241.
Hémoleucocytaire (Formule) dans les abcès du foie, I, 38.
— — dans l'ankylostomiase, I, 229 ; II, 97, 419.
— — dans le béribéri, III, 751.
— — dans la bilharziose, V, 396 ; VI, 260.
— — dans la coccidiose des animaux, XIX, 427.
— — chez les distomés, I, 54.
— — dans la dysenterie amibienne, IX, 330.
— — dans la fièvre récurrente, XII, 621 ; XXIII, 697.
— — — — africaine, XV, 225 ; XVII, 115.
— — dans un cas de fibrome périostique coexistant avec la tuberculose pulmonaire, XXII, 788.
— — dans la filariose, VII, 192.
— — dans le larbish, XXIV, 159.
— — dans la leishmaniose américaine, X, 36.
— — — cutanée, II, 259.
— — — interne, VI, 498 ; XVII, 477.

— — dans la lèpre, I, 86, 489 ; II, 22 ; VI, 418 ; XXIII, 942 ; XXIV, 367, 484.
— — dans la maladie de Raynaud, V, 342.
— — dans la mélioïdiose, XXIII, 273.
— — dans l'ostéopériostite post-mélitococcique, VI, 668.
— — dans le paludisme, X, 945 ; XIV, 70, 104 ; XVII, 631 ; XXIV, 544.
— — dans le parasitisme intestinal, XXI, 23 ; XXIII, 792.
— — dans le saturnisme, XVI, 348.
— — dans le scorbut, IV, 315, 320.
— — dans la spirochétose humaine au Congo, XI, 362 ; XII, 497.
— — dans la splénomégalie tuberculeuse, XXIII, 16 (fig.).
— — dans les staphylococcies, XXIII, 669.
— — dans les suppurations profondes, XVI, 693.
— — dans la trypanosomiase humaine, I, 360, 366.
— — — — chez les indigènes du Congo, V, 284.
— — dans le typhus exanthématique, XXIV, 303.
— — — — chez le cobaye, IX, 321.
— — dans la vaccination jennérienne, V, 226.
— — chez les chameaux, XIX, 582.
— — chez la poule. Variation, XXII, 766.
Hémolyse dans le paludisme, V, 801.
Hémolytiques (Substances). Action sur les spirochètes, les protozoaires et les vibrions, I, 117.
— — dans l'ankylostomiase, II, 97, 102.
— (Pouvoir) des vibrions cholériques et paracholériques, V, 435.
— — du venin de vipère, VI, 51.
Hémorragies au Maroc, VIII, 595.
Hémorroïdes. Traitement par l'émétine, XI, 401.
Hémosporidies. Position systématique, VIII, 241.
Hémothérapie (Auto) de la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XIII, 336.
Henry (Réaction de floculation d'). Voir **Réaction** d'—.
Hépatite dysentérique, I, 170, 236.
— pneumococcique chez les noirs, XI, 159.
— suppurée. Hémorragies intestinales et hématémèses, symptômes d'—, XI, 800.
— — XXV, 837.
— et émétine, VI, 426, 716, 723.
Hérédité et immunité dans les trypanosomiases, VII, 724 ; VIII, 73.
Hérisson. Développement direct d'un *Hymenolepis* dans les villosités intestinales du —, XIV, 386 (fig.).
— et virus rabique, XV, 779.
Hermaphrodisme (Pseudo-) androgyne, XXI, 259.
Hernie étranglée. Résection du sac herniaire, XXI, 773.
Herpès. Sensibilité de la civette et de la genette, XXIV, 145.
— — des singes, XXIV, 144.
— Virus d'origine marocaine, XVIII, 623.
— Essais de culture du virus avec protozoaires, XXV, 724.
Herpetomonas. Voir aussi *Leptomonas.*
— du *Chamæleon vulgaris*, de *Chalcides* = *Gongylus ocellatus* et *Tarentola mauritanica*, XIV, 641.
— de larves d'œstrides cavicoles, VIII, 369 (pl.).
— des puces. Infection de mammifères, VII, 605.
— Infections expérimentales chez les chiens et les cobayes à l'aide de cultures d'— d'insectes, XIII, 569.
— *ctenocephali*, VI, 255.
— — de la puce du chien. Culture, XII, 310 (fig.).
— — Infection des souris blanches à l'aide des cultures de —, XII, 379.
— — var. *chattoni*. Inoculation aux cunhorbes, XIII, 798.
— *ctenopsyllæ*. Culture, VIII, 266.
— — XVI, 15.
— *funtumiæ*, n. sp., XV, 109 (fig.).
— *ganoræ*, n. sp., XXIV, 848 (fig.).
— *hemidactyli*. Morphologie et cycle évolutif dans l'intestin d'*Hemidactylus brooki*, XV, 795 (fig.).
— *muscæ domesticæ* infectant les mouches de Madras, III, 264.
— — — Infection du rat et de la souris, VIII, 109.
— — — Inoculation aux euphorbes, XV, 792 (fig.).
— *myoxi*, n. sp., XIV, 278 (fig.).
— *periplanetæ*, n. sp., XIII, 145 (fig.), 331.
— *pseudo-leishmania*, VI, 255, 578.
— *pyrrhocoris*. Culture, XV, 161 (fig.), 551 (fig.).
— *tarentolæ*. Culture, XIV, 323 (fig.).
Hexamastix ardin-delteili, flagellé nouveau dans une dysenterie chronique, VII, 571.
— Derrieu et Raynaud nec Alexieff = *Pentatrichomonas*, VIII, 574.
Hexamitus brumpti, n. sp., XVIII, 61 (fig).
Hibernation des moustiques en Chine, III, 155.
Hippobosca cameloparalis, n. sp., XVIII, 466 (fig.).
— *maculata*, VIII, 657.
Hippopotame parasité par un œstride nouveau *Rhinœstrus hippopotami*, II, 615.
Hodi-potsy, achromie parasitaire de Jeanselme = *Tinea flava* de Castellani. Voir **Mycoses.**
Hollande. Paludisme, XXII, 642.
— Fréquence saisonnière des anophè-

les impaludés aux environs d'Amsterdam, XV, 116.
— Variations de taille de l'*Anopheles maculipennis*, XX, 366.
Hormodendron fontoymonti, agent de l'achromie parasitaire malgache, XV, 424 (fig.), 436 (fig.).
Hôte invertébré. Cycle évolutif des trypanosomides chez l'—, V, 366 ; VI, 182.
Huile à gaz, produit larvicide, XXI, 109.
Huîtres à Tananarive. Caractéristiques de l'— saine, XXV, 1041.
Humidité et formation des corps en anneau, II, 235.
Hyæna crocuta parasitée par des filaires, IV, 629.
Hyalopus anoma, n. sp., XI, 332.
Hydarthrose du genou non traumatique. Présence de microfilaires, XVIII, 527, 529.
Hydatique (Kyste) du poumon. Faux cas, IX, 537.
— — et chylurie, XI, 452.
Hydnocarpus wightiana. Graines de —, productrices d'huile de chaulmoogra, XX, 710.
— — Huile de — irradiée ou additionnée d'ergostérine irradiée dans la lèpre, XXII, 759.
Hydra. Leishmaniose canine, VI, 117.
— — interne, VI, 114 (fig.), 430.
— — — Cas de guérison, VII, 43.
— — — Époque d'apparition, VII, 45.
— — — Mortalité en 1911, VII, 193.
Hydronéphrose du porc à Madagascar, XXV, 378.
Hygiène publique dans les colonies françaises, XIX, 321.
— — — — Projet d'organisation des services, X, 406, 421, 427.
— et médecine modernes en Chine, XXV, 515.
— de la Côte d'Ivoire, III, 785, 794 ; V, 150 (c.).
— — (en 1912), VI, 645 (c.).
— à la Guyane française, Salubrité et réglementations sanitaires, XIII, 199.
— aux Indes néerlandaises, XIII, 764.
— des indigènes des îles Loyalty, VII, 598.
— et médecine au Maroc, I, 594 ; VIII, 121.
— au Sénégal comparée à l'— de Bathurst, III, 546.
— à Dakar, XX, 99.
Hymen. Imperforation, cause de dystocie, XXII, 754.
— — XXIII, 207.
Hymenolepis dans les villosités intestinales du hérisson ; développement direct, XIV, 386 (fig.).
— *diminuta*. Cycle évolutif, IX, 580.
— *nana*. Cycle évolutif, IX, 581.
— — chez les Arabes du Tell algérien, VII, 301.
— — chez les enfants de Beni-Ounif (Algérie), IV, 421 (fig.).
— — en Cochinchine, XVIII, 722.
— — var. *fraterna*, XII, 228 (fig.).
— — — chez la souris, XXV, 99.
— *parvula*. Développement larvaire chez *Herpobdella octoculata* (Hirudinée), XV, 46 (fig.).
Hyperglobulie dans l'ankylostomiase, I, 229.
Hypertrophie de la rate avec le nagana *werbitzki*, IV, 237.
Hypochlorites. Action sur le vibrion cholérique, V, 167, 297.
— de soude dans la dysenterie amibienne, II, 80.
Hypoglobulie dans l'ankylostomiase, II, 97.
Hyrganol. Voir **Chaulmoogra.**

I

Ictère dans l'ankylostomiase, II, 97.
— épidémiques et spirochètes au Sénégal, XIV, 460, 632.
— infectieux chez les noirs, XV, 348, 385.
— — — à Brazzaville, XVI, 184.
— à vomissements noirs. Cas observé à Bamako, XXII, 612.
— à la suite d'injections de novarsénobenzol, XVI, 146.
Identification des trypanosomes, V, 611 ; VI, 685.
Ien-Ien de Fernando-Po, *Acacta hostilissima = Culicoïdes hostilissimus*, XXIV, 672 (fig.).
Image d'Arneth dans le béribéri et le scorbut, IV, 320.
— — dans la bilharziose, V, 396.
— — dans la leishmaniose infantile, VI, 498.
Immunisation contre les trypanosomes pathogènes, V, 877 ; VI, 176, 693, 699.
— contre le nagana expérimental des souris, VII, 53.
— variolique du singe, IX, 669.
— et prémunition ; immuniser et prémunir, XVII, 37.
Immunité naturelle. Mécanisme de l'— du rat et du cobaye à l'égard des cultures du *Leishmania infantum*, V, 358.
— relative des noirs au trachome, VI, 634.
— de race et vaccinations du jeune âge, IV, 104.
— dans la leishmaniose cutanée, IV, 134.
— active du chien pour la piroplasmose canine, VI, 499.
— conférée au macaque par le spirochète de la fièvre récurrente du Tonkin, III, 422.
— Durée dans la fièvre récurrente expérimentale, VI, 107, 242.

— croisée pour distinction de spirochètes du groupe *obermeieri*, VI, 107.
— — Expériences d'— avec *Tryp. brucei*, *Tr. brucei* var. *verbitzki* et *Tr. rhodesiense*, V, 101.
— Absence d'— héréditaire dans la trypanosomiase, VII, 724 ; VIII, 73.
— conférée par la variolisation vis-à-vis de la vaccine, II, 237.
— conférée par la vaccine, III, 167.
Inanition et béribéri, III, 118, 317.
Inde anglaise. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes, I, 548, 551-555 ; II, 5, 20.
— — Filariose du chien, V, 731.
— — (Bengale). Paludisme ; forme pernicieuse et fièvre hémoglobinurique, XV, 962.
— — Trypanosomiase du chien, V, 278.
— — Tuberculose, XXIII, 5.
— — Règlement concernant la vente de la quinine, I, 531.
— **française.** Alcoolisme, II, 332.
— — Choléra, XX, 708.
— — Dengue, XXV, 7.
— — Parasitisme intestinal à Pondichéry, XXI, 518.
— — Assistance médicale dans l'— et École de médecine de Pondichéry, XIV, 134
— **néerlandaises.** Béribéri, IV, 258.
— — Chromoblastomycose, XXIII, 765.
— — Hygiène, XIII, 764.
— — Lèpre, XIII, 769.
— — Paludisme, XIII, 770.
— — Peste, XIII, 767.
— — Variole, XIII, 766.
— — Prophylaxie anticholérique et antipesteuse, XVII, 703.
— — Protozoaires parasites intestinaux de l'homme et des animaux, XII, 628.
— — Deux nématodes de Java, XI, 705.
— **portugaise.** Blastomycose, XXII, 142 (fig.)
— — Lèpre, XIX, 928.
— — Méningite cérébro-spinale, XIV, 398.
— — Parasitisme intestinal, XX, 608.
— — Spirochétoses intestinales humaines, XVII, 857.
— — *Scopulariopsis sehnsuchta*, n. sp., XXV, 295.
Indice endémique et — épidémique, II, 583.
— — du paludisme en Algérie, II, 38.
— — — — (Sud-Oranais), III, 474.
— — — à la Côte d'Ivoire, IV, 108.
— — — dans le Haut-Sénégal et Niger, II, 34.
— — — au Tonkin, II, 577 ; III, 465.
Indochine. Voir aussi **Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos, Tonkin.**
— Alcoolisme, II, 332.
— Anaplasmoses, XXIV, 104.
— Ankylostomiase, III, 32, 315.
— Clavelée, XXIII, 804.
— Filariose, I, 369, 563 ; III, 142.
— Lèpre, III, 112.
— Myiases humaines, XXIII, 595.
— Paludisme, III, 110 ; V, 162 ; VI, 468 ; XVIII, 815 ; XXIII, 811 (c.).
— Parasitisme intestinal chez les Indochinois, XXIII, 790.
— Peste, IV, 217, 219, 220.
— — bovine, XXIV, 51, 521.
— Piroplasmoses, XVI, 30.
— Surra, I, 575 ; II, 65 ; XIX, 746.
— — équin, XXIV, 840.
— Trypanosomiases animales, IV, 56.
— Typhus exanthématique, I, 156.
— Ulcère phagédénique, XXV, 333.
— Trématodes, XVI, 173.
— Eaux d'égouts. Épuration, IV, 330.
— Laquage des dents, V, 401.
— La question de l'opium, VI, 296, 385, 480, 542, 543.
— Quinine, III, 109, 626.
— Société médico-chirurgicale, III, 485.
Indol. Contrôle automatique de la production d'— dans les milieux de culture, XI, 868.
Infantilisme palustre, III, 694 ; XI, 690, 839.
Infections paratyphoïdes dans l'Afrique du Nord, VI, 598.
— piroplasmique sans symptômes morbides en Algérie, VI, 622.
— secondaires et lèpre du rat, V, 466.
— expérimentales. Transmission du choléra aux singes, VI, 482.
— — des *Cyclops* par embryon de filaire, VI, 281.
— — par *Leishmania infantum*, V, 355.
— — des macaques par *Leishmania tropica* d'origine indienne, V, 573.
— — par le virus de la leishmaniose du chien, V, 351.
— — à *Schizotrypanum cruzi* chez le cobaye et la souris, V, 598.
— — du chien par *Toxoplasma gondii*, VI, 294, 464.
— — du lapin par *Tox. gondii*, VI, 249, 464.
— — des souris par *T. gondii*, VI, 460.
— — comparée des porcs par *Trypan. gambiense* et *Tr. rhodesiense*, V, 492.
— — produites par *Tryp. rhodesiense*, V, 213, 241, 492.
— — de moustiques par trypanosomes, VI, 442.
— — chez les singes (typhus exanthématique, trachome, etc.), V, 469.
Infirmerie indigène aux Loyalty, V, 137.
— — Type de cabine-étuve à désinfection, XII, 535.
Infusoires intestinaux, IV, 394 ; XXV, 1049.
— — à Madagascar, XX, 466.

— nouveau parasite du chimpanzé *Troglodytella abrassarti*, V, 499.
Insectes. Voir aussi **Diptères, Hémiptères.**
— Les diptères et la pathologie exotique, XIV, 58.
— parasites de l'homme et des animaux, XVII, 195.
— propagateurs de la flagellose des euphorbes, XIV, 148 ; XV, 21, 22, 166, 205, 408.
— Rôle dans la fièvre jaune (Hypothèse, 1821), VIII, 467.
— et leishmanioses, VI, 753.
— — Rôle dans l'étiologie du bouton d'Orient, XII, 500, 607.
— et transmission de la lèpre, XIX, 774.
— Sarcophaginés cause de myiase cutanée, XVI, 415.
— *Tabanus* (et tiques) agents de transmission de la peste du cheval, XI, 430.
— nuisibles aux plantes médicinales en Crimée, XIV, 164 (fig.).
— Larve de diptère parasite cuticole de l'éléphant d'Afrique, XVII, 86.
— Larve de *Ruttenia loxondotis* diptère parasite de l'éléphant d'Afrique, XIX, 666.
— Larves de sarcophagides probablement parasites accidentels de *Glossina palpalis* en captivité, XII, 104.
— *Lynchia maura* parasite des pigeons, XXIV, 338.
— — — hôte intermédiaire d'*Hæmoproteus columbæ*, XVII, 603 (fig.).
— *Pseudomeloë cokerelli*, n. sp., coléoptère médicinal du Pérou, XIX, 198.
— Les pseudo-méloïdes du Pérou ; emploi en thérapeutique, XVI, 615.
— prédateurs de larves de moustiques en Indochine, XVIII, 815.
— venimeux. Récolte des —, VII, 521.
— — Venin de la larve de *Magalopyge urens*, XXI, 656 (fig.).
— Champignon entomophyte parasite des fourmis en Afrique équatoriale, XIX, 813.
— Flagellés parasites des muscides, XIII, 141 (fig.).
— — nouveau de *Rhodnius prolixus*, XIII, 527 (fig.).
— — parasites. Pouvoir infectant pour la souris, XII, 665.
— — — (*Herpetomonas*). Pouvoir infectant pour le chien et le cobaye, XIII, 569 (fig.).
— — — Inoculation dans le latex des euphorbes, XVI, 646.
— Destruction par le Givral, XXII, 681.
— — par un liquide à base de pétrole et de pyrèthre (Fly-tox), XIX, 901.
— — dans le sol des cases au Sénégal, XXV, 539, 541.
— Sociétés d'—, XIX, 874.
— piqueurs en Afrique équatoriale française, III, 754.
— — en Afrique occidentale française, IV, 396, 544.
— — dans l'Afrique orientale. Nouveaux diptères piqueurs, XVIII, 465 (fig.).
— — en Algérie : Sud-Oranais, III, 471.
— — au Congo belge : Ouellé, IX, 95.
— — — — Diptères hématophages, XXIII, 987.
— — — — parasites du bétail, IX, 763.
— — — français, II, 108.
— — au Dahomey, II, 129 ; III, 559 ; IV, 122.
— — de la Haute-Guinée, VIII, 657.
— — au Niger-Tchad, III, 754.
— — au Pérou : Arequipa, XVII, 906.
— — au Vénézuéla, IV, 573.
— — Culicides, XX, 851 (fig.).
— — Appareil buccal et pompe salivaire des —, XX, 980 (fig.).
— — Pompe salivaire des Simulidés, XX, 748 (fig.).
— — Pompe salivaire des Tabanidés, XX, 846 (fig.).
— — Larves de névroptères éventuellement hématophages, XI, 586.
— — et lèpre, I, 288, 493 ; V, 667 ; VI, 555.
Insectivore réservoir de la peste au Cambodge, VIII, 54.
— parasités par *Synopsyllus fonquerni*, XXV, 962.
Intestinal (Parasitisme) en Afrique équatoriale française, XX, 743.
— — en Afrique orientale parmi les troupes belges, XII, 141.
— — en Algérie, chez les Arabes du Tell, VII, 301.
— — des enfants des écoles maternelles d'Algérie. Indice parasitaire en rapport avec la pureté des eaux de boisson, IX, 795.
— — en Annam, VI, 343 ; XIII, 596.
— — chez les Annamites, XVII, 581.
— — au Cambodge, XVIII, 61 ; XXIII, 790.
— — au Cameroun : Douala, XI, 749.
— — — Douala et région forestière, XII, 244.
— — en Chine occidentale, VI, 704.
— — en Cochinchine, VIII, 208, 245 ; IX, 15, 125.
— — à la Grande Comore, VI, 455.
— — au Congo français, XIX, 714.
— — au Dahomey : cercle de Djougou, XXIII, 859.
— — en France chez les indigènes du corps d'armée colonial, XVIII, 694.
— — — dans la région marseillaise, XIV, 151.
— — — dans la région de Toulon, XXV, 78.

— — en France. Cas de balantidiose ; traitement, XI, 558.
— — au Gabon, XV, 574.
— — en Géorgie, XIX, 205.
— — à la Guadeloupe, XXII, 671.
— — — Helminthiase, VII, 71.
— — à la Guyane française, X, 557.
— — — — à Cayenne, XXII, 568.
— — — — chez les enfants ; relation avec les eaux de boisson, XIV, 85.
— — — — Anguillules, XIV, 124.
— — — — Ankylostomiase, XIV, 89.
— — — — Flagellés de l'homme, XI, 368.
— — dans l'Inde française : à Pondichéry, XXI, 518.
— — aux Indes néerlandaises. Protozoaires de l'homme et des animaux, XII, 628.
— — chez les Indochinois, XXIII, 792.
— — dans la zone frontière du Libéria et de la Guinée : nématodes, X, 560.
— — à Madagascar (sud), XX, 464.
— — — chez les Malgaches, XXI, 20.
— — — Helminthiase et bilharziose à *Schistosomum mansoni*, XIV, 247.
— — au Maroc, chez les Berbères de Figuig, IV, 421 (fig.).
— — à la Martinique, IV, 390 ; XV, 185.
— — en Nouvelle-Calédonie, XXI, 241.
— — (Nouméa), XXII, 334.
— — en Russie. Protozoaires pendant les épidémies de Pétrograd (1919-1921), XVIII, 183.
— — au Sénégal, XV, 1020.
— — chez les tirailleurs sénégalais, XVI, 180.
— — en Transcaucasie. Protozoaires et infections —, XIV, 649.
— — en Turquie, XXIII, 192.
— — Eau du Niger et helminthiase, X, 730.
— — Méthode d'enrichissement des selles, XXV, 700.
— — associé à la fièvre typhoïde, XXV, 632.
— — Ascaridiose à forme typhoïde, XVI, 598.
— — Bilharziose à localisation appendiculaire, XI, 297.
— — Entéro-tricocéphalose et tricocéphalose appendiculaire, X, 932 (fig.), 936.
— — Trichomoniase, X, 553.
— — Pseudo-, XVII, 583.
— — — par larve de charançon, X, 385.
— — Amibes cultivables parasites de l'intestin de l'homme, XV, 229 (fig.).
— — Flagellés, XIV, 546, 548, 555, 558.
— — *Oicomonas granulata*, n. sp., XIV, 546.
— — Protozoaires de l'homme et des animaux, XV, 132 (fig.).
— — — agents de coliles chez l'homme, XIV, 548 (fig.).
— — — et leur dispersion par les mouches, XI, 171.
— — — en dehors de l'organisme de l'homme. Examen de l'intestin de *Periplaneta orientalis*, XV, 8.
— — — et toxémie, XVIII, 130, 132, 137, 177.
— — Spirochètes, XIV, 532 (fig.).
— — Prophylaxie et traitement, XXII, 581.
— — Syndromes dysentériques guéris par le seul traitement anthelminthique, XVI, 330.
— — et anthelminthiques, XXIV, 41.
— — Traitement par le tétrachlorure de carbone, XVIII, 460 ; XIX, 719.
— — des bovins et entéqué, XIX, 135.
— — Kystes intestinaux causés par un nématode chez les grands félidés, XI, 86.
— — Kystes de la paroi causés par un nématode chez un rongeur, XI, 574.
— — du mouton au Maroc. Épidémie de gastro-entérite parasitaire, XV, 820.

Intestinales (Affections). Rôle de bacilles pseudo-dysentériques, IX, 204.
— — dans l'Inde portugaise, XX, 608.
— — au Maroc, XXI, 440.
— — — et flagellés, XIX, 353.
— — au Soudan français, XVII, 944.
— — au Tchad : Ouadaï, VII, 525.
— — Syndromes dysentériques guéris par le seul traitement anthelminthique, XVI, 330.
— — Traitement par l'émétine, XI, 403.

Intoxication due au salicylate de soude, XIX, 859.
— par les eaux phosphatées, XXIV, 848, 927.
— arsenicale chez le cheval, XXV, 381.

Intra-palpébro-réaction dans les trypanosomiases, VIII, 112.

Invertébrés du Sud-Oranais, III, 481.

Iode. Voir aussi **Iodure.**
— dans la lèpre, XXII, 762.
— Lipiodol dans la lèpre du rat, XXV, 970, 973.
— dans le paludisme, XIX, 283.
— colloïdal dans la peste bubonique, XIX, 407, 670.
— Solution de Lugol dans la peste, XXI, 598, 600.
— Néoriodine dans la peste, XXI, 598, 600.
— Solution de Lugol dans le pied de Madura, XXI, 511.
— dans la spirochétose bronchique, XVII, 178.
— (Monochlorure). Emploi en irrigation continue, XII, 732.

Iodoforme dans la lèpre, IV, 48.

Iodosalyl dans la trypanosomiase et le pian, XIII, 246.

Iodure de potassium dans la lèpre, I, 347 ; IV, 48.

— — — murine, XXV, 969, 971.
— — dans la lymphangite épizootique, III, 453 ; XIII, 644.
— — dans les mycétomes, VI, 710.
— — dans les pyomyosites observées à la Côte d'Ivoire, XVI, 710.
— — dans la sporotrichose, XXV, 298.
— — dans la syphilis associée à la trypanosomiase, XVII, 181.
— double de quinine et de bismuth dans la leishmaniose américaine, XVIII, 634.
Ionisation dans le traitement de la lèpre, XX, 57.
Ipéca. Voir aussi **Émétine.**
— — désémétinisé dans la dysenterie amibienne, IV, 322.
— total glutinisé dans la dysenterie amibienne, X, 868.
Iritis et trypanosomiase humaine, I, 277.
Isospora belli. Description, XVIII, 572.
— *hominis*, XIII, 785 ; XV, 137.
Italie. Anaplasmose des ovins de Sardaigne et du Piémont, X, 143.
— Béribéri. Cas autochtone, VIII, 218.
— Choléra, III, 636.
— Coccidiose intestinale du bœuf, X, 446.
— Leishmaniose cutanée, III, 288 ; VI, 219 (fig.).
— — interne, XIX, 11 (fig.).
— Paludisme, VI, 468.
— Hématozoaires d'oiseaux, XVI, 118.
— — — *Hæmoproteus* chez l'hirondelle *Chelidon urbica*, XV, 13.
— *Toroplasma canis* à Turin, III, 359.
— Trypanosome de la chauve-souris, XIV, 542 (fig.).
Ixodidés. Voir **Argasinés, Tiques.**

J

Japon. Kagaminetsu, XVII, 819.
— Parasitologie, XXIII, 685.
Jatropa basiacantha et verruga du Pérou, XXIV, 27.
Jaunisse des bovidés de l'Afrique du Nord, XIII, 456, 779.
— — d'Algérie, XII, 108, 202.
Java. Choléra, V, 5.
— Infection à *Isospora hominis*, XV, 137.
— Maladies des œdèmes, XIV, 333.
— Pian. Traitement, XVI, 580.
— Parasites du dindon, XVI, 594 (fig.).
Jong (D. A. de). Éloge, XVIII, 446.
Journées médicales d'Égypte, XX, 705.
Joyeuxia nov. gen., XX, 437.
— *pasqualeiformis*, n. sp., XXI, 244 (fig.), 251.

K

Kagaminetsu, fièvre endémique accompagnée de lymphadénie généralisée, XVII, 819.
Kaki et pseudo-calculs intestinaux, I, 35 (fig.).
Kala-azar. Voir **Leishmaniose interne.**
Katanga. Voir **Congo belge.**
Katjang-idjou (*Phaseolus radiatus*) dans le béribéri, IV, 260.
Kcara du Pérou. Voir **Dyschromie.**
Kelsch (A.). Éloge, IV, 69.
Kératite à hypopion au Ouadaï, VII, 524.
— dans le kala-azar, VI, 477.
— Spécificité dans la leishmaniose canine, VII, 193.
— dans la toxoplasmose, VI, 478.
— Fréquence chez les chiens infectés par *Trypanosoma marocanum*. Cas ulcéreux double, XI, 375.
Kératodermie symétrique en Afrique, IX, 442 (pl.).
Kératoses pilaires préscorbutiques, XIX, 6.
Khartoum. Travaux des laboratoires Wellcome, II, 275.
Kho-sam dans le traitement de la dysenterie amibienne, I, 72.
Kirkia, genre nouveau d'œstrides, VII, 210, 215 ; VIII, 434.
Kitasato (S.). Éloge, XXIV, 345.
Koch (Robert). Éloge, III, 348.
Kushta et lèpre, XXIV, 175, 363.
Kystes à filaires, III, 88, 92.
— — au Soudan français, VIII, 635.
— hydatiques du foie, de la rate et du péritoine chez un noir du Congo, XVI, 144.

L

Laboratoire de Béni-Abbès. Fonctionnement, VIII, 66 ; IX, 469.
— de Cayenne. Examens, IX, 468.
— de Grand-Bassam. Photographie, IX, 413.
— coloniaux. Animaux d'expériences « de remplacement », XXIV, 502.
Lacertiens. Voir **Reptiles.**
Lacto-réaction dans la fièvre ondulante, I, 19.
Lagane (L.). Éloge, VIII, 564.
Lait condensé et puériculture en Nouvelle-Calédonie, V, 231.
— et fièvre ondulante, IX, 285.
— Enquête sur les chèvres laitières de Tunis au sujet de la fièvre ondulante, IX, 86.
— Passage des trypanosomes, VIII, 438.
Laitue. Amibe de la — *Lactuta sativa*, XV, 784 (fig.).
Lamblia. Voir *Giardia.*
Lamblies. Voir **Giardies.**
Lambliose intestinale, épisode de la — vésiculaire, XXII, 163.
— — Habitat de *Giardia intestinalis* chez l'homme, XVI, 589, 633, 735.

— intestinale. Traitement, VII, 659.
— — — Action des sels de bismuth, XVI, 737.
— — — par le luargol, XIV, 632.
— — — par le stovarsol, XVI, 325.
— du chien en Russie, XXII, 80.
Lambo, maladie des noirs de l'Afrique équatoriale ; staphylococcie, XX, 4.
Lantana toxique pour les volailles, III, 52, 261.
Laos. Distomatose hépatique, XXII, 331.
— Lèpre, XXV, 606.
— Paludisme, XXV, 419.
Lapin. Absence de kystes de Carini, VII, 271.
— Coccidiose, XVIII, 363, 663 ; XIX, 266, 269.
— Flagellés, XIV, 561 (fig.).
— Gale psoroptique au Congo belge, IX, 767.
— Intoxication par le jus de férule, XIX, 22.
— Toxoplasmose naturelle, IX, 432.
— *Entamœba cuniculi*, n. sp., XII, 631.
— Infection par *Leishmania infantum*, VI, 110.
— — par *Toxoplasma gondii*, VI, 249, 460.
— Réceptivité au spirochète de la fièvre récurrente nord-africaine, V, 472 ; VII, 565.
— — au spirochète de la musaraigne, XIX, 504.
— Sensibilité au virus de la peste bovine, XXIII, 904.
— — aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 533.
— Sérum de — traité par trypanosomes desséchés, VI, 179.
Laquage des dents en Indochine, V, 401.
Larbish, pseudo-myiase rampante sous-cutanée au Sénégal, VII, 398.
— à la Côte d'Ivoire (Grand-Bassam), X, 725.
— chez une Européenne au Gabon, XVI, 665 (fig.).
— Eosinophilie locale, X, 294.
— Etiologie. Traitement, XXIV, 157.
Larmes. Présence du spirochète de la fièvre récurrente, VII, 472.
Larves carnassières de moustiques, II, 147.
— cuticoles de muscides africains, I, 597.
— — de *Chrysomyia megacephala*, V, 737.
— de moustiques gênées par les vents, IV, 325.
Larynx. Section du — guérie par première intention, XVII, 715.
Latex parasiticide de *Ficus glabrata*, V, 483.
— milieu de culture pour les flagellés, XVI, 41, 256.
— favorables à la culture des flagellés, XVII, 32.
— (Plantes à). Amibiase, XV, 197, 287 (fig.), 393 (fig.), 399 (fig.), 784 (fig.).
— — Flagellose, XV, 109 (fig.), 149, 197, 198, 205, 408, 792 (fig.).
— — Protozoaires, XVI, 642 (fig.), 650 (fig.), 652 (fig.), 655 (fig.).
— des euphorbes. Toxicité, XVIII, 256.
— — Action sur différents protozoaires. Culture de flagellés, XVI, 41, 256.
— Essais d'inoculation de — parasités aux souris blanches. Abcès du foie expérimentaux, XVI, 162 (fig.).
Latitudes et paludisme, II, 572.
Latrodectus mactans au Pérou, XII, 702.
Lauréats de la Société médico-chirurgicale de l'Ouest-Africain, XXI, 69 ; XXII, 48 ; XXIII, 101 ; XXIV, 59.
— de la Société de Pathologie exotique, XX, 943 ; XXII, 629 ; XXIV, 756.
Laveran (A.). Eloge, XV, 373.
— « La vie et l'œuvre de — », XVI, 69.
— Médaille de la Société à l'effigie de —, XX, 303.
— Cérémonie au Val-de-Grâce en l'honneur de —, XXIII, 883.
Lebœuf (A.). Eloge, XV, 101.
Le Dantec (Alexandre). Eloge, XXV, 185.
Le Dentu (A.). Eloge, XIX, 765.
Leiognatus laverani, n. sp., acarien gamaside parasite de la chauve-souris et transmetteur de trypanosomes, XIV, 542 (fig.).
Leishman (Corps de —). Voir *Leishmania*.
— (Sir W.). Eloge, XIX, 397.
Leishmania de l'homme et du chien au Turkestan, VIII, 474.
— Culture, IX, 128 ; X, 719 ; XV, 534.
— — à partir des organes de tarente, VII, 577.
— — Infection d'euphorbes, XV, 792.
— Parasite du type — dans le sang du merle, XVI, 11.
— *donovani* au Turkestan russe, VIII, 484.
— — Culture, III, 216.
— — — souillée par un champignon, VIII, 429.
— — Infection des animaux de laboratoire, V, 715.
— — Inoculation à la souris blanche, XI, 205.
— *infantum*. Morphologie, II, 385.
— — et punaises, V, 817.
— — Absence à l'autopsie d'un enfant mort de kala-azar, V, 349.
— — Cultures, I, 121 (fig.) ; II, 385 (fig.) ; IV, 286 (fig.) ; V, 218, 721 ; VII, 480 ; IX, 128.
— — — Formes culturales distinctes

de celles d'un *Leptomonas* de la puce du chien, XII, 313.
— — Infection des animaux de laboratoire, V, 218, 355, 715 ; VI, 110, 574.
— — Inoculation au chien, III, 431.
— — — au chacal, V, 721.
— — Transmission de chien à chien par *Pulex serraticeps*, V, 595 ; VI, 578.
— — Mécanisme de l'immunité naturelle du rat et du cobaye à l'égard des cultures de —, V, 358.
— *tropica* au Brésil. Localisation dans les muqueuses, V, 176, 411.
— — en Grèce, IV, 454, 667 ; V, 489.
— — au Pérou, VI, 545.
— — Description, X, 66.
— — dans les lésions, II, 391.
— — et *Leptomonas*, XI, 599.
— — Répartition des parasites dans le bouton d'Orient, II, 26.
— — Transmission par les mouches, IV, 459.
— — Infection naturelle et expérimentale de *Phlebotomus papatasi*, XIX, 694.
— — Cultures, II, 391 ; IV, 228, 286 ; IX, 128.
— — Conservation de la virulence pour l'homme dans les cultures, VII, 700.
— — Infection expérimentale chez *Cercopithecus mona* et *Cercocebus fuliginosus*, X, 291.
— — — — chez un mandrill, X, 455.
— — — — chez la gerbille, VIII, 680.
— — — — généralisée chez la souris, VII, 272.
— — — — de souris, meriones, rats et macaques, VII, 663 (fig.).
— — Présentation d'un chien infecté, VII, 697.
— — Évolution des infections expérimentales des petits rongeurs, X, 110.
— — Essais d'infection de lacertiens, VIII, 104.
— — Inoculation au chimpanzé, XI, 561.
— — — au gecko, XII, 316.
— — — à l'homme, au singe, au chien, IV, 314.
— — — au loir, XI, 443.
— — — aux macaques, V, 573.
— — — à la souris blanche, XI, 205.
— — Recherches expérimentales (rongeurs, singes, chiens), X, 66, 110.
— — — — (souris), VIII, 22, 363, 499, 680.
— — var. *americana*, V, 486, 489 ; VI, 545.
— — flagellée dans le corps humain, V, 808.
— — d'origine indienne infectant les macaques, V, 573.
Leishmanioses autochtones en France, XXIV, 477.
— — — Vœu émis par la Société, XXIV, 517, 629.
— au Turkestan, VIII, 474 ; IX, 202.
— naturelles et expérimentales, VIII, 157.
— Périodes d'incubation chez les animaux, VIII, 430.
— Sérologie comparée des — humaine et canine, XXIV, 37.
— Classification générale, IX, 494, 761.
— Traité de A. Laveran, X, 678.
— **américaine** au Brésil, II, 252, 255 ; IV, 289 (pl.).
— — — (État de São-Paulo), VI, 732.
— — à la Guyane française, IX, 467.
— — — — = Pian bois, II, 587.
— — en Italie, VI, 219 (fig.).
— — à la Martinique, X, 379.
— — au Pérou, VI, 237, 545.
— — au Vénézuéla, XIII, 238.
— — Diagnostic, XXII, 43.
— — et blastomycose, XXII, 40, 42.
— — et bouton d'Orient, XXII, 37.
— — Ulcère de Bauru = buba = espundia, II, 252, 255 ; IV, 289 ; V, 176, 411, 486, 489 ; VI, 210 (pl.).
— — de la peau et des muqueuses, VIII, 284, 382.
— — Localisation aux muqueuses, V, 176 (fig.), 411 (pl.) ; VI, 237.
— — Formes et variétés cliniques, IX, 215, 494.
— — Nouvelle forme clinique, V, 411.
— — Formes *Uta* et *Espundia*, XXII, 38.
— — des sinus frontaux, XVIII, 634 (fig.).
— — ulcéro-végétante au Paraguay, XXV, 488 (pl.).
— — Inoculation négative à des grenouilles et au crapaud, XIX, 791.
— — Caractères et traitement, XXI, 846.
— — Traitement par l'émétique, VII, 277 ; X, 34 ; XXI, 846.
— — — — en injections intraveineuses et en applications locales, IX, 699.
— — — par l'iodure double de quinine et de bismuth, XVIII, 634.
— — — par l'oxyde d'antimoine, X, 381 ; XI, 372.
— **canine** en Afrique du Nord, IV, 40.
— — en Algérie, III, 510 ; IV, 40 ; V, 93 (pl.) ; VI, 579 ; XVII, 360.
— — — à Alger. Fréquence et variations saisonnières, V, 89.
— — en France, à Marseille, VII, 41, 173, 484 ; IX, 697 ; XXV, 1040.
— — — à Nice, XXV, 1091.
— — en Grèce, IV, 178 ; V, 88 ; VI, 117.
— — — dans l'île d'Hydra, VI, 117 ; IX, 302.
— — en Italie, III, 288.
— — au Maroc, IX, 202 ; XXV, 225.
— — — dans la région de Casablanca, XXV, 227.

— — en Nouvelle-Calédonie, III, 323.
— — au Sénégal, à Dakar, VIII, 162 ; IX, 696.
— — en Tunisie, I, 299 ; IV, 40, 452 ; VI, 163 ; VII, 479.
— — au Turkestan, VI, 432 ; VII, 185, 186 (fig.) ; VIII, 488, 502.
— — Développement du parasite chez *Phlebotomus major* var. *perniciosus*, XXIII, 724.
— — Séro-diagnostic et analyse sérologique, XXIII, 1028.
— — Diagnostic par la formol-gélification, XXV, 227.
— — et séro-floculation de Henry, XXV, 230.
— — et tuberculose, IX, 429.
— — Spécificité de la kératite, VII, 193.
— — Parasitisme anormal, XXII, 252.
— — cutanée, VII, 186, 502 ; XVII, 360 ; XXII, 252 ; XXIV, 535 ; XXV, 1036 (fig.).
— — généralisée, XXV, 225.
— — et kala-azar méditerranéen, XXV, 538.
— — Conservation du virus sur les chiens de laboratoire, XVI, 171.
— — Difficulté de conservation du virus par les passages, VII, 481.
— — Inoculation au loir, XI, 445.
— — — à la souris, VI, 683 ; XI, 205 ; XIII, 680.
— — Reproduction de la maladie chez le singe, V, 351.
— — Transmission par déjections de puces, VI, 578.
— — — par piqûres de *Pulex serraticeps*, V, 595.
— **cutanée** en Afrique équatoriale (Moyen-Chari), IX, 156.
— — en Algérie, II, 298, 388 (fig.) ; XVII, 360.
— — — aux environs d'Alger, XVIII, 249.
— — — Cas sporadique sur le littoral, XV, 440.
— — — chez un militaire, retour de Biskra, II, 88.
— — — dans le Sahara constantinois : Oued Souf, XVI, 92.
— — — dans le Sahara oranais, XVII, 886.
— — — Épidémiologie, XVIII, 485.
— — à l'Armée d'Orient, XI, 57, 59.
— — au Brésil, II, 252 (fig.), 255 ; IV, 289 (pl.).
— — au Dahomey, VII, 46.
— — dans le Djerid. Relations avec le faciès rupestre du sol, VII, 30 (c.).
— — en Égypte, II, 628.
— — Deux cas contractés en Espagne et en France, XIII, 235.
— — en Grèce, II, 257 ; IV, 454 (pl.), 667.
— — à la Guyane française, II, 587.
— — — hollandaise, XVII, 293.
— — en Italie, III, 288 ; VI, 219.
— — au Maroc, aux environs de Fez, XVIII, 639.
— — — à Figuig, XVIII, 146.
— — — en dehors des zones sahariennes, XVII, 565.
— — — dans le Sud : Haut-Guir, VII, 114.
— — en Mésopotamie, XII, 500.
— — au Niger, dans la région de Zinder, IV, 180.
— — au Pérou, VI, 545.
— — en Perse, II, 91.
— — en Syrie, à Damas, XXII, 774.
— — en Tunisie, à Tunis, IV, 452.
— — — Extension de la —, X, 378.
— — au Turkestan, VIII, 494.
— — spontanée du chien au Turkestan, VII, 186, 502.
— — Étiologie, II, 91 ; XII, 500 ; XIII, 508 ; XV, 80.
— — — Rôle du chameau, XIII, 511.
— — — Rôle du gecko, XIII, 508, 511.
— — tarentes et phlébotomes, XII, 607.
— — Biologie des phlébotomes en milieu endémique, XV, 80.
— — et mouches, IV, 459.
— — *Leptomonas* de la tarente, XIII, 508.
— — — — dans une région indemne de —, XI, 595.
— — Infection naturelle et expérimentale de *Phlebotomus papatasi*, XIX, 694.
— — Insecte transmetteur et réservoir de virus (?), VII, 577.
— — Recherche du parasite, I, 41, 48 ; II, 26.
— — Formule leucocytaire, II, 89, 392 ; IV, 293.
— — et craw-craw, X, 806.
— — et fuso-spirochétose, XXV, 141.
— — et leishmaniose américaine, XXII, 37.
— — et pian-bois, II, 587.
— — = ulcère de Bauru, II, 252, 255.
— — avec localisation aux cavités muqueuses, IV, 289 ; V, 176, 411, 808 ; VI, 237.
— — non ulcérative, II, 628, 642 (pl.).
— — Boutons multiples, VII, 36 ; XVII, 562 ; XVIII, 44.
— — Formes cliniques, XI, 153.
— — Longue incubation, XXI, 761.
— — d'origine expérimentale accidentelle, XI, 563.
— — Auto-inoculation accidentelle sur la conjonctive, X, 1.
— — Contagion, II, 628, 642 (fig.).
— — du chien, VII, 186.
— — — dans une localité où le bouton d'Orient est endémique, XVII, 360.
— — expérimentale. Voir aussi *Leishmania tropica*.
— — Données expérimentales, IV, 134.
— — Culture du parasite, IV, 286.

— — expérimentale chez les macaques et le chien, IX, 265.
— — — du singe patas, IX, 750.
— — Inoculation aux singes, II, 459 ; X, 455.
— — — aux macaques au moyen de cultures, V, 573.
— — expérimentale chez *Cercopithecus mona*. Multiplication des boutons primaires par auto-inoculations, XI, 130 (pl.).
— — Immunité, XXI, 638.
— — Conditions de l'immunité, IX, 265.
— — Antagonisme entre la — — et le kala-azar, IV, 434.
— — Traitement, IV, 182 ; XVII, 361.
— — — par l'arsénobenzol, IV, 185 ; VI, 624 ; VII, 36, 46.
— — — par le novarsénobenzol, VII, 36.
— — — par le bleu de méthylène, II, 90, 303 ; IV, 667 (pl.).
— — — par curettage et application de permanganate de potasse, IV, 182.
— — — par l'émétine en injections locales, XIII, 290.
— — — par l'éparséno, XIX, 331.
— — — par les pansements secs, XVIII, 46.
— — — par le salicylate de méthyle, II, 548.
— — — par le synectol, XXI, 764.
— **tégumentaire** en général, IX, 494, 761.
— **interne** en Afrique équatoriale (Moyen-Chari), IX, 299.
— — en Algérie, IV, 346, 554 ; V, 93 ; VII, 42 ; IX, 694 ; XVII, 778.
— — en Chine, XVIII, 364, 669.
— — en Égypte, XV, 843.
— — contractée en France (chez une adulte), XVI, 89.
— — au Gabon, XIII, 175.
— — en Grèce, II, 261 ; IV, 179, 664 ; V, 489 ; VI, 114 (fig.), 430 ; VII, 43, 193.
— — — Historique, IX, 10, 74.
— — — à Hydra, Époque de l'apparition, VII, 43.
— — — — Mortalité en 1911, VII, 193.
— — en Italie, à Sienne, Remarques épidémiologiques, XIX, 11 (fig.).
— — au Paraguay, VI, 118.
— — en Russie, V, 868.
— — en Syrie, XIX, 429.
— — en Tripolitaine, III, 511.
— — en Tunisie, I, 121, 602 ; II, 457 ; III, 431 ; IV, 138 ; VII, 479 ; IX, 126.
— — — Chronique de la — —, X, 715 (c.).
— — — chez l'adulte, XVIII, 397.
— — au Turkestan, VIII, 474.
— — méditerranéenne et kala-azar indien, VI, 574.
— — — Historique, VI, 23, 141.
— — coexistant avec l'infection d'un chien et d'un chat, V, 93.
— — Origine canine, I, 188, 299, 604 ; V, 93, 813.
— — — de la — — méditerranéenne, XXV, 558.
— — Rôle des puces dans la transmission, V, 93, 814.
— — Diagnostic. Ponction hépatique, I, 602.
— — — Ponction splénique, I, 121, 602 ; III, 431 ; IV, 138 ; IX, 444 ; X, 701, 814.
— — — Méthode pour assurer l'innocuité de la ponction splénique, XI, 701, 814.
— — — Splénomégalie, V, 489 ; VI, 143 ; VII, 480 ; XV, 843.
— — — Réaction de Chopra et Gupta, XXII, 77 ; XXIII, 29.
— — — Réaction de déviation du complément, XXIII, 1028.
— — — Formol-gélification, XX, 600.
— — — Hématologie, XVII, 477.
— — — Formule hémoleucocytaire, IV, 535 ; V, 97, 491 ; VI, 495 ; XVII, 479.
— — — Isolement et culture des *Leishmania*, I, 121, 602 ; II, 385 ; IV, 286 ; V, 218 ; VII, 480.
— — Gangrène de la bouche et du nez, V, 270.
— — Déplacement de la rate, V, 271.
— — Absence du parasite à l'autopsie, V, 349.
— — Cas de guérison, IV, 138 ; V, 91, 813 ; VI, 430, 495 ; VII, 45 ; VIII, 25.
— — Contagion, V, 93.
— — Étude anatomo-pathologique chez le chien, X, 386.
— — Immunité, II, 459 ; III, 432.
— — expérimentale. Voir aussi *Leishmania donovani* et *L. infantum*.
— — — Infection du chien, I, 188, 604 ; II, 385, 584 ; III, 432.
— — — Inoculation aux animaux de laboratoire, V, 218, 715.
— — — — au singe, II, 584.
— — Traitement. Note historique sur l'emploi de l'antimoine, X, 762.
— — — par l'émétique, VIII, 63.
— — — par l'émétique d'aniline, IV, 139.
— — — par l'arsénobenzol, III, 717 ; IV, 187.
— — — par l'arsénophénylglycine, II, 457.
— — — par l'atoxyl, II, 458 ; IV, 139.
Le Myre de Vilers. Éloge, XI, 262.
Lémurien inoculé de *Trypanosoma rhodesiense*, V, 380.
Léonin (Masque) dans la syphilis, V, 170.
Léopard. Nématode, VI, 451.
Lèpre en Afrique équatoriale dans la zone de délimitation A. E. F.-Cameroun, VIII, 124.
— — occidentale française, XXIV, 708.
— en Algérie, I, 173, 383, 594 ; II, 341 ; III, 59 ; XI, 433.

— en Algérie. Cas d'importation à Alger, XII, 61 ; XIV, 15.
— — dans le Sud-Oranais. Origine soudanaise, I, 173.
— aux Antilles, III, 412.
— au Cameroun dans la zone de délimitation A. E. F.-Cameroun, VIII, 124.
— — pendant la campagne, IX, 590 ; XII, 613.
— — dans la circonscription d'Ebolowa, XVI, 193 (c.), 231.
— — XVI, 233.
— aux Comores. Prophylaxie, VII, 91 (pl.).
— — à Mohéli, XI, 62.
— au Congo belge : Ouellé, VIII, 737.
— — — Nepoko, XII, 396.
— à la Côte d'Ivoire, cercle de Touba, VII, 539.
— au Dahomey, XXIV, 585.
— en France, I, 288 (c.) ; III, 696 (fig., pl.).
— — à Paris, III, 701.
— — — chez un tirailleur sénégalais, XXII, 408.
— en Guyane française, IX, 449 ; XX, 306, 311, 489, 623, 771.
— — — et réglementations successives, X, 733.
— — — dans l'élément pénal ; documents statistiques, XI, 793.
— aux Indes Néerlandaises, XIII, 769.
— dans l'Inde portugaise, XIX, 928.
— au Laos. Foyer circonscrit dans la province de Cammon, XXV, 606.
— aux îles Loyalty, II, 493 ; XXII, 362 , XXV, 479, 618.
— à Madagascar, III, 160, 255, 328.
— lazarine à Madagascar, XXV, 789.
— au Maroc, IX, 563 ; XXI, 611.
— — région de Fez, XVII, 597.
— — région de Marrakech, XXIII, 600.
— à la Martinique, XVIII, 90.
— en Nouvelle-Calédonie, IV, 253 (c.), 609 ; VI, 551 ; XVIII, 78 (c.), 158 (c.) ; XXI, 458 ; XXIII, 357, 772.
— — (tuberculoïde), XXIV, 17.
— — Forme fruste, V, 578.
— — Marche de la maladie dans l'archipel, VII, 222.
— — Nombre et distribution géographique des lépreux, VII, 218.
— — Camouflage des symptômes par les indigènes, XXIII, 574.
— — Prophylaxie, VII, 226 ; XXIV, 483, 716.
— — — à l'Institut G. Bourret en 1927, XXI, 288.
— — Léproseries partielles, XXII, 95.
— — Avenir des guérisons cliniques, XXIII, 63.
— à Rodrigues, XIII, 644.
— au Sénégal (Djoloff), XVII, 592 (c.).
— au Tchad (Ouadaï), VII, 525.
— Ancienneté d'après les Vedas, XXIV, 178, 362.
— Étiologie. Rôle des insectes piqueurs, I, 288, 493, 495.
— — Rôle des poux, XXII, 633.
— — Rôle des mouches, V, 860.
— — Nomination d'une commission, V, 774.
— — Transmission par les insectes, XIX, 774.
— — — par les insectes hématophages, IV, 239 ; V, 667, 787 ; VI, 535.
— — — par le mucus nasal, VIII, 57.
— — Contagion, II, 200 ; III, 326, 412, 696, 701 ; IV, 239.
— — — et — latente, XXV, 123.
— — Diffusion du bacille en milieu endémique, XXIV, 458.
— — Hérédité, III, 412.
— humaine et — des rats, V, 569, 578.
— Diagnostic bactériologique, IV, 239 ; XXV, 546, 614.
— — — Bacille dans les ganglions superficiels, V, 466, 569, 698, 773 ; VI, 607 ; VII, 365.
— — — Recherche du bacille dans le mucus nasal, I, 58 ; XXIV, 68.
— — — Recherche du bacille par le procédé de la goutte épaisse, XXIV, 172.
— — Recherches sérologiques, XX, 950.
— — Réaction de Botelho, XXIII, 105.
— — Déviation du complément, II, 820.
— — — — avec antigène méthylique du bacille de Kedrowsky, XXIII, 568.
— — Hématologie, I, 56, 489 ; II, 22.
— — Formule hémoleucocytaire, VI, 418.
— — Leucocytes, IV, 55.
— — Groupes sanguins, XXIV, 618.
— — Sédimentation globulaire, XX, 839.
— — — — Méthode de Rubino, XXI, 836 ; XXII, 152 ; XXIV, 519 ; XXV, 543.
— — Réflexe oculo-cardiaque, XXIII, 441.
— — Réflexes vaso-moteurs de la peau, XXV, 200.
— — Signe de la percussion douloureuse, XXIV, 363.
— — Réaction aux bacilles lépreux tués par la chaleur. Allergie et anergie, XXIII, 20 ; XXIV, 768.
— — Réaction d'Eitner, VIII, 259.
— — — de Meinicke, XXI, 187.
— — — de Vernes, XXV, 127, 128, 549.
— — — de Wassermann, VIII, 252, 259 ; XVIII, 378.
— Cholestérinémie, XV, 159 ; XVI, 57.
— et ainhum, XV, 648.
— et cancer, XXV, 124.
— et verrues, XXV, 302, 303.
— simulant le goundou, XXIII, 867.
— Splénomégalies subaiguës, XXIII, 911.
— Anesthésie de la —, IV, 1.

— anormale sur un tirailleur tonkinois, IV, 24.
— Bacillurie provoquée par la —, V, 784.
— Dystrophie adiposo-génitale, XVI, 75 (fig.).
— Élimination du phosphore et du calcium chez les Noirs, XV, 865, 1002.
— Érythème noueux au cours du traitement, XXI, 737.
— Forme familiale, XXII, 631.
— Fréquence de la — parmi les recrues coloniales, IX, 685.
— fruste en Nouvelle-Calédonie, V, 578.
— ganglionnaire, XXIII, 692.
— Léprides à forme d'érythème noueux, XXIV, 366.
— Léproïdes en aire, XXIV, 763.
— Lésions osseuses précoces constatées par radiographie, VII, 2 (pl.).
— Névrite du cubital, XXI, 735.
— nodulaire à évolution tuberculoïde secondaire, XXIV, 17.
— Pseudo-érythème noueux, IV, 278.
— pulmonaire, IV, 24, 65.
— Remarques cliniques, XX, 577.
— Stade tuberculoïde, XXIV, 453, 898.
— tuberculoïde primitive, XXIII, 772.
— Urétlirite lépreuse, VII, 557 (fig.).
— associée à la syphilis et à la tuberculose, XXI, 741.
— Test thermique de guérison clinique, XXIV, 272.
— Culture d'un bacille acido-résistant, IV, 89.
— Essais de culture du bacille de Hansen, XIX, 771.
— Essai d'inoculation au chimpanzé, I, 416 (fig.).
— Prophylaxie, II, 67, 166, 273 ; III, 59, 109, 160, 255, 326 ; VII, 91, 226 ; XVI, 215, 253, 298.
— — en France, IV, 9, 70, 73 ; XV, 827.
— — aux colonies. Commissions, I, 594 ; II, 67, 166 ; III, 416.
— — Rapport de Commission, IV, 9, 70.
— — Lettre du Ministre des Colonies, III, 109.
— — Arrêté du Gouverneur général de l'Indochine, III, 112, 412.
— — dans les colonies françaises, XVI, 215.
— — Commission créée au Ministère des Colonies, XXIV, 628.
— — en Afrique occidentale française, XXIV, 708.
— — au Cameroun, XVI, 253.
— — en Nouvelle-Calédonie, VII, 226 ; XXI, 288 ; XXII, 95 ; XXIV, 483, 716.
— Thérapeutique, IV, 48 ; XVI, 298.
— Curabilité, V, 196, 705.
— Traitement physiologique, XXIV, 852.
— — par l'antigène dégraissé de bacilles de la — murine, XXIII, 150.
— — par l'antigène méthylique tuberculeux, XXI, 14, 594.
— — par l'antimoine, XX, 774.
— — — (kermès), XVII, 761.
— — par l'arsénobenzol, VI, 51.
— — par le novarsénobenzol, XX, 953.
— — mixte par novarsénobenzol et B. C. G., XXII, 898 ; XXIII, 1005.
— — mixte par novarsénobenzol, collobiase de chaulmoogra, gynocardate de sodium et huile de chaulmoogra, XX, 953.
— — par le chlorure de calcium, XXII, 11.
— — par l'éparséno, XVIII, 514 ; XIX, 456, 779 ; XX, 774.
— — par l'huile de Chaulmoogra, IV, 48 ; VII, 535 ; X, 684 ; XIII, 490 ; XVI, 227, 234 ; XIX, 399 ; XX, 710, 773, 953.
— — — — (collobiase d'), XXV, 404, 410, 514.
— — — — Emulsion sodique, XVIII, 90.
— — — — Éthers éthyliques, XVIII, 90 ; XIX, 441 ; XX, 776 ; XXI, 831.
— — — — — (Hyrganol), XXIV, 437.
— — — — en savons, XIV, 520.
— — — — — (Alépol), XXII, 17, 155.
— — — — Savon total, XXIV, 770, 780.
— — — — tirée d'*Hydnocarpus wightiana*, XX, 710.
— — — — — et irradiée ou additionnée d'ergorone, XXII, 759.
— — par un soluté de chaulmoograte de soude, XXIV, 772.
— — par l'huile de foie de morue en savon, XIV, 520.
— — par l'iode, XXII, 762.
— — par l'iodoforme, IV, 48.
— — par l'iodure de potassium, I, 347 ; IV, 51.
— — par l'ionisation, XX, 57.
— — par injections d'une léproline, XXIII, 909.
— — par le lipol, XX, 773.
— — par les sels d'or, XXIII, 693.
— — par la trypaflavine, XXIII, 1009.
— — par le vaccin antituberculeux B. C. G., XIX, 520 ; XX, 91 ; XXI, 283.
— — — et le novarsénobenzol, XXII, 898 ; XXIII, 1005.
— — Influence sur les éléments éruptifs, XXI, 831.
— Comptes rendus de la 3e Conférence internationale, XVII, 619.
— Hommage d'une plaquette sur la — à la Société, IV, 653.
— cause d'un crime magico-religieux, XXV, 818.
— **des rats**, IV, 253.
— — à la Guyane française, XII, 169.
— — en Nouvelle-Calédonie, V, 463 (pl.) ; VI, 484.
— — et lèpre humaine, V, 569, 583.

— — Acido-résistance et alcalino-résistance du bacille, XXV, 1025.
— — Essais de transmission par les poux, XXII, 633.
— — Filtration du virus, XXII, 410.
— — Développement du virus filtrable avant sa transformation en bacille, XXII, 537.
— — — — après inoculation aux jeunes rats, XXII, 758.
— — L'ultra-virus, XXII, 896.
— — Phagocytose des bacilles de Stefansky dans le péritoine des rats et des cobayes, XVII, 208.
— — et infections secondaires, V, 466.
— — Essais de traitement, XXV, 969.
— Action préventive de l'antigène des bacilles dégraissés, XXIII, 149.
— Traitement par les bacilles dégraissés, XXIII, 145.
— — par le fiélate de sodium, XXIII, 268.
— — par l'alépol, savon d'huile de chaulmoogra, XXII, 17.
— — par le méthoxyphénylhydnocarpate, XXIII, 271.
— — par les produits : *541*, *580*, *581*, *579 B*, *579 A*, *579 C*, XXIII, 269 et suiv.
— — par le tribromométaxylénol, XXIII, 269.
Leptomonas. Voir aussi *Herpetomonas*.
— d'asilidés et réduvidés au Katanga, IV, 528.
— des mouches, III, 363.
— et puces, VI, 378.
— de la puce du chien. Formes culturales différentes de celles du kala-azar de souches humaines et canine, XII, 343, 665.
— de la tarente dans un milieu indemne de bouton d'Orient, XI, 595.
— Culture en milieux liquides au sang chauffé, XXII, 247.
— Formes de culture d'un trypanosome chez *Pangonia*, IV, 528.
— *davidi* au Congo et au Dahomey, IV, 198.
— — au Haut-Sénégal et Niger, IV, 626.
— — à Madagascar, IV, 464.
— — à la Martinique, IV, 461.
— — en Nouvelle-Calédonie, IV, 464.
— — au Portugal, IV, 532, 669 (fig.).
— — parasite des euphorbes, II, 344 ; IV, 464 ; XV, 166, 205, 408.
— — Hémiptères des euphorbes parasitées, VI, 292.
— — Insecte transmetteur, XII, 513.
— *elmassiani*, parasite d'une asclépiadacée, IX, 356.
— *pangoniæ*, n. sp., V, 604 ; VI, 184.
Leptospira ictero-hemorragiæ chez les rats sauvages de Saint-Paul (Brésil), XIII, 561.
Lérot. Toxoplasmose expérimentale, VIII, 58.
— Sensibilité au *Trypanosoma duttoni*, VII, 530.
— — — *lewisi*, V, 826 ; VII, 530.
Lésions nasales dans la lymphangite épizootique, VI, 145.
— de l'œil chez le chien infecté par *Toxoplasma*, VI, 478.
— — chez les poules trypanosomées, V, 213.
— osseuses chez deux singes, II, 220 (fig.).
Lettres soumises à la désinfection, II, 327.
— du Ministre des Colonies, III, 109, 285.
— — de l'Intérieur, III, 346.
— du Gouverneur général de l'Algérie, III, 347.
— de W. S. Patton, III, 57, 115.
— du Dr L. Raynaud, III, 114.
— de M. de Lanessan, III, 206.
— relatives à une entente internationale pour la prophylaxie de la maladie du sommeil, IV, 67.
— du Ministre des Affaires Étrangères relative à l'alcoolisme au Maroc, VI, 1.
— du Commissaire-Résident général au Maroc sur la taxe des alcools, VI, 2.
Letulle (Maurice). Éloge, XXII, 1.
Leucémie lymphoïde à type splénique pur, XV, 517 (fig.).
— chez la poule. Formule leucocytaire, XXII, 766.
Leucocytaire (Formule). Voir aussi **Hémoleucocytaire.**
— — des selles dans les dysenteries, XXII, 426.
Leucocytes. Variations dans le traitement de la lymphangite épizootique par la pyothérapie, XI, 446.
— Procédé d'examen, XIV, 291.
— Pseudo-pycnose des neutrophiles dans la dysenterie amibienne, XXIV, 469.
— Transformation du plasmocyte de Unna en cellule spumeuse à lipoïdes, XXIV, 526.
— des chameaux, XIX, 582.
Leucocytozoon. Dénombrement et essais de classification, VII, 437, 461, 549.
— et hématoblastes, V, 21.
— Nature des cellules hôtes, V, 77.
— — — Schizogonie, caractères, VIII, 229.
— Essais d'inoculation, XI, 33.
— *bouffardi*, n. sp., IV, 827.
— *laverani*, n. sp., parasite du faucon, *Albanella pallida*, XVI, 120.
— *lutzi*, n. sp., d'une chouette du Brésil, XIII, 506.
— *ziemani*, VI, 428.
— d'oiseaux au Congo, II, 207.
— — en Corse, VI, 515.
— — du Haut-Sénégal et Niger, VII, 391.

— — au Portugal, V, 17, 82, 173, 333.
— — de la région de Reims, X, 28.
— d'*Athene noctua*. Formes pigmentées, V, 333.
— — — Développement, VI, 428.
— de *Corvus corone*, VI, 520.
— de *Fringilla petronia*, VI, 519.
— d'un passereau du Haut-Sénégal et Niger, IV, 326.
— de la perdrix rouge d'Algérie, X, 704.
— de la poule au Tonkin, III, 504 (fig.).
— d'un rapace diurne : *Astur badius*, var. *sphenurus*, XI, 31.
— — — *Melierax gabar*, V, 74.
— de *Turtur auritus*, VI, 520.
Levure dans la sprue, I, 342.
— trouvée dans un cas de blastomycose humaine en Tunisie, IV, 366.
Liberia. Epidémie de fièvre jaune, XVIII, 746.
— Mission R. P. Strong, 1926-1927, XXIV, 5.
Limaces dans le tube digestif, IX, 524.
Linguatula serrata chez l'homme en Amérique centrale, V, 118.
Linguatules des vertébrés du Paraguay, IX, 363.
Linguatulidés. Embryon acariforme et stades larvaires, XVI, 340 (fig.).
— Morphologie de l'œuf et de l'embryon chez *Porocephalus clavatus*, XX, 260 (fig., pl.).
Liothryx luteus. Hémamibes et toxoplasme, VII, 24 (fig.).
Lipoïdes (Réaction des) dans les trypanosomiases et les spirilloses expérimentales, I, 140.
Lipol. Voir **Chimiothérapie.**
Locaux (Accidents) produits par les piqûres de phlébotomes, V, 511.
— (Phénomènes) produits par piqûre de la tsétsé chez l'Européen, VI, 628.
Locomoteur (Appareil). Maladies au Congo, VIII, 307.
— — Troubles dans la trypanosomiase des chevaux, XI, 568.
Lœffler (Solution de) dans le traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine, II, 409.
Lœschia, n. g., amibes du tube digestif des vertébrés, V, 142.
— en Annam, VI, 678.
— d'un singe coexistant avec un myxomycète, V, 180.
Loir. *Herpetomonas*, XIV, 278 (fig.).
— Piroplasme chez un petit — *Myoxus avellanarius*, XVII, 881.
— Toxoplasmose expérimentale, VIII, 58.
— Infection par *Trypanosoma gambiense*, VIII, 749.
— Sensibilité au *Tryp. lewisi*, VII, 654.
Lombricose à la Martinique, IV, 390.
Lophoceratomyia bernardi, n. sp., XX, 27 (fig.).
— *roubaudi*, n. sp., XX, 25 (fig.).
Lophoscelomyia annandalei, var. *djajasanensis*, n. var., XIX, 804.
Loups. Piroplasmose au Turkestan, X, 305.
Loyalty ou **Loyauté** (Iles). Lèpre, II, 493 ; XXII, 362 ; XXV, 479, 618.
— — Pian, VII, 180.
— — Vaccine, VII, 503.
— — Pathologie, urbanisme et situation économique, XXV, 585.
— — Aperçus démographiques, VII, 600.
— — Étude démographique, XXV, 431.
— — Hygiène des indigènes, VII, 598.
— — Obstétrique chez les Canaques, II, 502.
— — Pratiques chirurgicales des Canaques, I, 582, 593.
Luargol. Voir **Arsénobenzènes.**
Lucet (A.). Éloge, X, 2.
Lucilia serenissima parasitée par *Rhynchomonas luciliæ*, III, 300, 363, 433.
Ludyl. Voir **Arsénobenzènes.**
Lugol (Solution de). Voir **Iode.**
Lumière. Action sur le vibrion cholérique, V, 167.
— associée à la chaleur dans la dysenterie amibienne, VI, 725.
Lupus chez les indigènes musulmans d'Algérie, I, 593.
Luxations de l'atlas et de l'axis, XV, 756.
— Rareté chez les indigènes de l'Afrique occidentale française, XVIII, 293.
Lycodon aulicus. Propriétés de la salive parotidienne, X, 474.
Lycopode. Spores de — utilisées comme test en parasitologie clinique, XXIV, 284 (fig.).
Lymphangite endémique aux Comores (Mohéli), XI, 62.
— — à la Guyane française, X, 896.
— — à Madagascar, XX, 422.
— — des pays chauds, éléphantiasis et filariose, I, 473 ; VI, 663 ; X, 896.
— — à répétition, VI, 667.
— **épizootique** au Sénégal, III, 450.
— — Observations relatives à l'étiologie, XI, 351.
— — Nature mycosique du parasite, VII, 464 (fig.).
— — Evolution du parasite chez le cheval, VIII, 248.
— — Culture du parasite, VIII, 49, 89 ; X, 274.
— — Cultures et isolement du cryptocoque en milieux à l'acide citrique, XVII, 540.
— — Présence de cryptocoques dans le tube digestif d'un cheval atteint de —, XIV, 66 (fig.).
— — Lésions nasales, V, 774 ; VI, 143.
— — chez l'homme, IV, 384.
— — Traitement, XIII, 640, 777.
— — — par l'arsénobenzol, IV, 380, 384.

— — Traitement par les composés du mercure, X, 428.
— — — — — (bi-iodure), XIX, 762 ; XX, 829.
— — — Mycothérapie, XI, 609.
— — — Pyothérapie, X, 681.
— — — — Variations leucocytaires au cours du traitement, XI, 416.
— — — — Efficacité, XI, 12.
— — — — Préparation du pyovaccin, XI, 10.
— — — — aseptique, XI, 17.
— — Essai de vaccination préventive, XI, 551.
— — Monographie, XIII, 158.
— **ulcéreuse** du cheval, IX, 678.
— — — Traitement, XI, 683.
— — des équidés. Inoculation. Traitement, XII, 9.
Lymphatexie endémique aux Comores (Mohéli), XI, 62.
— — à la Guyane française, X, 896.
Lyperosia longipalpis et *L. Thirouxi*, IV, 547.
Lysato-vaccins antipneumococciques, XXV, 64.

M

Macacus cynomolgus. Physaloptère, V, 390.
Macaques. Voir aussi **Singes.**
— Cénure nouveau d'un Bonnet chinois, XII, 223.
— Corps de Graham Smith dans les hématies de *Macacus rhesus*, XV, 679.
— Dysenterie bacillaire, II, 17.
— — avec amibes et *Trichomonas*, II, 20.
— Hémogrégarine de *Macacus cynomolgus*, XIII, 165 (fig.), 394.
— Trypanosomiase. Traitement, III, 732.
— Trypanosome non pathogène, II, 267, 395.
— réfractaires à *Toxoplasma gondii*, VI, 164.
— Infection par *Trypanosoma rhodesiense*, V, 379.
— Sensibilité à la *Leishmania tropica*, V, 573 (pl.) ; VII, 663.
Macédoine. Voir aussi **Armée d'Orient.**
— Choléra pendant la guerre gréco-bulgare, VII, 447.
— Helminthiase, XXI, 214 (fig.).
— Anophélisme dans ses rapports avec le paludisme, X, 323 (fig.), 890.
— Culicides, XI, 330.
Macrogamètes. Parthénogenèse dans le paludisme chronique, II, 575 ; III, 498 ; IV, 296.
Macroglossie. Deux cas, I, 383.
Macrophages et *Leishmania*, II, 26.
Madagascar. Abcès sous-dermiques et gommes ulcérées produits par le *Sporotrichum carougeaui* associé à la tuberculose, XV, 444.
— — — dus à l'*Endomyces molardi*, n. sp., XV, 311.
— Actinomycose du rat, XV, 526, 596.
— Affections broncho-pulmonaires, XV, 155.
— — pulmonaires à spirochètes, XIX, 261.
— — intestinales, XV, 157.
— — vénériennes, XV, 157.
— Alastrim, XXIII, 346.
— Alcoolisme, II, 333 ; XV, 158.
— Anaplasmose des zébus, XXIV, 969.
— Ascaridiase, V, 842.
— Béribéri, III, 751.
— Bilharziose, XXI, 380, 435.
— — intestinale. Œufs de *Schistosomum* dans les selles d'individus cliniquement sains, XIV, 229, 328.
— Calculs urinaires, XXIV, 416.
— Conjonctivite folliculaire, XXIII, 255.
— Cysticercose bovine, XXI, 272.
— — du chien, XXIII, 877.
— — du porc, XXIII, 880.
— Dermatomycose : le hodi-potsy, XV, 424 (fig.).
— Diphtérie, I, 179 ; XXII, 748 ; XXIII, 1000.
— Distomatose des moutons, XXII, 521.
— Dysenterie amibienne, XX, 465.
— — bacillaire, XX, 465 ; XXI, 709 ; XXIII, 428, 429, 433 ; XXIV, 612 ; XXV, 374.
— Echinococcose, XXIV, 972.
— Eléphantiasis, XXI, 722.
— Encéphalite léthargique, XXI, 347.
— Favus du cheval, VI, 300 (fig.).
— Fièvre récurrente, IV, 509 ; V, 268 ; VI, 146 (c.), 523 ; IX, 688 ; XIII, 63.
— — typhoïde, XV, 675 ; XXII, 50.
— Goître, XXIII, 342 (pl.).
— Helminthiases, III, 752 ; V, 842 ; XXII, 390.
— — et syndromes dysentériques, XVI, 330.
— — intestinale, XIV, 247.
— — Anthelminthiques malgaches, XXII, 388.
— Hydronéphrose du porc, XXV, 378.
— Infections à déterminations gastro-intestinales, XXV, 790.
— Lèpre, III, 160, 235, 328 ; XXV, 789.
— Lésions du foie chez les moutons, XXII, 525.
— Lipomes ; variété ; siège. Étiologie, pathogénie, XI, 113.
— Lymphangite endémique, XX, 422.
— Méningite cérébro-spinale à méningocoques (?) Epidémie, X, 689.
— Mycoses. Voir plus haut Abcès, Dermatomycose.
— — malgaches, XV, 311.
— — Lésions — iques dues à *Saccharomyces granulatus*, XV, 53 (fig.).

— Nodosités juxta-articulaires, XXIV, 209.
— Paludisme, VII, 105, 462 ; X, 915 ; XV, 153 ; XVIII, 36, 809 ; XXI, 625, 629 ; XXII, 137, 1016 ; XXIII, 122 ; XXV, 178, 426.
— — Plan de campagne antipaludique, XIV, 97.
— — Lutte antilarvaire dans les terrains immergés, XXI, 346.
— Parasitisme intestinal, XX, 464 ; XXI, 20, 868.
— Peste, XIV, 602, 610 ; XVI, 501, 602 ; XVII, 63, 525 ; XVIII, 603 ; XIX, 410, 592, 820 ; XX, 106 ; XXI, 299, 598, 600, 876 ; XXII, 234, 412, 704 ; XXIV, 446, 748, 863, 865 ; XXV, 1012, 1022, 1024.
— — pulmonaire, XIX, 410, 820 ; XX, 233, 579, 632, 759.
— — — Gravité, XIX, 667.
— — murine, XVII, 525.
— Pian, XXII, 386 ; XXIII, 672.
— Pied de Madura, XI, 407.
— Pneumococcies. Complications extra-pulmonaires chez les Malgaches, XI, 159.
— — Vaccinothérapie et vaccinoprophylaxie, XIX, 521.
— — Vaccinations, XXI, 364.
— Pneumonies. Voir plus haut. Affections.
— — Gravité de la — chez les Malgaches et fréquence de la mort subite au cours de cette affection, X, 774.
— Poliomyélite, XXIII, 554.
— Pseudo-myiase rampante ou pseudodracunculose, XI, 716.
— Rage, XXV, 790.
— Spirochétose humaine, XIX, 261.
— Syngamose des volailles, XXIII, 681.
— Syphilis, XVI, 534 ; XXIII, 254, 257 ; XXIV, 609.
— — pulmonaire simulant la tuberculose cavitaire chez un Malgache, XVI, 396.
— — Mortalité des nourrissons et traitement antisyphilitique, XXII, 753.
— Tuberculose, XXI, 716 ; XXII, 533 ; XXIII, 246, 672, 870 ; XXIV, 645 ; XXV, 1011.
— — Cuti-réactions à Tananarive, XXI, 878.
— — Vaccination des nourrissons par le B. C. G., XXI, 282 ; XXIII, 870.
— — bovine, XXIII, 250.
— — du zébu, XXII, 757.
— Cercaires de trématodes hébergées par une limnée, XXII, 523 (fig.).
— *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 465.
— Linguatulidé nouveau : *Armillifer brumpti*, n. sp., XV, 565.
— *Madurella mycetomi*. Culture, VI, 407.
— — — Traitement, VI, 710.
— Puces de la région de Tananarive, XXV, 381, 542.
— — domestiques à Tananarive, XXV, 710.
— — du rat des régions pesteuses, XVIII, 730.
— — du rat à Tananarive, XXV, 383.
— Pulicidé nouveau, parasite des rats domestiques, XXV, 327.
— — — — des rongeurs et insectivores, XXV, 962 (pl.).
— *Schistosomum mansoni*, XI, 34 ; XIV, 250.
— Caractéristiques de la pathologie malgache, XV, 153.
— Natalité et mortalité des indigènes, XXII, 444.
— Groupes sanguins chez les Malgaches de l'Emyrne, XXIV, 247.
— Taux normal de l'urée sanguine chez les Malgaches, XXV, 376, 426.
— Sels utilisés par les indigènes, XXIII, 118.
— Commerce des huîtres à Tananarive, XXV, 1011.
— Bulletin économique, XXII, 757.
— Société médicale, III, 485.
— — des sciences médicales de — rattachée à la Société de Pathologie exotique, XXI, 267.
— Six ans de politique sociale (Brochure), XXIV, 756.
Madère (Ile de). Choléra, IV, 358.
Madurella mycetomi. Culture, VI, 407.
— *tabarkæ*, n. sp., agent d'un mycétome tunisien à grains noirs, XII, 741.
Madura (Pied de). Voir **Mycétomes.**
Maki. Infections par *Trypanosoma gambiense* et *Tr. rhodesiense*, VIII, 746.
Maladies des pays chauds (Manuels des), III, 6, 287.
— tropicales en Russie, V, 868 (pl.).
— — à Tripoli, V, 850.
Maladie de Chagas. Voir **Trypanosomiase humaine américaine.**
— **du sommeil.** Voir **Trypanosomiase humaine.**
Mal de Caderas. Voir **Trypanosomiases animales.**
— **del Pinto.** Voir **Dyschromie.**
— **d'engasgo,** dysphagie tropicale, VI, 47.
Malassezia, agent d'une mycose des rongeurs du genre *Mus*, XII, 350 (fig.).
Mammifères du Sud-Oranais, III, 481.
— du Paraguay. Microfilaires, IX, 361.
— « Marginal points » des hématies, VII, 580.
Manaut (Albert). Eloge, XII, 2.
Mandchourie. Peste, IV, 636.
Mangouste. Piroplasmose, I, 410.
Mangue obscur. Animal d'expériences, XXIV, 504.

Mannite. Action sur la — des bacilles dysentériques, III, 20.
Manson (Sir Patrick). Éloge, XV, 284.
Maroc. Voir aussi **Afrique du Nord.**
— Affection non décrite du chien, XII, 132 (pl.).
— — non classée du cheval, XIV, 222.
— Affections à parasites endoglobulaires chez le cheval, XI, 26.
— Aïnhum, XVII, 482 (fig.) ; XXV, 322.
— Alcoolisme, V, 747, 777 ; VI, 1, 5, 290.
— Anémie pernicieuse du cheval, XVI, 300, 525, 634.
— Asthme, XVIII, 421.
— Azoospermie essentielle congénitale chez les Israélites, XVIII, 784.
— Bilharziose, XVI, 491.
— — Répartition de *Bullinus contortus* et de *Planorbis metidjensis*. Étude épidémiologique, XV, 632.
— — Absence de la — à Tanger, XIX, 487.
— Blastomycose de l'âne, XVI, 478.
— — des voies lacrymales de l'âne, XVIII, 124, 127.
— Charbon bactéridien, XII, 126 ; XIII, 14 ; XIV, 359 ; XVII, 767.
— — — Prophylaxie, XIII, 14.
— Coccidiose de la chèvre, XII, 298.
— Conjonctivite granuleuse, XVII, 925 ; XIX, 49.
— Darmous du mouton, XIV, 848 (fig.).
— Dercum (Maladie de) chez une indigène, XVIII, 246 (fig.).
— Diarrhée à *Trichomonas*, XVII, 128, 301, 557.
— Dysenterie amibienne, XXI, 94, 444.
— — bacillaire, XXI, 447.
— Eléphantiasis, XVI, 423, 494.
— Fièvre aphteuse, XIII, 726.
— — exanthématique d'été, XXII, 712.
— — jaune. Protection contre la —, VIII, 732.
— — ondulante, VI, 668 ; IX, 207.
— — récurrente, VI, 599 ; VII, 382 ; XXII, 818.
— — typhoïde, XX, 481, 576 ; XXV, 447, 461, 626.
— — — (para), XX, 481 ; XXV, 447, 461.
— Filariose rare à Tanger, XIX, 487.
— Gastro-entérite parasitaire et faune du tube digestif du mouton, XV, 820.
— Géophagisme, XVII, 149.
— Hémorragies, VIII, 595.
— Hématurie dite essentielle à Tanger, XX, 989.
— Intestinale (Pathologie), XXI, 440.
— — (Infections) à flagellés, XIX, 333.
— Kératodermie symétrique, IX, 442 (pl.).
— Kystes hydatiques et chylurie, XI, 452.
— Leishmaniose canine, IX, 202 ; XXV, 223, 227.
— — cutanée, XVIII, 146, 639.
— — — dans le Sud marocain (Haut-Guir), VII, 114 ; XVII, 565.
— Lèpre, IX, 563 ; XVII, 597 ; XXI, 611 (fig.) ; XXIII, 600.
— Moniliase bronchique, XXIV, 15.
— Nodosités juxta-articulaires, XVI, 346.
— Paludisme, XIII, 334 ; XVII, 335 ; XVIII, 538, 794 ; XX, 45 ; XXIII, 53.
— — Épidémie palustre, X, 586.
— — Lutte antipaludéenne, X, 710.
— — Assainissement antipalustre, XII, 274 (c.).
— Pasteurelloses, XIII, 493.
— Peste, XVII, 791 ; XXV, 958.
— Piroplasmose bovine, VIII, 643 ; XIII, 733 (fig.).
— — — Rapports avec les piroplasmoses circumméditerranéennes, XIV, 116.
— — vraie du cheval, XI, 26.
— — Nuttaliose du cheval, XI, 27.
— Pied de Madura, V, 707.
— Plaies de guerre. Infections à microbes anaérobies, XIX, 106.
— Rage, XXV, 289.
— — Virus de rue renforcé, XVII, 538.
— Septicémie contagieuse du porc, XI, 117.
— Sodoku, X, 120.
— Spirochétoses, XI, 261.
— — des gallinacés, XIV, 316.
— — des oies, XVI, 582.
— Staphylococcies cutanées, XVII, 757.
— Trypanosomiases animales, XXIII, 747 ; XXIV, 112, 569.
— — — des chevaux, VIII, 145, 433, 503, 576, 646 ; IX, 130 ; X, 253, 501, 850 ; XI, 448 (c.), 566 ; XII, 220.
— — — — Dourine, XVII, 27, 298 ; XIX, 325.
— — — Infection spontanée du chien par *Tryp. marocanum*, XIII, 23.
— Tuberculose, XXI, 10, 192.
— Vitiligo, XXIII, 576.
— Anophélines, X, 605.
— Acridiens. Lutte contre les —, XII, 362.
— — Destruction du *Schistocerca peregrina* par *Coccobacillus acridiorum*, VIII, 638 ; IX, 682.
— Arachnides, myriapodes et serpents, XIX, 560.
— *Euphorbia thymifolia*, XIII, 13.
— *Galeodes olivieri*. Innocuité, XVIII, 781.
— Ixodes, XVIII, 469.
— Mouches de la région de Tanger, XX, 619.
— Moustiques, IX, 140 ; XVII, 570.
— — *Stegomyia fasciata*, VIII, 732.
— — — — dans la région de Tanger, XVII, 137, 571.
— *Ornithodorus*. Nouvelle espèce, XII, 99 (fig.).
— — *talaje*, XIV, 24.
— — Parasites intestinaux, IV, 421.
— Phlébotomes, XIV, 566.

— *Phlebotomus papatasi*, IX, 762.
— Puces. Détermination spécifique, XVIII, 149.
— *Pulex irritans*, var. *fulvus* chez deux carnassiers, XXV, 960.
— Rats, XVII, 584.
— — de Mazagan. Rareté du surmulot, XVIII, 152.
— — — Infestation par la puce chique de la poule, XVI, 592.
— — Dératisation, XXIII, 442.
— Sangsue de cheval : *Limnatis nicolita*, X, 458.
— *Trypanosoma lewisi* et *duttoni* à Mazagan et dans le cercle de Doukkala, X, 456.
— Dimorphisme du Trypanosome de Mazagan, IX, 130.
— Ballote, gland doux, dans l'alimentation de l'homme, XXIV, 463.
— Assistance dentaire, XXIII, 58, 263.
— Hygiène, VIII, 121.
— L'habitation, XIV, 282.
— Climatologie et démographie de Casablanca, XII, 525.
— Journées médicales et vétérinaires, XX, 303.
Marsat (F.). Éloge, XVIII, 585.
Marseille. Choléra à l'asile Saint-Pierre, V, 294.
— Fièvre ondulante, II, 364.
— Leishmaniose canine, VII, 41, 173, 484 ; IX, 697.
Martinique. Voir aussi **Antilles.**
— Amibiase intestinale, IV, 393.
— Ankylostomiase, III, 27, 30 ; IV, 391.
— Bilharziose, I, 280 ; III, 26, 29, 30 ; IV, 392.
— Éléphantiasis, VI, 663.
— Fièvre jaune, I, 530, 630.
— Filariose, II, 349 ; VI, 663.
— Leishmaniose américaine, X, 379.
— Lèpre, XVIII, 90.
— Lymphangite endémique, VI, 663.
— Paludisme. Indice endémique, XII, 301 (c.).
— Parasitisme intestinal, IV, 390 ; XV, 185.
— Peste, IV, 164.
— Pian, IV, 563 ; XXI, 430.
— Syphilis, IV, 563.
— Tuberculose. Prophylaxie, VI, 368.
— Trypanosomiase bovine, XXII, 246.
— *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 461.
— Hygiène, XV, 179, 190.
Masque léonin dans la syphilis, V, 170.
— protecteur dans la peste, IV, 636 (fig.).
Maurice (Ile). Peste, II, 195.
— Vaccination antituberculeuse par le B. C. G., XXI, 190.
Mauritanie. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Béribéri, III, 745.
— Scorbut, III, 745.
Mbori. Voir **Trypanosomiases animales.**
Mecistocirrus digitatus, var. *javanica*, XI, 705 (fig.).
Médaille A. Laveran, XX, 303.
— — Remise à Sir Arnold Theiler, XX, 943.
— — — à Edm. Sergent, XXII, 629.
— — — à J. Rodhain, XXIV, 874.
Médecine coloniale. Précis, XX, 401.
— tropicale. « London school of Hygiene and tropical medicine », XXV, 673.
— et hygiène modernes en Chine, XXV, 282, 515.
Méditerranéenne (Fièvre). Voir **Fièvre ondulante.**
Mégalosplénies d'origine inconnue et kala-azar en Grèce, V, 489.
Meinicke (Réaction de) dans la lèpre, XXI, 187.
Mélanodermie physiologique des muqueuses en Algérie, VII, 216.
Melierax gabar. Hématozoaires, V, 74.
Melitococcie. Voir **Fièvre ondulante.**
Meloe d'Arequipa. Sang du — dans le traitement du papillome cutané, I, 207 (fig.).
Mélioïdiose, maladie commune à l'homme, aux rongeurs et aux équidés, XXIII, 210 (pl.).
— au Cambodge, XXIII, 436.
— en Cochinchine, XXIII, 273.
Mélophage. Infection de mammifères par le *Crithidia melophagi*, VII, 605 (fig.).
Méningée (Réaction) de la syphilis chez un Noir, VIII, 570.
— (Complication) de la tuberculose pulmonaire chez un Noir, XXV, 839.
Méninges. État dans la trypanosomiase humaine, VII, 63.
Méningites dans la région de Bamako (Soudan français), X, 568.
— à bacille septique aérobie, XIV, 31.
— **cérébro-spinale** en Afrique occidentale française, XIX, 388.
— — en Afrique orientale parmi les troupes belges, XII, 149.
— — en Chine occidentale (Setchouen), XII, 356.
— — au Congo belge, XI, 779.
— — — — Essai de vaccination, XVIII, 241.
— — en Guinée française, IX, 551.
— — dans l'Inde portugaise. Épidémie, XIV, 398.
— — à Madagascar, X, 689.
— — à bacille de Pfeiffer, XVIII, 448.
— — à méningocoques (?) à Madagascar, X, 689.
— — pesteuse à Dakar, VIII, 92.
— — chez la chèvre, XIII, 497 (fig.).
— — chez le chimpanzé, II, 202 (fig.).
— — Traitement par l'association urotropine et sérum, XXIV, 589.
— paludéenne, V, 569 ; XI, 694.

— pesteuse, XVI, 378.
— à pneumocoques en Afrique occidentale française, XIX, 388.
— — des tirailleurs sénégalais, VII, 466.
— — chez les tirailleurs des camps de Fréjus et de Saint-Raphaël, X, 821.
— suppurée chez les Noirs, VIII, 566.
— toxique d'origine parasitaire au Soudan français, X, 568.
— typhique suppurée chez un Malgache porteur biliaire de germes, XI, 264.
— aiguë dans la trypanosomiase humaine, II, 400 ; V, 187.
— tuberculeuse chez un Noir, XXV, 839.
Méningitiques (Accidents) dans le paludisme, V, 713.
Méningocoque (Pseudo-) isolé d'un abcès de la fosse iliaque, XV, 652.
Méningo-encéphalo-myélite des poules, IX, 561.
Menstrues de la guenon contenant des spirochètes, I, 579.
Mercure chez les nourrissons de Tananarive, XXII, 753.
— dans la trypanosomiase humaine, I, 572.
— Bi-iodure de — dans la lymphangite épizootique, XIII, 642 ; XIX, 762 ; XX, 829.
— Calomel dans la dysenterie bacillaire, XXIV, 507.
— Composés du — dans la lymphangite épizootique, X, 428.
— Cyanure de — dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique, XIII, 35 ; XIV, 226 ; XXII, 742.
— — dans la fièvre récurrente, XV, 330.
— Sels de — dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique à spirochètes, XIX, 332.
— — dans la syphilis associée à la trypanosomiase humaine, XVII, 181.
— *Smalarina* dans le paludisme, XIX, 431 ; XX, 304, 323, 966.
Meriones. Infection par *Trypanosoma gambiense*, VIII, 750.
— Sensibilité aux *Tryp. lewisi* et *duttoni*, VII, 531.
— — à la *Leishmania tropica*, VII, 663.
Merle métallique. Microfilaire, VI, 361.
— vert. Microfilaire, VI, 361.
Mermis. Larves de — parasites des larves de *Stegomyia fasciata*, II, 106.
Merveilleux (G.). Éloge, XVII, 523.
Mésanges. Leucocytozoon des — au Portugal, V, 83.
Mésopotamie. Étiologie du bouton d'Orient, XII, 500.
Metastrongylus elongatus, XI, 708 (fig.).
Metchnikoff (E.). Éloge, IX, 545.
Méthoxyphénylhydnocarpate. Voir **Chimiothérapie.**
Météorologie et paludisme en Algérie, XXV, 133.
Métoléines d'arsenic et d'antimoine dans les trypanosomiases, VIII, 28.
Micrococcus fluorescens fœtidus, cause d'une pseudo-mycose, XI, 323.
— *melitensis*. Recherche dans le lait de chèvres, II, 193.
— — Séro-diagnostic, III, 214, 490, 512 ; IV, 92 ; V, 454.
— — associé à l'hématozoaire du paludisme, IV, 106.
— — Culture, V, 454.
— — Pouvoir pathogène pour le rat et la souris, XVII, 465.
— — et typhus, III, 214.
Microfilaires du sang des indigènes en Afrique occidentale française, V, 438, VI, 80.
— chez les enfants d'Angumu (Congo belge), XXV, 889.
— des animaux domestiques au Turkestan, VII, 188.
— d'*Agama colonorum*, VII, 121.
— du caméléon à Madagascar, VII, 70.
— du gecko, I, 372 (fig.).
— de *Fringilla petronia*, VI, 518.
— d'oiseaux du Congo, VII, 297.
— — de la Corse, VI, 518.
— — du Haut-Sénégal et Niger, VI, 359.
— — de la Russie centrale, VI, 592.
— d'un oiseau rapace *Melierax gabar*, V, 74.
— du porc en Annam, V, 623.
— Déplacement dans le champ du microscope, V, 450.
— Action des médicaments sur les —, VI, 457.
Microfilaria bancrofti, III, 138, 399, 404, 737, 738.
— *bycanisti*, n. sp., VII, 297.
— *diurna*, III, 309, 613.
— *ninæ-kohl-yakimovi*, n. sp., VII, 189.
— *schizorhinos*, n. sp., VII, 298.
Microscopie. Réseau oculaire pour le dessin, la mensuration et la numération microscopiques, XII, 135.
— Emploi de petits grossissements, XX, 753.
— Précis, XIV, 309.
— Traité, IX, 203.
Microsporidies et trypanosomides chez les insectes, IV, 662.
Microsporum audouini en Algérie, XXIV, 177.
— *ferrugineum*, XV, 588 (fig.).
Microtome simple et économique, X, 489.
Microtrombidium guineense, n. sp., VI, 202.
Minchin (Ed.-A.). Éloge, VIII, 622.
Miracidium bilharzien. Observations biologiques, V, 837.
— de *Schistosomum hæmatobium*. Particularités biologiques, III, 532.

Mission sanitaire de la Société des Nations à Dakar, XIX, 374, 390.
— R. P. Strong, 1926-1927 au Libéria et au Congo belge, XXIV, 5.
— d'enquête amarile au Niger et au Dahomey, XXV, 834.
Moelle osseuse. Ponction, XV, 722.
— — Prélèvement pour le diagnostic *post-mortem* de la peste, XIX, 405.
— — et diagnostic du charbon symptomatique, XIX, 515.
Moineau. Microfilaire, VI, 360.
Moisissures. Conservation et envoi, II, 60.
Molluscum fibrosum multiforme, II, 73 (fig.).
— — et chéloïdes géantes, XI, 712, 813 (pl.) ; XII, 188 (pl.).
Mollusques. Voir aussi *Bullinus*, **Limaces.**
— autochtones. Essais d'infection par bilharzies, XI, 854.
— Présence en France et en Corse de *Bullinus contortus*, hôte intermédiaire de *Schistosoma hæmatobium*, XV, 208.
— et bilharziose, XVIII, 267
— — au Maroc, XVI, 491.
— — — Répartition de *Bullinus contortus* et de *Planorbis metidjensis*, XV, 632.
— — Gîtes à *Bullinus* et à *Planorbis* en Tunisie, XV, 954 (c.).
— — Infestation de *Bullinus contortus*, XXI, 8.
— — Essais d'infestation de *Bullinus brocchi* avec des œufs de *Schistosomum hæmatobium*, XX, 23.
— — *Planorbis dufourii*, hôte intermédiaire de *Sch. hæmatobium* au Portugal, XV, 805.
— Limnée de Madagascar hôte de cercaires de trématodes, XXII, 523.
Monas sp. dans les selles de l'homme, XIV, 557.
— dans l'intestin de l'homme, XVIII, 188.
Monilia et diarrhée dysentériforme en Égypte, XXII, 11.
— *balcanica*. Production des anticorps, XI, 820.
Moniliase bronchique. Deux cas au Maroc, XXIV, 15.
Monnier. Éloge, XXII, 625.
Monstre double otocytaire monomphalien, XVII, 715.
— Fœtus opodyme de vache, XXIV, 743.
Moranyl. Voir **Chimiothérapie** : ***205 B-309 F.***
Mortalité des Européens à Saïgon, III, 459.
Morue. Savon d'huile de foie de — dans le traitement de la lèpre, XIV, 520.
Morve. Lésions nasales, V, 774.
Mouches. Voir aussi **Auchméromyies, Chéromyies,** *Chrysomyia*, **Glossines, Stomoxes.**
— de la région de Tanger, XX, 619.
— anthomyide, VIII, 591.
— calliphorine à larve suceuse de sang d'oiseaux, VIII, 77.
— Forme inédite de *Calliphorinæ testacæ*, XXII, 437.
— domestique, agent vecteur d'habronémoses d'équidés, XIV, 471.
— — Évolution de l'*Habronema muscæ* chez la —, XV, 572.
— Rôle dans la dispersion des amibes dysentériques et autres protozoaires intestinaux, XI, 166.
— piqueuses d'Afrique, I, 252.
— — de l'Est africain, XVIII, 465.
— L'œstre du mouton au Ruanda (Afrique orientale), XVI, 17.
— et fièvre récurrente, IV, 276.
— et leishmanioses, IV, 459.
— et lèpre, V, 860.
— Larves de *Pycnosoma putorium* dans un cas de myiase nasale, XV, 416.
— exotiques à larves parasites, XVIII, 732.
— parasites des vers à soie, III, 766.
— ectoparasites (nymphes de gamase) de la — domestique, IX, 486.
— parasitées par les protozoaires, III, 264 (pl.), 300.
— Protozoaires de — capturées sur les euphorbes, XV, 970 (fig.).
— Destruction par le formol, I, 610.
— — des larves par les poules, I, 613.
— Guide pour l'étude des tsétsés, XVIII, 693.
Mouette. Filaire, IV, 825.
— *Halteridium*, IV, 524.
Moustiquaires destinées aux troupes en campagne et aux voyageurs, IX, 75 (pl.), 122 (pl.).
Moustiques. Voir aussi **Anophèles, Anophélines,** *Culex*, *Stegomyia*, *Theobaldia*.
— en Basse-Albanie, XII, 266.
— des confins albano-macédoniens, XI, 492, 494, 496, 498, 500.
— d'Algérie : Sud-Constantinois, VII, 418.
— — Sud-Oranais, III, 481.
— en Annam (Yaback), XIX, 851.
— — (Sud-), XIX, 472 ; XXIII, 763.
— — Gîtes de *Neocellia maculata*, XIX, 703 ; XXIII, 763
— récoltés par la mission antipaludique de l'Armée d'Orient en 1918, XIII, 117.
— nouveaux du Brésil, II, 162, 163.
— de la Chine (Tchentou), I, 227.
— — du Nord. Hibernation, III, 155.
— de Cochinchine. IV, 395 ; XIX, 472.
— — (plantation Gia-Nhan), XIX, 677.
— — Espèces nouvelles (*Lophoceratomyia roubaudi* et *L. bernardi*, XX, 25.
— — et du Sud-Annam. Monographie, XXIII, 763.

— au Congo belge (Katanga), XX, 170, 185.
— — français, XIII, 377.
— — — Gîtes à larves à Brazzaville, XXI, 768.
— de France. Détermination, XIV, 179.
— en Géorgie. Hibernation des anophèles et des *Stegomyia* en Abasie, XIX, 480.
— en Grèce, XXIV, 122 (fig.).
— de la Haute-Guinée, VIII, 658.
— de la Guyane française, IX 383 ; XI, 397.
— — hollandaise et de la région néotropicale, XIX, 166.
— en Macédoine, Remarques sur les anophélines, X, 890.
— — Hibernation des larves, XI, 729.
— — XI, 530.
— au Maroc, région de Salé, IX, 140.
— — région de Tanger, XVII, 570.
— au Sénégal (à Dakar en 1931), XXV, 797.
— au Tonkin, II, 577.
— — (à Chapa), XXV, 245.
— Pompe salivaire, XX, 851.
— Maturation des œufs, XXII, 683.
— Larves carnassières, II, 147.
— Larves dans les trous de crabes, XXII, 175.
— Influence des vents sur les larves, IV, 325.
— Résistance des larves dans les eaux picriquées, XII, 231.
— Manifestations biologiques peu connues, XIX, 259.
— et dengue, XXII, 275 ; XXIII, 797.
— et infection à *Plasmodium relictum*, XII, 601, 603.
— Influence du froid sur le développement de *Pl. relictum* chez le —, XII, 174.
— et lèpre, I, 288, 493 ; IV, 245 ; V, 669, 787 ; VI, 551.
— et paludisme, XXII, 5 ; XXIII, 122.
— — au Petchili, VII, 110.
— — Rôle suspecté en 1774, VIII, 279.
— — Note historique sur le rôle des —, VIII, 594.
— et peste du cheval, XI, 430.
— Flagellés parasites, XIII, 138 (fig.).
— et trypanosomiases animales : — du genre *Mansonia* dans le nagana, I, 355.
— — humaine, I, 144 ; VI, 442 ; VIII, 195.
— — — Expériences de transmission de trypanosomes humains, VII, 49.
— *Aedes mariæ* (Sergent, 1903) = *A. zammittii*, XXV, 702 (fig.).
— Lutte contre les —, III, 418, 455, 457 ; XI, 464, 536, 643 ; XIII, 88.
— — Procédé pour empêcher la ponte, XVIII, 779 ; XIX, 702.
— — Destruction dans les locaux mal clos, V, 633 (fig.).
— — — à Saint-Louis-du-Sénégal, V, 637.
— — — par le filet à papillons, III, 457 ; VI, 43, 205.
— — — par le gîte-piège, III, 455 ; VI, 513.
— — — par les trous-pièges, I, 100.
— — — par les produits chimiques, I, 605.
— — — par le crésyl, V, 561, 627 ; VI, 645.
— — — par le givral, XXII, 681.
— — — par la quinoléine, V, 556, 739.
— — — au moyen de tabac consumé, V, 633.
— Lutte antilarvaire, XXIII, 128, 402.
— — — par le crésyl au Bassam, VI, 645.
— — — au Bas-Dahomey dans une zone inondée, XXI, 323 (fig.).
— — — à Madagascar, XXI, 346.
— — — Poudres larvicides légères, XIX, 287.
— — — Culture des lentilles d'eau, XII, 735.
— — — Travaux antilarvaires, XI, 461, 503, 517, 646.
— — — Poissons larvivores, XX, 476.
— — — — — de la Guadeloupe, XXV, 248.
— — — Effets comparés de quelques larvicides, XXI, 109.
Moutons. Voir aussi **Ruminants.**
— Anaplasmose en Indochine, XXIV, 104.
— — en Piémont et en Sardaigne, X, 143.
— — en Russie, XXII, 423.
— algériens et bactéridie charbonneuse, V, 336.
— — et clavelée, VII, 506.
— — indemnes d'infection mélitensique, XXII, 412.
— Charbon bactéridien. Intradermovaccination, XVII, 467.
— Coccidiose dans le Caucase du Nord, XXII, 71.
— Darmous, XXIV, 848.
— Distomatose à Madagascar, XXII, 521.
— Fièvre catarrhale ou *blue-tongue* en A. O. F., XVIII, 215.
— Gastro-entérite parasitaire. Faune du tube digestif au Maroc, XV, 820.
— *Heart-water* des — et peste du cheval, XI, 426.
— Helminthiase en Guyane française, IX, 402.
— Lésions du foie à Madagascar, XXII, 525.
— Otacariose au Congo belge, IX, 767.
— Paralysie par les tiques dans la région de Sitia (Crète), XVII, 378.
— Piroplasmose en Algérie, XV, 789 (fig.) ; XVII, 122.
— — — Traitement, XX, 71.
— — dans l'Ouellé (Congo belge), IX, 95.
— — au Turkestan, X, 305.
— — en Turquie, XXIV, 822.

— — Theilériose, IX, 102, 201 ; X, 308.
— Trypanosomiases dans l'Ouellé (Congo belge), IX, 95.
— — I, 272, 353, 523.
— Sensibilité au trypanosome humain du Sénégal, VII, 716.
— Infection expérimentale par *Tryp. gambiense*, IV, 619.
— — — par *Tryp. rhodesiense*, IV, 623, 675.
— Helminthes en Haute-Guinée française, XIII, 180.
— Œstres en Afrique orientale (Ruanda), XVI, 17.
— — au Sénégal, V, 733.
— Protozoaires parasites de l'estomac, III, 297, 298.
— parasité par *Ctenocephalis canis*, XVIII, 755.
— piège à puces, XV, 416.
— Répulsion exercée sur les puces, XVI, 96.
— *Theileria ovis*, IX, 102 (fig.), 201.
Mozambique. *Trypanosoma dimorphon*, II, 39.
— Relation d'un voyage en —, XVII, 195.
Mucus nasal et bacille de Hansen, IV, 609.
— vaginal et bacille de Hansen, II, 200.
Mules de Panama. Trypanosomiase, IV, 168.
Mulets du Turkestan. Microfilaires, IX, 222.
Mulot. Toxoplasmose expérimentale, VIII, 58.
— Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 529.
Multiceps glomeratus de la gerbille à pieds velus, VIII, 173 (fig.).
— *ramosus*, n. sp., XII, 223.
Muqueuses. Mélanodermie physiologique des — en Algérie, VII, 216.
— et leishmanioses, V, 176, 411, 486, 808.
— intactes. Infection de toxoplasmose et de paralysie bulbaire, VII, 112.
— — traversées par le virus de la peste aviaire, II, 243.
— — — par *Schizotrypanum cruzi*, V, 723.
— — — par les spirochètes, II, 239.
— — — par *Toxoplasma gondii*, VI, 468.
— — — par les trypanosomes, II, 244 ; III, 433.
Muridés. Hémogrégarine et trypanosome d'*Akodon fuliginosus*, VIII, 165.
— Trypanosome de *Dendromys* sp., VIII, 726.
— Trypanosomes des — de la Côte d'Ivoire, VIII, 80.
Mus concha. Trypanosoma eburneense, VIII, 84.
— *decumanus*. Corps de Graham-Smith, VIII, 103.
— *maurus*. Parasite sanguin, VI, 247.
Musaraigne. Peste chez les — à Dakar, XVI, 133.
— réservoir de virus pesteux au Cambodge, XVI, 158.
— (*Crocidura stampflii*). Spirochète, X, 280.
— Spirochète inoculable au lapin, XIX, 504.
— — de la — transmis expérimentalement au singe par le pou, XXI, 173.
— Toxoplasmose expérimentale, VIII, 58.
— Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 534.
Musca domestica, III, 264.
— *nebulo*, III, 264.
Muscides. Larve hémophage (*Passeromyia*) des oiseaux, IX, 765.
Mycétomes au Ouadaï, VII, 525.
— à grains noirs, XII, 37, 741.
— — — Culture et inoculation expérimentale, I, 95 (fig.).
— — — Présentation de malade, XV, 353 (fig.).
— — — dû à *Glenospora clapieri*, XX, 502.
— — — du pied, XXIV, 80 (fig.).
— à grains rouges. Culture, V, 588 ; VI, 294.
— — — VIII, 623, 624 ; XII, 478.
— — — Evolution, IX, 346 (fig.).
— — — Traitement, VI, 710 ; IX, 346.
— à *Nocardia maduræ* en Tunisie, X, 431.
— du pied à *Nocardia maduræ* chez un indigène algérien, XV, 379.
— — — — en Algérie, XIV, 357.
— — (type pied de Madura) dû à l'*Aleurisma apiospermum*, XIV, 285 (pl.) ; XVII, 735.
— — en Algérie, XX, 11.
— — à Mohéli (Comores), XI, 62.
— Pied de Madura à la Côte d'Ivoire, VI, 485.
— — à Madagascar (Fort-Dauphin), XI, 407 (pl.).
— — au Maroc, V, 707.
— — Traitement par les injections intraveineuses de Lugol, XXI, 511.
— du poumon chez l'âne, VIII, 11.
— Essais de vaccinothérapie, XV, 7.
Mycoderma, agent d'un mycétome à grains rouges, XII, 478.
Mycologie du canal intestinal à Porto-Rico ; ses relations avec la sprue tropicale, XXII, 58.
Mycoses. Voir aussi **Actinomycose, Blastomycose.**
— malgaches. Abcès sous-dermiques dus à l'*Endomyces molardi*, n. sp., XV, 311 (fig.).
— du Pérou, XIII, 663 (fig.).
— — à Arequipa, XVII, 906.
— due à un *Aspergillus* en Tunisie, XVII, 343 (fig.).
— Dermatite verruqueuse, XVII, 227 (pl.).

— (Dermato) à la Guyane française, XIV, 354.
— — Étiologie du tokelau, XVI, 111.
— — malgache : le hodi-potsy, XV, 424 (fig.).
— Deux espèces nouvelles de dermatophytes en Mandchourie : *Microsporum ferrugineum*, n. sp., et *Trichophyton pedis*, n. sp., XV, 588 (fig.).
— gommeuses de la Côte d'Ivoire, XI, 306.
— à grains rouges, XV, 862 (fig.).
— Grains rouges et grains noirs, VI, 294.
— à grains rouges et à grains noirs au Ouadaï, VII, 525.
— pseudo-tuberculose, III, 488.
— pulmonaire, XV, 949.
— à *Scopulariopsis* avec lésions cutanées simulant la lèpre, XV, 654 (fig.).
— tropicales au Brésil, XXI, 419.
— brésilienne (Zymonématose) avec localisations buccales, V, 313.
— (Oto) brésilienne à *Sterigmatocystis hortai*, n. sp., XV, 383 (fig.).
— des rongeurs du genre *Mus* à Arequipa, XII, 350 (fig.).
— (Pseudo-) à bacille encapsulé, XI, 321.
— — à microcoque, XI, 323.
Mycothérapie de la lymphangite épizootique, XI, 609.
Myiases aux Antilles, VII, 367.
— de la Haute-Guinée, VIII, 658 ; XV, 416.
— en Indochine, XXIII, 595.
— du Sahara, VI, 487.
— à *Chrysomyia bezzianum* chez un indigène à la Côte d'Ivoire, XXII, 48.
— « Creeping disease » (*Myiasis linearis*) en Russie, XV, 555.
— cutanée due à des sarcophaginés, XVI, 413.
— furonculeuse au Congo français, VI, 350.
— génitale de la femme, XXIII, 595.
— intestinale, V, 508 (pl.).
— — simulant la fièvre typhoïde, I, 374.
— nasale, XV, 416.
— — à *Chrysomyia dux*, XVII, 375.
— oculaire à l'île de Sal (Archipel du Cap-Vert), XII, 736.
— — à *Œstris ovis* dans la région parisienne, XIV, 595 (fig.).
— urinaire, XXI, 852.
— Agents producteurs, VIII, 2.
— (Pseudo-). Larbish. Éosinophilie, X, 294.
— — à Grand-Bassam, X, 725.
— — à Tamatave, XI, 716.
— — rampante. Cas probable, XV, 1018.
— — sous-cutanée au Sénégal, VII, 398.
— animales au Congo belge (bas-Congo), IX, 763.
— — — — (Katanga), X, 467, 472.
— — cavitaire du dromadaire, IX, 483.
— — prévaginale de la vache, V, 737.
— Études sur l'hypoderme ou varron des bœufs. Extrait d'œstres et immunisation, XVII, 259.
Myriapodes. Récolte des — venimeux, VII, 521.
— des fosses nasales de l'homme, IX, 244 (fig.).
— dans l'intestin IX, 530.
— vésicant du Tonkin : *Otostigmus aculeatus*, XIX, 343.
Myxomycète (*Dictyostelium mucoroïdes*) coexistant avec une entamibe du singe, V, 180.
Myxo-sarcome du bras chez un bambara, IX, 702.
Myxosporidies des poissons du Paraguay, IX, 363.
Myxosporidiose de *Temnodon saltator*, XXIII, 181 (fig.).

N

Nagana. Voir **Trypanosomiases animales.**
Naganol. Voir **Chimiothérapie : *205 B.-309 F.***
N'Diank (Ch.). Éloge, XVII, 342.
Nauleau (Choléra du Sénégal), V, 753.
Necator americanus, III, 27, 30, 58, 315.
— — en Colombie, II, 603.
— — à la Côte d'Ivoire, IV, 117.
— — en Haute-Guinée, V, 843.
— — Envoi d'échantillons, I, 318.
— — chez les singes, I, 186.
— — Sécrétion de substances hémotoxiques, I, 231.
— — cause d'infection, II, 418.
— — et *ankylostomum duodenale*, XIV, 89, 139.
Nématodes. Voir aussi **Anguillules, Ascarides, *Dispharagus*, Filaires, Oxyures.**
— chez les Arabes du Tell algérien, VII, 303.
— au Cambodge, XVIII, 61.
— en Cochinchine, XVII, 577.
— parasites du Congo belge, XI, 82.
— chez le Malgache en Émyrne (Madagascar), XXII, 391.
— Œufs de — indéterminés trouvés dans les matières fécales à la Guyane, XIV, 155.
— intestinaux en Annam, XIII, 596.
— — au Cameroun, XII, 244.
— — à Madagascar, XIV, 247 ; XX, 466.
— Lésions anatomiques produites par les —, XI, 573.
— Genre *Camallanus* = *Cucullanus*, VIII, 446.

— *Crassicauda crassicauda* chez un dauphin des côtes de la France, XXIV, 198 (fig.).
— *Crossophorus collaris*, ascaride parasite des damans, XIV, 390 (fig.).
— Genre *Gœzia*, VIII, 270.
— du genre *Hepaticola*, parasite du chimpanzé, XXI, 221.
— *Quimperia*, n. g. *lanceolata*, n. sp., parasite des poissons, XIX, 798.
— spiroptères du genre *Habronema* et dermite granuleuse, VIII, 695.
— Tricocéphalidé du rat à Shangaï : *Hepaticola hepatica*, XVII, 638.
— de l'éléphant africain, XV, 122.
— — d'Asie, VII, 129, 206.
— chez le léopard, VI, 451.
— parasites des reptiles, V, 251 (fig.).
— vasculoïdes des bovins annamites, V, 115.
— intestinaux et anthelminthiques, XXIV, 41.
— Larves de — cause de télangiectasie du foie et de la rate du porc, XXIV, 611.
— Larves spirulées de — chez les puces, XXI, 104 (fig.).
Nematodirus, genre de strongylidés, V, 35.
Neocordylobia roubaudi, n. sp., XXII, 438.
Néosalvarsan. Voir **Arsénobenzènes.**
Néphrite pneumococcique chez les Noirs. XI, 159.
Nerveux (Système). Troubles dans les trypanosomiases, I, 569.
— — Anatomie pathologique dans la trypanosomiase humaine, II, 140.
Nerveuses (Maladies). Banga de l'Ouellé (Congo belge), VIII, 743.
914 = néosalvarsan. Voir **Arsénobenzènes.**
Névrites périphériques chez les coloniaux venant du Congo, III, 251.
Nez. Myriapode des fosses nasales de l'homme, IX, 244.
Niaouli (Essence de). Production et emplois, XIII, 222.
— — — menacée en Nouvelle-Calédonie, XIV, 396.
Nicotine. Action sur les moustiques, I, 603.
— dans les vins en A. O. F., XIX, 951.
Niger. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Fièvre jaune, XXV, 834.
— Leishmaniose cutanée, IV, 180.
— Paludisme, XVI, 137 ; XVII, 327.
Noc (F.). Éloge, XVII, 285.
Nocardia maduræ, VI, 295 ; X, 431 ; XIV, 337.
— — et *pelletieri*, VIII, 624.
— *pelletieri*, V, 589, 708 ; VI, 295.
— Adénite à — ayant simulé un bubon pesteux, XII, 60.
Nodosités juxta-articulaires, VI, 86, 711 ; IX, 211 (fig.), 341.
— — chez les indigènes d'Algérie, XIII, 738.
— — à Moheli (Comores), XI, 62.
— — des Malgaches, XXIV, 209.
— — au Maroc chez un Européen, XVI, 346.
— — et kystes filariens en pays Toma (région militaire de la Guinée), X, 150.
— — Origine probablement syphilitique, XIII, 548.
— — et tréponèmes, XVI, 553.
— — Examen histologique, IX, 212 (fig.), 287, 341.
— — Traitement par le novarsénobenzol, XIII, 554.
— — Insuccès du traitement par l'arsénobenzol, XV, 488.
Noguchi (Hideyo). Éloge, XXI, 417, 575, 576.
Nogue (L.). Éloge, XIX, 513, 762.
Noirs. Appendicite, XXIII, 996.
— Dépigmentation (Maladie de) chez un indigène du Congo belge, XI, 867.
— Diabète sucré chez un — d'Afrique, XXI, 701.
— Fistule stercorale de la région inguinale droite, IX, 340.
— Cas gynécologiques, XXIII, 205.
— Ictères infectieux, XV, 348 ; XVI, 184.
— Kystes hydatiques du foie, de la rate et du péritoine chez un — du Congo, XVI, 144.
— Méningite typhique suppurée chez un Malgache porteur biliaire de germes, XI, 264.
— Paludisme chez les — adultes de l'Ouest africain, XVI, 281.
— Parasitisme intestinal chez les tirailleurs sénégalais, XVI, 180.
— Pneumococcie à métastases pulmonaires et extra-pulmonaires, IX, 7.
— — (Manifestations de la) chez les tirailleurs des camps de Fréjus et de Saint-Raphaël, X, 816.
— — Complications extra-pulmonaires, XI, 159.
— — Gravité de la pneumonie et fréquence de la mort subite au cours de cette affection, X, 774.
— Syphilides psoriasiformes confluentes, X, 688.
— Tuberculose de la voûte du crâne chez un — du Soudan, XIII, 330.
— — pleuro-pulmonaire, XIII, 743.
— — pulmonaire à complication méningée, XXV, 839.
— — Cuti-réaction à la tuberculine, XXIII, 279.
— — Dépistage par la réaction de Vernes, XXV, 549.
— — Vaccination des nourrissons par le B. C. G., XVII, 938 ; XVIII, 431.
— Tumeurs, XV, 363, 485 (fig.).

— Tumeurs chez les — de l'Afrique centrale, XII, 567.
— — malignes chez les Sénégalais, XXIII, 109.
— — Cancer du sein, XIX, 499.
— — — chez les — de l'Afrique centrale, XIX, 564.
— — Chéloïdes géantes, X, 39.
— — Gliome du cerveau, XIII, 34.
— — Myxo-sarcome du bras chez un Bambara, IX, 702.
— Porocéphales en Afrique occidentale, XII, 92.
— — (Larves de) dans le foie d'un tirailleur, XI, 262.
— Élimination du calcium dans la lèpre, XV, 865.
— Moindre résistance du gonocoque chez les —, XI, 438.
— Observations médicales recueillies parmi les troupes coloniales belges en Afrique orientale, XII, 137.
— Résistance péritonéale marquée chez un — de la Côte d'Ivoire, XXI, 177.
— congolais. Tolérance à la ponction lombaire, XXII, 257.
— Protection sanitaire de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire, XVIII, 439.
— Détermination de l'âge des recrues. Chronologie des dents de sagesse, XXIV, 595.
— Nouvel indice de robustesse, XXIV, 60.
Noma dû à *B. perfringens* chez le chimpanzé, XXIV, 787.
Nomination de membres titulaires, XXV, 187, 390.
— d'un membre titulaire honoraire, XXV, 281, 933.
Notocotylus attenuatus. Cycle évolutif, XV, 331 (fig.).
— *noyeri*, n. sp., XV, 338 (fig.).
Nouvelle-Calédonie. Alcoolisme, II, 331 ; III, 175.
— Ankylostomiase, V, 192.
— Fièvre récurrente, XIX, 529.
— — simulant le paludisme, VII, 133.
— Filarioses, III, 737 ; IV, 202 ; XVIII, 651.
— Leishmaniose cutanée, III, 323.
— Lèpre, IV, 253 (c.) ; 609 ; VI, 551 ; VII, 218 ; XVIII, 78 (c.), 158 (c.) ; XXI, 228, 458 ; XXII, 95 ; XXIII, 63, 337, 574, 772 ; XXIV, 17, 483, 717.
— — Prophylaxie, XXI, 288.
— — des rats, V, 463 (pl.) ; VI, 484.
— Ostéopathie des chevaux, V, 519, 643, 697.
— Ostéoporose chevaline ou « big head », XIII, 262 ; XIV, 337.
— Parasitisme intestinal, XXII, 334.
— Peste, IV, 31 ; VI, 660 ; VIII, 422.
— Sodoku, XIX, 529.
— Stéphanurose du porc, XV, 849.
— Syphilis, XXI, 457.
— Trypanosomiase humaine, IV, 624.
— Tuberculose, XXI, 457.
— Vaccine, VII, 503.
— *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 464.
— Parasites intestinaux, XXI, 211.
— Eaux de Nouméa. Javellisation, XXI, 663.
— Causes de la disparition d'une race d'indigènes, XXI, 453.
— Obstétrique chez les Canaques, II, 502.
— Puériculture, V, 231.
— Inspection médicale, XXIV, 716.
— L'essence de niaouli menacée dans sa production, XIV, 396.
Nouvelle-Guinée hollandaise. *Granuloma venereum* dans la tribu des Marandinois, XXI, 354.
Novarsénobenzol. Voir **Arsénobenzènes.**
Novatoxyl. Voir **Arsenicaux.**
Nuttalia civittæ, n. sp., piroplasme de la civette du Sénégal, XIII, 649.
— *equi*, X, 309.
— *myoxi*, n. sp., XVII, 881 (fig.).
Nuttaliose. Voir **Piroplasmoses.**

O

O (Produit). Voir **Arsénobenzènes.**
Obstétrique chez les Canaques, II, 502.
Océanie (Établissements de l'—). Alcoolisme, II, 331.
Octomitus muris chez le campagnol indigène, XIV, 710 (fig.).
Œdèmes (Maladie des) à Java, XIV, 333.
Œil. Affections en A. O. F. Traitement par les sérums seuls ou associés au ludyl et au galyl, VIII, 404, 557.
— — à la Côte d'Ivoire, XXIV, 406.
— Blessure par projection de soude, XXII, 386.
— Cataracte de Morgagni, XV, 501
— Cécité en Chine. Causes, XXIV, 235, 419.
— Complications oculaires dans la piroplasmose canine expérimentale, XV, 545.
— Iritis chez les Malgaches, XXIII, 254.
— Lésions chez un chien inoculé de kala-azar indien, VI, 477.
— — chez les poules trypanosomées, V, 213.
— Mélano-sarcome de la choroïde chez une fillette bambara, XI, 36 (fig.).
— Myiase à *Œstrus ovis*, XIV, 595 (fig.).
— Ossification de la choroïde, XV, 872.
— Sparganose oculaire en Annam, XIII, 215.
— Trachome au Setchouen (Chine), XI, 845 (pl.).
— Troubles dans la maladie du sommeil, XV, 139.
— — dans la trypanosomiase des chevaux, XI, 566.

— Muqueuse traversée par *Schizotrypanum cruzi*, V, 723.
— Pseudo-parasites et charlatans, XI, 579, 724 ; XIII, 261.
Œrbiss. Voir **Larbish.**
Œsophagostome. Seconde espèce parasite de l'homme, II, 643.
— chez le singe, IV, 148.
— — Nodules aberrants, II, 611.
Œsophagostomiens des ruminants, VI, 506 (fig.).
Œsophagostomum stephanostomum, var. *thomasi*, parasite de l'homme, II, 643.
Œstre des moutons dans le Sahara touareg, VI, 487.
— — du Sénégal, V, 733.
Œstrides gastricoles et cavicoles de l'Afrique occidentale française, VII, 212.
— — au Congo belge, IX, 763.
— du Congo belge, VIII, 452, 687, 765.
— cavicoles. *Herpetomonas* parasite de larves, VIII, 369, 370 (fig.).
— Genres *Gyrostigma* et *Cobboldia*, VIII, 275 (fig.), 277.
— Création du genre *Kirkia*, VII, 210.
— nouveau parasite de l'hippopotame, II, 615.
Œstrus bertrandi, n. sp., VIII, 453.
— *ovis*, XII, 736 (fig.) ; XIV, 595 (fig.).
Oicomonas granulata, n. sp., parasite de l'intestin de l'homme, XIV, 546, 553.
— — à Pétrograd pendant les épidémies de 1919, 1921, XVIII, 187.
— — dans l'intestin des souris blanches, XVIII, 340.
Oiseaux. Voir aussi **Corbeau, Épervier, Geai, Mésanges, Moineau, Mouette, Perdrix, Pie-grièche, Pigeon, Pinson, Tourterelle.**
— du Sud-Oranais, III, 481.
— Charbon bactéridien et rapaces, XIX, 519.
— Coccidiose des oies en Russie, XXV, 1044.
— Coccidie du hibou, XXV, 1045.
— Corps étrangers du cloaque de l'oie, XXV, 175.
— Diptère parasite des pigeons : *Lynchia maura*, XXIV, 358.
— Dispharage du pigeon, III, 38.
— Filaires en Russie centrale, VI, 592.
— — de rapaces, IX, 364.
— Filariose du charognard *Neophron monacus*. Essai de traitement, XIII, 634.
— *Hæmoproteus*, III, 704 ; V, 71, 171 ; VII, 493.
— — du Haut-Sénégal et Niger, XI, 443.
— — *chelidonis* chez l'hirondelle *Chelidon urbica*, XV, 13 (fig.).
— — *columbæ*. Évolution spontanée de l'infection chez le pigeon, XV, 787.
— —.de l'hirondelle *Hirunda rustica*, XVI, 12.
— — (*Halteridium*) de Danilewsky (Infection par), V, 171.
— Hémamibes et toxoplasmes du *Liothryx luteus*, VII, 21.
— Hématophagie larvaire d'une mouche calliphorine *Phormia sordida*, VIII, 77.
— — — du genre nouveau *Passeromyia*, VIII, 591.
— Hématozoaires en Italie, XVI, 118.
— — particulier d'*Hypoleis hypoleis*, XVII, 884 (fig.).
— — d'un rapace diurne *Melierax gabar*, V, 74.
— Hémocytozoaires, II, 268 ; VI, 518 ; X, 699.
— — non pigmenté d'une anatidée, X, 699.
— Leucocytozoon, V, 17, 82, 173, 333 ; VI, 519 ; VII, 391 ; X, 28, 701.
— — chez une chouette *Scops brasiliensis*, XIII, 506.
— — de l'épervier, V, 18.
— — d'un rapace diurne *Astur badius*, var. *sphenurus*, XI, 31.
— Microfilaires, II, 208, 268, 544 ; VII, 297.
— — au Sénégal, VI, 359 ; X, 106.
— — de *Catharista atrata*, XI, 395.
— — d'hirondelles, XVI, 12.
— — d'un rapace diurne *Astur badius*, var. *sphenurus*, XI, 31.
— — sanguicoles de *Mercanser verrator* vivant dans les régions froides, XIII, 652 (fig.).
— Nécrose du foie chez un pigeon, XXV, 175.
— Paludisme des —. Étude expérimentale, XXIV, 327.
— — — et quinine préventive, XIV, 72.
— — — Traitement par l'atébrine, XXV, 875.
— — — Association avec la spirochétose. Étude expérimentale, XVII, 535.
— Parasites du dindon dans les îles de la Sonde, XVI, 594.
— — sanguicoles au Brésil, IX, 247.
— — — à la Guyane, XI, 124.
— — leishmaniforme du sang du merle, XVI, 11 (fig.).
— Pasteurellose en Cochinchine, XX, 315.
— Pica chez le canard, XXII, 230.
— *Plasmodium relictum*. Immunité, X, 550.
— — — Évolution influencée par la température extérieure, XXV, 416.
— Spirochétose en Algérie, XIX, 419.
— — des gallinacés dans le cercle de Doukkala, XIV, 346.
— — des oies dans le cercle de Doukkala, XVI, 582.
— — naturelle du canard domestique, XIII, 647 (fig.).

— Spirochétose associée au paludisme. Étude expérimentale, XVII, 535.
— Syngamose à Madagascar, XXIII, 681.
— *Toxoplasma cuniculi*. Infection des pigeons, IV, 518, 721.
— Trypanosomes, II, 268 ; VI, 515 ; VII, 115 (fig.), 296, 395 (fig.) ; 493.
— — d'— du Paraguay, IX, 339.
— — d'hirondelles, XVI, 12.
— Typhose à Brazzaville, XXIII, 353.
Onchocerca armillata, V, 117 ; X, 461 (fig.).
— *cœcutiens*, n. sp., parasite de l'homme, XII, 464 (fig.).
— *volvulus*, XII, 289, 442 (c.).
— — dans un abcès sus-pubien, XIII, 252.
— — et craw-craw, XIII, 305, 530, 535 ; XIV, 211, 725.
— — Observations diverses, XIII, 848.
— — Hématologie des sujets infestés, XIV, 653.
— — Étude clinique et histologique des lésions dues à —, XIV, 717.
— — Tumeur à — simulant un kyste synovial, XV, 499.
— — Recherches sur la transmission par divers parasites hématophages, XVII, 409.
Onchocercose humaine au Guatémala, XII, 442, 461.
— — à l'hôpital de Brazzaville, XV, 303 (fig.).
— — et éléphantiasis au Soudan français, XXII, 499.
— — Gale filarienne, XV, 815.
— — Dermite dyschromique marginée d'origine filarienne, XVIII, 316 (fig.).
Onyxis ulcéreux phagédénique, VIII, 715 (pl.).
Oospora pelletieri, n. sp. pathogène, V, 588.
Opalines. Cycle évolutif, VIII, 397.
Ophtalmie. Voir aussi **Conjonctivite, Kératite.**
— Étude en Algérie, X, 521.
— en milieu indigène algérien, X, 486 ; XI, 304.
— Conjonctivite phlycténulaire chez les indigènes algériens, XI, 578.
— au Guatémala. Cécité produite par une onchocercose humaine, XII, 442.
— au Ouadaï, VII, 524.
— Myiase oculaire, XII, 736.
Ophtalmoréaction à la tuberculine chez les indigènes algériens, I, 337.
— — chez les Noirs en Guinée française, III, 21.
— dans les trypanosomiases, VIII, 112.
Opistorchis sinensis. Lésions dues à —, I, 220.
Opium. Rapport sur la question de l'—, VI, 385, 480, 542, 543.
— Régie en Indochine, VI, 296.
Opothérapie rénale dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique avec anurie, VIII, 119.
Or colloïdal dans la pneumonie des tirailleurs annamites, IX, 275.
— (Sels d'—) dans la lèpre, XXIII, 693.
Orchite paludéenne, II, 374.
Ordonnance chinoise contre la fièvre typhoïde, I, 180.
Oreillons à Dakar, XXV, 837.
Organisme. Intervention de l'— dans la guérison médicamenteuse des spirochétoses, V, 524.
Orge parasitée par *Pediculoïdes ventricosus* et érythème ortié, I, 177.
Ornithodores du groupe *lahorensis* de l'Afrique du Nord, XXIV, 948.
Ornithodorus delanoëi. Description, XXIV, 948 (fig., pl.).
— *erraticus*. Spirochète d'— identique, à Dakar, à *Sp. duttoni*, var. *crociduræ*, XXV, 843.
— — var. *marocanus*, agent transmetteur de la fièvre récurrente à Dakar, XXV, 13.
— *foleyi*, n. sp. du Sahara algérien, XXI, 520 (fig.).
— du groupe *lahorensis* de l'Afrique du Nord, XXIV, 948.
— *marocanus*, n. sp., XII, 99.
— — Description, XIV, 331.
— — XV, 418.
— — dans le Sud-Oranais, XXII, 436.
— — Répartition géographique en Algérie, XXII, 436.
— *megnini* au Chili, XVIII, 408.
— — au Pérou, X, 773.
— *moubata*. Biologie, I, 432.
— — dans le Nord-Est du Congo belge, XII, 517.
— — à Madagascar, VI, 146 (c.), 533.
— — agent de transmission de *Sp. duttoni* et *Sp. gallinarum*, I, 577.
— — Évolution de *Schizotrypanum cruzi* chez —, V, 360.
— — Subsistance sur des reptiles, XV, 560.
— — Conservation du pouvoir infectieux d'— nourri sur reptiles, XVII, 376.
— — Ubiquisme parasitaire de l'— et infection par le spirochète de Dutton, XV, 564.
— — et fièvre récurrente africaine, XV, 222.
— — — — à Madagascar, IX, 693.
— — et spirochétose humaine au Congo, XI, 833.
— — — — dans le bassin du Congo, XII, 290.
— — parasite du porc, IX, 763.
— *savignyi*, agent de transmission de *Sp. duttoni*, I, 577.
— — en Algérie, à Ouargla, XVI, 741.
— *taleje* à Fez. Action pathogène sur l'homme, XIV, 24.
Orpiment dans les trypanosomiases, I, 28, 500, 503, 508, 569, 617 ; II, 51,

308 ; III, 42, 333, 443, 661 ; IV, 310 ; V, 287, 386 ; VI, 539.
— dans la prophylaxie de la trypanosomiase humaine, V, 287.
— Pureté, I, 619.
Orsanine = 270 F. Voir **Arsenicaux.**
Orthopterygium huaucui et verruga du Pérou, XXIV, 27.
Oseille de Guinée (*Hisbiscus sabdariffa*) dans le traitement du larbish, XXIV, 162.
Osseuses (Lésions) chez les singes, II, 220 ; IV, 150.
— — précoces dans la lèpre, VII, 2.
Ostéite hypertrophique au cours du pian, XIII, 315.
— paratyphique à la suite d'un traumatisme chez un homme sain, XV, 5.
— pianiques, « goundou », XVIII, 4.
Ostéolyse aïnhumique, XXV, 323.
Ostéopathie des chevaux en Nouvelle-Calédonie, V, 519, 643, 697.
Ostéomyélite ayant nécessité l'ablation du tibia, XXV, 1011.
Ostéopériostite post-mélitococcique, VI, 668.
Ostéoporose au Congo belge, XII, 238.
— chevaline en Nouvelle-Calédonie, XIII, 262.
— — — Dix années d'observation, XIV, 337.
Ouadaï. Voir **Tchad.**
Oubangui-Chari. Voir aussi **Afrique équatoriale française.**
— Dacaga, XI, 862.
— Filariose, VI, 80.
— Paludisme, XII, 538.
— Trypanosomiase humaine, V, 403 ; VIII, 138 (c.), 178 ; XIII, 234, 343 ; XVII, 234, 732 ; XX, 518.
— Champignon entomophyte des fourmis, XIX, 815.
— Filaire du crapaud de la région du Chari, IX, 133 (fig.).
— Glossines, XIII, 360.
— État sanitaire et dépopulation, XIII, 127.
Oulou-fato et rage, XXII, 635 ; XXV, 118.
— Virus isolé chez l'homme, XXIV, 931.
Ours et charbon bactéridien, XIX, 518.
Ouvrages reçus : I, 244, 313, 377, 446, 525, 590, 644 ; II, 63, 115, 160, 223, 272, 446, 515, 559, 649 ; III, 56, 107, 204, 282, 342, 416, 484, 578, 682, 794 ; IV, 64, 132, 175, 271, 343, 431, 503, 572, 646, 721 ; V, 51, 160, 212, 260, 330, 451, 563, 694, 771, 891 ; VI, 100, 136, 234, 375, 540, 595 ; VII, 86, 172, 258, 358, 460, 647, 695 ; VIII, 47, 155, 417, 554, 705, 779 ; IX, 118, 199, 283, 411, 542, 666, 748 ; X, 87, 158, 372, 418, 520, 676, 770, 942 ; XI, 55, 151, 259, 349, 548, 678, 773, 810, 880 ; XII, 52, 167, 210, 288, 474, 582, 813 ; XIII, 93, 156, 230, 325, 469, 618, 709, 760, 859 ; XIV, 55, 195, 254, 308, 352, 443, 542, 622, 729 ; XV, 99, 147, 370, 523, 672 ; XVI, 67, 294, 386, 570, 631, 702 ; XVII, 338, 418, 614, 723, 851 ; XVIII, 223, 358, 443, 510, 690, 759, 854 ; XIX, 72, 163, 318, 395, 662, 871 ; XX, 398, 448, 831, 938, 1066 ; XXI, 183, 275, 490, 603, 824 ; XXII, 55, 293, 394, 527, 626, 755, 1051 ; XXIII, 349, 557, 761, 881 ; XXIV, 72, 252, 360, 418, 512, 868 ; XXV, 94, 184, 387, 859.
Ovarite, complication de la dengue, XX, 402.
Oxalurie chez les Européens à Dakar, XXII, 734.
Oxygène. Injections d'— dans les anémies tropicales, VI, 130, 276.
Oxyspirura mansoni, III, 245, 670 ; V, 624.
Oxyures et appendicite du gorille, I, 557.
— chez les Arabes du Tell algérien, VII, 303.
— à Panama, IV, 334.
Ozène. Bacille acido-résistant dans l'—, IV, 90.

P

Pœderus, coléoptère produisant une dermatite vésiculeuse, VIII, 587 (fig.).
Paléopathologie. Ouvrage de Roy. L. Moodie, XVI, 573.
Palestine. Fièvre bilieuse hémoglobinurique, VII, 512.
Palme (Huile de —) substituée à la glycérine pour la conservation du vaccin antivariolique, XVIII, 742.
— — purifiée et alimentation des indigènes de nos colonies, XXV, 965, 967.
Paludisme en A. E. F. : au Cameroun pendant la campagne, IX, 588.
— — — (Douala), XI, 744.
— — — Recherches sur l'endémie paludéenne à Douala en 1917, XI, 286.
— — — Indice plasmodique, XXII, 556.
— — au Moyen-Congo, VIII, 202, 734.
— — — Indice à Brazzaville, XX, 722.
— — en Oubangui-Chari (Bangui), XII, 538.
— — au Tchad, dans l'Ouadaï, VII, 527.
— — — au Moyen-Chari, IX, 158.
— — — — Fort-Archambault, VII, 693.
— en A. O. F., XIX, 388.
— — chez les Noirs adultes. Étude parasitologique et clinique, XVI, 281.
— — en Côte d'Ivoire, IV, 108.
— — au Dahomey, XII, 304.
— — — Indice épidémique à Porto-Novo, XXIII, 106.
— — en Guinée française (au Fouta-Djallon), XVI, 496.
— — — — Indice endémique, XV, 497.

— (en A. O. F.) en Haute-Volta chez les Européens, XXI, 207.
— — — chez les indigènes, XXI, 309.
— — — Indice endémique à Ouagadougou, XVI, 383, 556.
— — — Indice splénique, XV, 765 ; XVII, 104.
— — au Niger (Niamey). Indice endémique, XVII, 327.
— — — (Zinder). Indice hématologique, XVI, 137.
— — au Sénégal. Indice endémique en saison sèche, XV, 766.
— — — — — durant la mauvaise saison, XVI, 208.
— — — à Dakar, XV, 515 ; XVI, 453.
— — — — Indice endémique dans la saison fraîche, XV, 510 ; XXII, 618.
— — — — chez les nourrissons indigènes, XVII, 279.
— — — en Gorée, XIX, 507.
— — — à Kaolack, XVI, 272.
— — — au camp de Tiaroye, XVII, 503.
— — — Vœu de la Société, XVI, 53.
— — au Soudan français. Indice endémique à Bamako, VII, 181 ; XV, 933.
— — — — (Cercle de Mopti), XVII, 939.
— en Afrique orientale parmi les troupes belges, XII, 157.
— en Albanie dans les territoires de Gora, Verca et Opara, XII, 266.
— — dans la région du lac Presba, X, 707, 804.
— — dans la région de Koritza, XI, 470.
— — Étude épidémiologique et prophylactique, XVIII, 320 (c.).
— en Algérie, II, 38.
— — Enseignements d'une épidémie foudroyante dans la Mitidja, X, 548.
— — en Oranie. Indice endémique, III, 474.
— — — Anophélisme et —, I, 437.
— — — (Sud-Oranais), Béni-Abbès et Oued Saoura, VIII, 67 ; IX, 470.
— — dans le Sud-Constantinois, VII, 416.
— — et météorologie, XXV, 133.
— — et fièvre typhoïde. Diagnostic différentiel, XII, 504.
— — Infantilisme, XI, 839.
— en Annam : Hué et environs, XIX, 335.
— — région de Kontum. Indice splénique, XXI, 26.
— — (Yaback). Enquête épidémiologique et entomologique, XIX, 845.
— à l'Armée d'Orient, X, 184, 208, 217 ; XII, 266 ; XXV, 389.
— — Constatation d'hématozoaires en 1916, X, 284.
— — Travaux de la mission antipaludique, XI, 456.
— — Répartition dans la région de Koritza (Basse-Albanie), XI, 470 (c.).
— — Carte des confins albano-macédoniens, XI, 483.
— — Réservoirs de virus indigènes en Macédoine, XI, 759.
— — Culicides récoltés par la mission, XIII, 117.
— en Chine (Petchili), VII, 110.
— en Cochinchine, à Can-Tho et Bac-Lieu. Enquête entomologique et épidémiologique, XX, 974.
— — (Chaudoc), XIX, 806.
— — à Dalat. Enquête malariologique, XX, 427.
— — (Gia-Nhan), XIX, 677.
— — à la station d'essai de Giaray. Enquête malariologique, XXI, 312.
— — (Saïgon), XX, 994.
— — et constitution du sol, XIX, 935 (c.).
— — Prophylaxie, XIX, 811.
— — et mortalité infantile, XX, 52.
— — Réceptivité naturelle d'*Anopheles aconitus*, XXIV, 554.
— — Tension artérielle et viscosité sanguine chez les Annamites, XVII, 799.
— aux Comores (Grande-) en 1925, XXI, 35, 132.
— — (Mohéli), XI, 61.
— au Congo belge, XX, 338 ; XXV, 885, 1062.
— en France : en Corse. Indice splénique, XIV, 700.
— — — Épidémiologie, XIV, 340, 654, 685 (c.).
— — — Recrudescence, XV, 683.
— — — Formes diverses. Apparition des gamètes, XXIV, 841.
— — — et anophélisme, XIV, 340, 685.
— — — — Protection fournie par le bétail, XV, 935, 936.
— — — Prophylaxie, VII, 366 ; XIV, 348, 657 ; XV, 3, 92, 683 ; XVI, 485.
— — — Vœux, XIV, 657 ; XV, 3.
— — — Brochure de Léger et Arlo, VII, 366.
— — Cas autochtones contractés sur le front, X, 171, 706.
— — — contractés au contact de troupes martiniquaises et annamites, IX, 693.
— — — à *Pl. falciparum*, X, 883 ; XI, 282 ; XIV, 266, 268, 272.
— — en Haute-Alsace, XII, 54.
— — dans les Ardennes, XIII, 88.
— — autochtone en Argonne et topographie anophélienne, XII, 23.
— — — dans les Basses-Pyrénées, XXIII, 726.
— — — en Bretagne et somnambulisme, XIX, 675.
— — — — dans la presqu'île de Langle (Morbihan), X, 803.
— — — — dans la banlieue de Lorient, XIII, 461 (fig., c.).
— — — dans l'Indre, XV, 191.
— — — Foyer en Seine-et-Marne, XII, 605.

— — à Saint-Raphaël (Var), XIII, 729.
— — dans l'Yonne, IV, 300.
— en Géorgie (Abkasie). Parasitologie et épidémiologie, XVIII, 327.
— — (Gagry), XVIII, 389 ; XIX, 100 ; XX, 153.
— — (Oudé) en montagne, XVIII, 383.
— à la Guadeloupe. Indice plasmodial, XXV, 211.
— en Guinée portugaise. Indice endémique, XX, 280.
— à la Guyane française, IX, 376 ; XIX, 243, 280.
— — — Indice endémique, X, 749.
— — — Documents hématologiques, XI, 67.
— aux Indes anglaises (Bengale). Forme pernicieuse et fièvre hémoglobinurique, XV, 962.
— — néerlandaises, XIII, 770.
— en Indochine. Voir aussi en Annam et en Cochinchine.
— — Porteurs de virus, XXIII, 841 (c.).
— — Riziculture et distribution géographique du —, XVIII, 815.
— — au Laos (à Thakhek), XXV, 419.
— à Madagascar, XV, 153 ; XXI, 625.
— — à Tananarive, VII, 105 (c.).
— — en Emyrne. Prophylaxie, XXV, 178.
— — dans la province de Diégo-Suarez. Indice splénique, XXI, 629 (c.).
— — Indice endémique. Valeur de la formule leucocytaire, X, 915.
— — chez les indigènes des Hauts-Plateaux, XXII, 137.
— au Maroc, à Casablanca, XIII, 334.
— — Épidémie des Oulad Hassoun, X, 586.
— — à Salé, X, 710.
— — à Tanger, XX, 45.
— — — pendant les 20 dernières années, XVIII, 558 (c.).
— — — et dans la région, XVII, 355.
— — Tentative d'assainissement, XII, 274.
— à la Martinique. Indice endémique, XII, 301 (c.).
— aux Pays-Bas. Longue incubation, XXII, 642.
— au Pérou. Traitement, XVI, 308.
— en Russie, XVI, 71.
— en Syrie, à Beyrouth, XVI, 86, 481.
— au Tonkin, VI, 745 (c.), 752 ; XXV, 976.
— — Indice endémique, III, 465.
— — à Chapa, V, 345.
— — à Hagiang, XX, 895.
— — — Indice splénique, XX, 905.
— — (vallée de la Rivière claire), III, 632.
— — Épidémie dans la province de Sontay, VII, 388.
— en Tunisie, I, 385 ; II, 450.
— en Turkestan russe, XVI, 243.
— Unité des protozoaires du —, XI, 624.
— Variété nouvelle du parasite de Laveran, VII, 385.
— Examen du sang par le procédé de la goutte épaisse, X, 702 ; XII, 375 ; XXV, 561.
— Coloration de l'hématozoaire, X, 540 ; XI, 440.
— Recherche de l'hématozoaire, XI, 96 (fig.).
— — — Xénodiagnostic, XIII, 20, 21.
— Morphologie du *Plasmodium* dans un cas mortel, XV, 104 (pl.).
— Culture du *Plasmodium*, XXI, 607.
— Formule parasitaire, XVII, 316.
— Multiplicité des races dans les trois formes du —, XV, 108.
— Les groupes d'hématozoaires dans la circulation, XVII, 313.
— Hématozoaire de la fièvre quarte et accès pernicieux mortel, X, 879.
— Propriétés morphologiques du sang, XVII, 631.
— Altérations globulaires, I, 201, 251 ; II, 235 ; X, 841 ; XI, 366 ; XII, 73.
— — — Genèse et valeur des stigmates globulaires, X, 841.
— Formule hémoleucocytaire, X, 915 ; XI, 625 ; XIV, 70, 701 ; XVII, 631.
— Critérium leucocytaire de la persistance de l'infection, XXIV, 544.
— Considérations physio-pathologiques sur l'hémolyse, V, 801.
— et coagulabilité du sang, XI, 173.
— Résistance globulaire, IX, 647.
— Considérations hématologiques sur des accès pernicieux traités par la quinine, X, 492.
— Données hématologiques et cliniques de la guérison chez les paludéens rapatriés, XIV, 101.
— et urée sanguine, XXV, 426.
— Réaction de Henry (séro-floculation), XXIV, 539.
— — — Rôle du *p*H, XXV, 221.
— — — appliquée à l'étude épidémiologique du —, XXV, 310, 314.
— — — et surfloculation de certains sérums de paludéens, XXV, 314.
— — de Wassermann, VIII, 258.
— et anophélisme en Algérie (Oranie), I, 437.
— — en Cochinchine (région de Chaudoc), XIX, 806.
— — en France, XV, 30, 36.
— — — (Haute-Alsace), XI, 848 ; XII, 54.
— — — dans les Ardennes, XIII, 88.
— — — en Argonne, XII, 23.
— — — à Bordeaux, III, 668.
— — — en Corse, XIV, 340, 685.
— — en Hollande, aux environs d'Amsterdam. Infection saisonnière des anophèles, XV, 116.
— — en Macédoine, X, 323, 890.
— — à Madagascar, XXIII, 122.
— — au Petchili, VII, 110.
— — en Syrie, à Beyrouth, XVI, 86, 481.

— et anophélisme au Tonkin, III, 632.
— et moustiques. Découverte de Ronald Ross, XXII, 5.
— — Rôle des moustiques suspecté en 1774, VIII, 279.
— — Intensité du — en rapport avec l'armature maxillaire des *Anopheles maculipennis*, XV, 29, 36.
— — Les gîtes d'anophèles en France. Répartition, XII, 178, 332, 779.
— — Culicides récoltés par la Mission antipaludique de l'Armée d'Orient, XIII, 117.
— — Réceptivité naturelle de *Anopheles* (*Myzomyia*) *aconitus* en Cochinchine, XXIV, 554.
— — — — des anophèles d'Indochine, XXIV, 949.
— — Protection fournie par le bétail, XV, 935, 936 ; XVIII, 725, 728 ; XIX, 100.
— — Déviation des anophèles, XVIII, 725, 728.
— — Différenciation des races zootropiques d'anophèles et régression du —, XIV, 577 ; XV, 29, 30, 36.
— — Lutte contre les moustiques, XI, 464, 556 ; XII, 735 ; XXIII, 795.
— — Assainissement d'une région infectée par un ancien lit de rivière, IX, 504 (fig.).
— — Mesures antilarvaires, XI, 461, 503, 517 ; XXIII, 402, 795.
— — — — Culture des lentilles d'eau, XII, 735.
— — Préparations arsenicales larvicides, XXI, 655.
— — Effets comparés de divers larvicides, XXI, 109.
— — — — du vert de Paris et de la paraffine liquide comme larvicides, XX, 123 ; XXI, 109.
— — Poissons larvivores, VII, 462 ; XX, 45, 476.
— Influence des altitudes et de la latitude, II, 572.
— — du milieu extérieur sur la résistance de l'organisme, XI, 1.
— — des races sur la résistance au —, XX, 898.
— — du bien-être sur la régression du —, XIV, 435, 658, 662.
— dans ses rapports avec la situation économique de la Corse, XV, 92, 683.
— Mode d'action du climat sur la répartition géographique du —, XI, 73.
— Transmission en fonction de la physiographie des lieux (au Tonkin), XXV, 976.
— Recherche de l'indice splénique, XXII, 785.
— Splénomégalie et formes parasitaires, XIV, 699, 700.
— et dengue, XV, 834.
— et fièvre jaune, XXII, 462.
— et fièvre typhoïde. Diagnostic différentiel, XII, 504.
— et infection du *post-partum*. Diagnostic différentiel, XVIII, 685.
— Affection pulmonaire simulant le —, guérie par la quinine, XX, 113.
— Fièvre simulant le — en Nouvelle-Calédonie, VII, 133.
— Classification des formes suivant le parasite et les catégories de malades, XX, 917.
— aigu. Complications méningitiques, V, 713.
— chronique, IV, 296.
— — chez les enfants indigènes d'Algérie, XVIII, 546 ; XIX, 96.
— épidémié, X, 184.
— larvé, IV, 688.
— « de première invasion », XIV, 636 ; XV, 292.
— accidentel, XXII, 318.
— congénital, XX, 338 ; XXV, 952.
— Etude clinique au Tonkin, XX, 907.
— Accès fluxionnaires intermittents, XVII, 773.
— Accès à forme pulmonaire, XVII, 568.
— Sclérose du poumon, I, 536.
— Formes pneumonique et dysentérique, I, 224.
— Evolution chez le même sujet de la tierce primaire en tierce secondaire, III, 182.
— et fièvre hémoglobinurique, IV, 301, 303 ; VII, 509, 512 ; XV, 962 ; XVIII, 715.
— Méningite, X, 569 ; XI, 694.
— Orchite, II, 374.
— Paralysie du deltoïde, III, 182.
— Polynévrite palustre simulant le béribéri, IX, 634.
— Purpura hémorragique, I, 478.
— Urobilinurie dans les congestions hépatiques, VII, 596.
— Urticaire palustre en France, XXV, 882.
— Complications rénales, XXIII, 958.
— cause de néphrite et de dégénérescence amyloïde, XXIII, 584.
— Rupture spontanée de la rate, XX, 719 (fig.).
— Arthrite suivie de gangrène du pied et de la jambe, XI, 28.
— Récidives, II, 572 ; III, 498 ; IV, 296.
— Causes des rechutes, III, 498.
— Rechute six ans après le départ du pays d'endémie, XXII, 73, 75, 76.
— viscéral, prémunition et réaction d'Henry, XXIII, 590.
— et grossesse, XX, 589.
— — Menace d'avortement. Guérison par la quinine, XIV, 535.
— dans les suites de couches, XVIII, 110, 685.
— et somnambulisme, XIX, 675.
— Histo-pathologie d'un cas primaire, XIV, 38.
— Evolution chez les enfants indigènes d'une région progressivement assainie, XXI, 856.

— Association avec l'amibiase. Traitement, X, 329 ; XVI, 304.
— — avec la fièvre ondulante, IV, 106.
— — avec la fièvre récurrente, X, 827.
— — avec la fièvre typhoïde, XXV, 634.
— — avec le ver de Guinée. Prophylaxie commune, XVII, 104.
— Epidémiologie et prophylaxie, VII, 25, 462.
— et splénectomie, XXV, 685.
— Accès convulsifs remplaçant les frissons dans le — primaire à *Pl. præcox*, XI, 364.
— à *Pl. falciparum* (*præcox*) congénital, XI, 841.
— — Diagnostic et traitement, XV, 834.
— — Epidémie sur un navire, XVIII, 218.
— — Fièvre rémittente à —. Rupture spontanée de la rate, XX, 719 (fig.).
— — Episode démentiel et gangrène symétrique des extrémités, XXV, 307.
— — Raisons de l'absence en Europe septentrionale de l'endémie estivo-automnale, XVIII, 279.
— Maladie de Raynaud avec éosinophilie locale, V, 342.
— Eclampsie infantile, XI, 560.
— Quelques facteurs de fièvre pernicieuse, XXIII, 927.
— Anémie pernicieuse, XXIV, 942.
— Accès pernicieux et azotémie, XVII, 282.
— Le mystère de la fièvre quarte, XXIV, 280, 282, 283.
— et phagédénisme. Infantilisme, III, 694 ; XI, 690, 839.
— Tension artérielle et viscosité sanguine, XVII, 799 ; XIX, 540.
— Chimisme sanguin, XXIV, 34.
— — — et cures hydro-minérales, XXIV, 222.
— — — et guérison des paludéens, XXIII, 820.
— Albumines et cholestérine du sérum sanguin chez les paludéens chroniques de race annamite, XXIV, 724.
— Réactivation endocrinienne, XX, 718.
— Inoculation au chimpanzé, XIII, 713.
— Essais de transmission à la rousseste X, 704 ; XI, 152.
— ***Prophylaxie*** en A. O. F., XVIII, 32.
— — — au Dahomey. Lutte antilarvaire, XXI, 323 (fig.).
— — — en Haute-Volta, XVII, 104.
— — — en Haut-Sénégal et Niger, II, 34, 84.
— — — au Sénégal, III, 541.
— — — — à Dakar, XVI, 51, 53, 453 ; XVII, 101, 103.
— — — — Commission antipaludique à Dakar, XV, 756, 1024.
— — — — au camp de Tiaroye, XVII, 506.
— — en Afrique orientale, VI, 569.
— — en Albanie, XVIII, 326.
— — en Algérie, I, 248, 316, 534 ; II, 162 ; III, 6 ; IX, 504.
— — en Annam, IV, 651 ; VI, 730 ; XV, 674 ; XVI, 361.
— — à l'Armée d'Orient, X, 421, 450, 886, 923 ; XI, 456, 641 ; XXV, 389.
— — au Brésil, II, 163.
— — en Cochinchine, XIX, 811.
— — dans les colonies françaises, II, 225.
— — en France, dans les Ardennes, XIII, 88.
— — — en Corse, VII, 366 ; XIV, 348, 657 ; XV, 3, 92, 683 ; XVI, 485.
— — en Indochine, III, 110, 626 ; IV, 275 ; V, 162.
— — — Service de quinine, III, 110.
— — en Italie, VI, 468.
— — à Madagascar, VII, 462 ; XIV, 97 ; XVIII, 36 (c.), 809.
— — — Lutte antilarvaire, XXI, 346.
— — — Service antipaludique, XXII, 1016 ; XXIII, 122.
— — au Maroc, XVIII, 794 ; XX, 45 (c.) ; XXIII, 33.
— — en Syrie, à Beyrouth, XVI, 481.
— — au Tonkin, II, 577 ; VI, 745.
— — en Tunisie, I, 385.
— — pratique. Voir aussi — et moustiques.
— — — Ensemble des mesures, XVIII, 40, 199, 227, 297.
— — — Organisation d'une campagne contre le —, XVIII, 300.
— — par la déviation des anophèles, XVIII, 725, 728 ; XIX, 100 ; XX, 153.
— — Stabulation du bétail, facteur de réduction du —, XX, 153 ; XXI, 322.
— — Zoophilie de l'*Anopheles maculipennis* en Ukraine, XXI, 322.
— — et plasmoquine, XXIV, 649.
— — Prémunition, XIX, 534.
— ***Traitement*** par quelques amino-alcools nouveaux, XX, 458.
— — par l'antimosan (Heyden, 661), XIX, 182.
— — par l'atébrine, XXV, 874, 878.
— — par l'atoxyl, I, 539.
— — par l'ionoïde d'arsenic, XIII, 504.
— — par le stovarsol, XIX, 96, 180, 359, 782 ; XX, 331 ; XXI, 636.
— — — Durée d'action, XIX, 96.
— — par le novarsénobenzol, XI, 282 ; XIII, 172, 264, 502.
— — Action adjuvante du sulfarsénol, XXII, 1010.
— — par le bleu de méthylène, I, 292.
— — par le trypanobleu, XII, 434.
— — par la quinine, I, 385, 534 ; III, 626 ; IV, 296 ; X, 492 ; XI, 80 ; XIII, 748 ; XIV, 109, 535 ; XV, 169, 237 ; XVI, 309, 436, 567 ; XVII, 310, 660, 874 ; XVIII, 28, 326, 710, 770 ; XIX, 26, 185, 282, 782 ; XX, 917 ; XXII, 555.
— — — Mode d'administration. Poso-

logie, X, 208, 217, 329 ; XV, 169 ; XVI, 436 ; XVII, 310, 660, 874.
— — par la quinine. Choix de l'heure, XI, 871.
— — — à petite dose, IV, 296.
— — — en injections intraveineuses, XIII, 748.
— — — Mode d'action sur diverses formes d'hématozoaires, XI, 648, 699.
— — — — sur *Pl. vivax*, XVI, 433.
— — Quinine préventive, III, 541, 626 ; IV, 275 ; XV, 293, 674, 686, 690, 777 ; XVI, 81 ; XVII, 506, 875 ; XVIII, 7, 29, 33, 153, 268, 272, 683 ; XIX, 190 ; XX, 917 ; XXII, 535.
— — — — chez les enfants au Sénégal par le tannate de — en poudre, III, 541.
— — — — Contrôle au moyen du réactif de Tanret, XIX, 190.
— — — — Réglementation de la vente des dragées, III, 6.
— — — en comprimés. Voir Quinine.
— — — associée à l'arrhénal, XIV, 109.
— — — — — et à l'iode, XIX, 283.
— — — associée au phosphore et au tartre émétique, X, 287.
— — — — — à la radiothérapie, XVI, 244.
— — — Effets comparés de la quinine, de la cinchonine et du quinctum, XVIII, 770.
— — par la plasmoquine, XX, 727, 728 ; XXIV, 104 ; XXV, 942.
— — Plasmoquine dans la prophylaxie, XXIV, 649 ; XXV, 942.
— — par le quinctum, XVIII, 770.
— — Accès pernicieux traité par le séroquinol, XXV, 842.
— — par le stovarsolate de quinine, XIX, 782 ; XX, 408, 456, 727 ; XXI, 625, 760 ; XXII, 137 ; XXIII, 651 ; XXIV, 335.
— — par le 710 Fourneau, XXIV, 97.
— — — et 574, XXV, 1074.
— — par le quinquina, XI, 845.
— — — Action des alcaloïdes, XII, 307.
— — par la cinchonidine, XIX, 185.
— — par la cinchonine, XVIII, 770 ; XIX, 185.
— — par la *Smalarina cremonese*, XIX, 431 ; XX, 304, 323, 966.
— — par le trépol, XV, 534.
— — des accès pernicieux par l'abcès térébenthiné, XI, 179.
— — des cachexies paludéennes, VII, 678.
— — Radiothérapie, adjuvant de la quinine, XVI, 244.
— — standard recommandé par le « National Malaria Committee », XV, 169.
— — aux thermes d'Encausse, XXII, 938.
— — — — et chimisme sanguin, XXIV, 222.
— — Climato et crénothérapie, XXIII, 832.
— expérimental. Traitement abortif, XXIV, 645.
— — — par le 664 Fourneau, XXIV, 93.
— Enquête et appréciation des statistiques, VII, 441.
— Instruction pratique sur la prophylaxie, XVIII, 227, 297.
— Commission. Rapport, XV, 150, 189, 378.
— Film cinématographique, XVIII, 447.
— Congrès international à Alger, XXIII, 559.
— Manuel (Parrot), VII, 550.
— Traité (Cardamatis), VII, 89.
— — de médecine tropicale. Fascicule : —, II, 563.
— Nomenclature, XV, 525.
— Société russe pour l'étude du —, VII, 462.
— Dispensaire du Gouvernement militaire de Paris, XII, 549.
— **des oiseaux.** Voir **Oiseaux.** Paludisme.
Panama. Ankylostomiase, IV, 334.
— Parasitisme intestinal, IV, 334.
— Trypanosomiases animales, III, 381 ; IV, 168.
Pangonia avec trypanosome dans l'intestin, IV, 528.
— *infusca* parasité par *Leptomonas pangoniæ*, V, 604.
Papier. Présence de protozoaires dans un — annamite, I, 297.
Papillome cutané. Traitement par le sang d'un *meloe*, I, 207.
Papillons saturnides du genre *Hylesia* et dermatose prurigineuse, XI, 104.
Papillonite guyanaise, XXV, 1099, 1106.
Pappataci. Voir **Phlébotomes.**
— (Fièvre à). Voir **Fièvre.**
Paraffine liquide larvicide, XX, 123.
Paraguay. Leishmaniose américaine, XXV, 488.
— — interne, VI, 118.
— Mycétomes, XXIV, 80 (fig.).
— Trypanosomiase des bovidés (mal de Caderas), XXV, 590.
— Flagellé parasite d'une asclépiadacée, IX, 356.
— Parasitologie des vertébrés, IX, 359.
Paralysie bulbaire infectieuse (pseudo-rage) au Brésil, V, 576.
— — — Infection par les muqueuses saines, VII, 112.
Paraplasma flavigenum, VIII, 562.
Pararhizomastix hominis, n. gen., n. sp., XIV, 553
Parasites intestinaux à la Côte d'Ivoire, IV, 117.
— — à Figuig, IV, 421 (fig.).
— — à la Martinique, IV, 390.
— (Pseudo-), vers des dents et vers des yeux, XV, 825.

Parasitisme cutané à Douala (Cameroun), XI, 758.
— hépatique et intestinal en Chine occidentale, VI, 704.
— intestinal. Voir **Intestinal** (Parasitisme).
— vulvo-vaginal par un acarien sarcoptide au Cameroun, XI, 722.
— (Pseudo-) et charlatans, XI, 579 ; XIII, 261.
— Cas de pseudo- et de xéno-, IX, 522.
— Méningite toxique d'origine parasitaire au Soudan français, X, 568.
— chez l'homme par *Rhipicephalus sanguineus*, XIV, 94.
— et symbiose, XIV, 448.
— et cycle évolutif d'*Habronema megastoma* chez la mouche, XIX, 471.
— Hémo- et les hémoporteurs de germes, XIV, 291.
— Hémo-. Variété des voies d'accès des parasites sanguicoles à leurs hôtes, XIV, 310.
Parasitologie au Japon, XXIII, 685.
— au Pérou, à Arequipa, XVII, 906.
— au Tonkin, IV, 574.
— des animaux du Tonkin, XVIII, 343.
— de l'homme et des animaux domestiques, IV, 653.
— Précis (Brumpt), III, 585 ; VI, 657 ; XX, 706.
— humaine. Précis (Verdun et Mandoul), XVII, 725.
Paratyphoïde. Voir **Fièvre paratyphoïde.**
Parthénogenèse des macrogamètes dans le paludisme, II, 575 ; III, 498 ; IV, 296.
Passeports médicaux au Congo belge, IV, 433.
Passeromyia, genre nouveau à larve hématophage, VIII, 591.
Pasteur, précurseur en microbiologie tropicale, XVI, 389.
Pasteurella. Septicémie avec localisation hépatique suppurée due à un germe à l'aspect de —, XV, 491, 495.
— Urétbrite à —, XXI, 839.
— *bouffardi*, n. sp. dans la pyomyosite, XI, 822 ; XIII, 398.
Pasteurellæ. Influence du *p*H dans la lyse des — du barbone et du choléra aviaire, XXII, 245.
Pasteurelloses au Maroc. Observations, XIII, 493.
— aviaire en Cochinchine. Son bactériophage, Prophylaxie, XX, 315.
— bovine en Cochinchine, XVI, 425 ; XXII, 245
— des grands ruminants. Transmission par voie digestive, XIX, 853, 910.
Pathologie exotique. Progrès de la —. Conférence, II, 518 ; IV, 2, 3.
— — Traité (Grall et Clarac), V, 335.
— — Précis (Salanoue-Ipin), III, 6.
— — — (Le Dantec), XVII, 422 ; XXII, 297.
— — vétérinaire. Éléments pratiques (Velu et Barotte), XVII, 619.
Pays-Bas. Voir **Hollande.**
Peau. Absorption du rayonnement solaire, VII, 406.
— intacte traversée par les spirochètes, II, 239.
— — — par les trypanosomes, III, 433.
Pediculoïdes ventricosus en Algérie, III, 39 (fig.).
— — — cause d'une petite épidémie, IX, 771.
— — cause d'érythème ortié, I, 177 ; III, 39 (fig.).
Pediculus vestimenti et fièvre récurrente, I, 174 ; IV, 438.
— — et typhus exanthématique, II, 564.
Pelade en Afrique occidentale française. Enquête, XVI, 428.
— Traitement et étiologie, XIV, 280.
Pellagre en Algérie, I, 383 ; VI, 198.
— aux Antilles, VII, 367.
— importée à Constantinople, XIX, 75.
— familiale autochtone à Constantinople, XIX, 78.
Pénis. Éléphantiasis, XI, 715 (pl.).
Pentatrichomonas (genre) = *Hexamastix* Derrieu et Renaud nec Alexief, VIII, 574.
Perchlorure de fer dans l'éléphantiasis, II, 360.
Perdrix. Microfilaire, VI, 366.
Pericoma, XII, 54.
Periplaneta orientalis. Protozoaires rencontrés dans l'intestin de —, XV, 8.
Péripneumonie contagieuse du bœuf au Tchad, XVII, 200.
Péritoine. Résistance marquée du — chez un indigène de la Côte d'Ivoire, XXI, 177.
Pérou. Actinomycose humaine, VII, 380 ; VIII, 571.
— Blastomycose humaine, VIII, 90 ; IX, 21, 756.
— Dysenterie bacillaire à Arequipa. Première constatation, XI, 268.
— — à *Trichomonas*, VI, 120.
— Fièvre ondulante, V, 454.
— Leishmaniose cutanée américaine, VI, 237, 545.
— Mycoses, XIII, 663 (fig.) ; XVII, 917.
— — des rongeurs du genre *Mus*, XII, 350 (fig.).
— Paludisme, XVI, 308.
— Pian, V, 69.
— Trichomoniase vésicale, XIX, 697.
— Trypanosomiase dans les forêts orientales, XII, 723.
— Verruga, XX, 559, 790 ; XXII, 348 ; XXIV, 27.
— Vitiligo et Kcara, XXIV, 219.
— Flagellés de reptiles et de batraciens, XVIII, 58 (fig.).
— *Glyptocranium gasteracanthoïdes*, araignée venimeuse. Etude du venin, X, 136.

— Hémogrégarine de *Phyllodactylus gerrhopygus*, X, 873, 878 (fig.).
— *Latrodectus mactans* ou Lucacha. Étude clinique et expérimentale de l'action du venin, XII, 702.
— *Ornithodorus megnini*, X, 773.
— Parasitologie d'Arequipa, XVII, 906.
— Pseudo-méloïdes employés en thérapeutique, XVI, 615.
— *Pseudo-meloë cockerelli*, n. sp., insecte médical, XIX, 198.
Perrier (Edmond). Éloge, XIV, 445.
Perse. Affection humaine fébrile transmise par les tiques, XXII, 677.
— Leishmaniose cutanée, II, 91.
— Trypanosomiase animale, XXIV, 89.
Peste en Afrique occidentale française, XIX, 383.
— en Algérie, III, 59.
— — en 1907 : département de Constantine, I, 111.
— — — ville d'Oran, I, 367 ; IV, 549.
— — en 1926 à Oran, XXII, 193.
— — — — Prophylaxie, XXII, 200.
— en Annam (Sud), X, 41.
— au Brésil, à Rio-de-Janeiro, II, 162.
— au Cambodge, IV, 220 ; XVIII, 630 ; XXI, 497
— — à Pnom-Penh, XVI, 668.
— — Formes anormales, XVII, 39.
— — Insectivore réservoir de virus, VIII, 54.
— en Chine, à Sim-lam, V, 303.
— en Cochinchine, Formes anormales, XVII, 39.
— à la Côte d'Ivoire en 1899, XXIII, 891.
— en Espagne, dans le port de Malaga, XVII, 20.
— aux Indes néerlandaises, XIII, 767.
— — — Prophylaxie, XVII, 703.
— en Indochine, IV, 217, 219, 220.
— à Madagascar, XIV, 602, 610 ; XVII, 63.
— — à Diégo-Suarez. Diagnostic *post-mortem*, sérothérapie et vaccination, XIX, 592.
— — en Émyrne, XXI, 598.
— — dans la province de Fort-Dauphin (1924-1926), XX, 106.
— — — de l'Itasy, XIX, 410, 667.
— — à Tananarive, XVI, 503.
— — — Épidémiologie, XXIV, 863.
— — — Recherche de porteurs sains dans la région, XXIV, 748.
— — Influence de la température, XXII, 704.
— — Dépistage *post-mortem*, XVIII, 603.
— — Chloropicrine et dératisation, XVI, 603.
— — pulmonaire. Sa gravité, XIX, 667, 880.
— — — Épidémiologie, XX, 233, 632, 759.
— — — en Émyrne, XIX, 410, 820.
— — — primitive à Tamatave, XXI, 876.
— en Mandchourie, IV, 636.
— au Maroc occidental. Épidémie de — pulmonaire autochtone, XVII, 791.
— — — Importance de *Pulex irritans*, XXV, 958.
— à la Martinique, IV, 164.
— à Maurice, II, 195.
— en Nouvelle-Calédonie, IV, 34 ; VI, 660 ; VIII, 422.
— en Russie, XVI, 467 ; XXIII, 901.
— — Épidémiologie, XVIII, 624.
— au Sénégal, XVII, 65, 718, 834 ; XXII, 368.
— — en 1929. Épidémiologie, XXIII, 474, 737.
— — Évolution, XVI, 372.
— — à Dakar. Épidémie, VIII, 660.
— — — en 1921, XIV, 627.
— — — 1921-1922, XV, 874.
— — — en 1922, XVI, 454.
— — — (Hôpital central), XXV, 671.
— — — XXV, 837.
— — aux environs de Dakar, XXV, 669, 670, 671.
— — à Saint-Louis en 1929. Étiologie, XXV, 597, 941.
— — au Cayor en 1928, XXII, 506.
— — — — Épidémiologie, XXII, 516.
— — — chronique chez un rat, XII, 482.
— au Siam, IV, 224, 351 (c.), 492.
— en Tunisie, I, 165, 167 ; II, 323 ; IV, 213.
— en Turquie, à Constantinople, chez les réfugiés russes de Crimée, XIV, 193.
— Étiologie, XXIII, 563, 564, 899, 901 ; XXV, 941.
— Épidémiologie, XV, 502 ; XXIII, 899.
— La faune des rongeurs et les manifestations pesteuses à Dakar, XVII, 834.
— Épizootie pesteuse dans la région du lac Tamnah (Sénégal). Développement parallèle de la — humaine, XII, 291.
— Filiation de deux cas d'une allure septicémique, l'autre à allure pneumonique, XXV, 933, 1022, 1024.
— Insectivore réservoir de virus au Cambodge, VIII, 54.
— Porteurs de germes, XXV, 940.
— Rongeurs et puces dans la transmission de la —, XXI, 727.
— de l'homme et — du rat. Remarques sur l'interdépendance, XXIII, 448, 451, 455, 899.
— Souche isolée de porteurs sains. Sa virulence comparée, XVI, 54.
— Diagnostic par la ponction du foie, XVI, 501.
— — *post-mortem*, XIX, 405, 592 ; XXV, 399.
— — par examen du sang, XXV, 1012.

— Cause d'erreur due à un bacille anthracoïde, IV, 98.
— Forme anormale du bacille pesteux dans les frottis de foie, XVI, 512.
— Bacille de Yersin et pneumocoque, XX, 643.
— — — et — septicémique, XX, 765.
— Hémoculture, XXII, 234.
— Septicémie précoce suivie de guérison, XIII, 209.
— Conservation des ganglions, I, 547.
— La chauve-souris, animal réactif, XVI, 78.
— Adéno-phlegmon à évolution chronique, XXIII, 997.
— Angine pesteuse avec bubon sous-claviculaire, XXIV, 164.
— Bubon sous-épitrochléen, XXIII, 533.
— Persistance anormale du bacille dans la — bubonique, XV, 759.
— Méningite pesteuse, XVI, 378.
— — cérébro-spinale due au bacille de la — à Dakar, VIII, 92.
— pneumonique, IV, 213, 356, 357, 549.
— pulmonaire à évolution atypique, XVI, 203.
— — à longue évolution, XXV, 176, 177.
— — Longue incubation, XXIV, 904.
— — primitive, XVIII, 16 ; XXII, 234.
— — — Lésions histologiques, XXIV, 388.
— — Traitement, XXI, 600.
— à vomissements noirs, XXIII, 102.
— Étude clinique et thérapeutique. Période endémique oct. 1921-oct. 1922 à Dakar, XV, 874.
— Réceptivité du nourrisson, XV, 920.
— Complications rares, XXIV, 274.
— Cas de *Pestis minor*, XXIV, 446, 448.
— Septicémie due au bacille de la — chez des lapins domestiques, XXI, 299.
— Histoire du masque protecteur, IV, 636.
— Outillage ancien conservé au lazaret de Marseille, IV, 179.
— Organisation du service de prophylaxie à Dakar, XV, 661, 778.
— Prophylaxie, III, 59.
— Sérothérapie, II, 195 ; IV, 213 ; XIX, 592.
— — préventive, XX, 579.
— et sérum antipesteux, V, 459.
— Conservation du sérum, VIII, 424.
— Vaccination, IV, 217, 219, 220 ; IX, 592 ; XIX, 592 ; XXII, 412 ; XXV, 672, 796.
— — par voie buccale, XVI, 469 ; XVIII, 235.
— — du cobaye par les voies cutanée et sous-cutanée, XVII, 471.
— Traitement par le bactériophage, XXIII, 618, 936, 943 ; XXV, 437, 672, 677.
— — par l'iode colloïdal, XIX, 407.
— Monographie, XIV, 513.
— **murine** à Madagascar, en Emyrne, XXIV, 865.
— — — à Tananarive, XVII, 525.
— — — Puces de rat des régions infectées, XVIII, 730.
— — au Sénégal, à Dakar en 1921, XIV, 514, 516.
— — — — chez les muridés et les musaraignes, XVI, 133, 455.
— — en Sénégambie. Cas sporadique de — chronique chez un rat du Cayor, XII, 482.
— — *Pestis minor* expérimentale des rats blancs, XV, 506.
— — La musaraigne réservoir de virus, XVI, 158.
— **aviaire.** Essais de transmission par *Argas persicus*, V, 165.
— **bovine** en Cochinchine, XVI, 425.
— — en Indochine et avortement, XXIV, 74.
— — — Porteurs de virus, XXIV, 51, 74.
— — — Unicité du virus, XXIV, 521.
— — au Tchad, XVII, 196.
— — et coccidiose, XIV, 380.
— — Infection inapparente, XXII, 239.
— — Rôle des sangsues dans la transmission, XXV, 44.
— — Persistance du virus dans les viandes salées, XXV, 287.
— — Influence du virus sur les piroplasmoses des bovidés, XXV, 728.
— — Expériences, XIX, 915 ; XXII, 239.
— — — Teneur en virus de quelques tissus, XXIV, 21.
— — — Sensibilité du lapin, XXIII, 904.
— — Formes de l'immunité, XXII, 242.
— — Sérothérapie, XV, 102.
— — Production rapide du sérum, XIV, 367.
— — Préparation du sérum par injections de pulpes organiques, XXII, 313.
— — Vaccination, XIII, 338 ; XIV, 9, 361 ; XXIV, 789.
— — — par la méthode de Schein (séro-inoculation), XII, 487.
— — — et séro-vaccination, XII, 65.
— **du chimpanzé,** maladie à virus filtrable, XXIV, 140.
— **de coçar.** Voir **Paralysie bulbaire infectieuse.**
— **du cocotier,** XXIV, 146.
— **équine** (« horse-sickness ») au Congo belge, XI, 423.
— — et « heartwater » des ruminants, XI, 426.
— — en Somalie, XII, 485.
— **porcine** à Alger, V, 781.
Pesteux. Coccobacille pseudo- extrêmement virulent, XV, 862.
Pétrole. Action larvicide comparée à celle d'autres produits, XXI, 109.

— sulfo-carboné dans le traitement de la gale du dromadaire, XIII, 547.
Pfeiffer (Bacille de) agent d'une méningite cérébro-spinale, XVIII, 448.
— — Action du « dissodoluargol » de Danysz et de l' « arsolan » sur le —, XIV, 630.
pH. Importance dans la lyse des *Pasteurellæ* du barbone et du choléra aviaire, XXII, 245.
— Rôle dans l'écologie des anophèles, XXIII, 38.
Phacochères. Œstrides au Congo, VIII, 452.
— *Porocephalus armillatus*, XIII, 659 (fig.).
Phagédénisme. Voir aussi **Ulcère.**
— cutané amibien, V, 246, 799.
— et paludisme, XI, 690.
Phagocytose. dans la piroplasmose, IV, 291, 295.
— des trypanosomes, III, 365.
Phaseolus radiatus (Katjang idjou) dans le béribéri, IV, 260.
Phénique (Acide) pur en attouchements dans le traitement du chancre mou et de son bubon, XIX, 314.
Phénolphtaléine adjointe au thymol comme anthelminthique, XXIV, 41.
Philophtalmus gralli, n. sp., III, 251.
Phlébotomes. Voir aussi **Titira.**
— de l'Afrique occidentale, VI, 124, 126.
— d'Algérie, VII, 660.
— — du département de Constantine, XI, 791.
— — en Oranie, V, 541, 780.
— — (Sahara oranais), IX, 486.
— européens, VII, 584 (fig.).
— en France, XIII, 735.
— — Identification, XIV, 21.
— — Détermination spécifique d'une femelle, XIV, 23.
— — en Haute-Alsace, XII, 54.
— — en Aunis, XIX, 705.
— — en Corse, VI, 637 (fig.).
— — — et bassin méditerranéen, V, 780.
— — dans la région marseillaise, XIII, 809.
— — — parisienne, IX, 573.
— — — sud-est, V, 780.
— en Grèce, XXIV, 287.
— en Haute-Volta, à Ouagadougou, XX, 342.
— du Maroc, XIV, 566.
— — à Mazagan, IX, 762.
— du Portugal, XI, 730.
— du Soudan, à Bamako, XX, 474.
— du Turkestan, XXII, 545 (fig.).
— Anatomie, XXI, 159 (fig.), 254.
— Constitution du canal alimentaire, XIX, 709 (fig.).
— et dengue, XXII, 275.
— dengue et fièvre de trois jours, IX, 778.
— et leishmaniose cutanée, XI, 604 ; XVII, 293 ; XIX, 694.
— — — en Mésopotamie, XII, 500.
— transmetteurs de la verruga du Pérou, XXIV, 27.
— Biologie des — en milieu endémique, XV, 80.
— Flagellés, XIII, 143 (fig.).
— Étiologie de la fièvre à —, XIV, 447.
Phlebotomus. Introduction à l'étude systématique des diptères du genre —, XIII, 695.
— *brumpti*, n. sp., XIII, 659.
— *minutus* capturés dans les terriers en rase campagne, XXII, 544.
— — var. *africanus*, insecte transmetteur du clou de Biskra, VII, 577.
— — — Parasitisme chez les reptiles, VII, 83.
— *papatasi* en Corse, V, 710 ; VI, 637.
— — au Portugal, VI, 123.
— — capturés dans des terriers en rase campagne, XXII, 544.
— — Asthénobiose et hibernation provoquées, XXI, 436.
— — Longue durée de l'asthénobiose pseudo-hivernale. Action réactivante de l'athermobiose prolongée, XXI, 107.
— — L'hétérodynamie et le rôle de l'athermobiose dans le cycle évolutif, XX, 613.
— — et fièvre boutonneuse de Tunisie, III, 492.
— — et *Leishmania tropica*, II, 390.
— *perniciosus* dans la Haute-Marne, XVI, 664.
— — dans l'Oise, XVI, 16.
— — dans la région parisienne, XV, 694.
— — en Saintonge, XVII, 894.
— *major*, var. *perniciosus* Newst., hôte du parasite de la leishmaniose canine, XXIII, 724.
— *sergenti*, n. sp. en Algérie, X, 564 (fig.).
— — var. *alexandri*, XXII, 545.
Phlegmons traités par l'autosang hémolysé, XXIII, 120.
Phosphates. Eaux phosphatées, XXIV, 848, 927.
Phosphore. Manque de — cause de maladies du bétail, XX, 947.
— Empoisonnement par le — et fièvre jaune, XXV, 853.
— dans le traitement du paludisme, X, 287.
Photomètre Vernes-Bricq-Yvon dans la réaction de Chopra et Gupta, XXIII, 29
Phytalophora, champignon spécifique de la dermite verruqueuse, XVII, 227 (fig.).
Physaloptère de *Macacus cynomolgus*, V, 390.
Physocéphalose du porc, XXIII, 874.

Pian dans la zone de délimitation A. E. F.-Cameroun, VIII, 124.
— en voie de disparition de certains pays d'Amérique, XXI, 428.
— aux Antilles, VII, 367.
— au Brésil, II, 459 (fig.) ; X, 863 (pl.) ; XXI, 387.
— au Cameroun, XII, 441.
— en Colombie, II, 245.
— aux Comores (Mohéli), XI, 62.
— à Costa-Rica, XVIII, 450 (fig.) ; XXI, 667.
— en France, X, 784.
— en Guinée (région militaire), X, 90.
— à la Guyane française, X, 528 ; XXI, 428.
— à Java. Traitement, XVI, 580.
— aux îles Loyalty, VII, 180.
— à Madagascar, chez un indigène des Hauts-Plateaux, XXIII, 672.
— à la Martinique, IV, 563 ; XXI, 430.
— au Pérou, V, 69 (pl.).
— Le chancre, lésion primaire d'inoculation, XXII, 785.
— et syphilis, I, 484, 487.
— et ostéite hypertrophique, XIII, 315 (pl.).
— Ostéites pianiques « Goundou », XVIII, 4.
— Lésions ostéopériostites, XXV, 1032 (pl.).
— Évolution clinique, XXI, 277.
— Cicatrice pianique ayant oblitéré l'orifice préputial, XXIII, 104 (fig.).
— Présentation d'un malade. Traitement, XXII, 386.
— Boubas dans la région de l'Amazone. Traitement par les arsenicaux et l'émétique, X, 863 (pl.).
— Surinfection, XXV, 869, 946.
— Traitement. Chimiothérapie, XVII, 94, 502 ; XXII, 743, 747.
— — par l'acétylarsan, XIX, 416 ; XX, 209 ; XXI, 745.
— — par le narsénol, XXII, 744.
— — par le stovarsol, XVI, 635 ; XVII, 100 ; XVIII, 437, 661 ; XX, 841 ; XXI, 743.
— — par le « 189 », XV, 528, 607 ; XVII, 95, 96, 99.
— — par l'arsénobenzol (salvarsan), VI, 14, 243.
— — — — cuprique (sel sodique), VIII, 582.
— — par le novarsénobenzol, IX, 760 (fig.) ; XVII, 95, 96 ; XXI, 745.
— — — en injections sous-cutanées, XV, 489.
— — par le sulfarsénol, XVII, 96.
— — par les sels de bismuth, XVII, 97, 100, 502 ; XX, 6 ; XXI, 745, 746.
— — — (salicylate) en émulsion gaïacolée, XX, 6.
— — par l'émétique, XVII, 95.
— — par l'iodosalyl, XIII, 246.
— **bois.** Voir **Leishmaniose américaine.**
Pica chez le canard, XXII, 230.
Pied bot artificiel d'une chinoise, V, 641 (pl.).
Pied de Madura. Voir **Mycétomes.**
Pied végétant du Paraguay. Voir **Leishmaniose américaine** ulcéro-végétante.
Pièges à moustiques, I, 100 ; III, 455.
Pie-grièche. Microfilaire, VI, 360.
Pigment ocre dans le béribéri, I, 425.
— chez les trypanosomes, III, 366.
Pigeons porteurs de dispharages, III, 38.
— spontanément infectés de *Toxoplasma cuniculi*, IV, 518, 721.
— Infection par *Toxoplasma gondii*, VI, 460.
Pinson. *Hæmoproteus*, VI, 518.
— *Leucocytozoon*, VI, 519.
— Microfilaire, VI, 518.
— Trypanosomes, VI, 515.
Pinta. Voir **Dyschromie.**
Piqûres de phlébotomes produisant des accidents locaux, V, 511.
— de tsétsé — — —, VI, 628.
Pirobleu. Voir **Chimiothérapie.**
Piromonas russica, n. sp., XIV, 563.
Piroplasma. Voir aussi *Babesiella.*
— (s. str.) *argentinum*, XIII, 427 (fig.).
— *bigeminum*, II, 120, 293, 384 ; IV, 179, 451 ; V, 87, 482 ; XIII, 430 (fig.).
— — Transmission héréditaire chez *Rhipicephalus bursa*, XXIV, 195.
— *bovis*, XIII, 421 (fig.).
— *bubali*, XVI, 33.
— *caballi.* Transmission à l'âne, XIX, 546.
— *canis*, V, 143 ; VI, 499.
— — de l'Inde, III, 57.
— — Culture, VI, 140.
— *gibsoni*, n. sp., III, 57, 115, 274 (fig.).
— *herpestedis*, n. sp., I, 410.
— *hudsonius bovis*, XIII, 455.
— *mutans.* Voir *Theileria.*
— *ovis*, n. sp. Comparaison avec *Babesiella ovis*, XVIII, 140.
— *parvum.* Influence du froid sur les tiques transmetteuses, I, 451 ; II, 120 ; IV, 179, 451 ; V, 87.
Piroplasmes des bovidés de la Chaonia, VIII, 643.
— — et leurs hôtes vecteurs, XIII, 416.
— — Inoculation directe et transmission par les tiques, XV, 295.
— de la civette au Sénégal, XIII, 649.
— du mouton en Algérie. Morphologie, XV, 789 (fig.).
— de la rupture de rate, XIII, 436.
— anaplasmes et grains chromatiques, XII, 558.
Piroplasmidæ. Position systématique ; priorité du nom *piroplasma*, VIII, 241.
Piroplasmoses en Algérie, XVI, 23.
— au Congo belge (Ouellé), IX, 95, 100.
— d'Indochine, XVI, 30.
— au Soudan, XXII, 349.

— au Tchad, XVII, 204.
— et anaplasmose en Turquie en 1916, X, 723.
— Association des — et *P. annulatum* de Dschunkowsky et Luhs, 1904, XVI, 23.
— **bovines** en A. E. F., au Moyen-Chari, IX, 163.
— — en Algérie, VI, 618, 622 ; XIII, 779 ; XVI, 6, 23 ; XVIII, 721.
— — — et tiques, XXI, 846.
— — — chez les bovidés importés pendant l'hiver, VII, 699.
— — au Caucase. Répartition géographique, XXI, 644.
— — au Congo belge (Stanley Pool), II, 120.
— — à la Côte d'Ivoire, I, 234.
— — au Dahomey, V, 482.
— — en Grèce, IV, 179 ; V, 87 ; XXV, 889.
— — au Maroc. Fréquence des formes latentes, XIII, 733 (fig.).
— — — Rapports avec les — circumméditerranéennes, XIV, 116.
— — — dans la Chaouïa, VIII, 643.
— — en Russie dans le Gouvernement de Pétrograd en 1923, XVIII 48, 50, 51.
— — — — en 1925, XIX, 14, 16, 18.
— — — au Nord du Caucase, XXI, 644.
— — (s. str.) au Turkestan, X, 302, 303.
— — en Turquie, XXIV, 817.
— — bacilliforme. Cas suspects au Congo, X, 172.
— — Accès suraigu en Algérie, XIII, 779.
— — et fièvre bilieuse hémoglobinurique du bœuf d'Algérie, XII, 108, 202.
— — et hématurie, XIX, 686.
— — et virus de la peste bovine, XXV, 728.
— — Hémoglobinurie au cours de la babésiellose, XX, 415.
— — Résistance des globules rouges dans la babésiellose, XIX, 548.
— — Immunisation contre la babésiellose, XIX, 550.
— — Prémunition, XIX, 532 ; XXI, 371.
— du zébu, XXIV, 636.
— des zébus en Tunisie, IV, 451.
— Transmission au buffle des — du bœuf, XXIV, 820.
— **canine** française. Transmission par *Dermacentor reticulatus*. Embolie parasitaire dans les capillaires de l'encéphale, XII, 651.
— — — Transmission par *Dermacentor venustus*, XV, 340 (fig.).
— — de l'Inde, III, 57.
— — en Russie, IV, 110.
— — au Tonkin, II, 380.
— — tunisienne. Transmission par *Rhipicephalus sanguineus*, XII, 757.
— — et splénectomie, V, 143.
— — Immunité active des chiens, VI, 499.
— — Résistance globulaire, IV, 520.
— — Auto-agglutination des hématies, IV, 370.
— — expérimentale. Complications oculaires, XV, 545.
— **équine**, XIII, 460.
— — en Algérie, VI, 571.
— — dans la Loire-Inférieure, XVII, 347.
— — au Maroc, XI, 26, 27.
— — vraie, XXV, 18.
— — — en Grèce, XXV, 889.
— asine en Afrique occidentale, V, 806.
— chez un muleton du Poitou, XVII, 354.
— du chevreuil *Cerculus muntjac*, XVI, 41.
— chez un petit loir *Myoxus avellanarius*, XVII, 881 (fig.).
— chez la mangouste, I, 410.
— **du mouton** en Algérie, XV, 789 ; XVII, 122, 784 ; XVIII, 140 (fig.).
— — — Traitement, XX, 71.
— — au Congo belge, IX, 95, 100.
— ***Traitement*** par le pirobleu, XXIII, 506.
— — des — bovines par l'ichtargan, XVIII, 49, 50, 51 ; XIX, 786.
— — — — par le luargol, XVIII, 49, 50, 52.
— — — — par le protargol, XIX, 41, 789.
— — — — par le salvarsan à l'argent, XIX, 34, 887.
— — — — par le trypanobleu, XVIII, 49, 50 ; XIX, 783 ; XX, 64.
— — — — à *P. bigeminum* par l'arrhénal, XIX, 787.
— — de la babésiellose par l'albargine, XIX, 887 ; XX, 596.
— — — par l'apioplasmine, XIX, 15, 18.
— — — par l'argoflavine, XIX, 889 ; XX, 596.
— — — par l'arrhénal, XIX, 15, 554 ; XX, 596.
— — — par l'ichtargan, XIX, 15, 16 ; XX, 596 ; XXIV, 939.
— — — par le luargol, XIX, 15.
— — — par le protargol, XIX, 15 ; XX, 596.
— — — par les sels d'argent, XIX, 15, 16, 887 ; XX, 595.
— — — par le silbernovarsolan, XIX, 889 ; XX, 596.
— — — — + ichtargan, XX, 596.
— — — par le silbersalvarsan, XIX, 15.
— — — par le trypanobleu, XIX, 783.
— — de la — canine par l'arsénobenzol, IV, 291.
— — — — par le 205 Bayer, XV, 619.

— — de la — équine par le trypanobleu, VI, 571.
— — — — vraie par le trypanobleu, XXV, 18.
— **Nuttalioses** au Turkestan (chevaux, ânes), X, 309.
— — de l'âne en A. O. F., V, 806.
— — du cheval dans le Sud-Annam, IV, 39 ; X, 871.
— — équine au Maroc, XI, 27.
— **Theilérioses** dans l'Est africain (Ruanda), XVII, 637.
— — des grands animaux de l'Ouellé, IX, 95.
— — au Turkestan (bovidés, moutons, chameaux, renards), X, 307.
— — bovine en Algérie, XVI, 6, 23 ; XVIII, 721.
— — — nord-africaine. Traitement par l'antimosan, XXV, 136.
— — — au Congo (?), X, 172.
— — du zébu, XXV, 1049.
— — congénitale, XVIII, 721.
— — Transmission par injection intrajugulaire de tiques, XIX, 725.
— — — de la — sud-africaine par le sang, XXI, 121.
Placenta. Adhérence intime. Délivrance tardive, XXIII, 869.
Plaies de la face dorsale des doigts et des mains par choc sur les arcades dentaires, XVII, 528.
— de guerre au Maroc, XIX, 106.
Plantes médicinales de l'île Maurice et des pays intertropicaux, V, 571.
Plasmodies des oiseaux du Brésil, IX, 259.
Plasmodiidæ. Position systématique, VIII, 241.
Plasmodium. Cultures, XXI, 607 (fig.) ; XXV, 953.
— du paludisme à l'Armée d'Orient, X, 284.
— — Multiplicité des races dans les trois formes, XV, 108.
— *falciparum* ou *præcox*, XIV, 38.
— — essais de culture. Action de l'acide carbonique, XXV, 953.
— — Observations microscopiques, VI, 615 (pl.).
— — Variabilité de la proportion des éléments mâles et femelles, XIII, 167.
— — Morphologie dans un cas d'accès pernicieux, XV, 1010.
— — dans le sang du cordon ombilical, XX, 589.
— — dans le paludisme autochtone, XIV, 266, 268, 272.
— — dans un cas de paludisme autochtone à Rennes, XI, 282.
— — Accès convulsifs remplaçant les frissons dans le paludisme primaire, XI, 364.
— — Raisons de l'absence de l'infection à — en Europe septentrionale, XVIII, 279.
— — et quinio-stovarsol, XXIII, 651.
— — *malariæ* et *vivax* associés dans un cas mortel de paludisme, XV, 104 (pl.).
— *malariæ*. Action de la quinine sur les schizontes, XVIII, 710.
— *vivax* à Koritza (Basse-Albanie), XI, 482.
— — Cas autochtone de paludisme à — en pays basque, XXIII, 726.
— — Action de la quinine sur les schizontes au stade intraglobulaire, XVI, 433.
— — Mode d'action de la quinine, VI, 153.
— — et quinio-stovarsol, XXIII, 651.
— — var. *minuta*, VII, 385 (pl.).
— *epomophori*, n. sp., XIX, 828 (fig.).
— *kochi* au Moyen-Chari (A. E. F.), IX, 161 (fig.).
— — Réveil d'infection chez un singe, I, 187.
— — du *Cercopithecus cephus*, VII, 299.
— *mesnili* du serpent cracheur, VII, 491.
— *minasense*, V, 593.
— *relictum*. Influence du froid sur le développement chez le moustique, XII, 174.
— — Disparition de la virulence chez le moustique après plusieurs mois d'hibernation, XI, 281.
— — ne donne pas une maladie mortelle au moustique transmetteur, XII, 601.
— — Évolution influencée par la température extérieure, XXV, 416.
— — Formes sans pigment ou à pigment très fin apparues au cours de passages par canaris, X, 448.
— — Absence de parallélisme entre l'infection sanguine de l'oiseau et l'infection consécutive du moustique contaminé, XII, 603.
— — Etude expérimentale. Effets de la quinine et d'autres médicaments. Essais de vaccination, XIV, 72.
— — Immunité, X, 550.
— — Prémunition, XIX, 532.
— — et *rouxi* du moineau du Vieux Continent et *Pl. cathemerium* du moineau du Nouveau Continent, XXIV, 327.
— *tyrio*, n. sp., XXI, 205.
— d'une chauve-souris, VIII, 729 (fig.).
— — *Nycteris hispida* au Congo belge, XIX, 780 (fig.).
— d'*Iguana medicollis*, X, 95.
— de *Tupinambis nigropunctatus*, XII, 219.
— d'un passereau du Haut-Sénégal et Niger, IV, 526.
Plasmoquine. Voir **Quinoléine** (Dérivés).
Plâtre. Emploi des appareils en — dans les pays chauds, XVIII, 118.
Pneumococcies en Afrique occidentale française, XIX, 388.

— en Afrique orientale parmi les troupes coloniales belges, XII, 147.
— pendant la campagne du Cameroun, IX, 590.
— à métastases pulmonaires et extra-pulmonaires chez un tirailleur sénégalais, IX, 7.
— Manifestations cutanées, méningées, généralisées chez les tirailleurs du camp de Fréjus et de Saint-Raphaël, X, 816.
— Complications extra-pulmonaires (néphrite, hépatite) chez les Noirs, les Malgaches en particulier, XI, 159.
— Traitement par les lysats-vaccins, XXV, 64.
Pneumocoque en Afrique équatoriale française, XXV, 58.
— dans les conjonctivites, VII, 19.
— Méningite à — chez les tirailleurs sénégalais, VII, 466.
— — — à Bamako, X, 568.
— et peste pulmonaire, XIX, 671.
— associé au bacille de Yersin dans la peste pulmonaire, XX, 645.
— Action du dissodoluargol et de l'arsolan, XIV, 630.
Pneumocystis carinii, VII, 271.
Pneumonie dans l'Ouadaï, VII, 523.
— Gravité chez les Noirs. Fréquence de la mort subite, X, 774.
— Traitement par le salicylate de soude en injections intraveineuses, XXII, 607.
— — chez les tirailleurs annamites par les injections intraveineuses d'or colloïdal, IX, 275.
— — Sérothérapie, XXI, 596.
— paludéenne, I, 224.
— et trypanosomiase humaine, III, 25.
Poissons d'eau douce de la France. Hémogrégarines, XVI, 353.
— du Paraguay. Parasites, IX, 360.
— Myxosporidiose de *Temnodon saltator*, XXIII, 181.
— Leucocytogrégarine, X, 99.
— Nouveau nématode parasite, XIX, 798 (fig.).
— larvivores, XXIII, 56, 129.
— — dans la prophylaxie des maladies à moustiques, XX, 476.
— — (*Lebistes reticulatus*) de la Guadeloupe. Biologie, XXV, 248.
— vénéneux, II, 214.
— venimeux, XXV, 188.
— — Prophylaxie et traitement des piqûres, XXV, 189.
— vivant, corps étranger du pharynx, V, 41.
— Action sur des — marins des venins de vipère aspic et de céraste, XXV, 189.
Polydactylie chez un Ouolof, XVI, 369 (fig.).
Polynévrite. Epidémie de — simulant le béribéri, IX, 634.
— observées à l'hôpital indigène de Cholon, janvier-août 1926, XX, 33.
— des poules, V, 54.
Poliomyélite antérieure aiguë à Madagascar, XXIII, 554.
Polytoma uvella dans l'intestin de l'homme, XVIII, 188.
Ponction lombaire. Tolérance des Noirs congolais à la —, XXII, 257.
— — et trypanosomiase humaine, XXII, 784 ; XXIII, 23, 77, 222, 289, 307, 582, 640 ; XXIV, 534, 658, 758, 826, 831, 834.
Ponos et *Leishmania* en Grèce, II, 261 ; IV, 178.
Porcins et conservation des ectoparasites humains dans les régions chaudes, IX, 768.
Porcs. Charbon bactéridien au Maroc, XIV, 359.
— Coccidiose, XV, 160 ; XIX, 263.
— — (*Eimeria brumpti*, n. sp.) en France, XIV, 645 (fig.).
— — en Russie, XX, 215.
— — du porc sauvage, XXV, 1046.
— Corps étrangers du foie, XXIV, 620.
— Cysticercose, XXIII, 880.
— Epizootie de gorets au Congo, VIII, 360.
— Filariose, IV, 386, 482, 485.
— Hydronéphrose à Madagascar, XXV, 378.
— Intoxication par le jus de férule, XIX, 22 (fig.).
— Maladie expérimentale due à *Bacillus asthenogenes*, XVIII, 65.
— Néoformation osseuse de nature métaplasique, XXIV, 619.
— Peste des — à Alger, V, 781.
— Physocéphalose de l'estomac, XXIII, 874.
— Septicémie contagieuse au Maroc, XI, 117.
— Spirochétose cutanée, XIX, 86.
— Stéphanurose et son agent, XIV, 47, 219.
— — en Nouvelle-Calédonie, XV, 819.
— Télangiectasie parasitaire du foie et de la rate, XXIV, 611.
— Trypanosomiases, I, 523.
— — en A. E. F., XXI, 152.
— — au Congo belge, XXV, 906.
— — en Guinée française, XIII, 792.
— — et surra d'Indochine, VI, 690.
— — Infection comparée par *Tryp. gambiense* et *Tryp. rhodesiense*, V, 492.
— Fréquence des amibes iodophiles chez le — en France, XIV, 321 (fig.).
— Présence d'amibes non iodophiles — —, XV, 390 (fig.).
— *Fasciolopsis buski*, IV, 200.
— Helminthes en Annam, IV, 693.
— — en Cochinchine, VI, 41.
— — en Haute-Guinée française, XIII, 180.
— Insectes et acariens ectoparasites au Congo belge, IX, 763.

— Microfilaire en Annam central, V, 623.
— Nématode à Java, XI, 708 (fig.).
— Puce de l'homme. Le — hôte électif, XVIII, 191.
— Strongylidé nouveau : *Bourgelatia diducta*, n. gen., n. sp., XII, 324.
Porocéphales. Mode de développement et hôtes nouveaux, XXII, 255.
— Fréquence chez les Noirs de l'Afrique occidentale, XII, 92.
— Larves de — dans le foie d'un tirailleur noir, XI, 262.
— Infection naturelle de la genette du Sénégal par des larves de —, XV, 621 (pl.).
— et lymphadénie tuberculeuse, XV, 951.
Porocephalus armillatus. Évolution biologique, XIII, 656.
— — chez un tirailleur malinké, XI, 60.
— *moniliformis* au Congo, VII, 497, 502.
Porteurs d'amibes, II, 78 ; IV, 117.
— sains de vibrions cholériques. Essais de traitement, VI, 306.
Porto-Rico. Voir aussi **Antilles.**
— Mycologie du canal intestinal et sprue, XXII, 58.
Portugal. Bilharziose, XV, 805 ; XVI, 491 ; XX, 350.
— Fièvre à phlébotomes, VI, 123.
— Spirochétose broncho-pulmonaire, XV, 284.
— Hématozoaires des sauriens, I, 595.
— *Leptomonas* parasites des euphorbes, IV, 532, 669 (fig.).
— *Leucocytozoon* des oiseaux, V, 17, 82, 173, 333.
— Phlébotomes, VI, 123 ; XI, 730.
— Trypanosomes non pathogènes dans le sang des bovidés, V, 603, 725.
Poules. Voir aussi **Oiseaux.**
— Absence des anses intestinales, XVII, 508.
— Coccidiose en Russie, XXIII, 714.
— Distension énorme du gésier, XVI, 221 (fig.).
— Empoisonnement par le lantana, III, 52, 261.
— Méningo-encéphalo-myélite au Brésil, IX, 561.
— Myiase des — et puce chique au Congo belge, IX, 763.
— Parasitisme et cachexie, XXIV, 167.
— Spirochétose indéterminée, XXV, 130.
— — dans le Nord du Caucase, XXII, 764.
— — en Grèce, XVIII, 701.
— — au Maroc, XI, 261.
— — au Sénégal, X, 435.
— — au Turkestan, IX, 227.
— Maladie à virus filtrable en Égypte, XXII, 64.
— *Ægyptianella pullorum* chez les — d'Algérie, XXIV, 371.
— Hémocytozoaires, III, 504.
— Leucocytozoon au Tonkin, III, 504.
— Puce chique. Infestation massive d'un élevage, XVI, 593.
— Corps de Balfour, XXII, 316.
— Variations cytologiques du sang, XXII, 766.
— agents destructeurs des larves de mouches, I, 612.
Pouls lent dans la trypanosomiase humaine, VI, 269.
Poumon. Affection subaiguë simulant la tuberculose et guérie par la quinine, XX, 113.
— Formes pulmonaires de la fièvre récurrente, XX, 716.
— Mycétome chez l'âne, VIII, 11.
— Hépatisation chez une souris infestée par des larves de *Strongyloïdes ratti*, XXV, 98.
— Ponction *post-mortem* pour le dépistage de la peste, XVIII, 603.
Poux à Douala (Cameroun), XI, 758.
— des rats de Toulon, XXV, 240, 243.
— Structure de l'appareil génital mâle de *Phtirius inguinalis*, XVI, 416 (fig.).
— Cause de l'action sur le derme de l'homme, XVII, 143.
— Cause de l'apparition des taches bleues chez l'homme, XV, 558, 826.
— et conjonctivite phlycténulaire, XIII, 645.
— dans la fièvre récurrente, I, 174 ; IV, 438 ; XIII, 43.
— — Détails de la transmission des spirochètes, XVIII, 97.
— dans la fièvre des tiques. Rôle négatif, VI, 106.
— dans la lèpre, IV, 243 ; V, 684.
— dans le typhus exanthématique, II, 564 ; XII, 364 ; XIII, 282.
— *Rickettsia prowazeki* parasite des — de l'homme et considéré à tort comme l'agent causal du typhus exanthématique, XI, 249.
— — — Poux infectés, XXV, 187.
— Transmission expérimentale au singe du spirochète de la musaraigne par les —, XXI, 173.
— Moyens de destruction, XVI, 101.
— — — des — de corps par le crésyl et le brossage, VIII, 280.
— — — — par les essences, VIII, 370, 470.
— des dindons de Java, XVI, 594 (fig.).
Prémunition et immunisation ; prémunir et immuniser, XVII, 37.
— XXII, 887.
— et bartonelloses, XXIII, 173.
— et protozooses sanguines, XIX, 532.
Prépuce. Calculs multiples, XXII, 623.
Président. Élection ajournée, IV, 654.
Pression artérielle et viscosité sanguine chez les paludéens, XIX, 540.
Prévention contre les infections à *Trypanosoma gambiense*, I, 210 ; II, 402 ; III, 732.

Prévôt (A.). Éloge, XIX, 165.
Primates. Voir aussi **Singes.**
— parasités de trématodes, V, 833.
— Distome, VI, 256 (fig.).
Primet (E.). Éloge, XXI, 1.
Prisonniers. État sanitaire d'un camp en Allemagne, VIII, 547.
Prix fondés par la Société médico-chirurgicale de l'Ouest africain, XVIII, 677.
— biennal créé par la Société de Pathologie exotique, XX, 206, 303.
— Lauréats. Voir ce mot.
Progynopylidium monoophorum, XXI, 245.
Prophylaxie du béribéri, IV, 498.
— du choléra, IV, 358 ; V, 4, 167, 297 ; VI, 306 ; VII, 447.
— de la fièvre jaune. Voir **Fièvre jaune.**
— de la lèpre. Voir **Lèpre.**
— du paludisme. Voir **Paludisme.**
— de la peste, III, 59 ; IV, 164, 217, 219, 220, 492 ; V, 303.
— de la syphilis, VI, 102.
— des trypanosomiases animales. Voir aussi Trypanosomiases animales.
— — — III, 235, 380 ; IV, 56 ; V, 380.
— de la — humaine. Voir Tryp. humaine.
— de la tuberculose. Voir aussi Tuberculose.
— — VI, 67, 291, 368.
— du typhus exanthématique, III, 764 ; V, 744.
Prostatite aiguë. Traitement par l'émétine, XI, 402.
Protéolytique (Action) du venin, VI, 52.
Protéosomes. Voir **Plasmodiés.**
Protozoaires. Coloration, XXIII, 787.
— Cultures, XVIII, 260, 261, 306.
— et éosinophilie, II, 29, 32.
— nouveau du bétail : *Anaplasma marginale* n. gen., n. sp., III, 135.
— intestinaux, II, 425 ; IV, 147.
— — Rôle des mouches dans la dispersion, XI, 166.
— — au Cameroun, XII, 244.
— — et sanguicoles observés en Guinée française, VI, 612.
— du sang, VI, 156.
— parasites du lapin, IV, 373.
— de l'intestin de l'homme en dehors de l'organisme de l'homme, XVIII, 306.
— — du bétail, III, 293.
— — des mouches, III, 264.
— — — capturées sur les euphorbes, XV, 970 (fig.).
— — des rats d'égouts, XVIII, 311.
— de l'estomac du mouton, III, 297, 298 (fig.).
— des hématies de la taupe, IV, 544, 660.
— nouveau du lapin : *Toxoplasma cuniculi*, II, 462.
— dans le papier annamite, I, 297.
— phytoparasites, XVIII, 251.
— Recherches biochimiques sur la nutrition des —, XXV, 282.
— Action des substances hémolytiques sur les —, les spirochètes et les vibrions, I, 121.
Prowazek (S. von). Éloge, VIII, 159.
Prowazekia cruzi, XI, 369.
— *ninæ kohl yakimov*, n. sp., X, 101 ; XIV, 550 (fig.).
— — dans les eaux de la Néva, XV, 12.
— — à Pétrograd pendant les épidémies de 1919-1921, XVIII, 189.
— *weinbergi*, VI, 708.
Prunier d'Amérique (*Chrysobalanus icaco*) dans le larbish, XXIV, 163.
Pseudophyllidea trouvés chez l'homme, XXII, 115.
Pseudomeloë cockerelli, n. sp., insecte médicinal du Pérou, XIX, 198.
Pseudo-rage. Voir **Paralysie bulbaire infectieuse.**
Pseudo-tuberculoses mycosiques chez les Chinois de Canton, III, 488.
Pseudo-typhus en Annam, XVI, 105.
Psorophora. Nouvelle espèce, II, 162.
Publication des travaux, notes et mémoires dans le Bulletin, VI, 101.
Puces des rats d'Algérie, I, 111 (c., fig.), 367.
— des rongeurs au Congo belge (à Stanleyville), XXII, 661.
— en France. Foyer de développement de *Xenopsylla cheopis* à Paris. Biologie, XXI, 227.
— des rats à Brest, XXV, 285.
— — à Toulon, XXV, 238, 243.
— — à Madagascar. *Synopsyllus fonquerniï*, n. gen., n. sp., XXV, 327.
— — — (à Tananarive), XXV, 383, 962 (pl.).
— de la région de Tananarive, XXV, 381, 542.
— domestiques à Tananarive, XXV, 710.
— des indigènes marocains. Détermination spécifique, XVIII, 149.
— au Sénégal. *Synosternus pallidus*, — — domestique dominante dans certaines régions pesteuses, XXIV, 551 (fig.).
— — P. des rats et peste, XXV, 944.
— de la région du Cayor, XXIII, 474.
— des rongeurs du Cayor, XXII, 514.
— Appareil buccal, XX, 467.
— Invasion domiciliaire par *Ceratophyllus fasciatus*, XXIV, 383.
— de l'homme chez le porc, hôte électif, XVIII, 191.
— *Ctenocephalus canis* parasite du mouton, XVIII, 755.
— et leishmaniose, V, 93, 814.
— et leishmaniose canine, V, 595 ; VI, 578.
— dans la lèpre, I, 288 ; IV, 243 ; V, 683.

— Rôle dans la peste, XXV, 601, 944.
— avec bacilles de la peste dans l'intestin, I, 367.
— et manifestations pesteuses à Dakar, XVII, 834.
— du rat des régions pesteuses de Madagascar, XVIII, 730.
— et rongeurs dans la conservation et la transmission de la peste, XXI, 727.
— Importance de *Pulex irritans* dans les épidémies de peste au Maroc, XXV, 958.
— de spermophiles et peste, XXIII, 901.
— et variole, III, 98.
— des rats et virus exanthématique, XXV, 285.
— *Xenopsylla cheopis* hôte intermédiaire probable de *Gongylonema neoplasticum*, XXI, 104 (fig.).
— Infection des mammifères par les flagellés des —, VII, 605.
— — naturelle de la souris par les flagellés de *Ctenopsylla musculi*, XV, 405.
— *Herpetomonas* de *Ctenopsylla musculi*, VIII, 266.
— Evolution des trypanosomes chez les —, VI, 167.
— *Herpetomonas ctenocephali* de la — du chien, XII, 310 (fig.).
— *Leptomonas* de la — du chien, XII, 313, 665.
— Infection leishmaniforme produite chez la souris par l'inoculation des fèces de *Ctenopsylla musculi*, XV, 407.
— Culture des parasites leishmaniformes obtenus chez la souris par inoculation des fèces de *Ctenopsylla musculi*, XVI, 14.
— Stades probables de développement d'*Hæmoproteus chelidonis* chez *Ceratophyllus hirundinis*, XV, 13 (fig.).
— Etude zoologique des — et des rats à Pnom-Penh, XVII, 372.
— Destruction, IV, 224.
— Piège à —, XV, 39.
— Le mouton, piège à —, XV, 416.
— Répulsion pour le mouton, XVI, 96.
— **chique** à Douala (Cameroun), XI, 758.
— — parasite des rats en Chine : *Dermatophilus lagrangei*, n. sp., XVIII, 399.
— — parasite des porcs au Congo belge, IX, 763.
— — et accidents septiques à Mohéli (Comores), XI, 62.
— — de la poule (*Sarcopsylla gallinacea*) parasite du rat, XVI, 592.
— — — Infestation massive d'un élevage, XVI, 593.
Puériculture et lait condensé en Nouvelle-Calédonie, V, 231.
Pulex irritans, var. *fulvus* chez deux carnassiers du Maroc, XXV, 960.
Pulex serraticeps transmettant la Leishmania de chien à chien, V, 593 ; VI, 578.
Punaises. Voir aussi *Cimex*.
— dans la fièvre récurrente, I, 175.
— et *Leishmania*, V, 817.
— dans la lèpre, I, 288 ; IV, 242 ; V, 677.
— et onchocercose, XVII, 414.
— Evolution des trypanosomes chez les —, VI, 167.
— Culture du trypanosome du gecko chez la —, XI, 387.
— Transmission de *Trypanosoma cruzi*, VI, 172.
— Importance du cannibalisme et de la coprophagie pour la conservation des trypanosomes, VII, 702.
— des lits. Adaptation spontanée aux rongeurs domestiques, XXI, 224.
— — Eclectisme parasitaire. Son entretien aux dépens des reptiles, XI, 382, 603.
— du chou. Flagellose, XV, 163 (fig.).
— — Flagellés, XVI, 319 (fig.).
— des euphorbes. Spirochétose des — et du latex, XIV, 205.
Pupillaire (Inégalité), signe possible d'abcès du foie, I, 421.
Purpura hémorragique dans le paludisme, I, 478.
Pyocyanique (Maladie) à la Guyane française, IX, 395.
Pyodermite guérie par l'antivirus de Besredka, XX, 546.
— rebelle guérie par l'antivirus de Besredka, XXII, 731.
Pyohémies à abcès profonds, XV, 459.
Pyomyosite, pyohémie atténuée avec localisations intramusculaires chez les indigènes de la région de Bamako, XI, 822.
— à la Côte d'Ivoire. Traitement par l'iodure de potassium, XVI, 710.
— maladie humaine à *Pasteurella*, XIII, 398.
Pyothérapie des blessures de harnachement aux colonies, X, 901.
— Traitement de la lymphangite épizootique, X, 681.
— — — — Variations leucocytaires, XI, 416.
— — — — Préparation du pyovaccin, XI, 10.
— Efficacité et non-spécificité de la — anticryptococcique chez le cheval, XI, 12.
— dans la lymphangite ulcéreuse, XI, 683.
— **aseptique,** XI, 17.
— — dans la lymphangite épizootique, XIII, 641.
— — dans le typhus exanthématique, XV, 387.
Pyretophorus atheniensis, n. sp., XXIV, 129 (fig.).
— *chaudoyei*, XI, 291, 549 ; XII, 53, 182.
— *costalis* et paludisme, II, 34.

Pyréthrine en solution alcoolique (chrysémine) dans l'ankylostomiase, XXII, 23.
Pyridine et dérivés. Action sur les moustiques, I, 605.

Q

417 Fourneau. Voir **Arsenicaux.**
Quimperia lanceolata, n. gen., n. sp., XIX, 798 (fig.).
Quinetum. Voir **Quinine.**
Quinine. Importance du choix de l'heure dans l'administration, XI, 871.
— Posologie infantile, XVI, 436.
— (Chlorhydrate de —). Dose limite pour le calfat, VI, 642.
— Tannate de — chez les enfants, III, 541.
— dans la balantidiose, XI, 559.
— et fièvre bilieuse hémoglobinurique, I, 406 ; III, 104 ; IV, 307, 308 ; VIII, 597 ; XXII, 739, 742.
— dans la fièvre ondulante, I, 476, 544.
— dans l'hémoglobinurie, XVIII, 289, 590.
— curative dans le paludisme, I, 406 ; II, 225, 450, 454 ; VI, 743 ; VII, 25 ; XI, 691 ; XV, 169, 237, 293, 837, 962, 1016 ; XVI, 81, 273, 308, 486 ; XVII, 101, 279, 310, 506, 660 ; XVIII, 28, 230, 289, 326, 710, 715 ; XIX, 26, 185, 282, 340 ; XX, 918 ; XXII, 555 ; XXIV, 646.
— — — Mode d'action sur les diverses formes d'hématozoaires, XI, 648, 699.
— — — Valeur thérapeutique, XVII, 332.
— — — en injections intraveineuses, XIII, 748.
— — — Action sur les hématozoaires, VI, 153, 336.
— — — Action sur les schizontes de *Pl. vivax* au stade intraglobulaire, XVI, 433.
— préventive dans le paludisme, III, 626 ; VI, 743 ; VII, 25 ; XI, 645 ; XVII, 875, 880 ; XVIII, 7, 29, 33, 42, 153, 268, 272, 683 ; XIX, 190, 340 ; XX, 919 ; XXII, 555.
— — — Contrôle au moyen du réactif de Tanret, XIX, 190.
— Essais de quininisation préventive et curative au Cameroun, XXII, 555.
— et prophylaxie du paludisme au Tonkin, VI, 743 ; VII, 25.
— comparée à la cinchonine et au quinetum, XVIII, 770.
— dans le paludisme des oiseaux, XIV, 72.
— dans le traitement des pyrexies, XVII, 941.
— Affection pulmonaire simulant la tuberculose guérie par la —, XX, 113.
— et « 606 », III, 708.
— associée à l'arrhénal dans le paludisme, XIV, 109.
— — — et à l'iode dans le paludisme, XIX, 283.
— — à l'arsénobenzol dans l'infantilisme palustre, XI, 691.
— — au 710 Fourneau dans le paludisme, XXV, 1074.
— — — — et au stovarsol dans le paludisme, XXIV, 378.
— Préparations diverses, II, 434 ; III, 543 ; IV, 275.
— (Dérivés de la —). Voir aussi Quinetum, Quinoléine.
— Stovarsolate de — dans le paludisme, XX, 408, 665, 727 ; XXI, 625 ; XXII, 137 ; XXIII, 651 ; XXIV, 335, 646.
— — associé au 710 et au 574 dans le paludisme, XXV, 1074.
— Séroquinol dans l'accès pernicieux, XXV, 842.
— Iodure double de — et de bismuth dans la leishmaniose américaine, XVIII, 634.
— Action des sels doubles de — et d'urée sur les verrues, XXV, 326.
— en comprimés, XVI, 567.
— Insolubilité de certains comprimés, XVII, 93.
— — des comprimés et insuccès de la quininisation préventive, XV, 293, 674, 686, 690, 777, 870, 959.
— Élimination de la — absorbée sous forme de comprimés dragéifiés, XVI, 21.
— Le sort dans l'organisme, XVII, 311.
— Passage dans le lait maternel, XXI, 466.
— Dosage dans les urines, XX, 591, 972.
— — instantané dans l'urine par échelle opacimétrique, XVIII, 773.
— Élimination urinaire de la — en solution ou en suspension huileuse, XI, 662.
— Inconvénients que peut présenter le traitement quinique appliqué avec trop de rigueur, XI, 80.
— Intoxication aiguë, XXIV, 184.
— Nécrose des muscles fessiers à la suite d'injections hypodermiques, X, 162.
— Anaphylaxie ; ses variations suivant la voie d'absorption, XIII, 394.
— — anti-anaphylaxie et désensibilisation, XIII, 556.
— Hémato-hémoglobinurie due à la —. Traitement par le novarsénobenzol, XIV, 78.
— Intolérance prévenue par le chlorure de calcium, II, 269.
— Considérations hématologiques sur deux cas d'accès pernicieux comateux à *Pl. præcox* traités par la —, X, 492.
— et grossesse, III, 629 ; XI, 841.
— dans le cas d'avortement menaçant

au cours d'un accès pernicieux, XIV, 535.
— à bon marché. Nomination d'une commission, I, 388.
— — Rapport de la commission, II, 225.
— Lettre du Ministre des Colonies, II, 450 ; III, 109.
— d'État. Lettre du Résident supérieur en Annam, IV, 651.
— — en Annam, VI, 730.
— en Tunisie, II, 450.
— Règlement concernant la vente en Algérie, I, 534.
— — — — dans l'Inde anglaise, I, 531.
— — — — en Indochine, III, 109, 626.
— Quinetum. Action thérapeutique comparée à celle de la —, XVIII, 770.
Quinoléine. Action sur les moustiques, I, 605.
— Désinfection culicidienne par la —, V, 556, 739.
— (Dérivés de la —). Plasmoquine dans le paludisme, XX, 727, 728 ; XXIV, 101, 646, 649 ; XXV, 942.
— — Quinoplasmine dans le paludisme, XXIV, 646.
— — 710 Fourneau dans le paludisme, XXIV, 93.
— — — associé à la quinine et au stovarsol dans le paludisme, XXIV, 378.
Quinoplasmine. Voir **Quinoléine** (Dérivés).
Quinquina. Voir aussi **Quinine.**
— en nature pour la cure du paludisme chez les hémoglobinuriques, XI, 845.
— Action curative des alcaloïdes sur le paludisme, XII, 307.

R

Races de trypanosomes résistants aux anticorps, III, 368.
Rachicentèse. Voir **Ponction lombaire.**
Rachidienne. Thérapeutique intradans la trypanosomiase humaine, VII, 63, 257 ; XV, 59.
Rachitisme. Enquête en Afrique occidentale, XVI, 428.
— Radiographie, XXIII, 342.
Radiateur photothermique et diarrhée de Cochinchine, IV, 155.
Radiation des membres associés et correspondants de nationalité germanique, XII, 243.
Radiographie. Lésions osseuses précoces dans la lèpre, VII, 2.
— Ostéo-périostite du radius et lésions osseuses du poignet, XIX, 312 (fig.).
— d'un ulcère et d'un cancer de l'estomac, XXV, 789.
— d'un cas de rachitisme, XXIII, 342.
Radiologie des abcès du foie, I, 38, 79.
Radiothérapie comme excitant dans le traitement du paludisme, XVI, 244.
Rage humaine en Haute-Volta, XXIII, 702.
— en Afrique équatoriale française, XXIII, 703 ; XXV, 191.
— — — — canine, XXV, 1018.
— — occidentale française, XIV, 6 ; XX, 404 ; XXII, 907 ; XXIII, 467, 857.
— — — — Unicité, XXIV, 154.
— — — — Transmission à l'homme et au guépard, XXII, 635.
— — — — en Guinée (à Kindia), XXIV, 145.
— — — — au Sénégal, III, 351 ; XIII, 16 ; XVI, 4.
— — — — au Soudan, XIV, 368.
— à Madagascar. Histoire au point de vue vétérinaire, XXV, 790.
— et virus rabique au Maroc, XXV, 289.
— et mal de Caderas des bovidés au Paraguay, XXV, 590.
— atténuée (accidents paralytiques et hyperesthésie cutanée) au cours du traitement, XVI, 417.
— Accidents au cours de passages de virus, XVII, 511.
— Paralysie mortelle chez un chien au cours d'un traitement antirabique prolongé, XVI, 599.
— Egagropile chez un chien mort de —, XXV, 175.
— Virus de rue renforcé recueilli au Maroc, XVII, 538.
— Identité du virus de Brazzaville et du virus fixe, XXV, 191.
— et oulou-fato, XXII, 635 ; XXV, 118.
— Virus de l'oulou-fato isolé chez l'homme, XXIV, 931.
— Transmission expérimentale de la — à partir du virus d'un chien « fou » en Haute-Volta, XXIII, 857, 888.
— Essai de culture du virus avec protozoaires, XXV, 722.
— et son traitement dans les pays tropicaux, XXI, 790.
— Vaccination au moyen de moelles glycérinées fraîches, XX, 843.
— Hérisson et virus rabique, XV, 779.
— Supposée immunité des chiens sloughis, XIX, 438.
— Virus de la — et venins, XXIII, 886.
— Résistance des batraciens et des serpents, VIII, 13.
— Propriétés vaccinantes de la sécrétion muqueuse des batraciens, VIII, 730.
— Affections simulant la — du chien à Dakar, XVII, 325.
Railliet (A.). Éloge, XXIV, 1.
Ransom (B. H.). Éloge, XVIII. 601.
Rate. Ponction, II, 444 ; XV, 722.

— Technique de la ponction, IX, 444 ; XI, 814.
— — — Méthode pour assurer l'innocuité parfaite, XI, 701 (fig.).
— Ponction pour le diagnostic de la leishmaniose interne, XVII, 477.
— Indice splénique, XV, 510, 765.
— Mesure de l'hypertrophie, XXII, 785.
— Hypertrophie d'origine inconnue et leishmaniose interne, V, 489.
— Mégalosplénie de cause inconnue. Mégalosplénies infectieuses, XIV, 468.
— — et kala-azar autochtone chez les indigènes en Egypte, XV, 843.
— — tuberculeuse primitive, XXIII, 16 (fig.).
— Abcès de la — et fièvre récurrente, XIX, 421.
— déplacée dans un cas de leishmaniose interne infantile, V, 271 (pl.).
— altérée chez les cobayes infectés de trypanosomes, I, 393 ; II, 526.
— Leucémie lymphoïde à type splénique pur, XV, 547 (fig.).
— et paludisme, II, 34, 38, 39.
— — Rupture de la — au cours d'une fièvre rémittente à *Pl. præcox*, XX, 719.
— et piroplasmose canine, V, 143.
Raton. Infection par *Trypanosoma gambiense*, VIII, 749.
Rats. Voir aussi **Rongeurs.**
— d'Alexandrie. *Epymis rattus*, var. *alexandrinus*. Nombre des mamelles, XVII, 589.
— au Cambodge. Etude zoologique des — et des puces à Pnom-Penh, XVII, 372.
— à Madagascar, XVI, 602.
— au Maroc : à Mazagan. Rareté du surmulot, XVIII, 152.
— — Enquête sur les différentes espèces dans les Doukkala, XVII, 584.
— Cancers produits par *Tænia crassicollis*, XVII, 835.
— Coccidiose chez les — blancs, XIX, 428.
— réservoir d'un virus exanthématique, XXV, 283, 286.
— et fièvre ondulante, XVII, 465.
— Lèpre des —, XXII, 17, 440, 537, 758 ; XXV, 1025.
— — — en Nouvelle-Calédonie, V, 463.
— — — Rôle des infections secondaires, V, 466.
— — — Phagocytose des bacilles de Stefansky dans le péritoine des rats et des cobayes, XVII, 208.
— — — Traitement, XXV, 969.
— Peste, XXIII, 448, 451, 455, 564.
— — et — d'Algérie, I, 444.
— — des rats à Tananarive, XVII, 525.
— — Puces des régions pesteuses de Madagascar, XVIII, 730.
— — des rats au Sénégal, à Dakar en 1924, XIV, 514, 516 ; XVI, 133.
— — et — de Tunisie, II, 323.
— — chronique chez un — du Cayor, XII, 482.
— *Pestis minor* expérimentale chez les — blancs, XV, 506.
— Spirochétose cutanée par la morsure du — à Bombay, XI, 188.
— Typhus murin (ou endémique) sur les — des navires de guerre à Toulon, XXV, 673.
— Amibes intestinales, XII, 635.
— *Bacillus duboscqi* chez un — africain *Golunda campanæ*, V, 703.
— Ectoparasites des — de Toulon, XXV, 237.
— Helminthes en Haute-Guinée française, XIII, 181.
— Parasite des hématies, VI, 247.
— Parasites sanguicoles à Stanleyville (Congo belge), XXII, 657.
— Protozoaires de l'intestin des — d'égout, XVIII, 311.
— Puces des — à Madagascar, XXV, 327, 383, 710.
— — — (Voir aussi — et peste).
— *Spirochæta crociduræ* chez les — de Dakar, XI, 22, 64.
— Spirochètes des — d'Alger, XI, 357.
— — des — d'égout en Grèce, XXV, 411.
— Tricocéphalidé à Shangaï, XVII, 658.
— Sensibilité du — blanc à la fièvre boutonneuse, XXV, 406.
— Infection expérimentale par *Herpetomonas* de *Muscæ domesticæ*, VIII, 109.
— — par *Leishmania infantum*, V, 356, 715 ; VI, 110.
— Sensibilité à *Leishmania tropica*, VII, 663.
— Infestation par la puce chique de la poule au Maroc, XVI, 592.
— Infection par *Toxoplasma gondii*, VI, 460.
— — par *Trypanosoma equiperdum*, XIV, 433.
— Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 528.
— de Gambie, animal d'expériences, XXIV, 504.
— palmiste, animal d'expériences, XXIV, 503.
— Association internationale pour la destruction des —, VII, 174.
— Lutte contre les —. Vœu relatif à l'agrandissement du port de Dakar, XIX, 658.
— Campagne de destruction à Cotonou (Dahomey), XVIII, 596.
— Destruction des — dans la vallée du Sous (Maroc), XXIII, 442.
Raynaud (Maladie de) d'origine palustre avec éosinophilie locale, V, 342.
Rayonnement solaire. Absorption par la peau et utilisation dans l'économie animale, VII, 406.
Rayons infra-rouges. Effets sur le venin de la vipère aspic, XXV, 320.

— X dans le diagnostic précoce de la lèpre, XVIII, 757 (pl.).
— — dans le traitement de la leucémie lymphoïde, XV, 517 (fig.).
Réaction. Voir aussi **Cutiréaction, Intra-palpébro-réaction, Ophtalmoréaction, Séro-diagnostic, Séroréaction.**
— d'agglutination dans la fièvre ondulante, VI, 601.
— — dans les trypanosomiases, V, 641.
— du benjoin colloïdal dans la trypanosomiase humaine, XX, 865.
— de Bordet et Gengou. Voir — de déviation du complément.
— de Bothelo dans la lèpre, XXIII, 105.
— de Boveri dans la trypanosomiase humaine, VIII, 261.
— de Chopra et Gupta dans la leishmaniose canine, XXV, 228.
— — et leishmaniose interne, XXII, 77 ; XXIII, 29.
— de déviation du complément dans le béribéri, XIX, 575, 641.
— — dans la lèpre, II, 520 ; VIII, 252, 259 ; XVIII, 378 ; XXI, 187.
— — dans le paludisme, VIII, 258.
— — dans le pian, XXI, 398.
— — dans la syphilis, VIII, 259.
— — dans les trypanosomiases, V, 641.
— — dans la trypanosomiase humaine, I, 26.
— — (Eitner) chez les lépreux et les syphilitiques, VIII, 259.
— de formol-gélification (— de Gaté et Papacostas, — de Napier). Valeur diagnostique, XIX, 127.
— — dans la leishmaniose canine, XXV, 227, 1041.
— — — interne, XX, 600.
— — dans la syphilis, XX, 600.
— — dans la trypanosomiase humaine, XX, 601, 737.
— de Gaté et Papacostas. Voir — de formol-gélification.
— d'Henry (séro-floculation) dans le paludisme, XXIII, 590 ; XXIV, 539.
— — — Rôle du *p*H, XXV, 221.
— — — Application à l'étude épidémiologique, XXV, 310, 314.
— — — « Surfloculation » de certains sérums paludéens, XXV, 314.
— — dans la trypanosomiase camélines et la leishmaniose expérimentales, XXV, 230.
— de Napier. Voir — de formol-gélification.
— de Rubino dans la lèpre, XXV, 543.
— de Targowla dans la trypanosomiase humaine, XXIII, 530.
— de Vernes (séro-floculation) dans la lèpre, XXV, 127, 128.
— — dans les maladies tropicales, XXIII, 31.
— — et syphilis. Indice fourni par la — à Tananarive, XXIII, 257 ; XXIV, 609.
— — et tuberculoses externes ou larvées, XXIV, 793
— — dans la tuberculose, XXV, 549.
— de Wassermann. Voir — de déviation du complément.
— de Weil-Félix et typhus exanthématique, XIII, 108, 281 ; XIX, 766.
— — — — Bactéries utilisées, XIV, 142.
Recklinghausen (Maladie de). Présentation d'un malade, XXV, 1011.
Récurrente. Voir **Fièvre.**
Réduves du Venezuela, VI, 382.
— transmettant une trypanosomiase, II, 304.
Réduvidés. Voir aussi **Conorhines.**
— transmetteurs de *Trypanosoma cruzi*, VII, 132.
— Importance du cannibalisme et de la coprophagie pour la conservation des trypanosomes, VII, 702.
— Emploi pour le xénodiagnostic de la trypanosomiase américaine, XII, 509.
— *Rhodnius brethesi*, n. sp., de l'Amazone, XII, 611.
— — *prolixus*, vecteur de la trypanosomiase américaine au Venezuela, XII, 509.
Règlement de la Société. Modifications, II, 519 ; XV, 674 ; XXIV, 757 ; XXV, 97.
Rein et fonctions rénales dans le béribéri. XX, 39 (fig.).
Relations bio-géographiques des glossines et des trypanosomes, VI, 28.
Renard. Theiléricse au Turkestan, X, 309.
— Infection par *Trypanosoma gambiense*, VIII, 747.
— infecté par *Pulex irritans*, var. *fulvus*, XXV, 960.
Repos et paludisme, II, 572.
Reptiles. Voir aussi *Agama*, **Crocodiles, Serpents.**
— en Algérie dans la région de Béni-Abbès, IX, 485.
— du Paraguay. Parasites, IX, 361.
— Coccidiose des voies biliaires d'un lézard (*Scincus officinalis*), XVI, 408.
— — — — (*Acanthodactylus scutellatus*), XXIII, 186.
— Cysticercoïdes d'un gecko (*Hemidactylus turcicus*), XIV, 20.
— — de *Tarentola mauritanica* et ténias du chat, XIII, 687.
— Filaire et microfilaire, VII, 70, 121.
— Microfilaire d'*Iguana tuberculata*, XI, 395.
— Flagellés observés à Arequipa, XVIII, 58.
— — intestinaux du type *Herpetomonas* du *Chamæleon vulgaris*, de *Chalcides* = *Gongylus ocellatus* et *Tarentola mauritanica*, XIV, 641.
— *Hæmogregarina pettiti* chez *Croco-*

dilus niloticus. Formes de reproduction, VI, 327 (fig.).
— *Hæmogregarina pallida* chez *Psammodromus algirus*, I, 595.
— Hématozoaires au Haut-Sénégal et Niger, VII, 488.
— — du gecko et spécialement *Herpetomonas tarentolæ*, XIV, 323 (fig.).
— Hématozoaires de *Lacerta ocellata*, I, 301.
— — de *Psammodrus algirus*, I, 595.
— Hémogrégarines, IV, 446 ; V, 72.
— — d'*Ameiva surinamensis*, V, 592.
— — de *Boodon fuliginosus*, VII, 575.
— — du crocodile, VI, 327.
— — d'*Iguana tuberculata*, V, 72.
— — d'un iguanidé *Tropidurus torquatus*, XIII, 783.
— — de *Lacerta ocellata*, I, 301 ; II, 295 ; V, 347.
— — de *Lachesis alternatus*, VI, 330.
— — de lézards, V, 592 ; VI, 231.
— — de *Phyllodactylus gerrhopygus*, X, 873.
— — intraleucocytaire d'un saurien *Tupinambis nigropunctatus*, X, 283.
— — et *Plasmodium* d'un saurien *Tupinambis nigropunctatus*, XII, 217.
— — et trypanosome d'un chélonien *Cinixis homeana*, XII, 14.
— *Herpetomonas* de l'intestin d'*Hæmidactylus brookei*, XV, 795 (fig.).
— Nématodes d'*Iguana tuberculata* et de *Testudo emys*, V, 251.
— Parasitisme des phlébotomes, VII, 83.
— *Plasmodium* d'*Iguana nudicollis*, X, 95.
— — de *Tupinambis nigropunctatus*, XII, 217.
— hôtes possibles de la punaise des lits, XI, 382, 603.
— Trypanosome d'un chélonien *Cinixis homeana*, XII, 14.
— Inoculations positives aux geckos de cultures de *Leishmania tropica*, XII, 316.
— Infection de lacertiens par *Leishmania tropica*, VIII, 104.
— Infection de lézards par *Toxoplasma gondii*, VI, 467.
— Culture du trypanosome du gecko chez la punaise des lits, XI, 387.
— Hypothèse du gecko réservoir de virus du bouton d'Orient, XIII, 511.
— *Tarentola mauritanica* réservoir de virus du clou de Biskra, VII, 577.
— Recherches expérimentales sur le rôle du gecko dans l'étiologie du bouton d'Orient, XIII, 508.
— *Leptomonas* de la tarente dans une région indemne de bouton d'Orient, XI, 595.
Requin hôte d'une hémogrégarine, d'un spirille et d'un trypanosome, I, 148.
Résistance aux anticorps de certaines races de trypanosomes, III, 368.
— globulaire et piroplasmose canine, IV, 520.
Réunion (Ile de la). Alcoolisme, II, 333.
— — Béribéri, III, 131.
— — Fièvre bilieuse hémoglobinurique, IV, 118.
— — Maladie de dépigmentation, IV, 227.
Rhinœstrus hippopotami, II, 615 (fig.).
— *phacochœri*, VIII, 482.
Rhinosclérome à Alger, II, 66.
Rhizoplaste des *Leishmania*, V, 812.
Rhizopus equinus, var. *annamensis* pathogène pour l'homme, VII, 430 (fig.).
Rhodnius brethesi n. sp. réduvide de l'Amazone, XII, 611.
— *prolixus* réduve du Venezuela, VI, 382.
— — Nouveau flagellé de —, XIII, 527 (fig.).
Rhumatisme infectieux dans la trypanosomiase humaine, V, 187.
Rhynchomonas luciliæ, III, 300 (fig.), 363, 433.
Rickettsia prowazeki, XI, 249.
Riz et béribéri, III, 9, 13, 19, 65, 70, 116, 118, 122, 123, 128, 285, 317, 352, 544, 624.
— Influence de la sulfuration, XXIV, 751.
Rodhain (J.). Remise de la médaille d'or, XXIV, 874.
Rodrigues (Ile). Lèpre, XIII, 644.
Rongeurs. Voir aussi **Cabiais, Campagnol, Écureuil, Lapin, Lérot, Loir, Rats, Souris.**
— Adénomes de la vésicule biliaire causés par un nématode, XI, 574.
— Germe diphtérimorphe et chromogène isolé du castor, XXIV, 450.
— *Grahamella* chez les — du Caucase, X, 98.
— — dans le sang de *Mus musculus*, XIII, 408 (pl.).
— Hémogrégarine de *Mus norvegicus*, V, 72.
— Lèpre des muridés à la Guyane française, XII, 169.
— *Leucocytogregarina musculi* à Pétrograd, X, 100.
— Mélioïdiose, XXIII, 210.
— Mycose des — du genre *Mus* à Arequipa, XII, 350 (fig.).
— Parasites sanguicoles à Stanleyville (Congo belge), XXII, 637.
— infestés spontanément par la punaise des lits, XXI, 224.
— Toxoplasmose du gondi, XVII, 354.
— et peste, XXV, 599.
— du Cayor et peste, XXII, 541.
— et puces dans la conservation et la transmission de la peste, XXI, 727.
— La faune des — et les manifestations pesteuses à Dakar, XVII, 834.
— Puces de spermophiles et peste bubonique, XXIII, 901.

— Peste des muridés à Dakar, XVI, 133.
— Carpincho réservoir de virus de Caderas, III, 324.
— Mulot réservoir probable du pseudo-typhus en Annam, XVI, 109.
— Sensibilité du — africain *Tachyorectes annectens* au *Trypanosoma pecaudi*, XII, 84.
Ross (Sir Ronald). Éloge, XXV, 861, 929.
Rothschild (Ch. N.). Éloge, XVII, 341.
Roudsky (David). Éloge, IX, 549.
Rouffiandis (V.). Éloge, III, 487.
Rouget nouveau des animaux en Guinée française, VI, 202 (fig.).
Roumanie. Choléra, V, 265.
— Dourine, II, 241.
— Spirochétose des poules, II, 292.
— Typhus exanthématique pendant la dernière guerre, XIII, 269.
— Anophélisme du delta du Danube, XX, 801.
Rouye ou farine de mil concentrée dans l'alimentation du nourrisson, XIX, 155.
Ruelle (E.). Éloge, III, 418.
Rubino (Réaction de). Voir **Réaction de —.**
Ruminants. Voir aussi **Bovidés, Chameaux, Chèvres, Chevreuil, Gazelle, Moutons, Zébus.**
— Coccidiose des petits — en Tunisie, XXV, 710 (fig.).
— Paratyphose, XXV, 204.
— réservoirs du surra en Indochine, I, 575 ; II, 68.
— Œsophagostomiens, VI, 506.
Russie. Anaplasmose des bovidés, XXI, 642.
— — des chèvres, XXIII, 382.
— — des moutons, XXII, 423.
— Bartonnellose des chiens, XXIV, 471.
— Coccidiose des animaux domestiqués, XIX, 262, 427.
— — des bovidés, XXII, 71.
— — du lapin, XIX, 266, 269.
— — des moutons, XXII, 71.
— — des porcs, XIX, 263 ; XX, 215, 588.
— — des poules, XXIII, 714.
— — des renards, XXII, 640, 909.
— Choléra, II, 276.
— « Creeping disease » *Myiasis lincaris*, XV, 555.
— Dysenterie amibienne, X, 125.
— Fièvre ondulante, V, 868.
— Filariose des oiseaux, VI, 592.
— Lambliose du chien, XXII, 80.
— Leishmaniose interne, V, 868.
— Maladie à protozoaires chez les animaux domestiques en Crimée, XX, 418.
— Maladies tropicales, V, 868 (pl.).
— Paludisme, XVI, 71.
— Peste, XVI, 467 ; XVIII, 624 ; XXIII, 901.
— Piroplasmose des bovidés, XVIII, 48, 50, 51 ; XIX, 14, 16, 18, 548, 550 ; XX, 595 ; XXI, 644.
— — du chien, IV, 110.
— Spirochétose des lapins, XXII, 906.
— — des poules, XXII, 764.
— Trypanosomiases : dourine, V, 822 ; XVIII, 54.
— — des chameaux, XVI, 314.
— Anophèles, XIX, 896.
— *Argas persicus*, V, 39, 120.
— Flagellés intestinaux, XIV, 546, 548 (fig.), 555, 556, 557.
— Ixodidés, XV, 41 ; XXI, 644.
— Protozoaires de l'intestin de l'homme pendant les épidémies de Pétrograd (1919-1921), XVIII, 183.
— *Stegomyia fasciata*, VII, 590.
— *Trypanosoma theileri*, VI, 433.
Ruttenia loxodontis, n. gen., n. sp., XVII, 86 (fig.).

S

Saccharomyces pathogène pour le cobaye, XV, 945.
— *granulatus*. Lésions dues au — observées à Tananarive. Guérison par le bleu de méthylène, XV, 53 (pl.).
— (*Para*) *ashfordi* cause de la diarrhée chronique des pays chauds, XIII, 384 (c.).
Sahara constantinois. Exploration scientifique, VII, 416.
Saignée. Instruments des canaques, I, 593.
Saint-Pierre et Miquelon. Alcoolisme, II, 335.
Salanoue-Ipin (H.). Éloge, VI, 479.
Salicylate de soude, toxique, XIX, 859.
— — en injections intraveineuses dans la pneumonie, XXII, 607.
Salive. Propriétés venimeuses de la — parotidienne chez les colubridés aglyphes des genres *Tropidonotus*, *Zamenis* et *Helicops*, IX, 369.
Salm (A. G.). Éloge, XVI, 705.
Salmonella dans la peste des porcs à Alger, V, 781.
Salvarsan. Voir **Arsénobenzènes.**
Sambon (L. W.). Éloge, XXIV, 623.
Sang. Colorations, XIII, 205, 206.
— Groupes sanguins chez les Malgaches de l'Emyrne, XXIV, 247.
— — — et *Tryp. gambiense*, XXIV, 664.
— dans l'ankylostomiase, II, 97, 418.
— Résistance globulaire au cours de la babésiellose bovine, XIX, 548.
— Sédimentation globulaire chez les lépreux, XX, 839.
— Coagulabilité et paludisme, XI, 173.
— Viscosité et pressions artérielles chez les paludéens, XIX, 340.
— Réactions cellulaires au cours du typhus exanthématique, XIII, 742.
— Albumines et cholestérine du sé-

rum chez les paludéens chroniques anamites, XXIV, 724.
— Influence de la cure hydro-minérale d'Encausse sur le chimisme du —, XXIV, 222.
— Variété des voies d'accès des parasites du — à leurs hôtes, XIV, 310.
— Les hémoparasitismes et les hémoporteurs de germes, XIV, 291.
— Recherche du *Trypanosoma gambiense*, I, 126.
— Toxicité comparée du — des serpents, XII, 159.
— auto-hémolysé dans le traitement des phlegmons, XXIII, 120.
Sangsues dans les leishmanioses, VI, 572.
— et onchocercose, XVII, 445.
— et peste bovine, XXV, 44.
— *Trichomonas* de l'intestin de *Limnatis turkestanica*, X, 293.
— Développement d'*Hymenolepis parvula* chez *Herpobdella octoculata*, XV, 46 (fig.).
— Emploi pour le xénodiagnostic des infections à trypanosomes, de vertébrés à sang froid, VII, 706.
— terrestres. Monographie, X, 640 (fig., pl.)
Santonine dans la balantidiose intestinale, XX, 741.
— dans les entérites dysentériformes, XXII, 227.
Sarcosporidiose de l'opossum, III, 543.
Sarigue. Lèpre ou maladie voisine, XXIV, 637.
Saturnisme. Diagnostic par l'examen du sang, XVI, 348.
Sauterelles. Voir **Acridiens.**
Savas (C.). Éloge, XXIV, 253.
Scarlatine à Yunnanfou, XVI, 760, 767.
Schein (H.). Éloge, XX, 942.
Schistosoma bovis. Cycle évolutif, XXIII, 136.
— *hæmatobium* au Congo belge, XIII, 28.
— — et *Bullinus contortus*, hôte intermédiaire, XV, 208.
— — et *Planorbis dufourii*, hôte intermédiaire au Portugal, XV, 806.
— *mansoni* à la Guadeloupe, VII, 75.
— — à la Guyane française, X, 464.
Schistosomiases. Voir aussi **Bilharziose.**
— humaines, II, 486, 538, 612 ; III, 27, 29, 30, 315, 446, 532 ; IV, 45, 627, 684 ; V, 396, 503, 837 ; VI, 260.
— Globuline du sérum au cours des —, XXV, 149.
Schistosomum. Voir *Schistosoma*.
Schyzotrypanum cruzi. Voir *Trypanosoma cruzi*.
Schneider (G. E.). Éloge, V, 245.
Schneider (J. E. J.). Éloge, X, 887.
Schöngastia salmi, n. sp., XVI, 336 (fig.).
Sclérose paludéenne du poumon, I, 536.
Scopulariopsis ivorensis, XI, 308.
— *leproïdes*, n. sp., XV, 654 (fig.).
— *sehnsuchta*, n. sp. aux Indes portugaises, XXV, 295.
Scorbut en Afrique occidentale française, XIX, 390.
— en Mauritanie, III, 745.
— Hématologie, IV, 345, 320.
— Kératoses pilaires préscorbutiques, XIX, 6.
— Stomatite épidémique, XIX, 5.
Scrotum. Éléphantiasis du — au Sénégal, V, 625.
Sécrétion de substances hémotoxiques chez *Necator americanus*, I, 231 ; II, 97, 448, 603.
Sédimentation globulaire dans la lèpre, XXV, 543.
Séguin (T.). Éloge, XXIII, 134.
Selles. Méthode d'enrichissement, XXV, 700.
Sels utilisés par les indigènes de Madagascar. Composition chimique, XXIII, 118.
Sénégal. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Acné varioliforme, II, 434.
— Alastrim, XXI, 87 (fig.).
— Bilharziose, V, 837 ; XVI, 141, 276, 368, 428.
— — intestinale à *Schistosoma hæmatobium*, XXV, 829.
— Choléra (N'diank), V, 753.
— Dengue, XIX, 860 ; XX, 92 ; XXII, 228.
— Diarrhée dysentériforme, XXV, 670.
— Diphtérie, XXV, 669, 670, 674.
— Dysenterie amibienne, XVI, 457.
— Eléphantiasis, V, 625.
— Encéphalite épidémique, XVII, 275.
— Fièvre bilieuse hémoglobinurique, XIII, 677.
— — jaune, XX, 197, 286, 295 ; XXI, 503, 509, 808 ; XXII, 184, 260, 368, 397, 793.
— — — Prophylaxie, XX, 299.
— — récurrente, XIII, 678 ; XIV, 460 ; XX, 441, 700, 826.
— — — à tiques, XXV, 13, 362, 368.
— Fièvre typhoïde à Tiaroye en 1932, XXV, 1109.
— Filariose d'oiseaux, VI, 359.
— Glossite, XVIII, 501 (pl.), 586 (fig.).
— Hépatite suppurée, XXV, 837.
— Ictères épidémiques et spirochètes, XIV, 460.
— Larbish ou Œrbiss des Ouoloffs, VII, 398.
— — — Eosinophilie locale, X, 294.
— Leishmaniose canine, VIII, 162 ; IX, 696.
— Lèpre, XVII, 592.
— Lymphangite épizootique, III, 450.
— Maladies vénériennes. Prophylaxie individuelle, XXI, 847.

— Méningite à pneumocoques des tirailleurs, VII, 466.
— Microfilariose du charognard, XIII, 654.
— Mycétome à grains rouges, XII, 478.
— Oreillons à Dakar, XXV, 837.
— Oxalurie chez les Européens à Dakar, XXII, 734.
— Paludisme, I, 224 ; III, 541 ; XIV, 70 ; XV, 510, 515, 756, 766, 1024 ; XVI, 51, 53, 208, 272, 453 ; XVII, 101, 103, 279, 503 ; XIX, 507 ; XXII, 648.
— Parasitisme intestinal, XV, 1020.
— Peste, VIII, 660 ; XIV, 627 ; XV, 874 ; XVI, 372, 454 ; XVII, 65, 718, 834 ; XXII, 368, 506, 516 ; XXIII, 474, 618, 737 ; XXIV, 448 ; XXV, 597, 669, 670, 671, 837, 941, 1108.
— — Prophylaxie, XV, 661, 778.
— — Vaccination, IX, 592.
— — murine, XII, 482 ; XIV, 514, 516 ; XVI, 133.
— — Épizootie pesteuse, XII, 291.
— Piroplasmose des bovidés, XVI, 60.
— — de la civette, XIII, 649.
— Pneumococcie à métastases, IX, 7.
— Rage, III, 351 ; XIII, 16 ; XVI, 4 ; XVII, 325.
— Spirochétoses humaines, XIII, 672 ; XIX, 860.
— — des poules, II, 285 ; X, 435.
— — sanguine animale à Dakar, XI, 64.
— Stomatites et glossites épidémiques à Dakar, XXV, 1110.
— Tétanos ombilical à Dakar, XIX, 656.
— Trypanosomiases animales, I, 269 ; IV, 189 ; V, 204 ; VIII, 132 ; IX, 805.
— Trypanosomiase humaine, I, 269 ; III, 239 (c.) ; IV, 189 ; VII, 716 ; IX, 723 ; XVIII, 116.
— — — Étude expérimentale sur un trypanosome humain, VII, 716.
— Tuberculose humaine, VI, 14 ; XV, 344 ; XX, 138, 228, 450 ; XXIII, 540, 664 ; XXV, 366, 657, 658, 662, 663, 839.
— — bovine, XV, 356 ; XVI, 207, 381.
— — chez un zébu, XV, 868.
— Tumeurs, XV, 363, 485 (fig.).
— — malignes, XVI, 450 ; XXIII, 109.
— Varicelle, XXV, 669, 671, 837.
— Variole à Dakar en 1922, XVI, 457.
— Anguillule intestinale de l'homme, XIII, 588.
— *Cercopithecus patas pyrrhonotus*, III, 453.
— Coccobacille pseudo-pesteux, XV, 862.
— Glossines, III, 239 ; V, 204 ; VIII, 130.
— — Zones à glossines, IX, 802.
— Microfilaires d'oiseaux, X, 106.
— Moustiques à Dakar en 1931, XXV, 797, 813.
— Œstres des moutons, V, 733.
— Porocéphales, XII, 92.
— *Porocephalus armillatus* parasite des serpents. Son évolution biologique, XIII, 656.
— Infestation massive de la genette par des larves de porocéphales, XV, 621 (pl.).
— Puce domestique prédominante dans certaines régions pesteuses, XXIV, 551 (fig.).
— Puces de la région du Cayor, XXIII, 474.
— — des rongeurs du Cayor, XXII, 514.
— Rongeurs (Faune des) et peste, XVII, 834.
— Spirochètes, XXV, 843.
— — Recherche du sp. ictéro-hémorragique chez les rats de Dakar, XI, 19.
— — *duttoni* et sp. récurrents, XXI, 585.
— — de la musaraigne, X, 280, 694 ; XI, 22.
— — Identité à Dakar du sp. des rats, du sp. de la musaraigne et du sp. récurrent humain, XXI, 472.
— — et ictères épidémiques, XIV, 460.
— *Toxoplasma cuniculi*, IV, 373.
— Trypanosomes et glossines en Casamance, V, 204.
— Hygiène, III, 546 ; XX, 99.
— Renseignements démographiques sur Dakar en 1921, XV, 667 ; XVI, 438.
— L'habitation indigène à Dakar, XIX, 141.
— Le lait d'ânesse dans l'alimentation des nourrissons malades, XVIII, 507.
— Fonctionnement de l'Institut d'hygiène à Dakar, XXI, 329.
— Prostitution à Dakar, XXI, 703.
— Agrandissement du port de Dakar et protection contre les rats, XIX, 657.
— Évacuation des matières usées à Dakar, XIX, 944.
— Désinsectisation du sol des cases, XXV, 539.
— Aliénés à Dakar en 1931, XXV, 820.
— Assistance des aliénés indigènes, XXI, 335.
— Enfance criminelle indigène, XXV, 826.
— Œuvre de sauvetage de l'enfance à Dakar, XXI, 401.
— Œuvre sanitaire de la circonscription de Dakar en 1927-1928, XXII, 368.
— École de médecine indigène de Dakar, XIII, 623.
— Rapport annuel de l'Institut de biologie de Dakar, XV, 189.

710 Fourneau. Voir **Quinoléine** (Dérivés).

Septicémie contagieuse du porc au Maroc, XI, 117.

— à entérocoque de Thiercelin, XXII, 690.
— avec localisation hépatique suppurée due à un germe à l'aspect morphologique de *Pasteurella*, XV, 491, 495.
— polymicrobienne chez un singe atteint d'œsophagostomose, IV, 148.
Serbes. Fièvre spirochéto-plasmodique X, 827.
Serbie. Identité des virus exanthématiques africain et balkanique, IX, 402.
— Recherches expérimentales sur le typhus exanthématique, IX, 341.
Sergent (Edm.). Remise de la médaille d'or, XXII, 629.
Sergentella anthropopitheci, n. sp., XX, 597 (fig.), 705.
— Organisme voisin de — *hominis* trouvé dans des urines sanglantes, XXI, 515 (fig.).
Sergentomyia, n. subgen. du genre *Phlebotomus*, XIII, 696 (fig.).
Séro-diagnostic, des infections à *Tryp. gambiense* et à *Tryp. rhodesiense*, V, 220.
Séro-réaction dans la fièvre, II, 520.
Sérothérapie du béribéri, XIX, 628.
— de la fièvre hémoglobinurique à spirochètes par le sérum de Martin et Pettit, XIX, 351.
— de la fièvre jaune, XIX, 651 ; XX, 391.
— des pasteurelloses, XIII, 496.
— antipesteuse, XV, 900 ; XIX, 597, 667, 823 ; XX, 579 ; XXI, 598, 600.
— de la peste bovine, XV, 102.
— — — Production rapide du sérum, XIV, 367.
— — — Préparation du sérum, XXII, 313.
— antipneumococcique, XXI, 596.
— antitétanique, XIII, 159 ; XIX, 66 ; XXI, 73, 694, 698.
— — intrarachidienne, XXIII, 244.
— — curative, XVIII, 433.
— — — Echec, XXIV, 497.
— dans la trypanosomiase humaine par sérum salvarsanisé ou atoxylé en injections intrarachidiennes, XV, 63.
— dans le typhus exanthématique, XII, 367 ; XIII, 284.
— Réinjections, VIII, 709.
Serpents. Voir aussi **Reptiles** et **Couleuvres,** *Vipera*.
— de la région de Tadla (Maroc), XIX, 560.
— Anatomie comparée de la tête et de l'appareil venimeux, VII, 515.
— Toxicité comparée du sang, XII, 159.
— Propriétés de la salive chez les colubridés aglyphes des espèces *Lycodon aulicus*, *Dentrophis pictus* et *Zamenis mucosus*, X, 474.
— — — chez les colubridés aglyphes des genres *Tropidonotus*, *Zamenis* et *Helicops*, IX, 369.
— Morsure mortelle de *Dendraspis viridis*, XVIII, 353.
— Récolte, conservation et envoi des — et de leur venin, VII, 517.
— Venin de la vipère aspic et rayons infra-rouges, XXV, 320.
— Résistance au virus rabique. Mécanisme, VIII, 13.
— Animaux destructeurs des — venimeux, XIV, 3.
— Coccidiose, XIV, 82.
— — chez deux crotales (*Crotalus terrificus*), XII, 11.
— — intestinale de la couleuvre à collier à *Cyclospora tropidonoti*, n. sp., XVII, 871 (fig.).
— — — à *Cyclospora viperæ*, XVI, 637 (fig.) ; XVIII, 707.
— — — de *Vipera berus* à *Cyclospora babaulti*, n. sp., XVII, 868 (fig.).
— — — *Cyclospora viperæ* parasite de la vipère aspic, XVII, 559.
— — *Coccidium persicum*, n. sp., parasite des voies biliaires de *Tropidonotus natrix*, var. *persa*, XVIII, 23.
— *Hæmogregarina brendæ* chez *Psammophis sibilans*, XIV, 451 (fig.).
— — *cenchridis*, n. sp. chez *Epicrates cenchris*, XXIV, 187.
— Hémogrégarines de *Crotalus terrificus*, XXIV, 190.
— — de la vipère à cornes, XVIII, 393 (fig.).
— — de *Vipera lebetina* d'Algérie, XI, 278 (fig.).
— Helminthes de *Psammophis sibilans* en Haute-Guinée française, XIII, 181.
— *Porocephalus armillatus* parasite des — du genre python. Évolution biologique, XIII, 656.
Sérum. Chauffage du — dans le sérodiagnostic de la fièvre ondulante, XII, 171.
— des trypanosomés, VI, 444.
— — Pouvoir floculant, XXII, 912 ; XXIII, 439.
— — Pouvoir protecteur, VI, 447.
— de lapin traité par trypanosomes desséchés, VI, 179.
— antipesteux comme moyen prophylactique, IV, 245.
— antistreptococcique en applications locales dans l'érysipèle, XXV, 840.
— antitétanique associé à l'urotropine, XXV, 819
— antivenimeux. Variations des propriétés au cours des saignées successives, I, 90.
— — dans les phénomènes tardifs d'envenimation, V, 43.
— pléiothérapeutique pour les colonies, II, 549.
— spirillicide, III, 353.
— normal humain. Sensibilité des try-

panosomes d'origine humaine, IX, 81.
— — — *Tryp. gambiense* resté résistant, VIII, 442.
— — — Résistance du *Tryp. rhodesiense*, V, 367.
— — — et nagana, III, 726.
Sérums normaux. Action protectrice de certains — contre la bactériophagie, XXV, 397.
— dans les affections oculaires, VIII, 404.
— Réinjections, VIII, 709.
Setaria des bovins et des équidés, V, 623.
Siam. Gnathostomose humaine. Œdème ambulant siamois, XV, 854 (fig.).
— Peste, IV, 224, 351 (c.), 492.
— L'Institut Pasteur de Bangkok, XIII, 720 ; XX, 558.
— Ouvrage sur le — publié par le 8e Congrès de la Far Eastern Association of Tropical Medicine, XXIV, 361.
Signe de Kérandel, I, 17.
— de Kernig dans le paludisme, V, 713.
— — dans la trypanosomiase humaine, V, 187.
Simonin. Éloge, XIII, 474
Simulies. Systématique, II, 428.
— de la Haute-Guinée, VIII, 657.
— dans la lèpre, I, 288.
Simulium escomeli, n. sp., II, 428.
Singes. Voir aussi **Chimpanzés, Macaques, Primates.**
— *Chilomastix* du chimpanzé et du macaque, XIX, 794 (fig.).
— Entamibes de la bouche, XXIII, 711 (fig.).
— porteur d'une entamibe et d'un myxomycète, V, 180.
— *Epidermophyton*, V, 60.
— Association fuso-spirochétienne, XXIV, 142.
— Goundou, I, 295 ; II, 216 ; IV, 150 ; XXIII, 478.
— Helminthes, XXIV, 142.
— — en Haute-Guinée française, XIII, 181.
— Helminthiase, I, 181 ; II, 104.
— Hématozoaires, XXIV, 142.
— Herpès, XXIV, 144.
— Infection polymicrobienne et œsophagostomose, IV, 148.
— Lésions osseuses, II, 220 ; IV, 154.
— Microfilaires de *Ateles pentadactylus* et de *Midas midas*, XI, 392.
— *Plasmodium kochi*, VII, 299.
— — — Réveil de l'infection, I, 187.
— Protozoaires intestinaux, XX, 19.
— et streptocoques, V, 60.
— Strongylidé nouveau, VI, 264.
— Toxoplasmose, IX, 467.
— Trématodes, V, 833.
— et trypanosomiase, VI, 587.
— Tuberculose, XXIV, 143.
— Vaccine, III, 496 ; VI, 488 ; XXIV, 144.
— et variole, VI, 488.
— — Immunisation variolique, IX, 669.
— et infections expérimentales. Choix de l'espèce, V, 469.
— Transmission par voie gastro-intestinale du choléra, VI, 482.
— *Macacus rhesus* réceptif au virus amaril d'origine murine, XXV, 866.
— Reproduction chez le — de la leishmaniose naturelle du chien, V, 351.
— Sensibilité à la leishmaniose canine, VII, 481.
— Leishmaniose cutanée expérimentale, IV, 134 ; IX, 265.
— — — — chez *Cercopithecus mona* et *Cercocebus fuliginosus*, X, 291 ; XI, 130.
— — — — chez un chimpanzé *Anthropopithecus niger*, XI, 561.
— — — — chez un mandrill, X, 455.
— réceptifs pour le spirochète de la musaraigne, XXI, 173.
— Infection expérimentale par le virus de la spirochétose ictéro-hémorragique, XIII, 676, 679.
— Résistance de *Cercopithecus lasiopyga petaurista* au *Tryp. gambiense*, XXIV, 372.
— *Cercopithecus ruber* ou *patas*, animal réactif dans la maladie du sommeil, II, 129 ; III, 453 ; VII, 716.
— — — animal réactif de la trypanosomiase humaine brésilienne, V, 723.
— — — Inoculation de *Tryp. cazalboui*, VII, 118.
— — — *pyrrhonotus au Sénégal*, III, 453.
— animaux d'expériences dans les laboratoires coloniaux, XXIV, 502.
— Utilisation en médecine expérimentale, XVII, 10.
— Trois naissances à l'Institut Pasteur de Tunis, XXIII, 596.
— Elevage à l'Institut Pasteur de Kindia, XXIV, 131.
Sira hazo, sel de tiges, XXIII, 119.
— *vondrona*, sel de fleurs, XXIII, 118.
606. Voir **Arsénobenzènes.**
664 Fourneau. Voir **Chimiothérapie.**
Smalarina cremonese. Voir **Mercure.**
Soamine. Voir **Arsenicaux.**
Societa fra i cultori delle malattie exotiche, V, 53.
Société argentine de Pathologie régionale du Nord. Primera Reunion seccional en Jujuy, XIX, 544.
— d'hygiène à la Martinique, V, 572 ; VI, 372.
— internationale de médecine tropicale, I, 315 ; II, 163.
— médicale de Madagascar, III, 485.
— médico-chirurgicale d'Indochine, III, 485.
— — de l'Ouest Africain, filiale de la

Société de Pathologie exotique, XV, 283, 353.
— médico-chirurgicale de l'Ouest Africain. Assemblée annuelle, XVI, 51.
— de Pathologie exotique. Célébration du 25e anniversaire, XXV, 861.
— Royal Society of tropical and hygiene. Adresse présidentielle : Some British and American pioneers in Tropical med. and hyg., XIX, 1.
Sodoku en Guipuzcoa (Espagne), XXIII, 266.
— au Maroc, X, 120.
— en Nouvelle-Calédonie, XIX, 529.
— spirochétose cutanée, XI, 188.
Somalie italienne. Peste équine, XII, 485.
— — Trypanosomiases animales, XIV, 423 (fig.).
Son de riz et béribéri, III, 13, 65, 123, 544, 624 ; IV, 498.
Soudan anglo-égyptien. *Enteromonas hominis* chez un officier anglais, X, 756 (fig.).
— **français.** Voir aussi **Afrique occidentale française, Haut-Sénégal et Niger** (Ancienne colonie du).
— — Affections intestinales, XVII, 944.
— — Amibiase, XVII, 944.
— — Bilharziose, XVII, 720, 833 ; XVIII, 458.
— — Dengue, XIX, 881 ; XXI, 577.
— — Dermatite due à *Haplophyllum tuberculatum*, X, 512.
— — Diarrhée cholériforme des équidés, I, 240.
— — Éléphantiasis, XXII, 449 (pl.), 503.
— — Fièvre jaune, I, 412 ; XIX, 345, 604.
— — — récurrente, XV, 320 ; XVI, 159, 272 ; XVII, 115.
— — Filariose, VIII, 655.
— — Ictère à vomissements noirs, XXII, 612.
— — Onchocercose, XXII, 499 (fig.).
— — Méningites dans la région de Bamako, X, 568.
— — Paludisme, VII, 181 ; XV, 933 ; XVII, 939.
— — Piroplasmoses, XXII, 319. .
— — — bovines, XXII, 320.
— — — canine, XXII, 323.
— — — équine, XXII, 322.
— — — de l'âne, XXII, 322.
— — — ovine, XXII, 322.
— — Rage, XIV, 368.
— — Spirochétose aviaire, II, 288.
— — Trachome, XVII, 746.
— — Trypanosomiases animales, III, 61 ; (Tahaga), XXII, 662.
— — Tuberculose, X, 570 ; XIII, 330 ; XXIII, 542.
— — — bovine, XVIII, 687.
— — Mouches piqueuses, IV, 396 ; V, 828.
— — *Stegomyia fasciata*, I, 484.
— — — et phlébotome à Bamako, XX, 474.
— — Voyage médical, XXIII, 265.
Soufre dans la lèpre, XX, 62.
— Influence de la sulfuration sur le riz, XXIV, 751.
Soulié (Henri). Eloge, XXIV, 516.
Souma. Voir **Trypanosomiases animales.**
Sources thermales et bilharziose en Tunisie, III, 446.
Souris. Voir aussi **Rongeurs.**
— Parasites sanguicoles à Stanleyville (Congo belge), XXII, 657.
— Infection naturelle par les flagellés de la puce *Ctenopsylla musculi*, XV, 405.
— blanches. Flagellés, XIV, 558.
— — hôtes d'*Oicomonas granulata*, XVIII, 310.
— — Inoculation de latex parasités. Abcès du foie expérimentaux, XVI, 162 (fig.).
— — Adaptation du virus amaryl à la —, XXV, 113, 533.
— et fièvre ondulante, XVII, 465.
— Immunité conférée par diverses souches de virus récurrent, XX, 1038.
— et *Hymenolepis nana*, var. *fraterna*, XXV, 99.
— Infection expérimentale par *Herpetomonas muscæ domesticæ*, VIII, 109.
— — — par la leishmaniose canine, XIII, 689.
— — — — naturelle, VI, 683.
— — par *Leishmania infantum*, V, 218, 356, 715.
— Sensibilité à *Leishmania tropica*, VII, 272, 663 ; VIII, 22, 363.
— Leishmaniose expérimentale sur la souris blanche, XI, 205.
— Infection leishmaniforme par l'inoculation des fèces de la puce *Ctenopsylla musculi*, XV, 407.
— Culture des parasites leishmaniformes obtenus par inoculation de fèces de puce, XVI, 14.
— blanche et spirochète du Tonkin, III, 75.
— Infection par *Schizotrypanum cruzi*, V, 598.
— — par *Toxoplasma gondii*, VI, 163.
— — par *Trypanosoma duttoni*, VI, 626.
— — par *Tryp. equiperdum*, XIV, 433.
— Sensibilité aux *Trypanosoma lewisi* et *duttoni*, VII, 528.
— Mode de diagnostic des trypanosomes des — sous l'action de divers médicaments actifs, XVI, 770.
— blanche. Guérison spontanée de l'infection mixte à *Tryp. brucei* et *Treponema crociduræ*, XXI, 345.
— et *Strongyloïdes ratti*, XXV, 98.

— naine (*Mus minutus*). Toxoplasmose expérimentale, VIII, 58.
Sparganose oculaire. Pathogénie, XXIV, 915.
Spasmes laryngés et tænia, X, 180.
Spina bifida, XXI, 259.
Spirillaires (Corps) dans les cultures amibiennes, II, 568.
Spirilles. Voir **Spirochètes.**
Spirillolyse, III, 353.
Spirillum balbianii. Morphologie, I, 151.
— *latapiei*, n. sp., parasite du requin, I, 148.
— *pitheci*, III, 419.
— *theileri*, II, 293 ; III, 73.
Spirobacillus zeylanicus, XI, 271 (fig.).
Spirochæta. Voir aussi *Spirillum*.
— *anatis*, n. sp., XIII, 647 (fig.).
— *balbianii*. Morphologie, I, 151 (fig.).
— *bilio-hæmoglobinuriæ*, n. sp., XV, 699.
— *bronchialis*, XI, 39 (fig.).
— — en Russie, XIV, 633.
— — Caractères, XVII, 899.
— *canina*, n. sp., XVIII, 702 (fig.).
— *crociduræ* chez *Mus decumanus* à Dakar, XI, 22.
— *duttoni* transmis par *Ornithodorus moubata*, I, 577 ; VI, 533.
— — — — *savignyi*, I, 577.
— — Passage dans le sang menstruel, I, 579.
— — Granules, XII, 595.
— — Virulence du cerveau dans l'infection expérimentale, XXIV, 804.
— — Entretien des souches de laboratoire, XXIV, 150.
— — Essais d'immunisation de —, III, 354.
— — et arsénobenzol, III, 647, 648 ; IV, 141.
— — var. *crociduræ*. Persistance dans le cerveau et la rate de la souris infectée expérimentalement, XXIII, 862.
— — — Identité à Dakar du — et du sp. infectant dans la nature *Ornithodorus erraticus*, XXV, 843.
— *gallinarum* transmis par *Ornithodorus moubata*, I, 577 ; V, 63.
— — Essais d'immunisation du —, III, 338.
— *hispanicum*, var. *marocanum*, XXII, 818 ; XXV, 944.
— — — Transport à longue distance, XXIII, 153.
— *ictero-hæmorragiæ* (ou *Leptospira*) chez les rats de Saint-Paul (Brésil), XIII, 561.
— — chez les rats de Dakar, XIII, 676.
— *neveuxi*, n. sp., II, 285.
— *obermeieri*, III, 353.
— *omeliansky*, n. sp., XVIII, 303.
— *pallida*, III, 359.
— *pallidula*, II, 245.
— *periplanetæ*, n. sp., XIII, 331.
— *roubaudi*, n. sp., XXIV, 810 (fig.).
— *vincenti*, XIV, 631.
— *zlatogorovi*, n. sp., XIV, 532 (fig.).
Spirochètes en Amérique, II, 117.
— au Tonkin, III, 75.
— Morphologie, I, 151.
— Action des substances hémolytiques sur les —, les protozoaires et les vibrions, I, 117.
— Passage à travers les muqueuses, XX, 653.
— Faux — dans les liquides souillés de sang, XVII, 307 (fig.).
— et dengue méditerranéenne, XIV, 198.
— de la fièvre d'automne japonaise, XXII, 923.
— et fièvre bilieuse hémoglobinurique, XVI, 297 ; XVII, 294 ; XIX, 345.
— dans le sang d'Européens atteints de fièvre bilieuse hémoglobinurique, XV, 699.
— de la fièvre bilieuse hémoglobinurique et pseudo- — du sang, XVI, 726.
— *Leptospira icteroides* et fièvre jaune, XXI, 70.
— et fièvre à phlébotomes, XIV, 447.
— de la fièvre récurrente, III, 75, 353, 422.
— — — Pénétration à travers les téguments, II, 239.
— — — et mouches, IV, 276.
— — — (à tiques) et poux, VI, 106.
— — — nord-africaine, VII, 565.
— — — — Etude expérimentale, V, 472.
— — — algérienne et américaine non transmis par *Ornithodorus moubata*, I, 577.
— et ictères épidémiques au Congo, XV, 385.
— — — au Sénégal, XIV, 460.
— ictéro-hémorragique. Sa recherche chez les rats de Dakar, XI, 19.
— de la spirochétose fébrile de Sumatra, XVII, 623 (fig.).
— Association fuso-spirochétienne et gangrène de la lèvre supérieure, XVI, 719 (pl.).
— du groupe *obermeieri*, VI, 107.
— d'Obermeier. Réceptivité de la souris grise, XVIII, 680.
— de l'intestin de l'homme, XIV, 532.
— saprophytes et — des voies respiratoires, XVII, 172.
— Essais de transmission aux animaux de laboratoire du — de la fièvre récurrente soudanaise, XVI, 159.
— récurrent humain de Dakar inoculable aux animaux de laboratoire, XX, 826.
— Précautions à prendre dans l'étude expérimentale des virus récurrents, XXI, 179.
— Identité à Dakar des — du rat, de

la musaraigne et du — récurrent humain, XXI, 472.
— Identité à Dakar du — de la fièvre des tiques et de divers — récurrents, XXI, 585.
— de Dutton. Réceptivité des roussettes épaulières, XVI, 729.
— de Vincent dans l'ulcère phagédénique du Congo, I, 339.
— — absent dans l'ulcère phagédénique de Kabylie, I, 305 ; II, 282.
— Infection mixte à *Treponema crociduræ* et *Trypanosoma brucei* chez la souris blanche. Guérison spontanée, XXI, 345.
— sanguicoles chez l'antilope *Cobus vardoni*, XXII, 651.
— dans le sang d'un cobaye, V, 589 (fig.).
— du campagnol indigène des environs de Lyon *Microtus arvalis*, XIV, 573 (fig.).
— de la musaraigne *Crocidura stampflii*, X, 280.
— — Pouvoir pathogène, X, 694.
— — inoculable au lapin, XIX, 504.
— — Transmission expérimentale au singe par le pou, XXI, 173.
— des poules. Morphologie, I, 151 (fig.).
— — au Soudan français, II, 288.
— — Transmission par *Ornithodorus moubata*, I, 577 ; V, 63.
— — Immunisation des — contre les anticorps spécifiques, III, 353.
— — et *Argas persicus*, II, 292.
— des rats d'Alger, XI, 337.
— — d'égouts en Grèce, XXV, 441.
— du singe, III, 23, 419.
— parasites du *Stegomyia fasciata* adulte, VI, 708.
— des euphorbes, XXIV, 809 (fig.).
— immunisés *in vitro* par des anticorps, III, 353.
Spirochétoses au Maroc, XI, 261.
— humaine à Alger, IV, 435, 438.
— — en Algérie chez des enfants indigènes, XVI, 392.
— — en Chine, IV, 510.
— — au Congo, VI, 559.
— — — (Brazzaville), XI, 359.
— — — et *Ornithodorus moubata*, XI, 833.
— — — Formule hémoleucocytaire, XII, 497.
— — — Symptomatologie. Diagnostic. Traitement, XII, 372.
— — et tiques dans le bassin du Congo, XII, 290.
— — à Madagascar, IV, 509.
— — au Sénégal, XIII, 672 ; XIX, 860.
— — à Tripoli de Barbarie, IV, 369, 613.
— — en Tunisie, IV, 613, 658.
— cutanée. Voir **Sodoku**.
— de Dutton parmi les troupes coloniales belges en Afrique orientale, XII, 154.
— respiratoires. Distribution géographique, XIX, 322.
— bronchiale. Pathogénie, XXI, 620.
— — XVII, 170, 899.
— — au Brésil, XIII, 500.
— — en Guyane française, XVI, 476.
— — traitée par l'arsénobenzol, XIX, 236.
— broncho-pulmonaire au Nord du Portugal, XV, 284.
— pulmonaire. Bronchite sanglante, XI, 39.
— — — — Traitement par l'acétylarsan, XXIII, 296.
— — à Madagascar, XIX, 261.
— ictéro-hémorragique à la Guadeloupe, XXV, 304.
— — à l'île de Syra. Origine hydrique, XXV, 441, 552, 1058.
— — Traitement, XII, 128.
— ictérigène, épidémique sur les indigènes de Brazzaville, XVI, 184.
— amarile ou fièvre jaune à Dakar, XIII, 673.
— ressemblant cliniquement à la fièvre jaune observée dans la Haute-Côte d'Ivoire, XVI, 238.
— intestinale dans l'Inde portugaise, XVII, 857.
— fébrile de Sumatra, XVII, 623.
— Marche des infections mixtes spirochéto-trypanosomiennes, XX, 633.
— expérimentales, II, 239, 243 ; III, 355, 419, 422, 425 ; IV, 276 ; V, 63, 320, 472 ; VI, 106, 107.
— — Réaction des lipoïdes, I, 142.
— — Auto-agglutination des hématies, III, 425.
— — ictéro-hémorragique inoculée au singe (*Macacus sinicus*), XIII, 679.
— — Immunité conférée au macaque, III, 422.
— — Essai de — chez quelques animaux avec *Sp. berbera*, XIV, 144.
— — humaines transmises aux poussins et aux embryons de poulet, I, 415.
— — Rôle négatif des poux dans la transmission de la fièvre des tiques, VI, 106, 107.
— Traitement par le 606, IV, 440.
— Essai de traitement de la — eurygyrata humaine, XVII, 861.
— Intervention de l'organisme dans la guérison médicamenteuse, V, 524.
— animale sanguine à Dakar. Sa valeur au point de vue épidémiologique, XI, 64.
— aviaire en Algérie. Longue durée de conservation du virus chez *Argas persicus*, XIX, 419.
— — en Grèce, XVIII, 701.
— — naturelle du canard domestique, XIII, 647 (fig.).
— — des oies au Maroc dans le cercle des Doukkala, XVI, 582.
— — des gallinacés au Maroc dans le cercle des Doukkala, XIV, 346.

— — des poules à Piatigorsk (Nord du Caucase), XXII, 764.
— — — en Roumanie, II, 292.
— — — au Sénégal, II, 285.
— — — — Evolution clinique, X, 435.
— — — au Soudan français, II, 288.
— — — au Turkestan, IX, 227.
— — — Traitement par les composés de l'antimoine, I, 613.
— — indéterminée de la poule, XXV, 130.
— — associée au paludisme des oiseaux. Étude expérimentale, XVII, 535.
— des bovidés dans le Sud-Annam, III, 73.
— — au Brésil. Transmission par *Margaropus australis*, XII, 748.
— des lapins en Russie, XXII, 906.
— cutanée du porc, XIX, 86.
— sanguicole du chien, XVIII, 702 (fig.).
— des punaises des euphorbes et du latex, XIV, 205 (fig.).
Spiroptères chez le chien, XXV, 372.
Spiroscope. Emploi dans l'entraînement respiratoire, XXIII, 137.
Splénectomie et paludisme, XXV, 685.
— et piroplasmose canine, V, 143.
— et infection à *Trypanosoma cruzi*, XXIII, 188.
Sporogonie d'une hémogrégarine, VI, 226 (pl.).
Sporotrichés. Genres *Sporotrichum* et *Rhinocladium*, XV, 453 (fig.).
Sporotrichose pulmonaire chez un Européen à Dakar, XV, 357.
— humaine. Nouveau cas en Algérie, XXV, 297.
Sporotrichum carougeaui associé à la tuberculose, XV, 444, 453.
Sprue. Voir **Diarrhée de Cochinchine.**
Staphylococcies cutanées à Tanger, XVII, 757.
— Métastases, XXIII, 668.
Staphylocoques dans l'éléphantiasis au Maroc, XVI, 422.
— Multiplication intraganglionnaire d'un — dans un cas rapidement mortel rappelant le bubon climatique, XI, 157.
— Préparation d'un vaccin, XVI, 390.
Statuts, I, 1.
— Commission pour la modification, IV, 654.
— Modification, V, 55.
Stefansky (Bacille de) et infections secondaires, V, 466.
Stegomyia au Dahomey, à Cotonou. Indice, XXIV, 292.
— au Sénégal, à Dakar, en 1931, XXV, 797.
— — — et fièvre jaune, XXV, 804.
— au Soudan français (Bamako), XX, 474.
— du Tonkin, VI, 511.
— Conservation en cage, XXII, 440 (fig.).
— Effets du chlore sur l'éclosion des œufs, XXIII, 202.
— Indice — et fièvre jaune, XXI, 325 ; XXV, 804.
— (*Aëdes*) *argenteus*, XVIII, 723.
— *calopus* et fièvre jaune, XIII, 673.
— *desbansi*, moustique du Var. Biographie, XXII, 179.
— *fasciata* au Congo ; à Brazzaville, XXI, 768.
— — au Maroc, VIII, 732.
— — — (région de Tanger), XVII, 137, 571.
— — en Russie, VII, 590.
— — au Soudan français, I, 454 (c.).
— — Biologie, II, 425.
— — et dengue, IV, 26 ; XXII, 278.
— — et *Dirofilaria repens*, VI, 89.
— — et fièvre jaune, I, 528, 530, 630 ; II, 5 ; III, 785.
— — et lèpre, IV, 245.
— — Flore intestinale, VI, 708.
— — parasités par des larves de *Mermis*, II, 106.
— — Transmission des trypanosomes humains d'Afrique, VII, 49.
— (*Aëdes*) *jugorum* et larves de moustiques à branchies très développées, XV, 25 (fig.).
— Destruction, V, 150, 556, 561, 627, 633, 637, 739 ; VI, 43, 205, 513, 645.
Stenocephalus agilis et *Leptomonas davidi*, XV, 22, 166, 205, 408.
Sterigmatocystis hortai, n. sp., XV, 383 (fig.).
— *nigra*, cause de pseudo-tuberculose, III, 488.
— *tunetana*, n. sp., parasite de l'homme en Tunisie, XVII, 345.
Stomatites en A. E. F., VIII, 301.
— ulcéro-membraneuses et scorbutiques, XIX, 5.
— épidémiques à Dakar, XXV, 1110.
Stomoxes d'Abyssinie, I, 195.
— au Dahomey, III, 559.
— à Rennes, II, 161.
— nouveaux du Soudan, IV, 396.
— et *Trypanosoma dimorphon*, V, 546.
— et *Tryp. evansi*, V, 548.
— et *Tryp. pecaudi*, V, 543.
— et *Tryp. soudanense*, V, 547.
— et trypanosomiases animales. Expériences de transmission, V, 544.
— — — (nagana), I, 355.
— — — (souma), I, 333, 390 ; V, 380, 545.
— agents transmetteurs du debab au chien, XVI, 168.
— Evolution de l'*Habronema microstomum* chez le —, XV, 572.
Stomoxydes de l'Afrique occidentale, IV, 544.
— du Dahomey, IV, 122.
Stomoxys rodhainica, n. sp., XVIII, 467.
Stovarsol. Voir **Arsenicaux.**

Stoxal, produit larvicide efficace dans la lutte contre les moustiques, XIX, 297.
— Action larvicide, XXI, 109.
— employé dans une zone inondée du Bas-Dahomey, XXI, 323 (fig.).
Streptocoques. Polymorphisme, XXIV, 761.
— dans l'éléphantiasis, VI, 663, 668 ; XVI, 422.
— cause d'une endocardite maligne, XXV, 668.
— et singes, V, 60.
Streptothrix pathogène chez des lapins inoculés avec le virus d'un « chien fou », XXIV, 631.
Strongle géant. Un faux cas, IX, 536.
Strongylidés. *Acheilostoma moucheti*, n. sp., bunostomien pathogène, parasite de la vésicule biliaire d'un rongeur africain, XI, 93.
— *Bourgelatia diducta*, n. gen., n. sp., du porc, XII, 324.
— du genre *Characostomum*, VI, 264 (fig.).
— *Galoncus perniciosus* vivant dans les kystes intestinaux chez les grands félidés, XI, 86 (fig.).
— *Mecistocirrus digitatus*, var. *javanica*, XI, 705 (fig.).
— *Metastrongylus elongatus*, XI, 708 (fig.).
— Genre *Metastrongylus*, XVI, 622 (fig.).
— Genre *Nematodirus*, V, 35.
— de l'éléphant d'Asie, VIII, 117.
— Stéphanurose du porc, XV, 849.
— — — Description de l'agent (*Stephanurus dentatus*), XIV, 47.
— — — en Guyane, XIV, 219.
Strongyloides en Guyane, XIV, 124.
— à Panama, IV, 334.
— au Sénégal, XIII, 588.
— *intestinalis* chez les singes, I, 181.
— — Rôle pathogène, VIII, 208, 217.
— — Caractères et biologie des larves, XIV, 214.
— *ratti*. Localisation dans le poumon de la souris, XXV, 98.
— *stercolaris*. Larves rhabditoïdes de — dans le liquide duodénal recueilli par tubage, XVIII, 525.
Strongylus additictus, n. sp., VII, 130 (fig.).
Sucre dans la dysenterie amibienne, V, 846.
Sueur. Présence du spirochète de la fièvre récurrente, VII, 472.
Sulfarsénol. Voir **Arsénobenzènes.**
Sulfo-tréparsan. Voir **Arsénobenzènes.**
Sulfureux (Bains) contre la gale des animaux domestiques, XIII, 186.
Sunoxol. Toxicité, XVIII, 221.
Suppuration des ganglions avec pus stérile, VI, 201.
— — dans la trypanosomiase humaine, V, 187.
Surra. Voir **Trypanosomiases animales.**
Symbiose et parasitisme, XIV, 448.
Syndrome. Les grands — en pathologie exotique, XXIV, 171.
— paroxystique de rythme synchrone cardio-pulmonaire, XXV, 964.
Synectol, produit à base de plantes dans le traitement de la leishmaniose cutanée, XXI, 764 (fig.).
Syngamose des volailles à Madagascar, XXIII, 681.
— des gallinacés en Guinée française, XXIV, 146.
Synopsyllus fonquernii, n. g., n. sp., XXV, 327 (fig.), 962 (pl.).
Syphilides psoriasiformes confluentes chez un Noir, X, 688 (fig.).
Syphilis en Afrique équatoriale française, VIII, 204.
— en Afrique occidentale française, XIX, 389.
— en Algérie, III, 59, 537.
— au Cameroun, XII, 407 (fig.).
— en Cochinchine, chez les Annamites, XVII, 433.
— — (Tabès), XIX, 81.
— aux Comores (Mohéli), XI, 62.
— au Congo belge, VIII, 570.
— à la Guyane française, IX, 467 ; XI, 784.
— à Madagascar (Tananarive), XVI, 534 ; XXII, 753 ; XXIII, 254, 257 ; XXIV, 609.
— à la Martinique, IV, 563.
— en Nouvelle-Calédonie, XXI, 457.
— à Tahiti, XXII, 30.
— au Tchad (Ouadaï), VII, 524.
— Guide pour le diagnostic et le traitement, XXIV, 609.
— Indice donné par la méthode de floculation de Vernes à Tananarive, XXIII, 257.
— Formol-gélification, XX, 600.
— Réaction de Wassermann et d'Eitner, VIII, 259.
— Résultats comparés de la déviation du complément et de la floculation, XXIV, 798.
— Masque léonin, V, 170.
— ou aïnhum de la jambe, XVIII, 470 (fig.).
— chez les lépreux. Importance du diagnostic, XXI, 741.
— pulmonaire simulant la tuberculose cavitaire, XVI, 396.
— et cécité en Chine, XXIV, 239.
— — à Madagascar, XXIII, 254.
— et nodosités juxta-articulaires, XIII, 548, 554.
— et pian, I, 484, 487.
— et mal de Pott, XXIII, 867.
— Aortite et maladie de Hugdson chez un Noir, XVIII, 288.
— Lésions monstrueuses chez un Noir, XVIII, 431.
— Réaction méningée chez un Noir, VIII, 571.

— nerveuse, XX, 116 ; XXIV, 588.
— Paralysie faciale et troubles trophiques dans le territoire du trijumeau, XIX, 236.
— cause d'une obstruction intestinale, XXIII, 115.
— osseuse, XIX, 498.
— Hérédo-osseuse précoce, XVII, 518.
— — — et mortalité à Madagascar, XXII, 753.
— Syphilome de la jambe, XVIII, 678.
— exotique et tabès, XXV, 680, 684, 685.
— Ulcère syphilitique phagédénisé ; cancérisation, XXV, 841.
— Traitement chez les indigènes de nos colonies, XXIV, 266, 369, 394, 434, 639.
— — par l'acétylarsan, XX, 209.
— — par les composés d'antimoine, I, 613.
— — de la — nerveuse par néosalvarsan et urotropine, XXIV, 588.
— — par le novarsénobenzol, XVI, 430 ; XVIII, 248.
— — — en lavements, XX, 696 (fig.).
— — par le salvarsan, VI, 14, 102.
— — par le sel sodique de salvarsan cuprique, VIII, 582.
— — par le trépol, XV, 364.
— — par le « 189 », XV, 607.
— et émétine, VI, 424.
Syrie. Bilharziose à Damas, XV, 695.
— Conjonctivite granuleuse, XVII, 591.
— Echinococcose, XX, 1004.
— Fièvre à phlébotomes, XX, 251.
— Leishmaniose cutanée, XXII, 774.
— — interne infantile, XIX, 429.
— Paludisme et anophélisme à Beyrouth, XVI, 86, 481.
— Anophélisme à Lataquié, XVII, 653.

T

Tabanides. Voir aussi *Hæmatopota*, *Pangonia*.
— d'Afrique, II, 519 ; III, 559.
Tabès chez les indigènes dans les colonies françaises, XVI, 475.
— et syphilis en Cochinchine, XIX, 81.
— — exotique, XXV, 680, 684, 685.
Tahaga = Taher. Voir **Trypanosomiases animales.**
Tahiti. Syphilis, XXII, 30.
Taimborontsiloza, anthelminthique malgache, XXII, 388.
Tamné, myiase humaine du Sahara, VI, 487.
Tarassévitch (L.). Eloge, XX, 557.
Tarentola. Voir **Reptiles.**
Targowla (Réaction de). Voir **Réaction de —.**
Tatouages en Algérie, I, 383.
Tatous porteurs de *Schizotrypanum cruzi*, XXIV, 627 (fig.).
Taupe parasitée par *Grahamella talpæ*, IV, 514, 660.
Tchad. Voir aussi **Afrique équatoriale française.**
— Aïnhum, VII, 525.
— Bilharziose, VII, 526, 693 ; VIII, 604.
— Coccidiose associée à la peste bovine, XVII, 198.
— Dysenterie amibienne, VII, 525.
— Fièvre aphteuse, XVII, 205.
— — indéterminée, VII, 526.
— Filariose humaine, VII, 525 ; IX, 163.
— Goitre, VII, 693 ; IX, 165 ; XXI, 152.
— Kératite, VII, 524.
— Leishmaniose interne, IX, 299 (fig.).
— Lèpre, VII, 525.
— Mycétomes, VII, 525.
— Ophtalmies, VII, 524.
— Paludisme (Ouadaï), VII, 527.
— — (Moyen-Chari), VII, 693 ; IX, 158.
— Parasitisme intestinal (Ouadaï), VII, 525.
— Affections parasitaires au Moyen-Chari, IX, 143.
— Peste bovine, XVII, 196.
— Piroplasmoses, XVII, 204.
— Pneumonie (Ouadaï), VII, 523.
— Syphilis, VII, 524.
— Trypanosomiases animales, VII, 689 ; IX, 151 ; XVII, 202.
— — humaine, VII, 686 ; IX, 143 ; XIII, 789 ; XIV, 57 ; XV, 253 ; XVI, 93 ; XVII, 732.
— Tuberculose, VII, 523.
— Ulcère phagédénique, VII, 524.
— Variole, VII, 523.
— Varioloïde, VII, 523.
— Géographie médicale de l'Ouadaï, VII, 522.
— Pathologie vétérinaire, XVII, 109, 196.
— Filaire et microfilaire du crapaud, IX, 133 (fig.).
— Mouches piqueuses, VII, 692.
Teignes. Voir aussi **Favus, Trichophyties.**
— en Algérie, chez les indigènes des environs d'Alger, XXII, 60.
— — dans la Grande Kabylie, XXIII, 170.
— — dans les agglomérations européennes, XXIII, 363.
— — dans les ports de la côte occidentale et en Oranie, XXV, 694.
— — — de la côte orientale, XXV, 101.
— — dans la région d'Oran, XXIV, 177.
— — dans le Sud Oranais, XXI, 729.
— — chez les indigènes du Sud Constantinois. Statistique et parasitologie, XXII, 299.
— — Champignons des — à Alger, VII, 544.
— du mouton causée par *Trichophyton pruinosum*, n. sp., XXIV, 296 (pl.).

Ténias. Voir aussi **Cestodes.**
— chez les Arabes du Tell algérien, VII, 303.
— à la Côte d'Ivoire, IV, 117.
— et spasme laryngé, X, 180.
— échinocoque chez les chiens d'Athènes et du Pirée, XXIV, 49.
Terminologie. Immuniser et prémunir, XVII, 37.
Terre-Neuve. Hygiène navale, XVI, 71.
Testicules et *Trypanosoma gambiense*, VI, 583.
— Orchite, complication de la dengue, XX, 402.
Tétanos pendant la campagne du Cameroun, IX, 587.
— à Mohéli, XI, 62.
— Diagnostic bactériologique, VI, 605.
— ombilical, XIX, 654.
— — guéri par la sérothérapie, XXV, 840.
— — Prophylaxie à Saïgon, XXII, 6.
— infantile guéri par la sérothérapie, XXI, 73.
— localisé suivi de guérison, XXV, 818.
— guéri par la sérothérapie, XVIII, 435, 678.
— Administration du sulfate d'atropine, XXII, 227.
— Emploi du sérum desséché et de fortes doses, XIII, 159.
— Sérothérapie intrarachidienne, XXIII, 244.
— — associée au sulfate d'atropine, XIX, 66 ; XXI, 694, 698.
— — — à l'hexaméthylène-tétramine, XXIV, 590 ; XXV, 849.
— — Échec, XXIV, 497.
Tétrachlorure de carbone. Voir **Chimiothérapie.**
Tetramitus. Voir aussi *Chilomastix.*
— *bocis*, n. sp., V, 726.
Theiler (Sir A.). Remise de la médaille d'or, XX, 943.
Theileria brimonti, n. sp. du *Bradypus tridactylus*, X, 173.
— *camelensis*, n. sp., X, 308.
— *mutans*, II, 120, 293 ; IV, 179 ; V, 87, 482 ; X, 307 ; XIII, 445 (fig.).
— — et corps bleus de Koch, XXIII, 377.
— — Corps en grenade, XXII, 542.
— — chez l'antilope, XXII, 651.
— — chez les bovidés du Sénégal, XVI, 60.
— *ovis*, X, 308 ; XV, 789 (fig.).
— — en Algérie, XVII, 125 (fig.), 126 (fig.).
— — dans l'Ouellé (Congo belge), IX, 95, 201.
— *parva*, XIII, 441 (fig.).
— — en Algérie, XVI, 6, 23.
— chez le campagnol, X, 99.
Theilérioses. Voir **Piroplasmoses.**
Theobaldia annulata. Évolution larvaire, IX, 704 (fig.).
— *spathipalpis* capturé dans les Bouches-du-Rhône, XIV, 163.
— — Morphologie et biologie de la larve, XI, 98 (fig.).
Thérapeutique clinique des maladies tropicales. Manuel, II, 162.
— coloniale. Guide, XIX, 321.
Thermothérapie dans le traitement de la diarrhée chronique des pays chauds, XI, 18.
Thomas (N. Wolferstan). Éloge, XXIV, 755.
Thymol contre les nématodes intestinaux, XXIV, 41.
Thysanoures. Parasitisme, XXI, 853.
Tick-fever. Voir **Fièvre des tiques.**
Tinea imbricata. Voir **Tokelau.**
Tiques. Voir aussi **Acariens,** *Argas*, *Ornithodorus.*
— du Nord du Caucase. Répartition géographique, XXI, 644.
— de la Haute-Guinée, VIII, 656.
— au Maroc, région de Tanger, XVIII, 469.
— à Mytilène, parasites des animaux domestiques, XIII, 260.
— de Russie, V, 40 ; XV, 41.
— du Turkestan, parasites des animaux domestiques, X, 298.
— de Turquie, X, 724.
— *Ixodes ricinus* des régions froides et tempérées, XIX, 558.
— Nouvelles espèces brésiliennes, II, 163.
— de l'antilope, XXII, 656.
— Contribution à l'étude des ixodes, XIII, 147.
— Influence du froid, I, 451.
— agents de transmission d'une affection humaine fébrile en Perse, XXII, 677.
— et conjonctivite infectieuse, XXIV, 76.
— et fièvre exanthématique, XXIII, 889.
— et onchocercose, XVII, 412.
— et paralysie chez le mouton, XVII, 378.
— et piroplasmoses bovines d'Algérie, XXI, 846.
— hôtes vecteurs des piroplasmes des bovidés, XIII, 416.
— agents de transmission de *Piroplasma bigeminum*, II, 384.
— Transmission de la heartwater et de la theilériose bovine par injection intrajugulaire d'une émulsion de —, XIX, 725.
— agents de transmission de piroplasmes et de spirochètes, II, 293, 384.
— Transmission de la spirochétose des bovidés au Brésil par *Margaropus australis*, XII, 748.
— — de la piroplasmose canine par *Dermacentor reticulatus*, XII, 651.
— *Dermacentor venustus*, vecteur de la piroplasmose canine, XV, 540 (fig.).

— Parasitisme chez l'homme par *Rhipicephalus sanguineus*, XIV, 91.
— *Rhipicephalus bursa* et *Piroplasma bigeminum*, XXIV, 195.
— Transmission de la piroplasmose canine tunisienne par *Rhipicephalus sanguineus*, XII, 757.
— Expériences négatives de transmission du surra du chien par *Rhipicephalus sanguineus*, XX, 222.
Titira, phlébotome transmetteur de la verruga du Pérou, XXIV, 27.
Togo. Voir aussi **Afrique occidentale française.**
— Bilharziose, XVIII, 592 (c.).
— Trypanosomiase humaine, XXV, 347, 902.
— Tumeur à *Onchocerca volvulus* simulant un kyste synovial, XV, 499.
— Enquête et sondages démographiques en pays Kabré, XXV, 986.
Tokelau ou *Tinea imbricata*, IV, 133.
— Étiologie, XVI, 111.
— dans la province chinoise du Honan, XVIII, 618.
Tonkin. Cancer, XXV, 85.
— Distomatose, I, 220 ; II, 488 ; IV, 200.
— Fièvre récurrente, III, 75, 422.
— Filariose, II, 144, 483.
— Helminthiases, II, 488 ; III, 32 ; IV, 200, 342.
— Paludisme, II, 377 ; III, 465, 632 ; VI, 745 (c.), 752 ; XX, 895 ; XXV, 976.
— — à Chapa, V, 345.
— — dans la province de Sontay, VII, 388.
— Pathologie humaine et animale, IV, 574.
— Piroplasmose canine, II, 380.
— Sparganoses humaines et animales, XIX, 802.
— Tumeurs. Voir aussi Cancer.
— — chez les animaux domestiques, XX, 344, 345.
— Typhus exanthématique, XIX, 766.
— Anophèles. Durée larvaire, XXIV, 923.
— — Variété d'*A. jeyporiensis*, XXIV, 958 (fig.).
— *Fasciolopsis buski*, IV, 200.
— *Hæmoproteus* des oiseaux, III, 704.
— Hémogrégarines des batraciens, IV, 448.
— — des reptiles, IV, 446.
— *Leucocytozoon* des oiseaux, III, 504.
— Moustiques. Voir aussi Anophèles, *Stegomyia*.
— — II, 377 ; III, 632 ; VI, 511 ; XXV, 243, 639 (pl.), 976.
— Myriapode vésicant *Otostigmus aculeatus*, XIX, 343.
— Parasites des animaux domestiques ou sauvages, XVIII, 343.
— Parasitologie humaine et animale, IV, 574.
— Protozoaires du papier, I, 297.
— Spirochètes, III, 75.
— *Stegomyia*, VI, 511.
Tourterelle. Microfilaire, VI, 365.
Toxémie et protozoaires intestinaux, XVIII, 130, 132, 137, 177.
Toxicité du chlorhydrate d'émétine chez l'homme, XII, 521.
Toxine et antitoxine, VI, 409.
— cholérique. Influence de l'âge des cultures, I, 32.
— de *Trypanosoma gambiense*, IV, 680.
Toxoplasma canis en Allemagne, IV, 617.
— — à Turin, III, 359.
— *caviæ*, n. sp., IX, 435.
— *cuniculi*, II, 462, 465, 524 (fig.).
— — à Saint-Louis du Sénégal, IV, 373.
— — chez les pigeons et les chiens du Brésil, IV, 518, 721.
— — Altérations anatomiques produites par —, VI, 138.
— — Formes flagellées et gamètes, VI, 318 (pl.).
— — Recherches expérimentales, VI, 460.
— *gondii*. Morphologie, VIII, 61.
— — Essais de culture, VIII, 62.
— — Infection du lapin, VI, 249.
— — — du chien, VI, 294.
— — Sensibilité de diverses espèces animales, VIII, 58 (fig.).
— — d'une souris de Stanleyville (Congo belge), XXII, 660 (fig.).
— — Sensibilité aux facteurs extérieurs, VII, 232.
— — Recherches expérimentales, VI, 460, 478.
— *liothricis*, VII, 21 (fig.).
Toxoplasme du cobaye, IX, 435.
— du lapin au Congo belge, IX, 432.
— d'un singe à la Guyane française, IX, 467.
— des oiseaux, VI, 323 (fig.).
— — du Brésil, IX, 262.
Toxoplasmose. Infection par les muqueuses saines, VII, 112.
— expérimentale, VII, 232 ; VIII, 58.
— canine en Allemagne, IV, 617.
— — au Brésil, VI, 681.
— — en Italie, III, 359.
— — en Tunisie, X, 377.
— du gondi, VI, 160, 249, 294, 460, 478 ; XVII, 354.
— du lapin, II, 462, 465, 524 (fig.).
— — au Sénégal, IV, 373.
— — chez les chiens et les pigeons, IV, 518, 721.
Trachome. Voir **Conjonctivite granuleuse.**
Traitement. Action de quelques substances médicamenteuses sur le pouvoir alexique du sérum, VII, 626.
— Ambocepteurs et arsénobenzol, VII, 633.
— Action protectrice et immunisante du sérum des animaux trypanosomés traités à l'émétique, VII, 670.

— Mode d'action des médicaments parasiticides, VII, 299.
— des adénopathies iliaques primitives, XVII, 67.
— des amibiases (Voir aussi Dysenterie amibienne), VIII, 332 ; XVI, 263, 308 ; XVII, 242 ; XVIII, 478 ; XIX, 91, 176 ; XXI, 883.
— de l'amibiase hépatique, VI, 564 ; VII, 659 ; X, 23 ; XV, 537 ; XXV, 421, 425.
— de l'amibiase associée au paludisme, XVI, 308.
— de l'anaplasmose, XV, 613 ; XVII, 641.
— de l'anémie, XXIV, 475 ; XXV, 789.
— de l'angine de Vincent, XVII, 530 ; XVIII, 305.
— de l'ankylostomiase, II, 603 ; V, 843 ; XIII, 229 ; XV, 127 ; XVI, 98 ; XVII, 145 ; XIX, 719 ; XXII, 23.
— des associations fuso-spirochétiennes, XVII, 530, 531, 533 ; XXIV, 142.
— de la balantidiose, XI, 558 ; XX, 741.
— du béribéri, III, 13, 65, 123, 544, 624 ; XIX, 628.
— des bilharzioses, XIV, 299 ; XV, 695 ; XVI, 560, 562, 564 ; XVII, 722 ; XX, 285 ; XXII, 168.
— de la blastocystose, XVIII, 136 ; XXI, 760.
— des blastomycoses, IX, 73 ; XX, 323 ; XXII, 42, 45 (pl.), 147.
— de la blennorragie, XI, 438 ; XXI, 713.
— de la bouffissure d'Annam, XIX, 209 (fig.), 309.
— de la bronchite fétide, XVII, 533.
— — sanglante, XXIII, 296.
— des cachexies paludéennes, VII, 678.
— du chancre mou, XIX, 314.
— du charbon bactéridien, XII, 309.
— de la clonorchiase, XIV, 161.
— de la coccidiose, XIX, 95 ; XX, 588.
— — des poules, XXIII, 714.
— de la conjonctivite granuleuse, XVII, 591 ; XIX, 49.
— du craw-craw, X, 137.
— de la dengue, XX, 98.
— des dermatomycoses, XIV, 354.
— de la dermite granuleuse des équidés, XI, 575.
— de la diarrhée de Cochinchine, I, 345 ; IV, 155, 162 ; XI, 18.
— des diarrhées cholériformes, XXIV, 783 ; XXV, 196.
— — des enfants, III, 47.
— de la distomatose, XXI, 222.
— — hépatique, XXV, 147.
— — ovine, XXII, 523.
— de la dourine, XVIII, 55.
— de la dracunculose, XII, 730 ; XV, 809 ; XVII, 147, 846 ; XX, 288, 398.
— des dyschromies, XXIV, 221.
— de la dysenterie amibienne, I, 68, 72, 77, 307 ; II, 29, 80 ; IV, 322 ; V, 565, 846 ; VI, 491, 564 ; VII, 142, 303, 405, 659 ; VIII, 332 ; IX, 325, 510 ; X, 23, 247, 277, 445, 611, 868, 904 ; XII, 632 ; XVI, 79, 557 ; XVII, 119 ; XVIII, 18 ; XIX, 399, 672 ; XX, 465 ; XXI, 367, 842 ; XXII, 156 ; XXIV, 28.
— — bacillaire, VII, 140 ; XVIII, 534 ; XX, 465 ; XXI, 16 ; XXIV, 271, 505.
— — mixte, VII, 405.
— de l'éléphantiasis, I, 285 ; II, 360 ; V, 625.
— de l'entéqué, XIX, 139.
— de l'entérite à *Trichomonas*, XVIII, 647.
— des entérites dysentériformes, XXII, 227.
— de la fièvre aphteuse, XIII, 726.
— — bilieuse hémoglobinurique, I, 406 ; IV, 118, 301, 303, 307, 308 ; XIII, 35, 336 ; XIV, 226 ; XVIII, 289, 590, 715 ; XIX, 345, 685 ; XXI, 636 ; XXII, 739 ; XXIII, 999 ; XXV, 215, 494, 735.
— — jaune, XX, 391 ; XXII, 811 ; XXV, 362.
— — ondulante, I, 476, 544 ; VI, 672 ; XXII, 150.
— d'une fièvre persane transmise par les tiques, XXII, 678.
— de la fièvre récurrente, I, 613 ; IV, 440 ; V, 339, 476 ; VI, 68, 532 ; VII, 101, 473, 569 ; XIII, 62 ; XIV, 633 ; XV, 330 ; XVI, 272, 303 ; XXI, 113 ; XXII, 838.
— — typhoïde, XIX, 175.
— de la filariose *Loa*, XXV, 690, 693.
— — des oiseaux, XIII, 654.
— des filarioses, XVI, 126 ; XVII, 146, 846 ; XVIII, 652.
— de la gale des animaux domestiques, XIII, 186.
— — du dromadaire, XII, 97 ; XIII, 29, 545.
— du goitre, XXIII, 342.
— des gonocoxcies, XXI, 487.
— du *granuloma venereum*, XXI, 361 ; XXII, 21, 148 (fig.).
— de l'helminthiase, XV, 576 ; XVI, 330 ; XVIII, 460, 694 ; XXII, 388 ; XXIV, 168.
— de l'hématurie dans la bilharziose, VII, 722.
— — et de l'hémoglobinurie, XIV, 78, 80.
— des hémorroïdes, XI, 401.
— de l'hépatite suppurée, XXV, 837.
— (préventif) de l'intolérance quinique, II, 269.
— de la kagaminetsu, XVII, 828.
— de la lambliose, VII, 659 ; XIV, 652 ; XVI, 325, 737.
— du larbish, XXIV, 161.
— de la leishmaniose américaine, VII, 277 ; IX, 699 ; X, 381 ; XI, 372 ; XIII, 289 ; XVIII, 634 ; XXI, 846 ; XXII, 42, 43 (fig.).
— — cutanée, II, 88, 91, 92, 301, 548 ; IV, 182, 185, 667 ; VII, 36, 46 ; XI,

563 ; XIII, 290 ; XVII, 361 ; XIX, 331 ; XXI, 764.
— — interne, II, 185, 187, 457, 667 ; IV, 187 ; VIII, 63 ; X, 762 ; XVII, 477, 778 ; XVIII, 669.
— de la lèpre, I, 347 ; IV, 48 ; VII, 535 ; X, 684 ; XII, 406 ; XIII, 490 ; XIV, 520 ; XVI, 227, 234, 298 ; XVII, 603, 761 ; XVIII, 90, 514 ; XIX, 399, 441, 779 ; XX, 57, 94, 710, 773, 953 ; XXI, 14, 594, 738, 831 ; XXII, 11, 17, 155, 759, 762 ; XXIII, 150, 693, 909, 911, 1005, 1009 ; XXIV, 433, 457, 770, 772, 780, 852 ; XXV, 404, 410, 514, 625.
— — des rats, XXII, 17 ; XXIII, 145, 149, 268 ; XXV, 969.
— des lésions pyogènes, XI, 14.
— de la leucémie lymphoïde, XV, 522.
— de la lymphangite épizootique, X, 428, 681 ; XI, 12, 17, 416, 609 ; XIII, 640, 777 ; XIX, 762 ; XX, 829.
— — ulcéreuse, XI, 683.
— de la méningite cérébro-spinale, XI, 783 ; XVI, 712, 715 ; XXIV, 589.
— des mycétomes, VI, 710 ; IX, 346 ; XV, 7 ; XXI, 511.
— des mycoses (Voir aussi Dermatomycoses), XV, 53, 654.
— des nodosités juxta-articulaires, XIII, 548, 554 ; XV, 488.
— de l'onchocercose, XII, 459.
— de l'ostéoporose chevaline ou « big-head », XIV, 337.
— du paludisme, I, 292, 385, 534, 539 ; III, 626 ; IV, 296 ; VII, 678 ; X, 208, 217, 287, 492, 886, 923 ; XI, 80, 179, 645, 648, 691 ; XII, 307, 434 ; XIII, 175, 264, 502, 504, 748 ; XIV, 109, 535 ; XV, 169, 237, 534, 834, 870, 962 ; XVI, 81, 244, 273, 308, 433, 436, 481, 567 ; XVII, 279, 310, 660, 874, 941 ; XVIII, 7, 28, 230, 289, 554, 590, 710, 715 ; XIX, 26, 96, 180, 182, 185, 282, 359, 431, 782 ; XX, 115, 304, 323, 331, 408, 456, 665, 727, 728, 917, 966 ; XXI, 625, 636, 760 ; XXII, 137, 555 ; XXIII, 631, 832 ; XXIV, 93, 97, 101, 223, 335, 378, 539, 645, 649 ; XXV, 842, 1074.
— — associé à l'amibiase, X, 329.
— du papillome cutané (Voir aussi Verrues), I, 207 (fig.).
— du parasitisme intestinal, XI, 403 ; XIX, 719 ; XX, 464, 741, 743 ; XXI, 212 ; XXII, 581 ; XXIV, 41.
— de la pelade, XIV, 280.
— de la peste, II, 195 ; IV, 213 ; V, 459 ; XV, 874 ; XIX, 407, 413, 592, 667, 823 ; XX, 106 ; XXI, 598, 600 ; XXIII, 618, 936, 943 ; XXV, 437, 672, 677.
— — bovine, XXII, 315.
— — du cheval, XI, 431.
— — du chimpanzé, XXIV, 141.
— — du cocotier, XXIV, 146.
— des phlegmons, XXIII, 120.
— du pian, VI, 14, 243, 308 ; VIII, 582 ; IX, 760 (fig.) ; X, 863 ; XII, 412 ; XIII, 246 ; XV, 489, 528, 607 ; XVI, 580 ; XVII, 94, 502 ; XVIII, 437, 451, 661 ; XIX, 416 ; XX, 6, 209, 841 ; XXI, 400, 674, 743 ; XXII, 386 ; XXV, 871.
— des piroplasmoses, XV, 613 ; XX, 64 ; XXIII, 506.
— de la piroplasmose bovine, VI, 618 ; XVIII, 49, 50, 51 ; XIX, 14, 16, 18, 34, 41, 554, 783, 786 ; XX, 64, 595.
— — canine, IV, 291 ; XV, 619.
— — équine, VI, 571 ; XXV, 18.
— des plaies de harnachement, X, 901.
— — aux colonies, XII, 732.
— des pneumococcies, XIX, 521 ; XXV, 64.
— de la pneumonie, IX, 275 ; XXI, 596 ; XXII, 607.
— de la poliomyélite, XXIII, 536.
— des porteurs sains de vibrions cholériques, VI, 306.
— de la prostatite aiguë, XI, 402.
— des pyodermites, XXII, 731.
— des pyohémies, XV, 475.
— des pyomyosites, XVI, 710.
— de la rage, XVI, 417, 599 ; XXI, 790.
— du rhumatisme déformant, XXIII, 876.
— de la sparganose oculaire, XIII, 220.
— des spirochétoses, XVI, 582 ; XVII, 177, 861 ; XIX, 345.
— — humaine, IV, 141 ; XII, 128, 372.
— de la — — bronchiale, XVII, 177 ; XIX, 236, 262 ; XXI, 621.
— — des poules, I, 613 ; XXII, 765.
— d'une — indéterminée des poules, XXV, 132.
— de la sporotrichose, XXV, 298.
— de la syngamose, XXIV, 146.
— de la syphilis, I, 613 ; VI, 14, 102 ; VIII, 582 ; XV, 364, 607 ; XVI, 430 ; XVII, 181 ; XVIII, 248 ; XX, 120, 209, 696 (fig.) ; XXII, 733, 852 ; XXIV, 266, 369, 434, 588, 609, 639.
— du tétanos, XIII, 159 ; XVIII, 435, 678 ; XIX, 66, 656 ; XXI, 73, 694, 698 ; XXIII, 244 ; XXIV, 497, 590 ; XXV, 818, 840.
— de la theïlériose bovine, XXV, 136.
— de la tick-fever, IV, 141.
— de la toxémie intestinale à protozoaires, XVIII, 136, 140, 182.
— des trichomoniases, XIX, 699.
— de la — intestinale, VII, 657.
— des trypanosomiases animales ou expérimentales I, 28, 44, 213, 215, 503, 508, 527, 617 ; II, 45, 51, 54, 402, 403, 526 ; III, 46, 218, 443, 526, 616, 618, 726, 732 ; IV, 116, 403, 472, 619, 679, 699 ; V, 45, 385 ; VI, 27, 502, 533, 536, 538, 588, 693, 699 ; VII, 200, 593, 670 ; VIII, 28, 31, 32, 37, 339, 348 ; IX, 236, 813 ; XI, 448 ; XII, 220, 514 ; XIII, 243, 546, 581 ; XV, 613 ; XVI, 587, 770 ; XVII, 130,

, 131, 203 ; XVIII, 55, 410, 453, 456 ; XIX, 325, 328, 329, 614, 692, 737, 754 ; XX, 222, 443, 535, 734 ; XXI, 148, 151, 849 ; XXII, 167, 382, 664, 669, 776 ; XXIII, 368, 393, 630 ; XXIV, 311, 563, 667, 840 ; XXV, 65, 354, 570.
— de la trypan. humaine, I, 47, 210, 212, 398, 500, 504, 508, 569, 617, 620, 624 ; II, 51, 54, 308, 314, 317, 402, 405, 409, 620 ; III, 42, 46, 194, 222, 228, 233, 330, 333, 386, 389, 443, 526, 561, 586, 642 ; IV, 141, 184, 310, 411, 419, 472 ; V, 287 ; VI, 272, 591, 632 ; VII, 63, 160, 257, 640, 741 ; VIII, 74, 169, 582, 752 ; IX, 13, 230 ; XI, 379 ; XII, 680 ; XIII, 27, 246, 366, 379, 482, 648 ; XIV, 238, 326 ; XV, 59, 692, 729, 797, 802 ; XVI, 606 ; XVII, 79, 179, 289, 368, 423, 491, 692 ; XVIII, 312, 410, 641, 645 ; XIX, 4, 8, 193, 271, 316, 463, 688, 838 ; XX, 55, 218, 460, 524, 689, 734, 875, 883 ; XXI, 144, 211, 646 ; XXII, 201, 431, 482, 487, 540, 667, 779, 872, 879 ; XXIII, 291, 338, 461, 491, 721, 947, 950 ; XXIV, 7, 374, 528, 530, 557, 657, 660, 757, 834, 839 ; XXV, 39, 252, 260, 347.
— du typhus exanthématique, II, 497 ; III, 172, 455 ; IX, 673 ; XII, 367 ; XIII, 284 ; XV, 387.
— de l'ulcère phagédénique, VI, 243 ; IX, 419 ; XI, 616, 827 ; XII, 64, 296, 495 ; XIV, 530, 625 ; XV, 607, 641, 926 ; XVII, 531 ; XVIII, 380, 433 ; XIX, 115 ; XX, 152 ; XXII, 386 ; XXIII, 483, 995 ; XXV, 333.
— des verrues, XVI, 619 ; XXV, 326.
— de la verruga, XXII, 357.
Transcaucasie. Parasites du sang des animaux, X, 98.
— Protozoaires et infections intestinales, XIV, 649.
Transfusion sanguine au cours d'une broncho-pneumonie, XXII, 747.
Trématodes. Voir aussi **Bilharzies,** *Clonorchis,* **Discrocœliidés, Distomes,** *Fasciolopsis, Gastrodiscus, Opistorchis, Schistosoma.*
— en Cochinchine, IV, 488 ; XVII, 579.
— d'Indochine, XVI, 173.
— en Macédoine, XXI, 244 (fig.).
— à Madagascar, chez le Malgache en Emyrne, XXII, 391.
— au Tonkin, IV, 200.
— Cercaires hébergées par une limnée de Madagascar, XXII, 523 (fig.).
— Enkystement d'une cercaire du type *carmata* chez un turbellarié d'eau douce, XIII, 182 (fig.).
— Activité génitale des métacercaires progénétiques, XXIII, 967.
— Cycle évolutif et description des Notocotyles, XV, 331 (fig.).
— parasites des anophèles, XI, 547.
— de l'éléphant d'Asie, VII, 78.
— de primates, V, 833 (fig.).
Tremblement essentiel héréditaire, XV, 757.
Trépanation par les Canaques, I, 582, 593.
Tréparsol. Voir **Arsenicaux.**
Trépol. Voir **Bismuth.**
Treponema pallidum, III, 359.
— — dans un fœtus syphilitique, II, 163.
Tréponèmes et nodosités juxta-articulaires, XVI, 553.
Triatoma geniculata, agent de transport de *Trypanosoma cruzi,* XXV, 145.
Triatomes. Voir **Conorhines,** *Conorhinus.*
Tribondeau (L.). Eloge, XI, 681.
Tribromométaxylénol. Voir **Chimiothérapie.**
Tricocéphales en Algérie, dans le Tell, VII, 303.
— de la Guadeloupe, VII, 71.
— Parasitisme intestinal en Annam, VI, 343.
— — — à la Grande-Comore, VI, 455.
— — — et hépatique en Chine occidentale, VI, 704.
— dans les diarrhées rebelles, IX, 293.
Tricocéphalose intestinale et appendiculaire, X, 932 (pl.).
Trichocephalus dispar, II, 246.
— — à la Côte d'Ivoire, IV, 417.
— — à la Martinique, IV, 391.
— — à Panama, IV, 334.
Tricholyga sorbillans, III, 766.
Trichomonas. Cultures, XXI, 651 ; XXIII, 216.
— dans diarrhées rebelles, IX, 293
— de l'intestin et de la sangsue du Turkestan, X, 293.
— des Macaques, II, 20.
— *elongata.* Culture, XXIII, 216.
— *hominis* à Pétrograd pendant les épidémies de 1919-1921, XVIII, 188.
— — propagé par les batraciens, XVIII, 521.
— *intestinalis,* IV, 393 ; V, 725.
— — Étude biologique, XIII, 800.
— — dans les selles diarrhéiques, XVII, 128, 301, 367, 537.
— *muris* chez le campagnol indigène, XIV, 716 (fig.).
— *vaginalis,* VI, 425.
— — dans l'urine d'un jeune garçon, XVII, 216.
Trichomoniase intestinale. Nouveau traitement (lavements iodés), VII, 657.
— — et vaginale, X, 553.
— vésicale, XIX, 697.
Trichophyties à Alger, XI, 350.
Trichophyton pedis, n. sp., XV, 588 (fig.).
— *pruinosum,* n. sp., XXIV, 296 (pl.).
Trichosoma longispiculum, III, 94.
Trichostrongylus instabilis chez les singes, I, 181.

Trionyx triunguis parasitée par une hémogrégarine, IV, 522.
Tripolitaine. Fièvre à phlébotomes, V, 850.
— — ondulante, III, 511 ; V, 850.
— — récurrente, IV, 369, 613 ; V, 850.
— Leishmaniose cutanée, V, 850.
— — interne, III, 511.
— Maladies tropicales, V, 850.
— Paludisme, V, 850.
— Typhus exanthématique, V, 778.
Troglodytella abrassarti, n. g., n. sp., infusoire parasite du chimpanzé, V, 499 (pl.).
309 Fourneau. Voir **Chimiothérapie.**
Trombidions de la Haute-Guinée, VIII, 657.
Trompe des glossines, siège de culture des trypanosomes, II, 599.
Tropicale (Médecine). Handbuch der Tropenkrankheiten, 3e édit., vol. IV, XIX, 257.
— (Maladies). Séro-floculation dans le diagnostic, XXIII, 31 (fig).
Tropidonotus. Propriétés venimeuses de la salive parotidienne, IX, 369.
Troupes noires en Algérie, III, 114, 209, 289, 346, 409.
Trous-pièges. Voir **Pièges.**
Trypanides, II, 532, 560 (pl.) ; III, 728.
Trypanobleu dans le paludisme, XII, 434.
— dans les piroplasmoses, VI, 571, 618 ; XX, 64.
— — dans l'immunisation contre la babésiellose bovine, XIX, 550.
— — dans le traitement des babésielloses, XIX, 783.
— dans la piroplasmose équine vraie, XXV, 18.
— — à *P. bigeminum*, XIX, 789.
— Action sur les *Tryp. congolense* et *cazalboui*, IX, 236.
Trypanolyse, III, 365, 368.
— (Réaction de) dans les infections à *Tryp. gambiense* et à *Tryp. rhodesiense*, V, 220.
— Action trypanolytique du sérum des animaux trypanosomés, XIII, 585.
Trypanorouge dans la dourine, IV, 116.
Trypanosoma akodoni, n. sp., VIII, 167 (fig.).
— *annamense*, VI, 690.
— *ardeæ* à la Guyane, XI, 125.
— *arvicanthidis*, n. var., VIII, 80.
— *berberum*. Comparaison avec le *Tr. soudanense*, VIII, 650, 654.
— — Hérédité de l'infection et immunité, XIII, 525.
— — Infection expérimentale des dromadaires, XIII, 521.
— — Passages sur cobayes. Augmentation de la virulence, XV, 947.
— — Inoculation à l'âne, XVII, 887.
— *blanchardi*, VI, 167.
— *brucei*, IV, 233, 273, 671 ; V, 101, 550, 611, 819, 877 ; VI, 28, 177, 340, 435, 502, 545, 590 ; VII, 53 ; XXIV, 311, 667.
— — Passage dans le lait, VIII, 438.
— — cause d'une infection humaine contractée au laboratoire, XXIII, 715.
— — et *Tr. rhodesiense*, VI, 340 ; IX, 731.
— — et *Tr. ugandæ*, IX, 731.
— — var. *ugandæ*, XII, 17.
— — — *werbitzkii*, V, 101.
— — Action synergique du 205 B-309 F. et d'un sérum spécifique, XXIV, 311.
— — Action du mélange naganol-sulfarsénol, XXIV, 667.
— *carchariasi*, I, 149 (fig.).
— *cazalboui*, I, 333, 354, 515, 519 ; II, 125, 551, 599 ; III, 80, 233, 364, 551, 603, 722 ; IV, 193, 539 ; V, 48, 281, 380, 545, 820 ; VI, 435, 536, 613 ; VII, 118, 691 ; IX, 152, 176.
— — au Sénégal, VIII, 130.
— — Inoculation au *Cercopithecus patas*, VII, 118.
— — Sensibilité de la rousselte, IX, 234.
— — Transmission, IX, 569.
— — Traitement, IX, 236 ; XXIV, 667.
— *cellii*, XIV, 430.
— *congolense*, I, 199, 351, 393, 515, 527 ; II, 125, 456, 526 ; III, 218, 233, 364, 443, 518 ; V, 45, 281, 550, 820 ; VI, 435, 503, 534, 588 ; XXV, 906 (fig.).
— — Étude expérimentale, IV, 196.
— — Diminution de virulence, IX, 109.
— — Sensibilité de la rousselte, IX, 234.
— — — des rousselles épaulières, XV, 246.
— — virulent pour le chat adulte, XXV, 21.
— — Exaltation de la virulence pour le chat, XXV, 33.
— — des porcs, X, 113.
— — Expériences et traitement, VIII, 31, 339.
— Traitement, IX, 236.
— — — Action de la combinaison émétique atoxyl-tryparosan, XII, 514.
— *cotylei*, n. sp., XVI, 14.
— *cruzi*, II, 304, 454 ; IV, 467, 662 ; V, 22 (fig.), 261, 360 (fig.), 598, 599 (fig.), 723 ; VII, 289.
— — Comparaison avec divers trypanosomes, VI, 167.
— — Formes dans l'estomac des punaises et des conorhines, VI, 378 (fig.).
— — Milieu d'isolement, XXII, 909.
— — Infection et voies de pénétration du virus, XIV, 537.
— — Passage à travers la peau, VI, 172.
— — Transmission par *Cimex rotundatus*, VI, 172.

— — Réduvide, hôte de —, VI, 382.
— — — transmetteur de l'Amérique du Nord, VII, 132.
— — Importance du cannibalisme et de la coprophagie chez les réduvidés hématophages pour la conservation en dehors de l'hôte vertébré, VII, 702.
— — transporté par *Triatoma geniculata*, XXV, 145.
— — Tatous porteurs de germes, XXIV, 62 (fig.).
— — Diminution de virulence, IX, 117.
— — et splénectomie, XXIII, 188.
— *cypseli*, n. sp., XVI, 13.
— *dendromysi*, n. sp., VIII, 726 (fig.).
— *denysi*, n. sp., V, 608 ; VI, 181.
— *dimorphon*, I, 213, 248, 354, 515, 519, 618 ; II, 39, 456, 551 ; III, 218, 443, 518. 551, 603, 722 ; IV, 190 ; V, 204. 278, 546 ; VI, 435, 503, 588, 612 ; IX, 152, 176.
— — au Sénégal, VIII, 130.
— — Variation du pouvoir infectieux et de la virulence, VII, 58, 281 (fig.), 361 ; VIII, 314 (fig.).
— — chez le cheval et le mulet, XIII, 241.
— — Essais de traitement, VIII, 28.
— *drosophile*, III, 364.
— *duttoni*, VI, 167, 626.
— — au Maroc occidental, X, 456.
— — Virulence pour quelques espèces animales, VII, 528.
— *eburneense*, n. sp., VIII, 81 (fig.), 84.
— *equinum*, III, 524.
— *equiperdum*, II, 211, 244 ; III, 379 ; V, 275, 611, 822 ; VI, 341, 583, 698.
— — Recherche, XIII, 515, 518.
— — Infection et voies de pénétration du virus, XIV, 537.
— — Diminution de virulence, IX, 117.
— — Essais de transmission héréditaire, XIV, 273.
— — Infection de la souris et du rat, XIV, 433.
— — Résistance vis-à-vis du 205 Bayer, XX, 413.
— *euphorbiæ*, n. sp., XV, 18.
— *evansi*, I, 198, 575, 617 ; III, 376 ; V, 31, 161, 276, 371, 548, 550, 880 ; VI, 435, 502. 691 ; XIII, 577.
— — Passage dans le lait, VIII, 438.
— — Comparaison avec *Tryp. ugandæ*, IX, 731.
— *gambiense*, I, 200, 210, 393, 510 ; II, 54, 129. 135, 244. 262, 308, 314, 397, 402, 472, 480 ; III, 82, 305, 364, 386, 433, 526, 561, 732 ; IV, 472, 619, 680 ; V, 26, 213, 220, 375, 492, 550, 614, 762 ; VI. 341. 435, 442, 503, 583, 588, 591, 697 ; VII, 49, 612.
— — Affinités avec *Tryp. rhodesiense*, VII, 612.
— — et groupes sanguins, XXIV, 664.
— — dans le liquide d'hydrocèle, XIV, 378.
— — Affinité pour le testicule, VI, 583.
— — Passage dans le lait, VIII, 438.
— — Diminution de virulence, IX, 109.
— — Sensibilité au sérum humain normal, IX, 81.
— — Conservation de la résistance au sérum humain, VIII, 442.
— — Inoculation au *Cercopithecus lasiopyga petaurista* et immunité consécutive, XXIV, 372.
— — Infection de la gerbille, du loir, du maki, du mérions, du raton et du renard, VIII, 745.
— — Sensibilité de la roussette, IX, 234.
— — — des roussettes épaulières, XV, 246.
— — Essai de vaccination. Toxine, IV, 680.
— — Traitement de l'infection expérimentale, VIII, 28, 31, 32, 37.
— — Pouvoir protecteur du sérum sanguin après injection de 309 Fourneau, XIX, 838.
— *grayi* = *Tr. kochi*, XXV, 575.
— *guist'hani*, n. sp., VIII, 87, 88 (pl.).
— *guyanense*, n. sp., XII, 258 ; XIII, 304.
— *heybergi*, n. sp., XVI, 659 (fig.).
— *hippicum*, III, 381 ; IV, 168 ; VI, 502.
— — Atténuation de virulence, V, 184.
— *hypostomi*, III, 521 ; IV, 168.
— *inopinatum*, V, 99.
— *karyoseukton*, II, 209.
— *kochi* = *Tr. grayi*, XXV, 575.
— *lagonostictæ*, VII, 115.
— *lanfranchii*. Sensibilité au sérum humain normal, IX, 84.
— *le royi*, n. sp. d'un chélonien (*Cinixis homeana*), XII, 14.
— *lewisi*, II, 209 ; V, 826 ; VI, 167, 175, 614.
— — au Congo belge (Stanleyville), XXII, 657.
— — au Maroc occidental, X, 456.
— — Virulence pour quelques espèces animales, VII, 528, 654.
— — Infection naturelle et expérimentale du rat, XIX, 791.
— — Inoculation à d'autres animaux que le rat, V, 826.
— — Sensibilité de la roussette, IX, 234.
— *liothricis*, VII, 116.
— *marocanum*, n. sp., agent d'une épizootie équine à Casablanca, VIII, 433, 576 ; X, 253, 504, 850 ; XVII, 131.
— — Étude morphologique et biologique, XXIV, 569.
— — Infection spontanée du chien, XIII, 23, 234.
— — Fréquence de la kératite chez les chiens infectés, XI, 375.
— *mega*, II, 209.

— *microti*, XIV, 574 (fig.).
— *minasense*, II, 304, 395.
— *montgomeryi*, XXV, 907 (fig.).
— *nabiasi*, VI, 167.
— *ninæ kohl-yakimov*, n. sp., XIV, 638, 652 ; XVI, 249, 314.
— *ougandæ*, VI, 685.
— — Comparaison avec *Tryp. evansi*, *rhodesiense* et *brucei*, IX, 731.
— — Traitement de l'infection expérimentale, VIII, 339.
— *pecaudi*, I, 351, 515, 519 ; II, 551 ; III, 364, 551, 599, 724 ; IV, 539 ; V, 545, 819 ; VI, 341, 435, 613 ; VII, 689 ; IX, 151.
— — Sensibilité du rongeur africain *Tachyorectes annectens*, XII, 84.
— *pecorum*, III, 718 ; V, 373, 820 ; VI, 440, 503.
— — var. *ruandæ*. Pouvoir attachant pour les hématies, XV, 203.
— *perroteti*, V, 595.
— *platydactyli* chez les geckos de Biskra, XI, 395.
— — Culture chez la punaise des lits, XI, 387.
— *rangeli*, n. sp. (= *Crithidia rangeli*) flagellé du *Rhodnius prolixus* au Venezuela, XIII, 527 (fig.).
— *rhamdiæ*, III, 523.
— *rhodesiense*, IV, 619, 623 ; V, 26, 101, 105, 213, 220, 241, 367, 379, 492, 877 ; VI, 340, 436, 502, 588, 698.
— — et *Tr. brucei*, VI, 340 ; IX, 731.
— — Affinités avec *Tr. gambiense*, VII, 642.
— — Action pathogène, IV, 675, 679 ; VII, 49.
— — Passage dans le lait, VIII, 438.
— — Infection du maki, VIII, 746.
— — Traitement de l'infection expérimentale, VIII, 32, 37.
— *rodhaini*, XXV, 906 (fig.).
— *rotatorium*, II, 209.
— — Formes crithidiennes et trypanosomiques, IV, 534.
— *simiæ*, XXV, 906 (fig.).
— *somalilense*, XIV ,430.
— *soudanense*, I, 394 ; V, 274, 547, 549 ; VI, 503.
— — Comparaison avec *Tr. berberum*, VIII, 650, 654.
— — chez les chevaux du Niger saharien, XXII, 662.
— — Absence d'immunité héréditaire, VIII, 73.
— — Traitement de l'infection expérimentale, VIII, 31.
— *talpæ*, XIV, 453.
— *theileri*, IV, 40, 112, 191, 309, 377, 378 (fig.), 536 (fig.) ; V, 281, 725 ; VI, 433, 434.
— — en Russie. Répartition géographique, XVIII, 57.
— — au Soudan français, XVIII, 823.
— — au Turkestan, IX, 229.
— *togolense*, III, 376, 616, 618 ; IV, 476.
— *undulans*. Formes aflagellées, V, 99.
— *venezuelense*, III, 380 ; XIII, 299, 576.
— *vickersæ*, I, 267, 395.
— *vivax*, III, 80 ; IV, 193.
— *wrublewskyi*, n. sp. = ? *theileri*, VIII, 431.
Trypanosomes et trypanosomiases (traité), V, 702.
— spirilles et spirochètes. Morphologie et classification, I, 151.
— Identification, III, 376 ; V, 611.
— Coloration, XIII, 205, 206.
— Xénodiagnostic (Diagnostic par l'examen de l'hôte invertébré), VII, 706.
— Formes d'évolution chez l'hôte vertébré ? XXII, 862.
— Perte du flagelle, III, 366.
— Dissociation des — par l'émétique, II, 125.
— et pigment, III, 369.
— métacycliques, VI, 168.
— phagocytés, III, 365.
— Action de la bile sur les —, VI, 24.
— d'origine humaine. Sensibilité au sérum humain normal, IX, 81.
— Adaptation à l'homme, XXIII, 719.
— Infections à — et voies de pénétration des virus, XIV, 537.
— Pénétration par les muqueuses intactes, II, 244 ; III, 433 ; V, 723.
— Passage dans le lait, VIII, 438.
— dans les ganglions avant et après le traitement, II, 472.
— dans le sang avant et après le traitement, II, 472.
— dans le liquide céphalo-rachidien avant et après le traitement, II, 472.
— Persistance des — dans le liquide céphalo-rachidien de mulets atteints de nagana, XII, 17.
— Non-transmission de la mère au fœtus, V, 550.
— Transmission héréditaire des — du dromadaire et du cheval, XXIII, 753.
— Passage de la mère au fœtus dans le debab, XII, 177.
— absents à la 3e période de la maladie du sommeil, II, 135, 535 ; III, 23, 62.
— Disparition sous l'action de divers médicaments, XVI, 770.
— et choriorétinite, III, 303, 305.
— Inoculation dans la cornée, II, 261.
— — intravortiqueuse et lésions choriorétiniennes, III, 303.
— Influence des passages par cobayes sur la virulence, I, 198.
— Diminution de virulence après un grand nombre de passages par animaux de même espèce, IX, 109.
— Altérations de la rate chez le cobaye infecté, I, 393.
— Incubation chez des chiens inoculés avec virus de chèvre, VIII, 653.
— Tableau généalogique d'un — du

dromadaire passé sur cobayes, XV, 947.
— et anaphylaxie, IV, 671
— et anticorps, II, 135, 535 ; III, 23, 368 ; VI, 699.
— Immunisation contre des — pathogènes, V, 877.
— Essais d'immunisation avec — desséchés, VI, 178, 693.
— morts comme vaccin, IV, 680.
— de l'Afrique du Sud, II, 392 ; V, 26.
— du Congo, II, 204, 209.
— du Togo, I, 200.
— des chameaux du Turkestan et de l'Oural, XIV, 637, 638.
— de la chauve-souris en Italie. Stades de développement chez un acarien, XIV, 542 (fig.).
— d'une chauve-souris (*Nycteris hispida*) au Congo belge, XVI, 659.
— du crocodile. Rôle de la membrane péritrophique des glossines dans l'évolution du —, XXV, 575.
— des lézards, V, 595.
— d'un lézard du Haut-Sénégal et Niger, VII, 491.
— des oiseaux au Brésil, VII, 395 (fig.) ; IX, 255.
— — en Corse, VI, 545.
— — en Grèce, II, 268.
— — du Haut-Sénégal et Niger, VII, 493.
— — au Paraguay, IX, 361.
— du *Bycanistes albotialis*, VII, 296.
— d'hirondelles, XVI, 12, 122.
— d'un passereau, IV, 526.
— des poissons. Culture, XVI, 412.
— — brésiliens, III, 521 (fig.).
— des porcs, XXV, 906 (fig.).
— du requin, I, 148.
— du caderas chez les carpinchos, III, 524.
— du type *lewisi* chez les muridés de la Côte d'Ivoire, VIII, 80 (pl.).
— de Mazagan. Dimorphisme, IX, 130 (fig.).
— d'un dromadaire et du cheval au Maroc, XXIII, 747 ; XXIV, 112, 569.
— Virus du Maroc. Infection d'un jeune chien par l'allaitement, IX, 567.
— non pathogènes dans le sang de bovidés en Algérie, IV, 40.
— — — — en France, IV, 112.
— — — — portugais, V, 603, 725.
— — — — en Russie, VI, 433.
— — — — au Turkestan, VI, 434.
— du debab égyptien, XXV, 563, 748.
— — — et du debab marocain, XXV, 750.
— — — et du surra, XXV, 753.
— — — Action du sérum humain, XXV, 749.
— — — Étude sérologique, XXV, 750.
— du latex des euphorbes, XV, 18, 197, 299.
— — — Culture, XV, 301.
— Action du latex d'euphorbes sur différents —, XVI, 41, 256.
— Culture dans les latex, XVI, 41, 256.
— parasites des puces, VI, 167.
— acentrosomiques, IV, 233, 273.
— et moustiques, VI, 442.
— en culture dans l'intestin de *Pangonia*, IV, 528.
— de la trompe des glossines, I, 564.
— et glossines, II, 599 ; III, 364, 599, 722 ; IV, 539 ; V, 204.
— — Évolution comparée des — pathogènes, VI, 435.
— — Relations bio-géographiques, VI, 28.
— Expériences de transmission par les glossines, V, 204.
— — — par déjections de puces, VI, 167.
— — — par les punaises, VI, 173.
— — — par les *Stegomyia*, VII, 49.
— — — par les stomoxes en A. O. F., V, 544.

Trypanosomiases animales en Afrique équatoriale française, région de Fort-Archambault, VII, 689.
— — — — — (Moyen-Chari), IX, 151.
— — — — — (M'Bomou), VIII, 197.
— — de l'Afrique du Nord, XIX, 321.
— — en Algérie, V, 274.
— — — dans la région de la Zousfana (Sud-Oranais), I, 25.
— — au Brésil, à Sao-Paulo, IV, 191.
— — au Cameroun, à Douala, XI, 746.
— — en Cochinchine, XVI, 425.
— — au Congo belge, VIII, 561.
— — — — (Bas-Katanga) et leurs rapports avec les glossines, V, 45, 281, 608.
— — — — (Haut-Katanga), V, 819.
— — — — dans l'Ouellé, IX, 95.
— — — français, I, 351, 515 ; XII, 431.
— — à la Côte d'Ivoire, VII, 152 ; IX, 176.
— — au Dahomey, I, 519.
— — au Haut-Dahomey, III, 551.
— — dans l'Oubangui-Chari, VIII, 197.
— — (équines) à Panama, III, 381 ; IV, 168.
— — en Perse, XXIV, 89.
— — en Russie d'Europe, V, 822.
— — au Sénégal dans les zones à glossines, IX, 802.
— — — en Casamance, IV, 189.
— — — — et Haute-Gambie, V, 204.
— — — à la Petite-Côte et dans la région de Niayes, I, 269.
— — — — et au Bas-Saloum, VIII, 130.
— — en Somalie italienne, XIV, 423 (fig.).
— — au Soudan, III, 61 ; XXII, 662.
— — au Tchad, VII, 689 ; IX, 151.
— — au Venezuela, XIII, 297, 380, 576.
— — Diagnostic, V, 611.

— — Ophtalmo- et intrapalpébroréaction, VIII, 112.
— — Réaction des lipoïdes, I, 140.
— — — à la trypanoléine et formolgélification dans les affections à *Tr. pecaudi*, XVIII, 352.
— — Pouvoir empêchant du sérum des malades chroniques, XVI, 733.
— — et infections bactériennes, III, 83.
— — Considérations d'ordre prophylactique, V, 380.
— — Prophylaxie, VII, 1, 152 (c.).
— — Traitement (Voir aussi aux divers trypanosomiases).
— — — par les composés d'antimoine. Voir aussi Bisantol (Bismuth).
— — — par l'émétique, I, 44, 212, 509 ; V, 388 ; VIII, 348 ; IX, 813 ; XVII, 130.
— — — — associé à l'atoxyl, XVII, 130.
— — — — sodique, III, 218.
— — — — d'aniline, III, 218.
— — — par les arsenicaux. Mode d'action, II, 45, 405.
— — — par l'atoxyl, I, 28 ; II, 51, 54 ; XVII, 131.
— — — — associé à l'afridol violet, II, 54.
— — — — — à l'orpiment, I, 28, 503, 617 ; II, 51 ; V, 387.
— — — par l'arsénophénylglycine, VI, 534, 588.
— — — par les dérivés phénylarsiniques administrés *per os*, XIX, 737.
— — — par le 2754 Hœchst, XX, 734.
— — — par l'halarsine, XX, 535.
— — — par l'orpiment, I, 28, 503, 617 ; II, 51 ; III, 221, 443 ; V, 386 ; VI, 534.
— — — par l'arsénobenzol, IV, 472.
— — — par le novarsénobenzol, XVII, 131.
— — — par le galyl, VI, 502.
— — — Action des composés du Bismuth, XVI, 587.
— — — par le bisantol, XX, 535.
— — — par le 205 Bayer-309 Fourneau, XV, 613 ; XIX, 614, 692 ; XXI, 148.
— des ânes au Turkestan, VII, 187.
— de l'antilope, XXII, 653.
— des bovidés en A. E. F., XXI, 148.
— — à la Guadeloupe, XIX, 435 ; XXII, 668.
— — à la Guyane française (*Tr. guyanense*), XII, 258.
— — au Congo belge (au Katanga), XXII, 381.
— — à la Martinique, XXII, 246.
— — Traitement par l'atoxyl, XXII, 668.
— — — préventif par le 309 F., XXII, 776.
— — — curatif par le 205 B.-309 F., XIX, 614, 692.
— des chameaux au Turkestan, VII, 187 ; IX, 230.
— — russes, XVI, 314.
— chez les chiens de la Haute-Volta, V, 278.
— des porcs en A. E. F., XXI, 152.
— — au Congo belge, X, 113 ; XXV, 906 (fig.).
— — en Guinée française, XIII, 792.
— des ruminants d'Indochine et prophylaxie, IV, 56.
— **Baleri.** Étude clinique, I, 390.
— — et *glossina morsitans*, IV, 539.
— — Traitement par l'association atoxyl et orpiment, I, 617.
— — — par l'orpiment, I, 617.
— **Caderas** (Mal de) des bovidés au Paraguay, XXV, 590.
— — — chez les carpinchos, III, 524.
— — — Traitement par l'émétique, I, 215.
— **Debab** en Algérie, dans la région de Barika, I, 22.
— — — dans le Sud-Oranais, III, 478 ; VIII, 68 ; IX, 480.
— — — dans la région de la Zousfana, I, 25 ; III, 478.
— — chez le chien dans le Sud-Oranais, VIII, 70.
— — — à Touggourt (Sud Constantinois), XV, 549.
— — — Transmission par les stomoxes, XVI, 168.
— — — Essais négatifs de transmission par *Rhipicephalus sanguineus*, XX, 222.
— — des dromadaires de la Zousfana, I, 25.
— — — Mortalité, XI, 568.
— — — Immunité, XII, 86.
— — — et nagana, XVII, 131.
— — — et trypanosomiase des chevaux du Maroc, XXIII, 747.
— — — Hérédité de l'infection et immunité, XIII, 525.
— — — Infection expérimentale par *Tr. berberum*, XIII, 521.
— — Évolution, XVII, 130.
— — Passage de trypanosomes de la mère au fœtus, XII, 177.
— — Prémunition, XIX, 532.
— — égyptien. Le trypanosome, XXV, 563, 748, 749, 750, 753.
— — — Transmission héréditaire, XXV, 748.
— — Essais de traitement, XVII, 130.
— — Traitement par l'atoxyl, XVII, 131.
— — — par le novarsénobenzol, XVII, 131.
— — — par l'émétique, XVII, 130.
— — — par l'émétique associé à l'atoxyl, XVII, 130.
— — Étude comparée du debab et de quelques autres —, V, 274.
— **Dourine** en Roumanie, II, 211.
— — en Russie, V, 822 ; XVIII, 54.

— — Diagnostic par ponction du testicule, XVII, 298.
— — — expérimental, XIII, 518.
— — Intrapalpébroréaction, XIV, 374 (pl.).
— — Réactions de fixation, XVII, 23, 27 ; XIX, 325.
— — Réaction des lipoïdes, I, 140.
— — et taher, III, 379.
— — taher et debab, V, 274.
— — Persistance des germes pathogènes chez des étalons guéris, XIII, 515.
— — Essais de transmission héréditaire, XIV, 273.
— — Traitement. Chimiothérapie, XIX, 328.
— — — par l'atoxyl, XVIII, 55.
— — — par la tryparsamide, XIX, 329.
— — — par le trypanroth et par des préparations arsenicales, IV, 116.
— — — par l'émétique, I, 213.
— — — par le 205 B.-309 F., XIX, 328.
— — — Résistance de *Tr. equiperdum* vis-à-vis du 205 B., XX, 413.
— **des chevaux du Maroc** (Maladie de Fez), VIII, 115, 433, 503 (pl.), 576, 646 ; X, 253, 850.
— — — par le Tryp. de Mazagan, X, 501.
— — — Identification du virus, X, 850.
— — — Troubles oculaires et locomoteurs, XI, 566.
— — — Étude expérimentale, X, 253.
— — — Essais de traitement, XI, 448.
— — — Guérison de la maladie expérimentale du chien par l'osarsan, XII, 220.
— **Nagana** de l'Ouganda, VI, 685 ; IX, 731.
— — du Togo, III, 376.
— — et debab du dromadaire de l'Afrique du Nord, XVII, 131.
— — et surra du Togo, III, 376.
— — Transmission par les moustiques du genre *Mansonia*, I, 355.
— — — par les stomoxes, I, 355.
— — expérimental. Réaction des lipoïdes, I, 141.
— — — Pouvoir bactéricide du sang, I, 136.
— — *ferox*, IX, 731.
— — *werbitzki*, IV, 233, 273.
— — Essais d'immunisation, VII, 53.
— — des souris et sérum humain, III, 726.
— — Traitement par l'émétique, I, 45, 212.
— — — par le 309 F., XXI, 148.
— — expérimental. Traitement préventif et curatif par le 309 F., XXIII, 630.
— **Souma** au Tchad, XVII, 203.
— — des bovidés de la région de Carnot (Haute-Sangha) : *Tr. cazalboui*, XII, 431.
— — Étiologie. Rôle des glossines et des stomoxes, I, 333, 390 ; II, 599.
— — et *Glossina palpalis*, II, 599.
— — Différenciation du *Tr. cazalboui* de *Tr. vivax*, IV, 193.
— — Prophylaxie, V, 380.
— — Traitement par l'arsénophénylglycine, VI, 536.
— — — par l'orpiment, I, 617 ; VI, 538.
— — — par l'association atoxyl-orpiment, I, 617.
— **Surra** en Basse-Cochinchine, V, 371.
— — d'Indochine. Historique. Répartition. Espèces affectées, XIX, 746.
— — chez les équidés et les bovidés à Ceylan, V, 161.
— — et nagana du Togo, III, 376.
— — d'Indochine. Ruminants réservoirs de virus, I, 575 ; II, 65 ; VI, 690.
— — — Agents de transmission, XIX, 752.
— — — Porteurs de parasites, XIX, 753.
— — — des bœufs. Diagnostic, XIX, 747.
— — debab et taher, V, 274.
— — nagana *ferox*, nagana de l'Ouganda et infections dues au *Tr. rhodesiense*, IX, 731.
— — des caprins, V, 31.
— — d'Indochine. Clinique, XIX, 749.
— — — Inoculation aux animaux d'épreuve, XIX, 751.
— — — Étude expérimentale, XIX, 754.
— — — Inoculation au porc, VI, 691.
— — Influence du passage par cobayes sur la virulence, I, 198.
— — d'Indochine. Essais de traitement, XIX, 754, 759.
— — Traitement par l'émétique, I, 46, 213.
— — — par l'arsénophénylglycine, IV, 403.
— — — par les composés arsenicaux et arséno-argentins, VII, 200.
— — — par le 309 F. associé au bismuth, XXII, 669.
— — du chien. Traitement par le 205 B., XX, 222.
— — équin. Chimiothérapie curative, XXIII, 393.
— — — — préventive, XXIII, 368.
— — — Traitement par l'association sulfarsénol et 309 F., XXI, 849.
— — — — par le 309 F., XXIV, 563.
— — — — préventif par le naganol, XXIV, 840 ; XXV, 893.
— — var. *m'bori* sur la rive droite du Sénégal, III, 377.
— — — Passages chez le cobaye, I, 199.
— **Taher** chez les chevaux du Niger saharien, XXII, 662.

— — et dourine, III, 379.
— **expérimentales.** Infection du dromadaire par *Tr. berberum*, XIII, 521.
— — Augmentation de la virulence de *Tr. berberum* par passages sur cobayes, XV, 947.
— — Infection naganique (*Tr. brucei*) des souris. Traitement par le sérum humain, III, 726.
— — des souris. Infection mixte à *Tr. brucei* et *Treponema crociduræ* ; guérison, XXI, 315.
— — Expérience d'immunité croisée avec *Tr. brucei*, var. *werbitzkii* et *Tr. rhodesiense*, V, 101.
— — Cultures de *Tr. congolense*, II, 529.
— — Infections à *Tr. congolense*. Traitement, II, 526 ; III, 218.
— — Marche de l'infection à *Tr. cruzi* chez le cobaye et la souris, V, 598.
— — Infections dues à *Tr. dimorphon*. Traitement, II, 526 ; III, 219.
— — Infection par *Tr. evansi*. Traitement, VII, 200.
— — Essais de transmission de *Tr. gambiense* par *Glossina morsitans*, V, 762.
— — Variations de virulence du *Tr. gambiense* de deux origines humaines, V, 375, 379.
— — Infection des moutons et des chèvres par *Tryp. gambiense*, IV, 619, 679.
— — — comparée des porcs par *Tr. gambiense* et *Tr. rhodesiense*, V, 492.
— — — dues à *Tr. gambiense*. Traitement, II, 402 ; III, 526, 732 ; IV, 472.
— — Essai de vaccination avec trypanosomes morts ; toxine de *Tr. gambiense*, IV, 680.
— — Fréquence de la kératite chez les chiens infectés par *Tr. marocanum*, XI, 375.
— — Action pathogène de *Tr. rhodesiense* sur divers animaux, IV, 675, 679 ; V, 243, 244 ; IX, 731.
— — Infection à *Tr. rhodesiense* chez la chèvre, V, 105.
— — — — sur poule, V, 243.
— — — — sur souris, rats, lapins, chèvres, macaques, V, 241.
— — — comparée des porcs par *Tr. rhodesiense* et *Tr. gambiense*, V, 492.
— — Expérience d'immunité croisée avec *Tr. rhodesiense* et *Tr. brucei*, var. *werbitzkii*, V, 101.
— — Étude d'un virus humain du Sénégal, VII, 716.
— — Marche des infections mixtes trypano-spirochétiennes, XX, 653.
— — Influence du passage par cobayes sur la virulence, I, 198.
— — et *Glossina tachinoïdes*, *Gl. morsitans*, IV, 539.
— — Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines, V, 204.
— — — — par déjections de puces, VI, 167.
— — — — par les stomoxes en A. O. F., V, 544.
— — Non-transmission de la mère au fœtus, V, 550.
— — Essai de transmission héréditaire de la dourine, XIV, 273.
— — Absence d'immunité héréditaire, VIII, 73.
— — L'immunité conférée aux caprins par une première atteinte n'est pas héréditaire, VII, 724.
— — Action protectrice du sérum d'animaux trypanosomés traités à l'émétique, VII, 670.
— — Production des anticorps chez les animaux trypanosomés traités par le salvarsan, VI, 699.
— — Essais d'immunisation. Trypanotoxines, VI, 176, 693.
— — et séro-floculation de Henry, XXV, 230.
— — des souris. Mode de disparition des trypanosomes sous l'action de divers médicaments, XVI, 770.
— — Action des médicaments sur le pouvoir alexique du sérum, VII, 626.
— — Ambocepteurs et arsénobenzol, VII, 633.
— — Action préventive de l'arsénophénylglycine, II, 402.
— — — synergique sur le *Tr. congolense* du 205 B.-309 F. et composés organiques d'antimoine, XXV, 65.
— — — — — et de l'arsénobenzène « 3 », XXV, 570.
— — Action de composés organiques d'antimoine seuls ou associés au naganol dans le surra, XXV, 354.
— — Traitement avec suspensions huileuses d'antimoine et d'arsenic, VIII, 28.
— — — par l'émétique et l'atoxyl, VIII, 339.
— — — par les composés arséno-argentiques, VII, 200.
— — — par les composés arsenicaux, VII, 200.
— — — comparé par l'atoxyl, le salvarsan, le néosalvarsan, le galyl et le ludyl, VIII, 37.
— — — par un dérivé du diamino-arsénobenzène (O_1), VII, 593.
— — — par le dérivé O_1 du diamino-arsénobenzène, VIII, 31.
— — — — OK_1 —, VIII, 32.
— — — et prévention des infections à *Tr. brucei* et *Tr. cazalboui* chez la chèvre et le mouton par le mélange sulfarsénol-naganol, XXIV, 667.
— — — des — du cobaye par le 309 F., XVIII, 410.
— — — par le 309 F. de bovidés infectés par *Tr. cazalboui*, XVIII, 453.

— — Traitement par le 309 F. de bovidés infectés par *Tr. congolense pecorum*, XVIII, 456.
— — Actions synergiques du 205 B.-309 F. et d'un sérum spécifique dans la — à *Tr. brucei*, XXIV, 341.
— — Action préventive du naganol dans le surra expérimental équin à *Tr. annamense*, XXV, 893.
— **humaine** en A. E. F., VI, 34 (c.) ; XVII, 727 ; XVIII, 5 ; XX, 55, 460, 511 ; XXI, 54, 141 ; XXIII, 331, 917 ; XXV, 39.
— — — Détermination de la limite nord de la maladie, XV, 253.
— — — Mission de délimitation A. E. F.-Cameroun, VIII, 515 (c.).
— — — La ponction lombaire en brousse, XXIV, 826.
— — — et le traitement standard, XXIV, 834.
— — — dans la Haute-Sangha, IV, 144.
— — — — (région de Carnot), XII, 416.
— — — au Cameroun (1913-1914), IX, 303 ; XVIII, 762.
— — — — pendant la campagne, IX, 590.
— — — — à Douala, XI, 744.
— — — — en janvier 1929, XXII, 473.
— — — au Congo, III, 529 ; V, 403, 410 ; VIII, 578 ; XII, 416 ; XVII, 234, 729.
— — — — (Alima, Likouala, Bas-Oubangui), XVII, 234.
— — — — Répartition géographique, II, 108 ; III, 389.
— — — — Contagion par familles et par cases, I, 144.
— — — — Mouvement des malades, III, 604.
— — — — chez des Européens, VIII, 372.
— — — — Rapport de la mission d'études (1906-1909), II, 344.
— — — — Formule leucocytaire, V, 284.
— — — — Recherches des propriétés du sérum des malades, VI, 444.
— — — — Prophylaxie, III, 561, 586 ; V, 2 ; XIV, 405.
— — — — — Fonctionnement d'un secteur au Moyen-Oubangui, XIII, 376 (c.), 817, 830.
— — — — Village d'isolement de Brazzaville, IV, 699 (fig.).
— — — — Œuvre de l'Institut Pasteur de Brazzaville, XXIV, 5.
— — — au Gabon, XVII, 749.
— — — — Evolution, pronostic et traitement, XVII, 179.
— — — à l'Oubangui-Chari, V, 403, 410 ; XVII, 732.
— — — — au Bas M'Bomou, VIII, 138 (c.), 178.
— — — — Essai de prophylaxie médicale, XIII, 234, 343 (c.).
— — — au Tchad, XVII, 732.
— — — — au Moyen-Chari, VII, 686 ; IX, 143.
— — — — à Kabé, XVI, 93.
— — — — à Tchoa, XIII, 789 ; XIV, 57.
— — — — Prophylaxie, XV, 254.
— — en A. O. F., XIX, 389.
— — — à la Côte d'Ivoire, XXIII, 922.
— — — — (Basse-), IX, 168 ; XIV, 326.
— — — — Mesures de protection, V, 157.
— — — au Dahomey, I, 524.
— — — en Guinée française, V, 644 ; XXIV, 146.
— — — — — chez un Européen, IX, 231.
— — — dans le Haut-Sénégal et Niger (Soudan français).
— — — — dans la boucle du Niger, I, 273.
— — — — à Koulikoro, V, 828.
— — — au Sénégal, III, 239 (c), IV, 189 ; IX, 723 ; XVIII, 116.
— — — — à la Petite Côte et dans la région de Niayes, I, 269.
— — au Congo belge au Nord-Katanga, XII, 671.
— — — — à Kisantu. Prophylaxie, X, 398.
— — — — — Mortalité infantile, VIII, 752.
— — — — au Moyen-Kivilu, XII, 798.
— — — — dans les districts de Kwango et Kasaï (1920-1923), XVII, 76.
— — — — (Ituri), XII, 394.
— — — — dans l'Ouellé à la fin de 1914, IX, 38.
— — — — (Moyen-), Rôle des porcs dans la propagation, X, 115.
— — en Guinée portugaise, XIX, 315.
— — en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, IV, 624.
— — Distribution géographique, III, 58 (c.).
— — Diagnostic, I, 15 ; II, 126, 248, 510 ; XXII, 784.
— — — Exploration méningée, XXIII, 1014.
— — — Chlorurachie et glycorachie, XXIII, 640.
— — — Ponction lombaire, XXII, 962 ; XXIII, 23, 77, 90, 222, 289, 307, 582, 640, 1014.
— — — Réaction de Boveri, VIII, 261.
— — — — du benjoin colloïdal, XX, 865.
— — — — de déviation du complément, I, 26.
— — — — de Targowla, XXIII, 530.
— — — Valeur comparée de la réaction de Gaté et de l'auto-agglutination des hématies, XX, 737.
— — — expéditif dans la pratique de la brousse, XII, 726 ; XVII, 485.
— — — rétrospectif, II, 40 (fig.).

— — — Formule leucocytaire chez les Noirs, I, 360, 366.
— — — Formol-gélification, XX, 601.
— — — Caractères du liquide cérébro-spinal, I, 496.
— — — Agglutination et désagglutination des globules rouges, X, 392.
— — — Auto-agglutination des globules rouges, III, 438 ; V, 686.
— — — Pouvoir floculant du sérum, XXII, 912 ; XXIII, 459.
— — — Quotient albumineux du sérum des malades, XXIV, 181.
— — — Résistance globulaire, IX, 660.
— — Modifications tardives du liquide céphalo-rachidien, XXV, 340.
— — non traitée. Modification du sang et du liquide céphalo-rachidien, XXV, 317.
— — Richesse d'un suc ganglionnaire en parasites, XVIII, 146.
— — Recherches des propriétés du sérum des malades au Congo français, VI, 444.
— — Période d'incubation, I, 402.
— — Symptômes, II, 264.
— — — nerveux du début, I, 15.
— — Début de l'évolution nerveuse, XXIV, 828.
— — Troubles psychiques, III, 486.
— — — oculaires, XV, 139.
— — Iritis, I, 277.
— — Pouls lent, VI, 269.
— — Période sanguine et période méningée, XXIV, 833.
— — Alternance de l'infection sanguine, XXII, 666.
— — Disparition spontanée des trypanosomes, XXV, 956.
— — Variations spontanées de l'infection sanguine, VI, 581.
— — Hypertrophie ganglionnaire, I, 221.
— — Lésions cutanées, II, 532.
— — Cyclite, I, 398.
— — Évolution et pronostic, III, 389.
— — — Renseignements fournis par la rachicentèse, XXII, 962.
— — chez les Blancs, I, 569 (pl.) ; II, 40, 480 ; III, 389.
— — Infection et réinfection chez un Européen. Auto-observation, XXV, 664, 666.
— — Auto-observation d'un médecin, III, 642.
— — Deux auto-observations de — africaine, XXII, 949.
— — contractée au laboratoire, V, 883.
— — Forme cérébrale, I, 569.
— — méningée et tryparsamide, XXIII, 950.
— — et méningite aiguë, II, 400.
— — et pneumonie, III, 25.
— — et signe de Kernig, V, 187.
— — et infection bactérienne, III, 83.
— — Infection locale à la suite de piqûres de glossines infectées, I, 402.
— — chez l'Européen. Phénomènes cutanés particuliers, VI, 628.
— — — Réactions locales, VI, 267.
— — et rechute, II, 54 ; III, 392.
— — et grossesse, VIII, 578.
— — Conception et grossesse au cours de la —, II, 477.
— — Non-transmission de la mère au fœtus, V, 550.
— — associée à diverses infections, XXIII, 1011.
— — Arséno-résistance et moranyl, XXIV, 374.
— — La — arséno-résistante est-elle transmissible ? XXIII, 499.
— — Durée de la stérilisation sanguine par une dose de divers médicaments, IX, 13.
— — Résultats éloignés du traitement, III, 333.
— — Durée moyenne de la vie des trypanosomés en traitement, X, 719.
— — Relation des pores avec la — au Moyen-Congo belge, X, 113.
— — *Cercopithecus ruber* ou *patas*, animal témoin, II, 129.
— — Étude d'un virus du Sénégal, VII, 716.
— — A propos du pouvoir protecteur de sérums de malades, VI, 447.
— — Hypothèse de l'immunisation au cours des épidémies, XIV, 410.
— — Travaux de Pittaluga, X, 161
— — Prophylaxie, I, 210, 247, 255, 258, 261 (c.), 271, 273, 319, 448 ; II, 308 ; III, 330, 386, 561, 586 ; IV, 67, 449, 505 ; V, 2, 287, 463 ; VI, 184, 272, 381, 632 ; XXIV, 757, 834.
— — — Rapport de commission, IV, 8.
— — — Commission d'études pour les colonies, IV, 649.
— — — Rapport Mesnil et Roubaud, VII, 1.
— — — Création d'une commission et rapport, XXIV, 254, 737.
— — — Vœux, IV, 67, 505.
— — — Notices sur la prophylaxie, XIII, 477 ; XVII, 424, 620 ; XVIII, 362.
— — — Lettre du Ministre des Colonies et arrêté, IV, 503, 506.
— — — dans les colonies françaises africaines, XVII, 288, 424, 523, 620 ; XVIII, 5 ; XX, 55, 511 ; XXI, 54 (c.), 141 ; XXIII, 331 (c.), 917, 920.
— — — Vœu relatif à l'A. E. F., XIX, 4.
— — — au Cameroun, IX, 303 ; XV, 830 ; XVII, 523 ; XVIII, 5, 6.
— — — au Congo belge, XVII, 485.
— — — au Moyen-Congo, XIV, 405.
— — — — Village d'isolement de Brazzaville, IV, 699 (fig.).
— — — au Tchad, XV, 253.

— — Prophylaxie par administration d'atoxyl et de tryparsamide, XIX, 463.
— — — par les huiles aromatiques, XIX, 701.
— — — Résultats fournis par deux méthodes de traitement, XX, 883.
— — — Etui porte-fiches des trypanosomés, XVII, 524.
— — **américaine** (Maladie de Chagas) (Voir aussi *Tr. cruzi*), II, 304 ; V, 22 ; VI, 49.
— — — au Brésil, dans l'État de Saint-Paul, VII, 289.
— — — au Pérou, dans les forêts orientales, XII, 723.
— — — au Venezuela, XII, 509.
— — — Réduvide transmetteur de l'Amérique du Nord, VII, 132.
— — — Importance du cannibalisme et de la coprophagie chez les réduvidés pour la conservation en dehors de l'hôte vertébré, VII, 702.
— — — Xénodiagnostic, VII, 706.
— — — Identification d'un virus contracté au laboratoire, VII, 196.
— — — Infection du cobaye et de la souris, V, 598.
— — — Hérédité des infections expérimentales à *Schizotrypanum cruzi*, XIV, 232.
— — — Immunité, VI, 172.
— — ***Traitement*** préventif, I, 210 ; XIV, 238 ; XIX, 463 ; XXII, 487, 872 ; XXIII, 491 ; XXIV, 557.
— — — Influence sur la natalité, XXII, 489.
— — — Cure standard, XXV, 39.
— — — — en A. E. F., XXIII, 339, 721, 917, 920 ; XXIV, 530, 834.
— — — Thérapeutique intrarachidienne, XV, 59.
— — — Cas de guérison à la deuxième période, XVII, 368.
— — — Observation et traitement de quelques malades, VII, 711.
— — — Résultats chez les Blancs. Délai d'observation, I, 570, 620.
— — — par la collobiase d'antimoine, XIII, 27.
— — — par l'antimosan (Heyden, 661), XIX, 688.
— — — par l'émétique, I, 47, 210, 212, 509 ; II, 51, 308, 317 ; III, 233.
— — — — huileux, XI, 379.
— — — — Accidents d'intoxication, II, 317.
— — — par association émétique d'aniline et atoxyl, III, 194, 288.
— — — par le stibosan (Heyden, 471), XIX, 193.
— — — par les composés arsenicaux. Vœu, XIX, 4.
— — — Arséno-résistance, XXII, 201, 540 ; XXIII, 291, 461, 499 ; XXIV, 374 ; XXV, 260, 279, 280.
— — — Echecs de l'action trypanocide des arsenicaux, XXIV, 660.
— — — par l'acide arsénieux, III, 386.
— — — par la solution arsenicale de Lœffler, I, 504 ; II, 409.
— — — par l'acétylarsan, XX, 218, 524.
— — — par l'arsénophénylglycine, II, 402, 405, III, 222 ; IV, 411, 419 ; VI, 272.
— — — par l'atoxyl, I, 398, 508, 569, 620, 624 ; III, 333 ; VI, 184 ; XX, 55, 511, 883 ; XXI, 144 ; XXII, 482, 779 ; XXIV, 7.
— — — — (préventif), I, 210 ; XXII, 487.
— — — par le novatoxyl, XXII, 431.
— — — par l'association atoxyl et afridol, II, 54.
— — — — et émétique, I, 210, 569 ; II, 51, 308, 620.
— — — — et mercure, I, 572, 621.
— — — — et orpiment, I, 500, 508, 617 ; IV, 310.
— — — — et strychnine, I, 621.
— — — par l'orpiment, I, 500, 508, 617 ; II, 51, 308 ; III, 42, 443 ; V, 287.
— — — par le stovarsol, XVII, 214.
— — — par le tryparosane, III, 330.
— — — par la tryparsamide, XV, 802 ; XVI, 606 ; XVII, 692 ; XVIII, 645 ; XIX, 4, 8, 271 ; XX, 689, 875 ; XXI, 145, 211 ; XXII, 484 ; XXIII, 950 ; XXIV, 9, 637.
— — — — associée au moranyl, XXV, 900.
— — — — Résultats éloignés dans la forme méningée, XXIV, 528.
— — — — (préventif), XXIV, 557.
— — — — Arséno-résistance, XXII, 201, 540.
— — — par le tryponarsyl = tryparsamide.
— — — par le 189, XV, 729, 797.
— — — par le 269 Fourneau, XXI, 646.
— — — par le 270 F. (Orsanine), XXIV, 10 ; XXV, 252, 902.
— — — par le 417 F., XXI, 649.
— — — par le 2754 Hœchst, XX, 734.
— — — par l'arsénobenzol, III, 526, 618 ; IV, 141, 472 ; VI, 632.
— — — — sous forme d'onguent, III, 618.
— — — par le novarsénobenzol (ou néosalvarsan). Etat des méninges et injections intrarachidiennes, VII, 63.
— — — par le salvarsan cuprique (sel sodique), VIII, 582 ; XII, 680.
— — — par les dérivés O, et OK du diaminoarsénobenzène, VIII, 74, 169.
— — — par le galyl, VII, 160, 640.
— — — par le ludyl, VII, 160, 640.
— — — par les couleurs de benzidine (afridol violet), II, 54.
— — — par le trépol (composé du Bismuth), XV, 692.
— — — par l'iodosalyl, XIII, 246.

— — — par le cyanure de mercure, III, 386.
— — — par les injections intraveineuses d'urotropine, XIII, 648.
— — — par le phosphure de zinc, III, 388.
— — — par le « 205 B.-309 F. » = Germanine = Moranyl = Naganol, XV, 613 ; XVIII, 410, 641 ; XX, 460 ; XXV, 898.
— — — — associé à l'atoxyl, l'émétique et le novarsénobenzol, XVIII, 312, 644.
— — — — associé à la tryparsamide, XXV, 900.
— — — — (préventif), XXII, 487, 872 ; XXIII, 491 ; XXIV, 557 ; XXV, 347.
— — — Arséno-résistance et moranyl, XXIV, 374.
Trypanosomides. Voir aussi *Crithidia, Herpetomonas, Leishmania, Leptomonas, Trypanosoma.*
— des insectes confondus avec des microsporidies, IV, 662.
— d'*Hæmatopota* au Congo belge, VI, 182 (fig.).
— Essai sur la pluralité des espèces parasitant le tube digestif des invertébrés, X, 811.
Trypanotoxines, IV, 42.
— Essais d'immunisation contre les trypanosomes, VI, 176, 693.
— Sur l'existence des —, XXI, 544.
Trypanotoxyl, II, 45, 405.
Trypanroth. Voir **Trypanorouge.**
Tryparosane dans la prophylaxie de la maladie du sommeil, III, 330.
— Action sur les *Tr. congolense* et *cazalboui*, IX, 236.
Tryparsamide. Voir **Arsenicaux.**
Trypasafrol dans les trypanosomiases, VI, 539.
Tryponarsyl. Voir **Arsenicaux.**
Trypoxyl. Voir **Arsenicaux** : Atoxyl.
Tsétsés. Voir **Glossines.**
Tubercules (Pseudo-) coccidiens du foie du lapin, XVIII, 633.
Tuberculeux (Bacilles) morts. Sensibilisation et nécrotuberculose provoquées par l'injection de —, I, 420.
Tuberculine. Ophtalmo-réaction chez les indigènes d'Algérie, I, 337.
— Ophtalmo et cuti-réaction, III, 21.
— et traitement de la tuberc., II, 163.
— (Les), II, 163.
— de Koch et B. C. G. Cuti-réactions comparées, XXV, 298.
Tuberculino-réaction, V, 234, 852, 855.
Tuberculoïdes de la lèpre, XXIV, 898.
Tuberculose en A. O. F., XIX, 389 ; XXIII, 533.
— en Algérie, dans le Tell algérois, VIII, 250.
— — dans les Hauts-Plateaux constantinois, VIII, 423.
— — dans le Sahara constantinois, VIII, 427.
— — dans le Hodna oriental, X, 860.
— — chez les indigènes du Hoggar, XXI, 493.
— — Étude de l'infection tuberculeuse dans la population indigène de Ouargla, XII, 589.
— — Cuti-réactions à Alger, IX, 425.
— — — chez les indigènes du Tidikelt, XII, 353.
— — sur les indigènes et ophtalmoréaction, I, 337.
— en Annam. Epidémiologie, V, 234.
— — à Hué, IV, 550.
— en Cochinchine, chez les Annamites, XVII, 466.
— dans nos colonies, XV, 51.
— aux Comores, à Mohéli, XI, 62.
— au Congo belge, XXIII, 283.
— — — à Léopoldville, VI, 55.
— — — T. pulmonaire dans l'Ouellé, VIII, 739.
— — — Cuti-réaction chez les jeunes Noirs de Stanleyville, XXIII, 279.
— à la Côte d'Ivoire, XXIII, 777 ; XXV, 679.
— — et alcoolisme, V, 855.
— en Guinée, chez les Noirs, III, 21.
— — Cuti-réaction, XV, 354.
— à la Guyane française, IX, 466 ; X, 778.
— aux Indes. Épidémiologie, XXIII, 5.
— à Madagascar, XXI, 716 ; XXII, 533 ; XXIII, 672 (fig.).
— — pulmonaire en Emyrne. Dépistage par un procédé *post-mortem*, XXIV, 615.
— — Cuti-réaction chez les enfants de Tananarive, XXI, 878.
— — Indice tuberculinique chez l'indigène en dehors de Tananarive, XXIII, 246.
— — pulmonaire chez les Malgaches. Radiographie, XXV, 1011.
— au Maroc. Main-d'œuvre marocaine en France et propagation de la — au Maroc, XXI, 192.
— — Cuti-réaction chez les indigènes de Figuig, XXI, 10.
— à la Martinique. Prophylaxie, VI, 368.
— en Nouvelle-Calédonie, XXI, 457.
— au Sénégal, à Dakar, XXIII, 664.
— — — Fréquence, XX, 450.
— — — hôpital principal, XXV, 657, 658.
— — — — central indigène, XXV, 662.
— — — T. extra-hospitalière, XXV, 663.
— — — Cuti-réaction chez les enfants, XV, 344.
— — — Prophylaxie, XX, 138, 228, 453.

— au Sénégal, à Dakar. Prémunition par le B. C. G, XXV, 366.
— — à Saint-Louis, VI, 11.
— au Soudan français, X, 570.
— au Tchad, dans l'Ouadaï, VII, 523.
— pleuro-pulmonaire des Noirs, XIII, 713.
— Cuti-réaction à la tuberculine, XXV, 298.
— Dépistage chez les Noirs par la réaction de Vernes, XXV, 349.
— (Bacilles de la). Formes d'involution, V, 13.
— — dans un abcès amibien du foie, VII, 475.
— cutanée avec association putride, XXIII, 672 (fig.).
— externes ou larvées chez les indigènes africains et réaction de Vernes, XXIV, 793.
— latente réactivée par le passage de larves d'ankylostomes à travers le parenchyme pulmonaire, XXII, 26.
— chez les lépreux. Importance du diagnostic, XXI, 741.
— Complication méningée chez un Noir, XXV, 839.
— Méningite à Bamako (Soudan français), X, 570.
— pulmonaire coexistant avec un fibrome périostique intrathoracique, XXII, 788.
— — granulique, XXIV, 968.
— Pyopneumothorax à signes cliniques et radiologiques atypiques, XXI, 349 (fig.).
— Mégalosplénie primitive avec anémie de type pernicieux, XXIII, 16.
— associée au *Sporotrichum carougeaui* chez un enfant malgache, XV, 444.
— et typhus exanthématique, XIII, 278.
— de la voûte du crâne chez un Noir du Soudan, XIII, 330.
— Posologie de l'antigène méthylique et son emploi dans la lèpre, XXI, 14, 954.
— Traitement par la tuberculine T. A. O., II, 163.
— Vaccination par le B. C. G., XXIV, 143, 173.
— — — à Dakar, XXV, 366.
— — — en Cochinchine et au Cambodge, XVIII, 379.
— — — à Madagascar, XXI, 282 ; XXIII, 870.
— — — à l'île Maurice, XXI, 190.
— — — des nourrissons noirs, XVII, 938 ; XVIII, 431.
— **bovine** en Cochinchine. Le bacille, XXV, 1026.
— à Madagascar dans la région Ouest Sakalave, XXIII, 250.
— — — chez le zébu, XXII, 787.
— — au Sénégal, à l'abattoir de Dakar, XV, 356 ; XVI, 207, 381.
— — — chez un zébu à Dakar, XV, 868.
— — au Soudan à l'abattoir de Bamako, XVIII, 687.
— pulmonaire du chat, XXIV, 861.
— et leishmaniose chez le chien, IX, 429.
— des singes, XXIV, 143.
— des poules. Formule leucocytaire, XXII, 767.
— Première conférence intercoloniale de la —, VI, 290.
— (Pseudo-) mycosique, III, 488.
— — zoogléique à la Côte d'Ivoire, IX, 416.
Tumeurs. Voir aussi **Papillome.**
— en Afrique centrale (Congo belge) chez les Noirs, XII, 567 ; XIX, 564 (fig.) ; XXIII, 205.
— en Afrique équatoriale française, VIII, 303.
— en Algérie chez les indigènes, I, 593.
— — Épithélioma, VI, 133, 714.
— — Tumeurs malignes de la peau chez les indigènes, XII, 184.
— au Cameroun : — superficielles multiples, XV, 956 (fig.).
— en Cochinchine, XVIII, 495 ; XIX, 569.
— au Sénégal, XV, 363, 485 (fig.). ; XXIII, 110.
— — à Dakar en 1922, XVI, 450.
— en Tunisie, IV, 399.
— **malignes** de la race noire, XXIII, 109.
— de l'œsophage chez un ouolof, XV, 363.
— mixte du maxillaire supérieur d'origine dentaire, XV, 485 (fig.).
— ganglionnaires malignes chez les animaux domestiques au Tonkin, XX, 345.
— chez une génisse zébu, X, 182.
— Néoformation osseuse de nature métaplasique chez le porc, XXIV, 619.
— bilharzienne, XXIV, 499.
— et bilharziose, XI, 710.
— Rôle étiologique des bilharzies, XXIII, 136.
— **filariennes**, III, 88, 92.
— Kystes et adénomes causés par des nématodes, XI, 573, 574.
— Kyste synovial simulé par *Onchocerca volvulus*, XV, 499.
— et parasites, XX, 345.
— chez les rats, dus au *Tænia crassicollis*, XVII, 835.
— Epithélioma de la paupière, XVI, 270 (fig.).
— fibreuses chéloïdiennes, XX, 553 (fig.).
— Cancer. Épidémiologie, XVII, 854.
— — de l'estomac. Radiographies, XXV, 789.
— — primitif du foie, XVII, 808.
— — — probable du foie en Cochinchine, XIX, 569 (pl.).

— — — du poumon au Tonkin, XXV, 85.
— — de l'ovaire, XVII, 330.
— — sur un ulcère syphilitique phagédénisé, XXV, 841.
— — et les Noirs de l'Afrique centrale, XIX, 564 (pl.).
— — du sein chez un Noir, XIX, 499.
— — expérimental chez les singes, XXIV, 144.
— — et lèpre, XXV, 124.
— Fibromes cutanés multiples, I, 51 (fig.).
— — naso-pharyngiens, XVI, 278 (fig.).
— — périostique intrathoracique coexistant avec la tuberculose pulmonaire, XXII, 788.
— — utérin et kyste de l'ovaire concomitants, XXII, 387.
— Gliome du cerveau chez un Noir, XIII, 34.
— Lipomes chez les Malgaches. Fréquence, variété, siège, étiologie, pathogénie, XI, 113.
— Lymphoblastome de la région inguinale chez un chien annamite, XX, 344.
— Mélano-sarcome de la choroïde chez une fillette bambara, XI, 36 (fig.).
— Myxo-sarcome du bras chez un Bambara, IX, 702.
— Ostéo-sarcome du maxillaire, XXIII, 342.
— Considérations anatomiques sur la structure des — paranasales du Goundou, XVII, 863.
— préputiale due à la présence de nombreux calculs, XXI, 720.
— Action du sang des pseudo-méloïdes sur la verrue humaine, XVI, 619.

Tunisie. Voir aussi **Afrique du Nord.**

— Bilharziose, II, 486, 612 ; III, 446, 532 ; IV, 627, 684 ; VI, 259 ; XV, 632 ; XVI, 18 ; XVII, 35 ; XX, 23.
— — et sources thermales, III, 446.
— Blastomycose humaine, IV, 366 ; VI, 856.
— Cancer, IV, 399.
— Dengue, XX, 705.
— Dysenterie amibienne, VI, 316.
— Entérites simulant les dysenteries, XVII, 367.
— Fièvre boutonneuse ou exanthématique, III, 492 759.
— — ondulante, I, 62, 193 ; II, 194 ; IX, 86 ; X, 1.
— — — Enquête sur les chèvres laitières de la Marsa, IX, 86 ; X, 376.
— — récurrente, IV, 643, 658.
— Helminthiase et géophagie, I, 600.
— Jaunisse des bovidés, XIII, 456.
— Leishmaniose canine, I, 299 ; IV, 40, 452 ; VI, 165 ; VII, 479.
— — cutanée, IV, 452 ; VII, 30 ; X, 378.
— — interne, I, 121, 602 ; II, 457, 584 ; III, 431 ; IV, 138, 187 ; VI, 23, 141, 574 ; VII, 479 ; IX, 126 ; X, 715 (c.).
— — — chez l'adulte, XVIII, 397.
— Mycétome à grains noirs, XII, 741 (pl.).
— — à *Nocardia maduræ*, X, 431.
— Mycose aspergillaire, XVII, 343, 348.
— Paludisme, I, 388 ; II, 450.
— Peste, I, 165, 167 ; II, 323 ; IV, 213.
— Piroplasmose bovine, IV, 451.
— Syphilis, III, 537.
— Toxoplasmose canine, X, 377.
— Typhus exanthématique, III, 764 ; V, 744 ; VIII, 160.
— *Xeroderma pigmentosum*, XII, 391.
— Coccidies des petits ruminants, XXV, 710 (fig.).
— *Leptomonas* de la tarente dans une région du Sud indemne de bouton d'Orient, XI, 595.
— Microfilaire du chat domestique, XI, 571.
— Destruction des sauterelles par *Coccobacillus acridiorum*, VIII, 629.

Turkestan. Anaplasmose, X, 310.

— Fièvre ondulante, XVI, 227.
— Filariose humaine, VII, 192.
— Leishmanioses, IX, 202.
— — canine, VI, 432 ; VII, 183 ; VIII, 483, 488, 502.
— — cutanée, VII, 186, 502 ; VIII, 494.
— — interne, VIII, 474.
— Maladies tropicales et animales, VII, 185 et suiv.
— Microfilariose des animaux domestiques, VII, 188 ; IX, 219 ; X, 102.
— — des chevaux, VII, 189.
— Paludisme, XVI, 243.
— Piroplasmoses, X, 302, 307, 309.
— Spirochétose des poules, IX, 227.
— Trypanosomiase bovine, VI, 434.
— — des chameaux et des ânes, VII, 187.
— Leucocytogrégarine des chiens, X, 281.
— Phlébotomes, XXII, 348 (fig.).
— Tiques des animaux domestiques, X, 298, 723.
— *Trichomonas* de l'intestin de la sangsue, X, 293.
— *Trypanosoma theileri*, VI, 434 ; IX, 229.
— Trypanosomes des chameaux, XIV, 637, 638.

Turquie. Ankylostomiase, XVIII, 265.

— Charbon bactéridien, XX, 208.
— Choléra à Constantinople et en Thrace de 1910 à 1913, VII, 313.
— — — chez les réfugiés de Crimée, XIV, 192.
— Dengue à Trébizonde, X, 724.
— Fièvre récurrente chez les réfugiés de Crimée, XIV, 191.
— Parasitisme intestinal, XXIII, 192.
— Pellagre, XIX, 75, 76, 78.
— Peste, XIV, 193.

— Piroplasmose et anaplasmose, X, 783.
— — bovines, XXIV, 817.
— — ovines, XXIV, 822.
— Typhus exanthématique à Constantinople chez les réfugiés de Crimée, XIV, 190.
— Variole chez les réfugiés de Crimée, XIV, 193.
— Tiques, X, 724.
Typhiques. Affections — et para — au Chili. Ostéite para — survenue à la suite d'un traumatisme chez un homme sain, XV, 5.
— — — Différenciation des bacilles par le procédé d'Orticoni, XVI, 226.
Typhoïde. Voir **Fièvre —.**
Typhose aviaire à Brazzaville, XXIII, 353.
— — en Guinée française, XXIV, 146.
— (Para) des ruminants, XXV, 204.
Typhus des carnassiers de ménagerie, XXV, 1015.
Typhus endémique à bord d'un cuirassé, XXV, 390, 514.
— — (Typhus murin) dans l'encéphale des rats des navires de guerre à Toulon, XXV, 673.
— **exanthématique** en Algérie, II, 342.
— — en Cochinchine, XXIV, 302.
— — — Étude du virus, XXIV, 678.
— — chez les réfugiés russes de Crimée à Constantinople, XIV, 190.
— — en Indochine, I, 156.
— — en Roumanie pendant la dernière guerre, XIII, 269.
— — au Tonkin, XIX, 766.
— — à Tripoli. Bactériologie et sérologie, V, 778.
— — en Tunisie, III, 764 ; V, 744 ; VIII, 160.
— — sur un croiseur revenant du pôle Nord, XXII, 303.
— — Rôle du pou et temps d'incubation de la maladie, XII, 364.
— — Infection des poux, XXV, 187.
— — *Rickettsia prowazeki*, parasite des poux de l'homme et considéré à tort comme l'agent causal du —, XI, 249.
— — Diagnostic précoce, XXI, 305.
— — Le « signe de la langue », XXI, 302.
— — Réactions cellulaires sanguines, XIII, 742.
— — Bactéries utilisées pour le sérodiagnostic, XIV, 142.
— — Séro-réaction et déviation du complément avec *B. proteus*, XIII, 108, 281.
— — Réaction de Weil-Felix. Faible pouvoir agglutinant du liquide céphalo-rachidien, XII, 592.
— — Comparaison du virus africain et du virus balkanique, IX, 402.
— — guatémaltique identique au — mexicain, XXV, 49.
— — et choléra, XIII, 277.
— — et dengue, XXV, 7.
— — et fièvre récurrente, XIII, 272.
— — et maladie de Marseille (fièvre exanthématique), XX, 958.
— — et *Micrococcus melitensis*, III, 214.
— — et tuberculose, XIII, 278.
— — Syndrome rabiforme chez une Annamite, XX, 318.
— — La toxémie dans le — et sa symptomatologie, XIV, 202.
— — Tableau clinique, X, 94.
— — Inoculation aux petits animaux de laboratoire, II, 564.
— — Mode d'inoculation, IX, 491.
— — Virulence des organes chez le cobaye infecté, IX, 491, 492.
— — Entretien du virus sur cobayes, IX, 487.
— — Cent passages par cobayes, X, 526.
— — Recherches expérimentales au laboratoire de Nich, IX, 311.
— — Absence de l'immunité héréditaire, IX, 493.
— — Durée de l'immunité chez le singe, IX, 493.
— — Moyens de préservation, XVI, 101.
— — Prophylaxie, III, 754.
— — Essais thérapeutiques, IX, 494.
— — Traitement, XIII, 284.
— — — par les abcès de fixation, II, 497 ; III, 172, 455.
— — — par injection extemporanée de sang de typhique en convalescence, IX, 673.
— — — Pyothérapie aseptique, XV, 387.
— — Sérothérapie, XII, 367.
— — Technique de la préparation du sérum à l'Institut Pasteur, IX, 750.
— **récurrent.** Voir **Fièvre récurrente.**
Tyroglyphus siro, parasite de la vulve et du vagin, XI, 722.

U

Ukraine. Zoophilie de l'*Anopheles maculipennis*, XXI, 322.
Ulcération récidivante des lèvres, XII, 214.
Ulcère de Bauru. Voir **Leishmaniose cutanée.**
— **phagédénique** pendant la campagne du Cameroun, IX, 590.
— — aux Comores (Mohéli), XI, 62.
— — au Congo français, I, 339.
— — chez les Kabyles, I, 303.
— — à l'Ouadaï, VII, 524.
— — Priorité de la découverte du bacille, VII, 262, 266, 376, 471.
— — des pays chauds et leishmaniose, IV, 180.
— — Pathogénie, VII, 176, 469.

— — Flagellé parasite fréquent, XIV, 208.
— — serpigineux vénérien, XV, 641 (fig.).
— — complication de la vaccine, XII, 493.
— — Inoculation expérimentale, VII, 96.
— — Clinique. Traitement, XXIII, 483.
— — Variétés d'— et traitement, XIV, 530, 625.
— — Traitement, XII, 64, 296, 495.
— — — rapide, IX, 419.
— — — par le pansement de Vincent, XI, 827.
— — — par l'émétique, XXV, 333.
— — — par le stovarsol, XVII, 531 ; XVIII, 433, 501.
— — — par le « 189 », XV, 607.
— — — par le 606, VI, 243.
— — — par le novarsénobenzol, XI, 616 ; XV, 926.
— — — par les insufflations de bismuth, XIX, 115.
— — — par un lipo-vaccin, XXIII, 995.
— — — Vaccinothérapie antispirillaire, XVIII, 380.
Uncinariose en Colombie, II, 603.
— en Haute-Guinée, V, 843.
— en Nouvelle-Calédonie, V, 192.
Urée composée de la série du 205 Bayer, XVII, 195.
— Action des sels doubles d'— et de quinine sur les verrues, XXV, 326.
— sanguine chez les Annamites, XXV, 427.
— — chez les Malgaches de Tananarive, XXV, 376, 426.
Uréthrite lépreuse, VII, 557.
— à *Pasteurella*, XXI, 839.
Urinaire (Rythme) dans l'hépatite suppurée, I, 236.
Urine. Dosage de la quinine dans l'—, XVIII, 773 ; XX, 591.
— Vieux documents sur l'examen des — dans la fièvre jaune, XXV, 535.
Urobilinurie dans les congestions hépatiques d'origine palustre, VII, 596.
Uronema caudatum, XIV, 554, 555.
— — à Pétrograd pendant les épidémies de 1919-1921, XVIII, 190.
Urotropine dans le traitement de la spirochétose ictéro-hémorragique, XII, 128.
— — de la trypanosomiase humaine, XIII, 648.
— associée au néosalvarsan dans la syphilis nerveuse, XXIV, 588.
— — au sérum dans la méningite cérébro-spinale, XXIV, 589.
— — — dans le tétanos, XXIV, 589, 590 ; XXV, 819.
— et perméabilité méningée, XXIV, 587.
Urticacées. Flagellés, XVI, 650 (fig.).
Urticaire dans la dracunculose, I, 309, 330.
Uta, maladie du Pérou (leishmaniose), VI, 545.
Utérus didelphe, XVII, 335.
— Infection secondaire *post-partum* par *Chilomastix mesnili*, XVIII, 258.
— — guérie par l'antivirus Besredka, XXII, 497.

V

Vaccin antivariolique. Conservation dans les pays chauds, II, 431 ; III, 159.
— — conservé à l'état humide sans glycérine, XVIII, 742.
— — desséché pour les pays chauds, IV, 283, 345 ; VI, 144.
— — — au Moyen-Congo, VII, 17.
— — — et — ensemencé sur génisse au Cameroun, XI, 593.
— — Fonctionnement du parc vaccinogène de Bouaké, VII, 246.
— — Préparation du — à Douala, XI, 733.
— — Création du centre vaccinogène de Tombouctou, XI, 300.
— — Immunité conférée par le —, II, 237 ; III, 167.
— — et singes, III, 496.
— **antipesteux** en Indochine, IV, 217, 219, 220.
— **antistaphylococcique.** Préparation, XVI, 390.
— **antituberculeux** B. C. G., XXIII, 552, 1005.
— — — dans le traitement de la lèpre, XIX, 520 ; XX, 91 ; XXI, 283.
Vaccinateur nouveau, II, 59.
Vaccination contre l'anaplasmose des bovidés, XIV, 449.
— — le charbon bactéridien, XIII, 14.
— — — — (Intradermique), XVII, 467, 767 ; XVIII, 16, 243 ; XIX, 499, 864 ; XX, 208 ; XXI, 294.
— — — — — Durée de l'immunité, XXI, 294.
— — — — Essais de cuti- —, XVII, 765.
— — le choléra, VIII, 17.
— — — à Java, V, 4.
— — la diphtérie, XXII, 751.
— — la dysenterie bacillaire, XVIII, 539.
— — la fièvre aphteuse, XIV, 523.
— — — jaune, XXII, 402.
— — la lymphangite épizootique, XI, 551.
— — les méningococcies, XVI, 712, 715 ; XVIII, 241.
— — la pasteurellose aviaire, XX, 345.
— — la peste, XIV, 607 ; XIX, 592, 667 ; XXII, 412 ; XXV, 672.
— — — en Chine, à Sim-lam, V, 303.
— — — au Sénégal, à Dakar, IX, 592 ; XXII, 412.

— contre la peste par la voie buccale, XVI, 469 ; XVIII, 235.
— — — Vaccination du cobaye, XVII, 471.
— — peste bovine, XII, 65, 487 ; XIII, 338 ; XIV, 9, 361 ; XXII, 310.
— — — du chimpanzé, XXIV, 141.
— — les piroplasmoses, XXI, 371.
— — *Plasmodium relictum*, XIV, 72.
— — les pneumococcies, XIX, 521.
— — — à Madagascar, XXI, 364.
— — la rage dans les pays tropicaux, XXI, 790.
— — — au moyen de moelles glycérinées fraîches, XX, 843.
— — *Trypanosoma gambiense*, IV, 680.
— — la tuberculose, XX, 139.
— — — V. des nourrissons noirs, XVII, 938 ; XVIII, 431.
— — — en Cochinchine et au Cambodge, XVIII, 379.
— — — à Madagascar (Tananarive), XXI, 282.
— — — à l'île Maurice, XXI, 190.
— — les affections typhoïdes aux colonies, XX, 706.
— — — avant le départ pour les colonies, XX, 44.
— — — au Maroc, XXV, 452, 460.
— — le typhus exanthématique, IX, 315.
— — la variole. Variations de l'équilibre leucocytaire, V, 226.
— — — Accidents anaphylactiques, XXI, 270.
— préopératoire, XXI, 260.
Vaccine et vaccin antivariolique en A. O. F., XIV, 26.
— en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyalty, VII, 503.
— et alastrim, XVI, 687.
— Exanthèmes, VI, 488.
— Complication phagédénique, XII, 493.
— chez les singes, XXIV, 144.
— Essai de culture du virus neurovaccinal avec protozoaires, XXV, 726.
— Immunisation variolique du singe, IX, 669.
— -variole, X, 260.
Vaccinothérapie au vaccin sensibilisé dans la fièvre typhoïde, XIX, 175.
— de la furonculose, XVI, 390, 551.
— des mycétomes, XV, 7.
— des infections à pneumocoques, XIX, 521.
— locale dans une pyodermite rebelle, XX, 546.
— antispirillaire dans les affections à association fuso-spirochétienne, XVIII, 380.
— d'affections à streptocoques, XVI, 552.
— dans le typhus exanthématique, IX, 317.
Vagin. Cloisonnement longitudinal, XVII, 335.
Vaginal (Mucus) et bacille de Hansen, II, 200.
— Myiase — de la vache, V, 737.
— (Parasitisme) par un acarien sarcoptide au Cameroun, XI, 722.
— Trichomoniase —, X, 553.
Vahlkampfia, n. gen., amibe *limax* dans l'intestin humain, V, 135.
— *ninæ kohl-yakimov*, n. sp., XIV, 649.
— à Pétrograd pendant les épidémies de 1919-1921, XVIII, 185.
Vallin (E.). Éloge, XVII, 193.
Varan. Hémogrégarines, VII, 488.
Varicelle au Sénégal, XXV, 669, 671, 837.
Variole en A. E. F., VIII, 199.
— en A. O. F., XIX, 385.
— aux Indes Néerlandaises, XIII, 766.
— au Sénégal, à Dakar en 1922, XVI, 487.
— chez les réfugiés russes de Crimée à Constantinople, XIV, 193.
— et puces, III, 98.
— et alastrim, VI, 549 ; XII, 489 ; XVI, 676.
— bénigne et alastrim, IV, 35, 37.
— et varioloïde dans l'Ouadaï, VII, 523.
— et vaccin, III, 167.
— Exanthèmes chez le singe et le buffon, VI, 488.
— Immunisation variolique du singe contre la vaccine, IX, 669.
— et singes, III, 497.
— -vaccine, X, 260.
— Emploi du vaccin sec au Moyen-Congo, VII, 17.
— **des chèvres** en Grèce, XX, 583 (fig.).
Variolisation au Setchouen, XIV, 93.
Varioloïde dans l'Ouadaï, VII, 523.
Vaseline liquide comme larvicide, XXI, 109.
Vénériennes (Maladies) dans la garnison de Tananarive, XVI, 534.
— — Prophylaxie individuelle, XXI, 817.
Venezuela. Distomatose et bilharzioses humaines, XIV, 382.
— Leishmaniose américaine, XIII, 238.
— Trypanosomiases animales, III, 384 ; XIII, 297, 576.
— — humaine américaine, XII, 309.
— Diptères vulnérants, IV, 573.
— Flagellé nouveau du *Rhodnius prolixus*, XIII, 527.
— Insectes piqueurs, IV, 573.
Venins et animaux venimeux. XV, 103.
— Récolte et conservation, V, 2 ; VII, 547.
— d'abeille. Symptômes graves déterminés par une seule piqûre, XI, 589.
— des araignées, XXI, 220.

— de l'araignée du Pérou *Glyptocranium gasteracanthoïdes*. Étude de l'action du —, XI, 136 (fig.).
— — — *Latrodectus mactans*. Étude de l'action du —, XII, 702.
— cutanés du *Bombinator pachypus*, var. *brevipes*, XVI, 541.
— — du *Speleerpes fuscus*, XI, 108.
— muqueux de la peau des batraciens, VI, 190.
— de la larve de *Megalopyge urens*, XXI, 656 (fig.).
— des poissons, XXV, 189.
— Anatomie comparée de la tête et de l'appareil venimeux chez les serpents, VII, 515.
— Propriétés venimeuses de la salive parotidienne chez les colubridés aglyphes, IX, 369 ; X, 474.
— de *Bitis arietans* ou vipère heurtante, VI, 50.
— d'*Heloderma suspectum* et de *Vipera aspis*, IV, 631, 721.
— Action des — de vipère aspic et de céraste sur quelques poissons marins, XXV, 189.
— de la vipère aspic et rayons infrarouges, XXV, 320.
— de la vipère aspic et d'abeille. Action vaccinante réciproque, XXV, 581.
— et virus rabique, XXIII, 886.
— Propriétés vaccinantes de la sécrétion muqueuse des batraciens contre le — de la vipère aspic et contre le virus rabique, VIII, 730.
— Supposée immunité des chiens sloughis aux — de scorpion et de vipère, XIX, 438.
Ventriculine dans le traitement de l'anémie, XXIV, 475.
Vents. Action sur le développement des larves de culicides, IV, 325.
Vernes. Voir **Réaction de —.**
Verrues vulgaires des lépreux, XXV, 302, 303.
— Éruption verruqueuse, XXV, 325.
— Traitement, XVI, 619 ; XXV, 326.
Verruga péruvienne. Unicité ou dualité, XX, 790.
— — ou maladie de Carrion. Description, XXII, 348.
— — Rôle étiologique probable de quelques plantes, XXIV, 27.
— — — transmetteur d'un phlébotome, XXIV, 27.
— — Conférence sur la —, XX, 449, 539.
Ver de case. Larves d'*Auchmeromyia luteola* et onchocercose, XVII, 415.
— **du Cayor** en A. O. F., VIII, 3.
— — dans le Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire), IV, 687.
— **de Guinée.** Voir aussi **Filaire de Médine** et *Filaria medinensis*.
— — III, 94.
— — en A. O. F., VIII, 4.
— — dans le Haut-Sassandra, IV, 206.
— — enkysté, III, 740.
— — Mode d'infestation, XX, 443.
— — Biologie. Infection intestinale des *Cyclops*, VI, 281 (fig.).
— — Infestation des *Cyclops* par voie digestive, XI, 338.
— — — — de la région parisienne (Essai), XIII, 254.
— — et paludisme en Haute-Volta. Prophylaxie commune, XVII, 105.
— — Radiographie après injection intrasomatique de lipiodol, XXI, 103 (pl.).
— — Extirpation avec cocaïnisation, I, 560 ; II, 66.
— — Traitement, XVII, 146, 846.
— — — par les sels d'antimoine, XV, 809.
— — — par l'émétique en lavements, XX, 285.
— — — — en injections intraveineuses, XVI, 566.
— — — par le kermès, XX, 395.
— — Monographie, II, 66.
— **intestinaux** chez 300 fous, IV, 334.
— dans l'appendicite du gorille, I, 556.
— des yeux, pseudo-parasites et charlatans, XI, 579, 724 ; XIII, 261.
— des yeux et des dents, pseudo-parasites, XV, 825.
Vers à soie. Maladies, III, 766.
Vessie. Calcul chez une jeune femme hova, XXI, 720.
— Cystites amibiennes, XVIII, 478.
Vétérinaire. Enseignement de médecine — coloniale, XIII, 761.
Viandes salées et virus de la peste bovine, XXV, 287.
Vibrions. Action des substances hémolytiques sur les —, les spirochètes et les protozoaires, I, 117.
— butyrique dans le béribéri, III, 13, 65, 128.
— cholériques isolés dans une épidémie de choléra en Algérie, V, 790, 792.
— — — — — en Roumanie, V, 265.
— — du N'Diank, V, 753.
— — isolés de l'eau de mer, VI, 9.
— — Recherche dans les fèces, VIII, 98.
— — Nouveau milieu de culture, VIII, 52.
— — Hématolyse et hémato-agglutination, XXIV, 907, 909.
— — et paracholériques. Pouvoir hémolytique, V, 455.
— — Action de la lumière et des hypochlorites, V, 167.
— — Traitement des porteurs de —, VI, 306.
Villes du Sénégal. Hygiène des — comparée à celle de Bathurst, III, 546.
Village d'isolement des indigènes trypanosomés au Congo, IV, 699 (fig.).

Vincent (Bacilles fusiformes et spirochètes de), II, 282.
Vipera aspis tuée par morsure d'*Heloderma suspectum*, IV, 631, 721.
Vipères (Venin des). Voir **Venins.**
Virulence des trypanosomes après passages par cobayes, I, 198.
— Atténuation de — d'une souche de *Tr. hippicum*, V, 184.
— Variations de — de *Tr. gambiense*, V, 375.
— — de l'infection sanguine chez quelques malades du sommeil, VI, 581.
Virus filtrable dans la peste porcine à Alger, V, 781.
— de l'Ouganda et nagana, VI, 685.
— (Ultra). Essais de culture en symbiose avec des protozoaires, XXV, 724, 727, 728.
Vision (Maladies de la) au Congo, VIII, 308.
Vitamines et béribéri, XIII, 196 ; XV, 476.
— Insuffisance de — et infection dans la maladie expérimentale du porcelet due à *Bacillus asthenogenes*, XVIII, 68.
Vitiligo géant chez les indigènes du Maroc, XXIII, 576.
— et kcara du Pérou, XXIV, 219.
Voatamenaka, anthelminthique malgache, XXII, 388.
Vœu au sujet de l'importation de l'alcool de traite, II, 354.
— — d'un droit sur les spiritueux, II, 354.
— — du nombre des débits de boissons, II, 354.
— — de l'interdiction de la vente de boissons alcooliques, II, 354, 452.
— — de la lutte contre l'alcoolisme aux colonies, II, 452.
— pour la répression de l'alcoolisme au Maroc, V, 777.
— au sujet de la fièvre ondulante, I, 62, 193.
— — de la lutte contre la lèpre, IV, 88.
— — de l'assainissement de la Corse, XV, 3.
— — du retour aux colonies des anciens paludéens, XV, 378.
— — de la vente de la quinine, II, 234, 449.
— — des comprimés de quinine, XV, 674.
— — de l'agrandissement du port de Dakar et de la protection contre les rats, XIX, 661.
— — de la maladie du sommeil, I, 323 ; IV, 8.
— — du salaire des indigènes, II, 354.
— — des monnaies et des services des indigènes, II, 354.
Volailles tuées par absorption de Lantana, III, 52.
Voratz. Voir **Prunier d'Amérique.**
Vulvaire (Parasitisme) par un acarien sarcoptide au Cameroun, XI, 722.
Vulve. Éléphantiasis, II, 8.
— Malconformation congénitale, XVII, 333.

W

Wallis (Iles). Éléphantiasis, III, 401, 609.
— Filariose, III, 138, 401, 609.
Waskia belostomæ, n. sp., XV, 134 (fig.).
Wassermann (Réaction de). Voir **Réaction de —.**
Wassilewsky (W. G.). Éloge, XVII, 617.
Weil-Félix (Réaction de). Voir **Réaction de —.**
Werbitzki. Trypanosome de —, IV, 233, 273.
Werlhoff (Maladie de) et paludisme, I, 478.
Wurtz (R.). Éloge, XII, 586.

X

Xénodiagnostic, VII, 706 ; XIII, 22.
Xeroderma pigmentosum. Dix cas en Tunisie, XII, 391.
Xérosis en Chine, XXIV, 260.

Y

Yatrène dans la toxémie intestinale à protozoaires, XVIII, 182.
— dans divers états d'amibiase, XXI, 842.
Yoghourt dans la diarrhée des pays chauds, I, 345.
Young (W.). Éloge, XXI, 576.
Yvon (P.). Éloge, VI, 297.

Z

Zabolotny (D. K.). Éloge, XXIII, 135.
Zamenis mucosus. Propriétés venimeuses de la salive parotidienne, IX, 369 ; X, 474.
Zébus Anaplasmose, XXIV, 969.
— Piroplasmose en Tunisie, IV, 451.
Zousfana (Mal de la) = Taher = Debab, V, 276.
Zymonema brasiliense, V, 313.
Zymonématose avec localisations buccales au Brésil, V, 313.

TABLE
ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS
(Tomes I-XXV)

Les chiffres entre crochets renvoient aux tomes.

A

ABADIE. — Éléphantiasis streptococcique chez une Algérienne d'origine espagnole . . [5], 57
ABBATUCCI (S.). — Accidents dus au néosalvarsan. Trois cas mortels . . . . . [12], 340
— La toxémie dans le typhus exanthématique et sa symptomatologie . . . . . [14], 202
—. Le paludisme dans ses rapports avec la situation économique de la Corse. . [15], 92
—. A propos de la lutte antipaludique à Beyrouth (discussion) . . . . . [16], 484
—. A propos du traitement de la maladie du sommeil par la tryparsamide . . . . [19], 271
—. Au sujet de la communication de M. E. Tournier sur la peste pulmonaire à Madagascar. . . . . [19], 880
—. Les causes de la cécité en Chine . . . . . [24], 419
ABBATUCCI (C. et S.). — La solution la plus approchée de l'extinction du paludisme en Corse . . . . . [16], 483
ABBATUCCI et GOUZIEN. — Note au sujet de la prophylaxie de la lèpre en France . . . [15], 827
ABBATUCCI (S.) et ROUBAUD (E.). — Expériences sur un liquide insecticide commercial à base de pétrole et de pyrèthre. . . . . [19], 901
ABETTI (A.) et DANIEL (G.). — Méningite cérébro-spinale au Congo belge. . . . . [11], 779
ABRAMI (P.) et SÉNEVET (G.). — A propos des gamètes du *Plasmodium præcox* . . . [13], 167
—. Paludisme et novarsénobenzol. . . . . [13], 264
ACAR (M.). — Sur un cas de peste pulmonaire à évolution atypique (discussion) . [16], 206
—. Évolution de la peste au Sénégal . . . . . [16], 372
ACHALME. — A propos des communications de MM. Ross et M. LEGER, sur la vaccination à l'aide de vaccin desséché. . . . . [4], 345
ACHALME (P.) et PHISALIX (Marie). — Contribution à l'étude de la conservation du vaccin dans les pays chauds . . . [2], 431
ACHITOUV et DELAMARE (G.). — Filaire de Médine calcifiée ; cellules géantes de corps étrangers, infiltration embryonnaire et sclérose . . . . . [17], 788
— et —. Hyperkératose folliculaire ; hypochromie et atrophie épidermique ; infiltration lymphoïde périfolliculaire et péri-vasculaire sans cellules

géantes ; pas de Bacilles acido-résistants ; Microfilaires. [18], 529
— et —. Pellagre familiale autochtone . . . . . [19], 78
Adam. — Le paludisme à la consultation des nourrissons indigènes de Dakar . . . [17], 279
—. Cancer de l'ovaire . . [17], 330
—. Sur une malformation génitale rencontrée en Afrique occidentale française. . [17], 333
—. Un cas d'utérus didelphe, avec cloisonnement longitudinal du vagin . . . . [17], 335
Adde (R.), Foley (H.) et Vialatte (C.). — Existence dans le Sud-Marocain (Haut-Guir) du Bouton d'Orient à l'état endémique . . . . . [7], 114
Adie (Helen). — The sporogony of *Hæmoproteus columbæ* . . . . . [17], 605
Adova (A.), Nikitinsky et Sebenzow. — Biologie et constitution physico-chimique des tourbières et conditions qui y règlent le stationnement des larves d'Anophèles . . [20], 192
— *Id. (Suite)* . . . . . [20], 271
Adova et Sebenzow (B.). — Biologie et constitution physico-chimique des tourbières et conditions qui y règlent le stationnement des larves d'Anophèles . . . . . [20], 811
— et —. La réaction actuelle du milieu dans l'écologie d'*Anopheles maculipennis* Mg. [22], 584
— et Smorodinzew (I. A.). — Le rôle du calcium dans l'écologie des larves d'Anophèles . [23], 34
—. Sur le rôle de la réaction du milieu dans l'écologie des larves d'*Anopheles maculipennis*. . . . . [23], 38
Advier (M.). — Note sur la sérothérapie antipneumococcique. . . . . [21], 596
—. Considérations sur le traitement de la peste en Emyrne. . . . . [21], 598
—. Note sur deux antihelminthiques malgaches . . . [22], 388
—. Les helminthiases chez le Malgache en Emyrne . [22], 390
—. Note sur la tuberculose à Madagascar . . . . . [22], 533
Advier (H.) et Boussy (R.). — Note sur deux cas autochtones d'encéphalite léthargique. . . . . [21], 347
Advier, Cazanove, Fournials et Lambert. — Sur les événements sanitaires du mois écoulé (mars 1932) . . . . . [25], 669
—, — et Gourry. — Événements sanitaires du mois écoulé . . . . . [25], 796
Advier (M.), Guérin (F.) et Borel (E.). — Stovarsol et paludisme . . . . . [20], 331
— et Heckenroth (F.). — Un cas de distomatose hépatique à *Fasciola hepatica* en Corse. . . . . [24], 46
— et Mathis (C.). — Considérations épidémiologiques sur la peste au Sénégal . . . [25], 941
—, Morin (H.-G.-S.) et Marinot (J.). — Note préliminaire sur les polynévrites observées à l'hôpital de Cholon en janvier-août 1926 . . . . . [20], 33
— et Peirier. — Mode d'action des huiles de *Caloncoba* et de leurs dérivés sur les bacilles acido-résistants. . . . [23], 767
— et Poisson (H.). — Note sur une Limnée de Madagascar et sur les cercaires de Trématodes qu'elle héberge. . . . [22], 523
— et Rabarijoana. — Note sur un cas de pyopneumothorax tuberculeux à signes cliniques et radiologiques atypiques. . . . . [24], 349
—, Riou et Gourry. — Stomatites et glossites épidémiques à Dakar . . . . . [25], 1110
—, Russaouen (J.) et Feytes (R.). — La typhoïde à Tiaroye en 1923. . . . . [25], 1109
Afanassieff (Mlle J.-A.), Yakimoff (W.-L.), Kédrinsky (A.-J.), Mlles Iwanoff (P.-S.) et Swirsky (S.-A.). — Le traitement de la babésiellose des bovidés par les sels d'argent . . . [19], 887
Affre (M.). — Sur un cas d'hérédo-syphilis osseuse précoce. . . . . [17], 518
—. Le paludisme dans les suites des couches . . . . . [18], 110
—. Sur la possibilité d'utiliser au Sénégal le lait d'ânesse dans l'alimentation des nourrissons malades . . . [18], 507
—. Le pouls comme moyen clinique de diagnostic entre le paludisme et l'infection *post-partum*. . . . . [18], 685
—. Contribution à l'étude du tétanos ombilical. . . . [19], 654
—. Cas déclarés de tétanos guéris par la sérothérapie (discussion). . . . . [18], 436
— et Boulay (A.). — De l'utilisation du Rouye (farine de mil fermentée) dans l'alimentation du nourrisson . . . . [19], 155
— et Lhuerre. — Sur un cas de dysplasie périostale . [17], 514
Agramonte (A.). — Notice sur Daniel de Beauperthuy . [2], 5
Aguessy (Dominique). — Parasi-

tisme intestinal dans le cercle de Djougou (Dahomey). [23], 859
—. Sur la fréquence de la lèpre au Haut-Dahomey. . . [24], 585
—, Bauvallet (H.) et Brugnan (N.). — Indice épidémique palustre à Porto-Novo (Dahomey) . . . . . [23], 106
— et Pettit (A.). — Le chimpanzé est-il réceptif au virus amaril ? . . . . . [25], 190
—, Thiroux (A.) et Ratsimamanga — Sur l'existence de tuberculoses externes ou larvées chez les indigènes africains et sur leur diagnostic par la résorcino-réaction de Vernes . . . . . [24], 793
Aguiar Pupo (J.). — Traitement de la leishmaniose des muqueuses par l'*éparséno* (amino-arséno-phénol de Pomaret). Ses possibilités d'emploi dans le traitement du kala-azar. . . . . [19], 331
Akil Moukhtar et Sédad. — Sur l'existence de l'ankylostomiase en Turquie . . . . . [18], 265
Alalou. — Remarques à propos d'une épidémie de stomatites ulcéro-membraneuses et scorbutiques . . . . . [19], 3
Alary (A.) et Sergent (Et.). — Petites épidémies d'acariose en Algérie. . . . . [9], 771
Aldigé (E.). — Trypanosomiase du porc en Guinée française. . . . . [13], 79
Alexa (I.) et Ciuca (M.). — Traitement de la malaria par le stovarsol . . . . . [19], 180
Alexeieff (A.). — Sur la pseudopycnose des neutrophiles dans la dysenterie amibienne. [14], 469
—. Le plasmocyte de Unna est capable de se transformer en cellule spumeuse à lipoïdes. . . . . [14], 526
Allain (J.). — Emploi du chlorhydrate d'émétine dans les amibiases par les médecins du corps de santé des troupes coloniales . . . . . [6], 723
—. Paludisme et quinine d'État en Annam pendant l'année 1942. . . . . [6], 730
Allain et Nattan-Larrier. — Équilibre leucocytaire chez les Noirs atteints de trypanosomiase . . . . . [1], 360
— et Trautmann. — Trypanosomiase humaine et pneumonie. . . . . [3], 25
Allain, Toullec et Guyomarc'h. — Épisode démential et gangrène symétrique des extrémités au cours d'une infestation palustre à *Plasmodium præcox* . . . . . [25], 307
—, Toullec et Jolly. — Anémie pernicieuse paludéenne. [24], 912
Alvarez Cienfugos (J.-M.) et Legendre (F.-M.-A.). — Sur quelques essais de traitements nouveaux du paludisme . . . . . [20], 436
Amanschouloff (S.-A.), Yakimoff (W.-L.), Arbousoff et Schourawleff. — L'anaplasmose des moutons en Russie (U. R. S. S.) . . . . . [22], 423
Amigues (M.). — Deux cas de bilieuse hémoglobinurique traités par le sérum médical de Normet, avec résultats très favorables . . . . . [23], 999
Ananiadès et Stylianopoulos. — — Contribution à l'étude des piroplasmoses en Grèce. [25], 889
Anderson (Ch. W.). — Note sur les gîtes à *Bullinus* et à *Planorbis* de la Tunisie. Leurs rapports avec les foyers de bilharziose. Carte provisoire de leur répartition. . . [15], 954
—. Note concernant la toxoplasmose du Gondi . . [17], 334
—. Sur quelques entérites particulières présentées comme des dysenteries . . . . . [17], 367
—. Note concernant les recherches pratiquées sur le latex de quelques Euphorbiacées de Tunisie. . . . . [18], 257
—. Présence de *Bullinus contortus* dans l'oasis de Biskra (Algérie) . . . . . [18], 267
— et Gobert (E.). — Un nouveau foyer de bilharziose en Tunisie. . . . . [16], 18
— et —. Note relative à la prophylaxie de bilharziose en Tunisie . . . . . [17], 35
— et Lagoanère (J.-L. de). — A propos de la bilharziose en Tunisie. Nouveaux essais d'infestation de *Bullinus brochii* avec des œufs de *Schistosomum hæmatobium* . . [20], 23
— et Nicolle (Ch.). — Conservation du virus de la leishmaniose canine dans les laboratoires . . . . . [16], 171
Anderson (T.-E.), Levaditi (C.) et Manin (Mlle Y.). — Le rôle du glutathion dans la production du trypanotoxyl et du bismoxyl . . . . . [21], 676
Andrade (Mario de) et Mello (Froilano de). — Spirochétose broncho-pulmonaire au Nord du Portugal . . . . . [15], 284
André (Z.) et Labernadie (V.). — Recherches sur la sédimenta-

tion globulaire chez les lépreux . . . . . [20], 839
—. Recherches sérologiques dans la lèpre (Réaction de Matefy, de Wassermann) . . . [20], 950
— et —. Utilisation du photomètre Vernes-Bricq-Yvon pour éviter certaines causes d'erreur dans le diagnostic du kala-azar par la réaction de précipitation de Choppa et Gupta . . [23], 29
ANDREANI-CONSTANTINI (Mme) et POMARET. — Sur un cas de bilharziose vésicale mixte . . [14], 567
ANDREJEWSKY (P.) et CURASSON (G.). — Sur les « corps de Balfour » du sang de la poule. . . . . [22], 316
ANDRIANTAVY et CARRETIER. — Note sur de nombreux cas d'exanthèmes, à forme d'alastrim, observés dans la région de Tuléar . . . . . [23], 346
ANFREVILLE (L. D'). — Lutte contre les moustiques à Saint-Louis (Sénégal) . . . . [5], 637
—. L'hygiène au Maroc . [8], 121
—. Les hémorragies au Maroc. . . . . [8], 595
—. La fièvre jaune et le Maroc. . . . . [8], 732
—. Les moustiques de Salé (Maroc). . . . . [9], 140
—. La kératodermie symétrique en Afrique ; avec la pl. X. . . . . [9], 442
—. Projet d'organisation de Services d'Hygiène publique dans nos colonies exotiques. [10], 409
—. La lutte antipaludéenne à Salé (Maroc) . . . . [10], 710
—. Essais sur la Climatologie et la Démographie de Casablanca. . . . . [12], 525
—. Le paludisme à Casablanca (Maroc). . . . . [13], 334
—. L'habitation au Maroc . . . . . [14], 282
—. Un moyen de lutter contre le paludisme au Maroc . [23], 53
— et THIROUX (A.). — De l'acné varioliforme ou *molluscum contagiosum* au Sénégal [2], 434
— et —. De l'emploi de *Cercopithecus ruber*, ou *patas* comme animal témoin dans la maladie du sommeil . . [2], 129
— et —. De l'hypertrophie des ganglions dans la trypanosomiase humaine. . . . [2], 397
— et —. Quelques considérations sur la thérapeutique dans la trypanosomiase humaine. . . . . [2], 51
— et —. L'émétique d'aniline dans la filariose . . . [3], 546
ANGELO (Mlle A.), PAPAGHEORGHIOU (S.) et JOANNIDÈS (G.). — Chronique de l'actinomycose en Grèce . . . . . [24], 432
ANGUERA (A.). — Le premier cas de Sodoku en Guipuzcoa (Espagne). . . . . [23], 266
ANTOINE. — Kystes fibreux provoqués par les Filaires . [3], 407
ARAGAO (H. et B.). — Sur le cycle évolutif de l'*Halteridium* du pigeon. Quelques espèces de Tiques brésiliennes . . . [2], 163
ARAUJO (A. D'), GRACIAS (Mlle E.) et NAZARETH (Mlle S.). — Lèpre dans l'Inde portugaise . . . . . [19], 289
ARAVANDINOS (A.). — Contribution à l'étude de l'historique de la leishmaniose interne. . [9], 10
—. Modification de la technique de la ponction de la rate. . . . . [9]. 444
—. Méthode pour assurer l'innocuité parfaite de la ponction splénique. . . . . [11], 701
— et MICHALIDIS (N.). — Un cas de cystite amibienne. . [11], 685
ARDOIN (Martial). — Les coloniaux à Vichy . . . . [23], 854
ARDOIN et MONTPELLIER (J.). — La cure arsénobenzolée dans la dracunculose. . . . [12], 730
ARGAUD (R.). — Ostéolyse aïnhumique . . . . . [25], 323
— et BRAULT (J.). — Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique et de la pathologie comparée de l'aïnhum . . . . . [7], 371
ARIAS (J.) et SURCOUF (J.). — Note sur les Diptères piqueurs recueillis au Dahomey par M. Pécaud. . . . . [3], 539
—. Notes sur les Diptères piqueurs du Niger-Tchad . [3], 754
ARISTARKHOVA (O.). — Etude épidémiologique d'un foyer pesteux au Sud-Est de la Russie. . . . . [18], 624
—. Observations sur la peste endémique en Russie . . [23], 901
—. Etude épidémiologique d'un foyer pesteux au Sud-Est de la Russie. . . . . [25], 624
ARLO (J.). — Pied de Madura avec envahissement du triangle de Scarpa et de la paroi abdominale. . . . . [6], 485
—. La méningite cérébro-spinale à Kindia, Guinée française (janvier-avril 1916) . . [9], 551
—. La rage canine au Soudan français . . . . . [14], 368
—. Recherches sur le parasitisme intestinal chez les tirailleurs sénégalais. . . . . [16], 180

— et LEGER (M.). — Le paludisme en Corse (Présentation). [7], 366
ARLO, SIMOND, AUBERT et BLANCHARD. — La fièvre de Malte à Marseille . . . . . [2], 364
ARMAND-DELILLE (P.), PAISSEAU (G.) et LEMAIRE (H.). — Note sur les constatations positives d'hématozoaires au Laboratoire de Bactériologie de l'Armée d'Orient pendant l'année 1916. . . . . [10], 284
ARMSTRONG et SOREL (F.). — Désinfection des immeubles de Dakar à la suite de l'épidémie de fièvre jaune de 1927. [21], 808
ARNAUD (R.). — Technique nouvelle de dosage des albumines rachidiennes. . . . . [22], 337
—. Au sujet du moranyl . [22], 872
—. Nouveau procédé de dosage des albumines rachidiennes . . . . . [23], 383
—. Au sujet de l'arséno-résistance de la trypanosomiase humaine . . . . . [23], 461
ARROUX et CONOR (A.). — La bilharziose en Tunisie : le foyer du Djerid . . . [6], 239
ARZT (L.) et LEVADITI (A.). — Mode d'action du salvarsan dans la fièvre récurrente du rat . . . . . [5], 320
ASSALI. — A propos d'un cas de tétanos (Discussion) . . [24], 499
ASSALI (J.). — A propos d'un cas de tumeur bilharzienne. . . . . [24], 499
— et BLONDIN (P.). — A propos d'un abcès du foie chez un Sénégalais . . . . . [24], 155
— et CUSSET (J.). — Un cas d'appendicite chez le Noir. . . . . [23], 996
— et CROZAT (P.). — Traitement de l'ulcère phagédénique par le lipo-vaccin antiphagédénique . . . . . [23], 995
ASSALI (J.), LAMBERT (L.) et POPOFF (S.). — Traitement du tétanos par l'association urotropine et sérum . . . . . [24], 590
— et POPOFF (S.). — Adénophlegmon à bacilles pesteux et à évolution chronique . [23], 997
ATHIAS (G.) et CRESPIN (J.). — Le paludisme à Alger. Difficultés du diagnostic avec la fièvre typhoïde. Cas de *Pl. falciparum*. . . . . [12], 504
AUBERT (P.). — Sur deux cas de trypanosomiase observés chez les Européens . . . . [8], 372
—. Grossesse et trypanosomiase. . . . . [8], 578
—. Essais de traitement de la trypanosomiase humaine avec un dérivé O_1 de diaminoarsénobenzène. . . . . [8], 74
—. Essais de traitement de la trypanosomiase humaine par les dérivés O_1 et OK_1 du diaminoarsénobenzène . . [8], 169
—. Amibiase à l'Armée d'Orient . . . . . [10], 611
— et HECKENROTH (F.). — L'arsénophénylglycine dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [4], 411
— et —. Prophylaxie de la trypanosomiase humaine et arsénophénylglycine en injection intraveineuse . . . . [4], 419
—. Village d'isolement pour les indigènes trypanosomés . . . . . [4], 699
— et —. La formule leucocytaire chez les indigènes trypanosomés du Congo . . . . [5], 284
—. Prophylaxie de la trypanosomiase humaine et orpiment. . . . . [5], 287
— et —. L'atoxyl dans la prophylaxie chimique de la trypanosomiase humaine . . [6], 184
—. L'arsénophénylglycine dans la prophylaxie chimique de la trypanosomiase humaine. . . . . [6], 272
—. Action de divers médicaments sur *Microfilaria perstans* et *diurna* . . . . . [6], 457
AUBERT (P.) et MICHELI (M.). — Essais de traitement des infections expérimentales à *Trypanosoma gambiense* et *dimorphon* avec des « suspensions huileuses » d'arsenic et d'antimoine (Métoléine). . . [8], 28
—, MONFORT (F.), HECKENROTH (F.) et BLANCHARD (M.). — Le salvarsan dans la prophylaxie et le traitement de la trypanosomiase humaine . . . [6], 632
AUBERT, NOC (A.) et SIMOND (P.-L.). — Filariose à la Martinique . . . . . [2], 319
—. SIMOND, BLANCHARD et ARLO. — La fièvre de Malte à Marseille . . . . . [2], 364
AUBERTOT (M.). — La flagellose des Euphorbes dans l'Est de la France . . . . . [20], 14
AUBIN (H.). — Essai de traitement de la lèpre par les sels d'or. . . . . [23], 693
AUBIN et LABERNADIE (V.). — Le réflexe oculo-cardiaque chez les lépreux . . . . . [23], 441
AUDAIN (L.) et MATHON (Ch.). — Paludisme larvé . . . [4], 688
AUDOYE et MARÇON. — Au sujet de quelques cas de typhus endémique observés à bord du cuirassé *Paris* . . . . [25], 390

Augé (J.). — Note au sujet du traitement de la peste pulmonaire (Discussion). . . [21], 601
—. Réaction immédiate et violente à la suite d'une injection intraveineuse de gonacrine. . . . . [21], 713
—. Sur deux cas d'aérophagie. . . . . [24], 744
— et Pezet (O.). — Épidémie de fièvre jaune au Dahomey. . . . . [5], 648
Ayraud (E.), Velu (H.) et Petitdidier. — Recherches sur la leishmaniose canine dans la région de Casablanca et sur la valeur de la formol-gélification comme méthode de diagnostic. . . . . [25], 227
Azevedo (Antonio de), Bras de Sa (L.-J.) et Mello (Froilano de). — Résumé des observations concernant l'action plasmodicide de l'atébrine . [25], 878
— et Mello (Froilano de). — Note préliminaire sur l'action plasmodicide de l'atébrine . [25], 874

B

Bablet (J.). — A propos de deux auto-observations de trypanosomiase africaine . . . [22], 949
—. Premiers essais de vaccination antituberculeuse des nourrissons en Cochinchine et au Cambodge . . . . . [18], 379
— et Bernard (P.-Noël). — Le cœur dans le béribéri . [20], 127
—, — et Guillerm (J.). — Le rein et les fonctions rénales dans le béribéri . . . . . [20], 39
—, — et Pons (R.). — Les vers intestinaux en Cochinchine . . . . . [17], 577
—, Guérin (F.), Lalung-Bonnaire et Pons (R.). — Examen radioscopique du cœur dans le béribéri. . . . . [20], 131
— et Guillerm (J.). — Les troubles du métabolisme de l'azote et du chlore dans le béribéri sec . . . . . [18], 735
— et —. Les troubles du métabolisme de l'azote et du chlore dans le béribéri humide [18], 739
—, — et Pham-Van-Lu. — Deux cas de cancer primitif probable du foie en Cochinchine . [19], 569
— et Houdemer. — Lymphoblastome de la région inguinale chez un chien annamite . . . . . [20], 344
— et —. Deux cas de tumeurs ganglionnaires malignes observées au Tonkin chez des animaux domestiques. . . [20], 345
— et Lalung-Bonnaire. — Premiers résultats de l'enquête sur les tumeurs en Cochinchine . . . . . [18], 495
— et Mesnard (J.). — Syndrome rabiforme dans un cas de typhus exanthématique chez l'Annamite . . . . . [20], 318
—, — et Polidori. — Premiers résultats d'une enquête sur le typhus exanthématique au Tonkin. . . . . [19], 766
—, — et Stefani. — Note sur un cas d'abcès amibien du poumon gauche . . . . . [19], 884
— et Soullier. — Sur deux cas de cancer primitif du poumon observés au Tonkin . . [25], 85
Bacigalupo (J.). — Importance du sondage duodénal dans le diagnostic et le traitement des distomatoses hépatiques . . . . . [24], 670
Bacqué (M.), Mathis (C.) et Cazanove (F.). — Inoculation de sang et d'urine de jauneux à des cobayes . . . . . [20], 1025
Bacmann (A.). — Notes sur les mœurs des Anophèles et leurs conditions de gîtes dans la ville de Famailla (Tucuman, République Argentine) . . . . . [14], 506
—. Sur la présence de Cryptocoques pathogènes dans les ganglions des chevreaux goitreux. . . . . [14], 199
Bader, Rodet (A.) et Rubinstein (Mlle). — Trypanosomiase et infections bactériennes : influence réciproque ; étude expérimentale. . . . . [3]. 83
Baer (J.-G.) et Joyeux (Ch.). — Sur quelques larves de Botriocéphales . . . . . [20], 921
— et —. Note sur quelques Helminthes récoltés en Macédoine. . . . . [21], 214
— et —. Les Cestodes rares de l'homme . . . . . [22], 114
— et —. *Railletina* (*Railletina*) *celebensis* Janicki 1902 et *Raill.* (*Raill.*) *bœri* Meggit et Lubramanian 1927. . . . . [22], 675
— et —. Sur la présence du Nématode, *Crassicauda crassicauda* (Creplin, 1829) chez un dauphin des côtes de la France . . . . . [24], 198
— et —. Recherches sur les Cestodes appartenant au genre *Mesocestoides* Vaillant . [25], 993
Bailey (Askford K.). — La mycologie du canal intestinal à

Porto-Rico et ses relations avec la Sprue tropicale . . [22], 58
BAILLY (J.) et REMLINGER (P.). — Essai de traitement de la lèpre par le B. C. G. Innocuité absolue de doses très élevées du bacille. . . . . [21], 283
— et —. Transport à longue distance du Spirochète hispano-marocain pour les besoins de la récurrentothérapie. . [23], 153
— et —. La rage et le virus rabique au Maroc. . . . [25], 289
BAIZE, MORVAN et VOIZARD (F.). — Le parasitisme intestinal des Malgaches (Parasitologie, Hématologie) . . . . . [21], 20
BALFOUR (A.). — Rapport des laboratoires Wellcome à Khartoum . . . . . [2], 275
—. Coccidiosis of African cattle (avec résumé français) . [3], 429
—. A note on the new genus *Grahamella* Brumpt (avec résumé français) . . . . [4], 660
—. Nasal lesions in glanders and epizootic lymphangitis . [6], 143
— et THOMSON (D. B.). — Two cases of non ulcerating « Oriental sore » better termed Leishman nodules. . . [2], 628
BALOZET (L.). — Étude clinique et expérimentale de l'anémie infectieuse des Equidés au Maroc. . . . . [16], 525
—. Contribution à l'étude des réactions de fixation dans la Dourine . . . . . [17], 2
—. Fréquence des formes latentes de piroplasmose bovine au Maroc . . . . . [13], 733
—. Diagnostic expérimental du charbon symptomatique par culture de la moelle osseuse. . . . . [19], 513
—. Myxosporidiose de *Temnodon saltator* L. . . . . [23], 181
—. Deux cas de moniliase bronchique. . . . . [24], 15
—. Les Coccidies des petits ruminants de la Tunisie . [25], 710
—. Étude expérimentale d'*Eimeria nina-kohl-yakimovi*, W. L. Yakimoff et Rastégaieva, 1930. . . . . [25], 715
—. Épizootie de gastro-entérite parasitaire et faune du tube digestif du mouton au Maroc. . . . . [15], 820
BALOZET et BAROTTE. — Application pratique au Maroc de la déviation du complément dans le diagnostic de la Dourine. . . . . [17], 27
—, — et VELU (H.). — Notes sur la valeur de la ponction du testicule dans le diagnostic de la Dourine . . . . . [17], 298
— et BÉROS (G.). — Fièvre exanthématique d'été au Maroc. . . . . [22], 712
— et VELU (A.). — Note sur une affection non classée du cheval au Maroc. . . . . [14], 222
— et —. Darmous (dystrophie dentaire) du mouton et solubilité du principe actif des phosphates naturels qui le provoque . . . . . [24], 848
BARAULT (G.). — Observations sur l'adaptation zoophile des Anophèles en Savoie . . . [14], 564
BARBACCI (P.). — Sur un cas de *Leishmania infantum* observé à Sienne (Italie) (Remarques épidémiologiques). . . [19], 11
BARBEAU (G.) et MAYA (E.). — La vaccination antituberculeuse par le B. C. G. à l'île Maurice . . . . . [21], 190
BARBIER (M.). — « Guide à l'usage des médecins malgaches pour le diagnostic et le traitement de la syphilis par la méthode de Vernes » . . . . . [24], 609
BARDENAT (E.) et LEMAIRE (G.). — Quelques complications rares au cours de la peste bubonique (Alger, 1930). . . . . [24], 274
BARLOVATZ (A.). — Les petits grossissements en microscopie pratique . . . . . [20], 753
—. Cas de mort consécutif à une injection de tryponarsyl [21], 211
—. Sur le traitement du Pian. . . . . [21], 743
—. Les sacs herniaires étranglés. . . . . [24], 775
—. L'arséno-résistance dans le traitement de la trypanose humaine par le tryponarsyl (tryparsamide belge) . . . [22], 201
—. L'arséno-résistance dans la trypanosomiase humaine. . . . . [23], 291
—. La trypanosomiase arséno-résistante est-elle transmissible d'homme à homme ? . [23], 499
—. L'exploration méningée dans la maladie du sommeil . [23], 1014
BAROTTE (J.). — Prophylaxie de la Dourine (Réaction de fixation et chimiothérapie) . [19], 325
— et BALOZET. — Application pratique au Maroc de la déviation du complément dans le diagnostic de la Dourine [17], 27
—, — et VELU (H.). — Notes sur la valeur de la ponction du testicule dans le diagnostic de la Dourine . . . . . [17], 298
— et VELU (H.). — Essais d'isolement en cultures du Cryptocoque de la lymphangite épizootique du cheval, par l'em-

ploi de milieux à l'acide citrique. . . . . [17], 540
BARRETO (F.) et MELLO (Froilano DE). — Contribution à l'étude de la valeur diagnostique de la *réaction* de Gaté et Papacostas et de quelques autres *réactions* alliées . . . [19], 127
BARTET (A.). — L'urticaire dans la dracunculose. . . . [1], 309
—. Essais de pathogénie de l'urticaire dans la dracunculose. . . . . [1], 330
—. Le Dragonneau . . . [2], 66
—. Contribution à l'étude des méningites suppurées observées chez les Noirs . . . . [8], 566
BARTET et DEFRESSINE. — Un cas mortel de fièvre ondulante observé à Ajaccio. . . [6], 601
BASILE (C.). — Sur l'identité des leishmanioses et sur leur mode de transmission. . . . [5], 812
BASS (C.-C.). — The Standard Treatment for Malaria recommended by the National Malaria Committee . . . . [15], 169
BASSILIA et YAKIMOFF (W.-L.). — L'anaplasmose des chèvres en Russie. . . . . [23], 382
BATHELLIER (Jean). — Premiers résultats zoologiques de l'étude des rats et des puces à Pnom-Penh . . . . . [17], 372
BAUCHE (J.) et BERNARD (N.). — Deux cas de filariose du chien. . . . . [4], 478
— et —. Filaire péritonéale du porc . . . . . [4], 482
— et —. Filariose et athérome aortique du buffle et du bœuf. . . . . [5], 109
— et —. Filariose animale de l'Annam central . . . [5], 622
— et —. Conditions de propagation de la filariose sous-cutanée du chien, *Stegomyia fasciata* hôte intermédiaire de *Dirofilaria repens* : . . [6], 89
— et —. Note sur le Surra d'Indochine à Hué. . . . [6], 690
— et MOTAIS (F.). — Sur un nouveau cas de dysenterie amibienne du chien . . . [13], 161
—, RAILLIET (A.) et HENRY (A.). — Sur les helminthes de l'éléphant d'Asie. I. Trématodes et Cestodes . . . . . [7], 78
—, — et —. Sur les helminthes de l'éléphant d'Asie. II. Nématodes. A . . . . . [7], 129
—, — et —. Sur les helminthes de l'éléphant d'Asie. III. Nématodes. B . . . . . [7], 206
—, — et —. Sur les helminthes de l'éléphant d'Asie. IV. [8], 177
—, — et —. Un nouveau Strongylidé du porc . . . . . [12], 324
BAUJEAN (R.). — Note sur le venin de *Bitis arietans* ou Vipère heurtante. . . . [6], 80
—. Epidémie de polynévrite palustre simulant le Béribéri. . . . . [9], 634
—. Note sur quelques manifestations de la pneumonie chez les tirailleurs des camps de Fréjus et de Saint-Raphaël. . . . . [10], 815
—. Foie infesté de larves de Porocéphales. . . . . [11], 262
—. Méningite typhique suppurée chez un Malgache, porteur biliaire de germes . . [11], 264
—. Traitement des bilharzioses, intestinale et viscérale, par l'émétique en injections intraveineuses. . . . . [14], 299
—. Alastrim et variole . [16], 676
—. Essais de traitement de la lèpre à la Martinique . [18], 90
— et MATHIS (C.). — La réaction de Wassermann dans la lèpre. . . . . [8], 252
BAUMANN (H.), CABU (F.) et SCHWETZ (J.). — Note sur la cuti-réaction à la tuberculine chez les jeunes Noirs de l'âge scolaire à Stanleyville (Congo belge) . . . . . [23], 279
BAURY (A.) et LEGER (M.). — Indice endémique du paludisme au Sénégal durant la saison sèche . . . . . [15], 766
— et —. *Pestis minor* expérimentale des rats blancs. [15], 506
— et —. Parasitisme intestinal au Sénégal . . . . . [15], 1020
— et —. Pseudo-Méningocoque pyogène isolé d'un abcès de la fosse iliaque. . . . . [15], 652
— et —. Recherches sur l'indice endémique du paludisme en Guinée. . . . . [15], 497
— et —. Septicémie, avec localisation hépatique suppurée, due à un germe à l'aspect morphologique de *Pasteurella* . [15], 491
— et —. Sur un Coccobacille pseudo-pesteux extrêmement virulent . . . . . [15], 862
—, BÉDIER (E.) et LEGER (M.). — Dakar et ses environs : indice du paludisme aux diverses saisons . . . [15], 1006
—, — et —. Indice paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison. . . . . [16], 208
—, LAURENCY et BÉDIER (E.). — Index endémique du paludisme à Niamey à la fin de la saison des pluies. . . . . [17], 327
— et LEGER (M.). — De l'emploi de la chauve-souris comme

animal réactif dans la peste. . . . . [16], 78
— et —. Souche pesteuse isolée des porteurs humains sains et sa virulence comparée . . . . . [16], 54
— et —. Vaccination contre la peste par la voie buccale [16], 469
— et —. De la peste chez les Muridés et les Musaraignes à Dakar . . . . . [16], 133
—, — et HUCHARD (G.-L.). — Un cas de sporotrichose pulmonaire . . . . . [15], 337
— et MATHIS (C.). — Pyodermite rebelle de la barbe rapidement guérie par l'antivirus de Besredka . . . . . [22], 731
BAUVALLET (H.). — Craw-craw et dermo-épidermite microbienne. Analogies. Traitement . [10], 137
—. Sur un cas de trypanosomiase humaine à la Basse-Côte d'Ivoire . . . . . [14], 326
—. Un accident mortel de rachianesthésie. . . . . [18], 294
—. Quatre mois de campagne antimurine (septembre à décembre 1924) à Cotonou (Dahomey) . . . . . [18], 596
—. Essai de lutte antilarvaire par l'emploi de poudre larvicide, dans une zone inondée du Bas-Dahomey . . . [21], 323
—. Index *Stegomyia* et fièvre jaune . . . . . [21], 328
—. Index *Aedinæ* à Cotonou (Dahomey) . . . . . [24], 292
—. A propos d'un cas de tétanos . . . . . [24], 497
—. A propos de la quinine préventive . . . . . [18], 683
—. Résultats d'une enquête démographique dans le Bas-Dahomey. . . . . [24], 604
BAUVALLET (H.), BRUCHAN (N.) et AGESSY (C.). — Index épidémique palustre à Porto-Novo (Dahomey) . . . . . [23], 106
BAYEUX (R.). — Efficacité des injections hypodermiques d'oxygène dans les anémies tropicales . . . . . [6], 130
—. Manuel opératoire des injections hypodermiques d'oxygène dans les anémies tropicales . . . . . [6], 276
BAZIN. — Un microtome simple et économique . . . . [10], 489
BAZIS (R.). — Réseau oculaire pour le dessin, la numération et la mensuration microscopiques. . . . . [12], 135
BÉCLÈRE. — Sur l'aide apportée au diagnostic et à la localisation des abcès dysentériques du foie par l'exploration radiologique. . . . . [1], 79
BÉDIER (E.), BAURY (A.) et LEGER (M.). — Indice paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison . . . . . [16], 208
— et BOULAY (A.). — Accès pernicieux et azotémie . . [17], 282
— et CHASSIGNEUX (A.). — Au sujet de quelques accidents observés à Dakar au cours des passages de virus rabique. . . . . [17], 511
— et CHESNEAU (P.). — Distomatose hépatique à *Opistorchis* au Laos (à Ventiane et Takhek) . . . . . [22], 331
— et HECKENROTH (F.). — Un cas d'encéphalite épidémique à forme myoclonique chez un Européen à Dakar . . [17], 275
—, LAURENCY et BAURY. — Indice endémique du paludisme à Niamey, à la fin de la saison des pluies. . . . . [17], 327
— et LEGER (M.). — La quinine sous forme de comprimés et son élimination par l'urine. . . . . [15], 870
— et —. Considérations sur la morphologie du *Plasmodium præcox* à propos d'un cas d'accès pernicieux . . . . [15], 1010
— et —. Indice bilharzien (*Schistosomum hæmatobium*) chez les enfants de Dakar. . [16], 276
— et —. Indice endémique du paludisme à Ouagadougou en saison sèche . . . . . [16], 383
— et —. La quinine agit-elle sur les schizontes de *Pl. vivax* au stade intraglobulaire ? . [16], 433
— et —. Notes brèves sur l'indice endémique du paludisme dans la Haute-Volta . . [16], 536
— et —. Piroplasmose à *Gonderia mutans* chez les Bovidés du Sénégal . . . . . [16], 60
— et —. Résultat d'un essai de prophylaxie quinique du paludisme dans les écoles de Dakar . . . . . [17], 101
—, — et BAURY (A.). — Dakar et ses environs : indice du paludisme aux diverses saisons . . . . . [15], 1006
—, PINAUD (J.) et LEGER (M.). — Le paludisme à Zinder : indice hématologique . . . . [16], 137
— et TRINH-VAN-DAM. — Au sujet du traitement du Pian par le salicylate de bismuth en émulsion huileuse gaïacolée . [20], 6
BÉGUET (M.). — Essais de destruction de *Stauronotus maroccanus* Thun, en Algérie, au moyen du *Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle . . . [7], 651
—. Cuti-réactions à la tubercu-

line faites à Alger, du 26 avril 1911 au 1er juin 1916 . [9], 425
—. 4e campagne contre les Acridiens (*Schistocerca peregrina* Ol.) en Algérie au moyen du *Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle . . . . . [9], 679
—. Note sur quelques bactéries utilisées pour le séro-diagnostic du typhus exanthématique. . . . . [14], 142
—. L'agglutination des *Brucella melitensis* et le séro-diagnostic de la fièvre ondulante. Causes d'erreur et précautions nécessaires . . . . . [17], 110
—. Deuxième enquête sur l'absence d'infection mélitensique chez les moutons algériens. . . . . [22], 412
— et CRESPIN (J.). — La courbe de l'hémolyse dans le paludisme . . . . . [5], 801
—, JOLLY (R.) et TEISSONNIÈRE (M.). — Remarques sur les hémocultures pratiquées au Laboratoire de Bactériologie de l'Armée d'Orient du mois de juin au mois de décembre 1917. . . . . [11], 154
—, — et —. Observation d'une épidémie de grippe à l'Armée d'Orient (mai-juin 1917). [11], 738
—, MUSSO (L.) et SERGENT (Et.). — Troisième campagne contre les Acridiens (*Schistocerca peregrina*) en Algérie au moyen du *Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle . . . . . [8], 634
—, PLANTIER (H.) et SERGENT (Ed. et Et.). — Observations microscopiques au cours d'un accès pernicieux paludéen . . . . . [6], 615
— et SERGENT (Ed.). — Anaplasmose chez les bœufs d'Algérie. . . . . [6], 573
—, SERGENT (Ed. et Et.) et LHÉRITIER (A.). — Comparaison entre le *Trypanosoma soudanense* et le *Tryp. berberum*. . . . . [8], 650
BEKENSKY (P.-W.), KOHL-YAKIMOFF (Nina) et YAKIMOFF (W.-L.). — Le trypanosome des bovidés en Russie d'Europe . . [6], 433
BÉLAWINE (W.-S.). — Traitement de la piroplasmose à *Piroplasma bigeminum*, au Nord du Caucase . . . . . [19], 786
—, YAKIMOFF (W.-L.), RASTÉGAÏEFF (Mme E.-F.) et NICOLSKY (S.-N.). — La répartition géographique des piroplasmoses et des tiques au Nord du Caucase . . [21], 644
BELLET. — Du traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique des paludéens . . [1], 406
—. De l'extirpation du ver de Guinée après cocaïnisation . . . . . [1], 366
BELLEVAL (G.), SERGENT (Ed.) et LHÉRITIER. — Sur le *Tryp. marocanum*, n. sp., agent d'une épizootie équine à Casablanca en 1914 . . . . . [8], 433
BÉLITZER (A.-W.), KOHL-YAKIMOFF (Nina) et YAKIMOFF (W.). — *Trypanosoma equiperdum* en Russie d'Europe . . . [5], 822
BÉNAZET (L.) et CONOR (A.). — Un nouveau foyer de bilharziose en Tunisie . . . . . [4], 684
— et —. Formule leucocytaire et image d'Arneth dans la bilharziose . . . . . [5], 396
BENHAMOU (Ed.). — Paludisme et splénectomie. . . . . [25], 685
BENOIT-BAZILLE (H.). — Note sur une *Grahamella : G. musculi*, n. sp., trouvée dans le sang de *Mus musculus* . . . . [13], 408
BENOIT-GONIN. — Note sur le traitement du Bouton d'Orient. . . . . [4], 182
BÉQUAERT (J.). — Sur quelques Auchméromyies du Congo . . . . . [8], 436
—. Dispersion des Glossines au Congo belge . . . . . [8], 461
—. Note rectificative concernant les Auchméromyies du Congo. . . . . [8], 593
—. Coléoptères vésicants (Discussion) . . . . . [8], 593
—. L'*Ornithodorus moubata* dans le Nord-Est du Congo belge. . . . . [12], 317
—. Action pathogène d'un champignon parasite des bambous en Afrique Centrale . . [13], 486
— et RODHAIN (J.). — Présence de *Leptomonas* dans le latex d'une Euphorbe congolaise. . . . . [4], 198
— et —. Sur quelques Œstrides du Congo . . [8], 452, 687, 765
—, PONS, VANDENBRANDEN (F.) et RODHAIN (J.). — *Leptomonas* dans l'intestin de divers insectes de Katanga . . . [4], 528
—, —, —, et —. Les trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les Glossines . . . . . [5], 45
—, —, — et —. Les trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les Glossines . . . . . [5], 281
—, —, — et —. *Leptomonas pangoniæ* . . . . . [5], 604
—, —, — et —. Trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les Glossines, *Tr. denysi* de l'écureuil volant . . . . . [5], 608

—, —, — et —. Essais de transmission de *Trypanosoma gambiense* par la *Glossina morsitans*. . . . . [5], 762
—, —, — et —. Note sur les trypanoses animales du Haut-Katanga . . . . . [5], 819
—, —, — et —. Note sur les trypanosomides intestinaux d'*Hæmatopota* au Congo belge. . . . . [6], 182
Bergevin (E. de) et Sergent (Et.). — A propos de l'hypothèse de la transmission du goitre endémique par un insecte piqueur. . . . . [9], 345
Bergonier (E.) et Heckenroth (F.). — Renseignements démographiques sur Dakar en 1922. . . . . [16], 438
— et Javelly. — Notes sur l'organisation du Service de Prophylaxie antipesteuse à Dakar . . . . . [15], 661
Bernard (P. Noël). — La question de l'opium . . . [6], 385
—. Sur un *Rhizopus* pathogène de l'homme : *Rhizopus equinus* Lucet et Costantin 1903, variété *annamensis* P. Noël Bernard, 1914 . . . . . [7], 430
—. Recherches sur la pathogénie de l'ulcère phagédénique des pays chauds . . . [7], 176
—. Sur une fièvre de cause inconnue observée en Cochinchine (Note préliminaire) . . . . . [13], 104
—. Situation actuelle et fonctionnement de l'Institut Pasteur de Saïgon . . . . [13], 714
—. Sur l'action pathogène du *Bacillus asthenogenes* isolé d'une fièvre de cause inconnue observée en Cochinchine . . . . . [15], 577
—. Sur un mode de préparation du vaccin antistaphylococcique . . . . . [16], 390
—. Avitaminose et infection dans la maladie expérimentale du porcelet due à *Bacillus asthenogenes* (Recherches sur le Béribéri) . . . . . [18], 65
—. Réaction de déviation du complément dans le Béribéri humain . . . . . [19], 575
— et Bablet (J.). — Le cœur dans le Béribéri . . . [20], 127
—, — et Guillerm (J.). — Le rein et les fonctions rénales dans le Béribéri . . . [20], 39
—, — et Pons (R.). — Les vers intestinaux en Cochinchine. . . . . [17], 577
— et Bauche (J.). — Deux cas de filariose du chien . . . [4], 478
— et —. Filaire péritonéale du porc. . . . . [4], 482
— et —. Filariose et athérome aortique du buffle et du bœuf. . . . . [5], 109
— et —. Filariose animale de l'Annam central . . . [5], 622
— et —. Conditions de propagation de la filariose sous-cutanée du chien, *Stegomyia fasciata*, hôte intermédiaire de *Dirofilaria repens* . . . [6], 89
— et —. Note sur le Surra d'Indochine à Hué . . . . [6], 690
Bernard (M.) et Remlinger (P.). — Le trachome à Tanger . . . . . [17], 92
Bernard (P. Noël) et Guillerm (J.). — Action du *Bacillus asthenogenes* sur les aliments (recherches sur le Béribéri). . . . . [16], 743
— et —. Action du *Bacillus asthenogenes* sur les corps phosphorés organiques (recherches sur le Béribéri) . . [17], 153
— et —. Fermentation du contenu stomacal dans le Béribéri humain et dans la maladie expérimentale due à *B. asthenogenes* chez le porcelet. . . . . [17], 382
— et Koun (L.). — Parasitisme intestinal en Annam . [6], 343
—, — et Meslin (Ch.). — Note sur la tuberculose à Hué [4], 550
—, — et —. Épidémiologie de la tuberculose en Annam . . . . . [5], 234
—, — et Lalung-Bonnaire. — Les œdèmes dans le Béribéri. . . . . [20], 30
— et Pons (R.). — Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine. . . . . [17], 39
Bernard (P.) et Fabre (H.). — Sur un nouveau foyer de trypanosomiase bovine observé à la Guadeloupe . . . . [19], 435
Béros (G.) et Balozet (L.). — Fièvre exanthématique d'été au Maroc . . . . . [22], 712
Bertrand (L.-E.). — Révulsion réciproque de l'intestin et du foie dans l'hépatite dysentérique ; balancement symptomatique et nosocomial . . [1], 170
—. Présence d'une levure dans la Sprue. Sa signification pathogénique (Discussion). [1], 344
—. Les émanations des selles dysentériques renferment-elles des principes toxiques ? (Discussion) . . . . . [1], 359
—. L'inégalité pupillaire signe possible de l'abcès du foie (Discussion) . . . . . [1], 424

—. Ankylostomiase au Congo (Discussion) . . . . . [2], 102
—. Rapport sur la quinine [2], 225
—. Sur un cas de *Clou de Biskra* (avec présentation du malade). . . . . [2], 88
—. Contagion de la lèpre (Discussion) . . . . . [3], 415
—. Diarrhée de Cochinchine (Discussion) . . . . . [4], 163
—. Fièvre bilieuse hémoglobinurique (Discussion). . . [4], 306
—. Ipéca désémétinisé (Discussion) . . . . . [4], 328
—. Parasitisme intestinal en Cochinchine. . . . . [8], 245
BERTRAND. — Perméabilisation méningée au sérum antitétanique par l'urotropine . [25], 819
BERTRAND-FONTAINE (Mme) et PAISSEAU. — Sur un cas d'amibiase bronchique . . . . . [19], 176
BETTENCOURT (A.) et BORGES (L.). — Trypanoses des bovidés portugais . . . . . [5], 603
— et —. Présence de trypanosomes dans le sang des bovidés portugais. . . . . [5], 725
— et —. La bilharziose au Portugal (*A propos du mémoire de* P. Remlinger *sur l'absence de bilharziose à Tanger*) . [20], 350
BEURNIER et CLAPIER. — Premiers essais du 189 au Gabon (Pian, Syphilis, Ulcères phagédéniques) . . . . . [15], 607
— et —. Notes sur quelques méthodes actuelles de traitement du Pian . . . . [17], 94
— et DANET. — Note sur le traitement du Pian par les sels de bismuth . . . . . [17], 502
BIDAULT (R.). — Le Bouton d'Orient au pays des dunes (Oued Souf, Sahara Constantinois). . . . . [16], 92
BIGOT (A.). — Au sujet de l'anémie infectieuse du cheval au Maroc . . . . . [16], 634
—. L'anémie pernicieuse du cheval au Maroc. Persistance du virus chez les animaux guéris. . . . . [16], 300
—. Différents procédés de coloration des Cryptocoques pathogènes en médecine vétérinaire. . . . . [17], 547
— et VELU (H.). — Blastomycose des voies lacrymales de l'âne (Anatomie pathologique). . . . . [17], 551
— et —. Isolement rapide de *Cryptococcus mirandei* en culture pure . . . . . [18], 127
— et —. Étude biologique de *Cr. mirandei*, agent de la blastomycose des voies lacrymales de l'âne . . . . . [18], 231
BIENASSIS (E.) et CONSEIL (É.). — Traitement de la fièvre récurrente par le néosalvarsan d'Ehrlich. . . . . [5], 476
BIJON (R.). — Note sur un cas d'Aïnhum . . . . . [8], 570
—. Étude expérimentale chez l'homme de l'influence de la quinine dans la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [8], 597
BILLET (A.). — Lavement créosoté dans la dysenterie (Discussion) . . . . . [1], 71
—. La peste en Algérie en 1907. Recherches particulières sur les rats, leurs ectoparasites et leurs rapports avec l'épidémie, dans le département de Constantine. . . . . [1], 111
—. Érythème ortié, d'origine acarienne, chez un Algérien (Discussion) . . . . . [1], 178
—. Globules géants ou « corps en demi-lune » du paludisme ; autres altérations globulaires au cours de cette maladie infectieuse (Discussion) . [1], 206
—. Sur la fréquence de *Fasciolopsis buski* (Lank. 1857) en Cochinchine (Discussion) [1], 206
—. Accès paludéens à formes pneumonique et dysentérique (Discussion) . . . . . [1], 226
—. Paralysie deltoïdienne d'origine palustre. Evolution chez le même sujet du paludisme tierce primaire en paludisme tierce secondaire . . [3], 182
—. La fièvre de Malte en Corse (Discussion) . . . . . [3], 773
—. Action de la quinine sur les hématozoaires du paludisme . . . . . [6], 336
— et GRENIER (M.). — Sur la fièvre récurrente au Maroc oriental . . . . . [7], 382
BILLIEMAZ (A.) et BRAU (P.). — Inconvénients que peut présenter le traitement quinique appliqué avec trop de rigueur. . . . . [11], 80
BIOT (R.) et RICHARD (G.). — De la possibilité d'inoculer *Tr. lewisi* à d'autres animaux que le rat . . . . . [5], 826
BIZARD. — Emploi de l'émétique dans le traitement de la dysenterie amibienne et de l'hépatite. . . . . [6], 564
— et LOGÉ. — Sur quatre cas de piroplasmose équine (*Piroplasma caballi*) observés dans le département de la Loire-Inférieure . . . . . [17], 347
— et TERRIEN (E.). — Cas de leishmaniose interne chez un

adulte, contracté en France. . . . . [16], 89
BLAIZOT (L.) et NICOLLE (Ch.). — Réceptivité des animaux de laboratoire au Spirochète du Nord de l'Afrique . . [4], 658
— et —. Nouveaux points de l'étude expérimentale du Spirochète de la fièvre récurrente nord-africaine. Réceptivité du lapin . . . . . [5], 472
— et —. Virulence des cultures de *Leishmania infantum* ; sensibilité du chacal au virus du kala-azar tunisien. . . [5], 721
— et —. Courte durée de l'immunité dans la fièvre récurrente expérimentale. L'épreuve croisée est sans valeur pour différencier les Spirochètes . . . . . [6], 107
— et —. Deuxième note sur la courte durée de l'immunité dans la fièvre récurrente . . . . . [6], 242
— et —. Technique de la préparation du sérum anti-exanthématique à l'Institut Pasteur de Paris (Démonstration) . . . . . [9], 730
—, CONSEIL (E.) et NICOLLE (Ch.). — Du rôle négatif des poux dans la transmission expérimentale de la fièvre des tiques. . . . . [6], 106
— et GOBERT (E.). — Deux épidémies de fièvre récurrente en Tunisie, leur origine tripolitaine. . . . . [4], 613
BLANC (G.). — Recherches sur le typhus exanthématique poursuivies au laboratoire de Nich, d'avril à octobre 1915 . [9], 311
—. Enquête sur les chèvres laitières de la Marsa (Tunisie) au sujet de la fièvre méditerranéenne. . . . . [10], 376
—. Sur un cas de toxoplasmose canine observé en Tunisie. . . . . [10], 377
—. A propos du paludisme autochtone de la région du lac Presba. Note complémentaire. . . . . [10], 804
—. Conjonctivite phlycténulaire et pédiculose . . . . [13], 645
—. Remarque à propos de la note de M. Manoussakis : « Quelques recherches expérimentales sur la Dengue ». . . . . [22], 68
— et BOUQUET (H.). — Un cas de mycétome à *Nocardia maduræ* observé en Tunisie . [10], 431
— et BRUN (Gabriel). — Nouveau cas de mycétome à grains noirs observé en Tunisie . . . . . [12], 741
— et CAILLON (Louis). — Sur une mycose aspergillaire observée en Tunisie . . . . . [17], 343
— et CAMINOPETROS (Jean). — Le cysticercoïde d'*Hemidactylus turcicus* Lin.. . . . . [14], 20
— et —. La *Tick paralysis* observée sur les moutons de la région de Sitia (Crête) . [17], 378
— et —. Quelques mots sur le mode de conservation des *Stegomyia* en cage . . . [22], 440
—, — et JOANNIDÈS (G.). — Chronique de l'actinomycose en Grèce . . . . . [21], 432
—, — et MANOUSSAKIS (E.). — Quelques recherches expérimentales sur la Dengue. [21], 525
— et CHATTON (E.). — Large éclectisme parasitaire de la punaise des lits. Son entretien aux dépens des reptiles. . . . . [11], 382
— et —. Culture du Trypanosome du Gecko chez la punaise des lits . . . . [11], 387
— et —. Le *Leptomonas* de la Tarente dans une région indemne de Bouton d'Orient. Observations et expériences. . . . . [11], 595
— et —. Inoculations positives de cultures de *Leishmania tropica* aux Geckos . . . [12], 316
— et CHRYSSOULIS (A.). — La fréquence du Ténia échinocoque (*Echinococcus granulosus*) chez les chiens d'Athènes et du Pirée . . . . . [24], 49
— et HECKENROTH (F.). — Répartition du paludisme dans la région de Koritza (Basse-Albanie). Carte des indices spléniques. . . . . [11], 470
— et HENRY (A.). — Le Physaloptère du *Macacus cynomolgus* L. . . . . [5], 390
—, JOANNIDÈS (G.) et PANGALOS (G.-C.). — La réaction de fixation du complément appliquée au séro-diagnostic de la lèpre avec un antigène méthylique de bacille de Kedrowsky [23], 568
—, MELANIDI (C.) et STILIANOPOULO (M.). — La variole des chèvres en Grèce . . . . . [20], 583
— et NICOLLE (Ch.). — Extension de la « région à Bouton d'Orient » tunisienne . [10], 378
—, — et LANGERON (M.). — Recherches expérimentales sur le rôle du gecko (*Tarentola mauritanica*) dans l'étiologie du Bouton d'Orient . . . [13], 508
BLANCHARD (C.). — Sur un nouveau type larvaire du groupe des Anophélines avec Note ad-

ditionnelle de R. Blanchard. . . . . [11], 668
Blanchard (M.). — Sur le ver de Guinée dans la région du Haut-Sassandra (Côte-d'Ivoire). . . . . [4], 206
—. Infection à *Schizotrypanum cruzi* chez souris . . . [5], 598
—. Épidémie de spirochétose humaine à Bikié (Congo français) . . . . . [6], 559
—. Variations spontanées de l'infection sanguine chez quelques malades du sommeil . . . . . [6], 581
—. Inoculation expérimentale de l'ulcère phagédénique tropical. . . . . [7], 96
—. Porocéphales (Discussion) . . . . . [7], 501
—. Un cas d'Œrbiss, ou pseudomyiase rampante, à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) [10], 725
—. Géophagie et ankylostomiase. . . . . [12], 322
—. Complications phagédéniques de la vaccine . . . . [12], 493
—. Sur la pathogénie de l'hémoglobinurie dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [24], 473
—. A propos de la note de H. Seidelin : « Au sujet des comprimés de quinine » . . . . . [15], 690
—. Les insuccès de la quinine préventive dus à l'insolubilité des comprimés . . . . [15], 293
—. Au sujet des accidents d'intolérance de la ponction lombaire . . . . . [22], 257
—. La prémunition par le B. C. G. à Dakar . . . . . [25], 366
—. Cancérisation d'un ulcère syphilitique phagédénisé . [25], 841
—, Aubert (P.), Monfort (F.) et Heckenroth (F.). — Le salvarsan dans la prophylaxie et le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . [6],
—, Broudin (L.) et Borel (É.). — Surra du chien. Traitement par Bayer 205. Guérison (?). Expériences négatives de transmission de l'affection par *Rhipicephalus sanguineus* Latr. . . . . [20], 222
— et Heckenroth (F.). — Note sur la présence et l'endémicité d'une myiase furonculeuse au Congo français . . . . [6], 350
— et —. Transmission de *Tryp. gambiense* par les moustiques. . . . . [6], 442
— et —. Recherches sur les propriétés du sérum des malades du sommeil au Congo . [6], 444
— et —. Le néosalvarsan dans le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . [6], 591
— et —. État des méninges et injections intrarachidiennes de néosalvarsan dans la trypanosomiase humaine . . . [7], 63
— et Laigret (J.). — Sur quelques cas de guérison de la trypanosomiase humaine à la deuxième période . . . [17], 368
— et —. Recherches sur la transmission d'*Onchocerca volvulus* par divers parasites hématophages. . . . . [17], 409
— et —. Sur la prophylaxie de la maladie du sommeil. A propos de la mission Schwetz au Congo belge. . . . . [17], 485
— et —. Les plaies de la face dorsale des doigts et des mains par choc sur les arcades dentaires . . . . . [17], 528
— et —. Pseudo-helminthiase intestinale . . . . . [17], 583
— et —. Premiers essais du produit 309 dans quelques trypanosomiases expérimentales et en trypanosomiase humaine. . . . . [18], 410
— et Lefrou (G.). — Le traitement de la maladie du sommeil par le « 189 ». . [15], 797
— et —. Présence dans une lésion humaine d'un Saccharomyces pathogène pour le cobaye . . . . . [15], 915
— et —. Présence de Spirochètes dans le sang d'Européens atteints de fièvre bilieuse hémoglobinurique. Le problème étiologique de cette spirochétose. . . . . [15], 699
— et —. Spirochètes de la fièvre bilieuse hémoglobinurique et pseudo-spirochètes du sang . . . . . [16], 726
— et —. Une erreur de diagnostic : fièvre récurrente à manifestation méningée, prise pour maladie du sommeil . . [16], 394
— et —. Essais du Stovarsol dans la trypanosomiase humaine . . . . . [17], 214
— et —. Considérations cliniques, pathogéniques et thérapeutiques sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique à Spirochètes . . . . . [19], 345
—, — et Laigret. — Note préliminaire sur des cas d'ictères épidémiques observés à Brazzaville (A. E. F.) . . . . [15], 383
—, — et —. Spirochétose ictérigène épidémique observée sur des indigènes à Brazzaville (A. E. F.) . . . . . [16], 184
— et Leger (A.). — Hémato-

zoaires d'un passereau du Haut-Sénégal et Niger .. [4], 326
— et Mesnil (F.). — Infection comparée des porcs par *Trypanosoma gambiense* et *Tr. rhodesiense*. . . . . [5], 492
— et —. Sur l'identification du virus d'un cas de trypanosomiase humaine de laboratoire. . . . . [7], 196
— et —. Sensibilité au sérum humain normal de Trypanosomes d'origine humaine . [9], 81
— et Pin (M.). — Rechute de paludisme six ans après le départ du pays d'endémie . . . . . [22], 73
— et Roubaud (E.). — Deux cas de ver de Cayor chez l'homme observés à la Côte d'Ivoire. . . . . [4], 687
—, Simon, Aubert et Arlo. — La fièvre de Malte à Marseille. . . . . [2], 364
— et Toullec (F.). — Sur le traitement de la mélitococcie par la protéine de *Br. abortus*. . . . . [22], 150
Blanchard (R.). — Tête de *Davainea madagascariensis* (Présentation) . . . . . [9], 413
—. Quelques cas de pseudo-parasitisme et de xéno-parasitisme . . . . . [9], 522
—. Monographie des Hémadipsines (sangsues terrestres) (pl. VII). . . . . [10], 640
—. Charlatans et pseudo-parasites. Les vers des yeux. . . . . [11], 579, 724
—. Larves des Nevroptères éventuellement hématophages . . . . . [11], 586
Blanquier (H.). — La lèpre dans le cercle de Touba (Côte d'Ivoire) . . . . . [7], 559
Blazy. — Considérations sur les rapports de la faune des rongeurs avec les manifestations pesteuses à Dakar . . [17], 834
—. Quatre mois de campagne antimurine (septembre à décembre 1924) à Cotonou (Dahomey) (Discussion) . . [18], 599
Blin (G.). — Destruction des moustiques par le procédé des trous-pièges (Discussion) [1], 100
Blin et Kernéis (J.). — Note concernant le premier cas de maladie du sommeil constaté chez un Européen en Guinée française . . . . . [9], 231
Bloch (A.). — Fautes d'alimentation par modification des habitudes des indigènes dans nos colonies (Discussion) [25], 967
Blondin. — Note sur un traitement des ulcères phagédéniques. . . . . [12], 296
—. Utilisation par les Indigènes de « Caisses de Secours » en dépôt dans les villages . [19], 943
—. Destruction de la face par lésions syphilitiques. Guérison par les 914 en lavements [20], 696
— et Assali (J.). — A propos d'un abcès du foie chez un Sénégalais . . . . . [24], 135
—, Wilbert (R.) et Delorme (M.). — Contribution à l'étude de la rage en Afrique Occidentale Française. . . . . [20], 404
Bodet. — Quelques cas de pseudo-myiase rampante ou pseudo-dracunculose, observés à Tamatave . . . . . [11], 716
Boisseau (R.). — Traitement du Pian par l'acétylarsan : avantages de ce produit chez l'enfant. . . . . [19], 416
—. Le parasitisme intestinal au Congo français . . . . [19], 744
—. Spirochétose indéterminée de la poule . . . . . [23], 130
— et Sicé (A.). — Quelques résultats obtenus avec la technique nouvelle de dosage des albumines rachidiennes. [22], 679
— et —. Note sur une épizootie de typhose aviaire à Brazzaville. . . . . [23], 353
— et —. Notes sur la dysenterie bacillaire en Afrique Equatoriale Française. Bacilles dysentériques. Bacilles pseudo-dysentériques . . . . [23], 385
— et —. Contribution à l'étude de la rage canine (virus des rues) en Afrique Equatoriale Française. . . . . [23], 703
— et —. Trypanosomiase humaine associée à différentes infections . . . . . [23], 1011
— et —. Infection à paratyphique A présentée par un nourrisson à Brazzaville . . [24], 348
— et Vaucel (M.). — Premiers essais de vaccination antituberculeuse par le B. C. G. à Brazzaville . . . . . [24], 173
— et —. La dysenterie bacillaire à Brazzaville pendant l'année 1930. . . . . [24], 267
— et —. L'action du moranyl dans l'arséno-résistance de la trypanosomiase humaine. . . . . [24], 374
— et —. Résultats éloignés du traitement de la trypanosomiase humaine à forme méningée par la tryparsamide. . . . . [24], 523
—, Sicé (A.), Provost (J.) et Daniel. — Le quotient albumi-

neux du sérum chez quelques trypanosomés . . . . . [24], 181
—, Vaucel (M.) et Salaün (G.). — Streptothrix pathogène, isolé au cours d'essais de transmission au lapin du virus d'un « chien fou » . . . . [24], 631
—, — et —. Rage canine en Afrique Équatoriale Française. . . . . [25], 191
Boissezon (P. de). — Remarques sur les conditions de la reproduction chez *Culex pipiens* L. pendant la période hivernale. . . . . [22], 549
—. Expériences au sujet de la maturation des œufs chez les Culicides . . . . . [22], 683
Bonain (C.). — Au sujet de l'expression « paludisme de première invasion » . . . [14], 636
Bonardel (Mme) et Roger (V.). — Sur un cas d'avortement provoqué pour bassin vicié chez une naine. . . . [22], 732
Bonnard et Malloizel. — Note sur le paludisme autochtone dans la presqu'île de Langle (golfe du Morbihan). . [10], 805
Bonne (C.). — Remarques sur les *Cellia* sud-américaines . [17], 132
— La leishmaniose cutanée dans la Guyane hollandaise . [17], 293
—. Recherches sur les spirochètes de la spirochétose fébrile de Sumatra . . . . . [17], 623
—. Sur la présence de la chromoblastomycose aux Indes Néerlandaises . . . . [23], 765
Bonnefay et Maille. — Abcès du foie amibien avec association de bacilles de Koch . . [7], 475
Bonnel (M.-F.). — Relation d'une épidémie d'Alastrim survenue dans un détachement de tirailleurs sénégalais . . . [21], 87
Bonnet (A.). — Étude de l'infection tuberculeuse par l'épreuve de la cuti-réaction dans les oasis du Tidikelt . . [12], 353
Bonnet (P.). — Quelques renseignements sur la biologie de *Lebistes reticulatus* Peters, poissons larvivores de la Guadeloupe . . . . . [25], 248
Boquet (A.) et Bridré (J.). — L'importation en France des moutons algériens et la protection des troupeaux métropolitains contre la clavelée. [7], 506
— et Nègre (L.). — Nature mycosique du parasite de la lymphangite épizootique. . [7], 464
— et —. Sur la culture du parasite de la lymphangite épizootique . . . . . [8], 49
— et —. Sur l'évolution du parasite de la lymphangite épizootique chez le cheval. . . . . [8], 248
— et —. Sur la culture du parasite de la lymphangite épizootique . . . . . [10], 274
— et —. Sur le traitement spécifique de la lymphangite épizootique par les cultures stérilisées de Cryptocoques [13], 777
—, Roig (G.) et Nègre (L.). — Premiers essais de vaccination préventive contre la lymphangite épizootique . . . [11], 551
—, — et —. Mycothérapie de la lymphangite épizootique . . . . . [11], 609
—, Sergent (Ed.) et Lhéritier (A.). — Étude sur les piroplasmoses en Algérie. Essai de traitement par le trypanbleu. . . . . [6], 618
—, — et —. Études sur les piroplasmoses en Algérie. Infection par les piroplasmes de bovins arrivant de France en Algérie pendant l'hiver. [7], 699
Boquet (C.). — Paludisme et Culicides au Petchili . [7], 110
—. Pus chocolat (Discussion). . . . . [7], 151
Boquet (H.), Sergent (Ed.), Lhéritier (A.) et Denarnaud (P.). — Épizootie de peste porcine avec présence de *Salmonella* à Alger. Transmission expérimentale par virus filtré . . . . . [5], 781
Bordes (L.-A.) et Nguyen-van-Lieng. — Note sur les albumines et la cholestérine du sérum sanguin chez les paludéens chroniques de race annamite . . . . . [24], 724
Borel (E.). — Note sur un procédé simple pour empêcher la ponte des moustiques dans les collections d'eau familiales indigènes . . . . . [18], 779
—. Note préliminaire sur les moustiques de Cochinchine et du Sud-Annam (Massif de Lagbian) . . . . . [19], 472
—. Résultats d'une enquête épidémiologique et entomologique à la plantation de Gia-Nhan (Cochinchine) . . . . [19], 677
—. Au sujet de l'action empêchante de la couleur blanche sur la ponte des moustiques, dans les jarres indigènes blanchies à la chaux . . . [19], 702
—. Note sur les gîtes de *Neocellia maculata* en Cochinchine et dans le Sud-Annam . [19], 703
—. Anophèles et paludisme dans la région de Chaudoc (Cochinchine). Résultats d'une enquête

faite du 16 au 21 janvier 1926. . . . . [19], 806
—. Paludisme en Cochinchine. Résultats de mesures prophylactiques à la plantation de Suzannah (11 au 13 août 1926) . . . . . [19], 811
—. Résultats d'une enquête épidémiologique et entomologique à Yaback (Annam) . . [19], 845
—. La constitution du sol et le paludisme en Cochinchine . . . . . [19], 935
—. Enquête entomologique et épidémiologique à Can-Tho et Bac-Lieu (Cochinchine). [20], 974
—. Description de deux espèces nouvelles de Culicides de Cochinchine *Lophoceratomyia roubaudi* et *L. bernardi* n. sp. . . . . [20], 25
—. Contribution à l'étude de la mortalité infantile en Cochinchine . . . . . [20], 52
—. Résultats d'une enquête malariologique à Dalat (Cochinchine). . . . . [20], 427
—. Enquête malariologique à la Station d'essai de Giaray (Cochinchine) . . . . . [21], 87
—. Note sur la présence d'*Argas vespertilionis* (Latreille, 1796) au Cambodge . . . . [21], 328
—, Blanchard (M.) et Broudin (L.). — Surra du chien. Traitement par le 205 Bayer. Guérison (?). Expériences négatives de transmission de l'affection par *Rhipicephalus sanguineus* Latr. . . [20], 222
—, Guérin (F.) et Advier (M.). Stovarsol et paludisme. [20], 331
— et Pons (R.). — Recherches sur l'étiologie du Bériberi, au cours d'une épidémie survenue dans une plantation en Cochinchine (juillet-décembre 1925) . . . . . [19], 620
Borges (L.) et Bettencourt (A.). — Trypanoses des bovidés portugais . . . . . [5], 603
— et —. Présence de Trypanosomes dans le sang des bovidés portugais. . . . . [5], 725
— et —. La bilharziose au Portugal (*A propos du mémoire de* P. Remlinger *sur l'absence de bilharziose à Tanger*) [20], 350
Bories (L.), Sergent (Ed.) et Nègre (L.). — Épidémie de fièvre ondulante à Arzew et Saint-Leu (département d'Oran) en 1913. . . . . [9], 351
Borrel (A.). — Spirilles, Spirochètes, Trypanosomes . [1], 151
—. Nécrotuberculose et sensibilisation (anaphylaxie) par bacilles tuberculeux morts. . . . . [1], 420
—. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dans l'Inde (Discussion) . . . . . [1], 551
Bossard (A.), Pascal (J.-M.), Champouillon (S.), Parrot (L.) et Foley (H.). —. Étude comparative des cuti-réactions à la tuberculine de Koch et à la tuberculine B. C. G. . . [25], 298
Bossavy (F.) et Velu (H.). — Deux cas de méningite cérébro-spinale chez la chèvre . [13], 497
Bosselut (B.). — Sur un Spirochète sanguicole du chien domestique . . . . . [18], 702
Bossert. — Compte rendu de l'expérimentation du 309 Fourneau dans le secteur de prophylaxie n° 1 (Afrique Equatoriale Française) . . . [20], 460
Botchkareff (P.-V.) et Stefko (W.-G.). — Sur quelques propriétés morphologiques du sang dans le paludisme. [17], 631
Botelho (C.) et Carini (A.). — Sur quelques Trypanosomes d'oiseaux du Brésil . . [7], 395
Botreau-Roussel. — Note sur le N'Goundou . . . . . [10], 480
—. Photographies d'individus atteints de Goundou et squelette d'un cas de Goundou généralisé (Présentation) . [12], 586
—. Radiologie du Ver de Guinée (Filaire de Médine) après injection intrasomatique de lipiodol . . . . . [21], 103
—. Considérations sur le traitement de la syphilis chez les Indigènes de nos colonies (Discussion) . . . . . [24], 439
— et Cornil. — Considérations anatomiques sur la structure des tumeurs paranasales du Goundou . . . . . [17], 863
— et Huard (P.). — Arthrites puriformes aseptiques dans la dracunculose chez le Noir . . . . . [23], 1020
Boucher (H.). — Photographies du laboratoire de bactériologie de Grand-Bassam (Présentation) . . . . . [9], 413
—. Un cas de blastomycose à la Côte d'Ivoire . . . [9], 414
—. Un cas de tuberculose zoogléique à la Côte d'Ivoire . . . . . [9], 416
—. Traitement rapide de l'ulcère phagédénique des pays chauds. . . . . [9], 419
—. Mycoses gommeuses à la Côte d'Ivoire . . . . . [11], 306
—. Sur un bacille septique aérobie . . . . . [14], 31
Boucher (M. le), Capéran (G.), Laigret (J.) et Tchernenko (A.).

— Note sur un cas d'ictère à vomissements noirs . . [22], 612
BOUET (G.). — Piroplasmose bovine observée à la Côte d'Ivoire . . . . . [1], 234
—. Notes sur les Trypanosomiases du Dahomey . . . [1], 519
—. Spirillose des poules au Soudan français . . . [2], 288
—. Une épidémie de fièvre jaune au Libéria. . . . . [18], 746
—. Sur l'existence d'un petit foyer de trypanosomiase humaine à la Basse-Côte d'Ivoire. . . . . [9], 168
—. Contribution à l'étude des zones à Glossines du Sénégal. Région du chemin de fer de Thiès à Kayes . . . . [9], 802
— et ROUBAUD (E.). — Expériences diverses de transmission des Trypanosomes par les Glossines. III . . . . . [3], 599
— et —. Expériences de transmission des Trypanosomes par les Glossines. IV . . . [3], 722
— et —. Expériences de transmission des Trypanosomes par les Glossines . . . . [4], 539
— et —. Expériences diverses de transmission des Trypanosomes par les Glossines . [5], 204
— et —. Expériences de transmission des trypanosomiases animales de l'Afrique Occidentale Française par les Stomoxes . . . . . [5], 544
— et —. Désinfection stégomycide par le crésyl . . [5], 627
— et —. L'Œstre des moutons au Sénégal . . . . . [5], 733
— et —. Myiase prévaginale chez la vache à *Chrysomyia* (*Pycnosoma*) *megacephala* Fabr. en Afrique Occidentale. Spécificité parasitaire des larves cuticoles de cette mouche . . . [5], 737
— et —. La piroplasmose (nuttaliose) de l'âne en Afrique Occidentale . . . . . [5], 806
— et —. Bilharziose au Dahomey et en Haute-Casamance. [5], 837
— et —. Nouvelles observations sur les Chéromyies de l'Afrique Occidentale . . . . . [8], 462
— et —. Nouvelle contribution à l'étude des Chéromyies de l'Afrique Occidentale Française . . . . . [9], 242
— et —. Répartition des Glossines à la Côte d'Ivoire . [10], 37
BOUFFARD (A.). — Observation de morsure de serpent suivie de mort . . . . . [18], 353
BOUFFARD (G.). — La maladie du sommeil et sa prophylaxie dans la boucle du Niger. [1], 273
—. Du rôle comparé des Glossines et des Stomoxes dans l'étiologie du Souma . .[1], 333
—. Souma et Baléri (Discussion). . . . . [1], 392
—. La défense de Bamako (Haut-Sénégal et Niger) contre la fièvre jaune en 1906 . . . [4], 442
—. Le *Stegomyia fasciata* au Soudan français . . . [1], 454
—. Autopsie d'un cas de Goundou chez le Cynocéphale [2], 216
—. Le rôle enzootique de *Glossina palpalis* dans le Souma. . . . . [2], 599
—. Prophylaxie du paludisme chez l'Européen dans le Haut-Sénégal et Niger . . . [2], 34
—. Prophylaxie du paludisme chez l'indigène dans le Haut-Sénégal et Niger . . . [2], 84
—. Vaccin (Discussion). . [3], 497
—. Quelques considérations d'ordre prophylactique concernant *Trypanosoma cazalboui*. [5], 380
—. Paludisme à Sontay (Discussion) . . . . . [6], 753
—. De quelques considérations d'ordre épidémiologique sur le paludisme. . . . . [7], 23
—. Chéloïde géante chez un indigène du Dahomey. . . [10], 814
—. Sur un cas de fièvre jaune à Porto-Novo (Dahomey) [11], 553
—. Traitement de l'ulcère phagédénique dans les pays chauds . . . . . [11], 616
—. Le paludisme au Dahomey. . . . . [12], 304
— De la pyomyosite, maladie humaine à *Pasteurella* . [13], 398
—. De la rage canine en Afrique Occidentale Française . . . . . [14], 6
—. Vaccin antivariolique et vaccine en A. O. F. . . . [14], 26
—. Gangrène de la lèvre supérieure et association fuso-spirochétienne . . . . . [16], 719
—. La chloropicrine dans la lutte contre la peste à Madagascar. . . . . [16], 602
—. Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine (Discussion) . . . . . [17], 63
—. Les principes du traitement quinique du paludisme (Discussion) . . . . . [17], 323
—. Note sur le traitement du Pian par le Stovarsol . [18], 473
—. Protection sanitaire de la main-d'œuvre indigène en Côte d'Ivoire . . . . . [18], 439
—. Alimentation en eau potable de la presqu'île d'Abidjan (Côte d'Ivoire) . . . . [19], 244
—. Traitement du Pian par le Stovarsol . . . . . [20], 841

—. Considérations sur l'épidémiologie du béribéri dans la province de Tanan en 1927 (Discussion). . . . . [22], 995
—. Dengue et fièvre jaune (Discussion) . . . . . [23], 159
—. Considérations au sujet de la transmission de la peste. . . . . [23], 455
—. L'ulcère phagédénique et son traitement . . . . . [23], 483
—. Au sujet de l'étiologie de la peste . . . . . [23], 563
—. La tuberculose en Côte d'Ivoire . . . . . [23], 777
—. La trypanosomiase humaine en Côte d'Ivoire . . . [23], 922
— et Dupont. — *Trypanosoma dimorphon* chez les chiens de la Haute-Volta noire (A. O. F.) . . . . . [5], 278
— et Girard. — La fièvre typhoïde chez le Malgache en Emyrne . . . . . [15], 675
— et —. Le dépistage de la peste par la ponction du foie. Son importance prophylactique . . . . . [16], 501
— et Legac (P.). — Myiase à *Chrysomyia bezzianum* observée chez un indigène de la Côte d'Ivoire. . . . . [22], 48
— et Neveux. — Bilharziose dans le Haut-Sénégal et le Haut-Niger . . . . . [1], 430
— et Roques. — Un cas de Goundou chez le Cynocéphale. . . . . [1], 295
Bougenault. — Note sur l'emploi de l'émétique en lavements dans : I. Un cas de bilharziose intestinale. — II. Deux cas de Vers de Guinée. . . . [20], 285
Bouguet (A.), Gueidon (E.), Sergent (Et.) et Catanei (A.). — Existence de la leishmaniose cutanée chez un chien dans la localité du Tell algérien où le Bouton d'Orient est endémique chez l'homme . . . . [18], 360
Bouilliez (M.). — Exposé des travaux en cours au laboratoire de Fort-Archambault (trypanosomiases, mouches piquantes, paludisme, bilharziose, goitre). . . . . [7], 685
—. Les bilharzioses dans le Moyen-Chari (Territoire du Tchad). Recherches expérimentales . . . . . [8], 601
—. Sur une Filaire du crapaud de la région du Chari . [9], 133
—. Etude et répartition de quelques affections parasitaires au Moyen-Chari (Afrique centrale) . . . . . [9], 143
—. Un cas de kala-azar infantile au Moyen-Chari (Territoire du Tchad). . . . . [9], 299
—. Auto-observation d'un cas d'inoculation accidentelle de Bouton d'Orient sur la conjonctive . . . . . [10], 1
—. Recherches expérimentales sur *Leishmania tropica* . [10], 66
—. Au sujet d'un Bouton d'Orient d'origine expérimentale accidentelle . . . [11], 563
Bouin (A.) et Velu (H.). — Essais de destruction de *Schistocerca peregrina* Olivier, au Maroc, par l'emploi des cultures microbiennes (*Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle) . [8], 638
Boulay (A.). — Mode simplifié de préparation des éthers éthyliques de l'huile de Chaulmoogra . . . . . [16], 151
—. Un moyen de recherche rapide de la nicotine dans les vins en A. O. F. . . . [19], 931
—. Un cas de diabète sucré chez un Noir d'Afrique. [21], 701
—. Note sur la fréquence des cas d'oxyluric chez les Européens à Dakar . . . . [22], 734
— et Affre. — De l'utilisation du Rouye (farine de mil fermentée) dans l'alimentation du nourrisson. . . . . [19], 155
— et Bédier (E.). — Accès pernicieux et azotémie . . [17], 282
— et Leger (M.). — Recherches sur l'élimination du Calcium dans la lèpre chez les Noirs. . . . . [15], 865
— et —. Elimination du Calcium et du Phosphore chez les lépreux . . . . . [15], 1002
— et —. Evaluation de la quantité de sang rendue par l'urine dans un cas de bilharziose vésicale . . . . . [16], 63
—. La cholestérinémie chez les lépreux . . . . . [16], 57
—, Lhuerre (H.) et Mitard (Mlle L.). — Sur le passage de la quinine dans le lait maternel. . . . . [21], 466
— et Nogue. — Note préliminaire sur l'insuffisance rénale chez les bilharziens. Essai de traitement par l'émétique . [16], 504
Bouquet (H.) et Blanc (G.). — Un cas de mycétome à *Nocardia maduræ* observé en Tunisie. . . . . [10], 431
Bourragué (N.) et Bourret (G.). — La diffusion de la tuberculose à Saint-Louis (Sénégal). . . . . [6], 11
Bourdelle (E.), Urbain (A.) et Davesne (J.). — Deux cas de gingivo-stomatite gangréneuse (Noma) due à *B. perfringens*

chez le chimpanzé (*Pan chimpanze* Meyer) . . . . [24], 787
BOURDELLE (Le). — Voir LE BOURDELLE.
BOURDIN et POISSON (H.). — Néoformation osseuse de nature métaplasique chez le porc. . . . . [24], 619
BOURGUEL (A.). — La ponction lombaire en brousse, dans les secteurs de prophylaxie de la maladie du sommeil, en A. E. F. . . . . [24], 826
BOURGUET (DU). — La fièvre de Malte en Corse. . . . [3], 773
BOURGUIGNON (G.-C.). — De l'importance actuelle de la ponction lombaire dans le dépistage et le traitement de la maladie du sommeil . . . . . [23], 90
BOURRET (G.). — Recherches sur la lèpre . . . . . [1], 56
—. Sur la valeur séméiologique de la formule leucocytaire dans la lèpre. . . . . [2], 22
—. La fièvre méditerranéenne en Afrique Occidentale Française. . . . . [3], 490
—. La toxoplasmose du lapin à Saint-Louis du Sénégal . . . . . [4], 373
—. La désinfection antimoustique au moyen de la quinoléine . . . . . [5], 556
—. La dysenterie à Hué . [6], 678
— et BOURRAGUÉ (N.). — La diffusion de la tuberculose à Saint-Louis (Sénégal). . . . [6], 11
— et EHLERS. — Réaction de Wassermann dans la lèpre . . . . . [2], 320
— et MARCHOUX. — Enquête étiologique dans un foyer de lèpre . . . . . [1], 288
— et —. L'iodure de potassium dans la lèpre . . . . [1], 347
— et —. Essai d'inoculation de la lèpre au chimpanzé . [1], 416
— et MESNIL (F.). — Sur un Trypanosome humain du Sénégal. . . . . [7], 716
—, WITH et EHLERS. — Recherches sur le mode de propagation et les procédés de diagnostic bactériologique de la lèpre . . . . . [4], 239
BOUSSIÈRE (F.). — Note sur un essai de traitement du typhus par l'injection extemporanée de sang de typhique en convalescence . . . . . [9], 673
BOUSSY (R.) et ADVIER (H.). — Note sur deux cas autochtones d'encéphalite léthargique. . . . . [21], 347
BOUTIN (P.), MONTPELLIER (J.) et LACROIX (A.). — Note hématologique concernant les sujets infectés par *Onchocerca volvulus* . . . . . [14], 653
BOUVIER (E.). — Le trachome dans la population rurale infantile du Nord-Annam. [16], 299
—. Résultats d'une mission d'hygiène et de prophylaxie antipalustre dans le secteur d'essai de Thanh-Hoa (Nord-Annam) . . . . . [16], 361
BOUVIER (J.-E.) et DE GOYON (J.). — La lutte antipaludique dans un régiment d'infanterie coloniale en Orient, 1917 . [10], 886
BOYÉ (L.). — La prophylaxie de la trypanosomiase en Afrique Équatoriale. Résultats de la méthode des six injections consécutives d'atoxyl . [20], 55
BOYÉ (R.-P.). — Essais de déparasitage méthodique des porteurs de Nématodes intestinaux . . . . . [24], 41
—. Sur une maladie de la Sarigue en Guyane présentant de grandes analogies avec la lèpre humaine . . . . . [24], 637
—. La papillonite guyanaise. . . . . [25], 1099
BRANDEN (VAN DEN). — Voir VAN DEN BRANDEN.
BRAS DE SA et MELLO (Froilano DE). — La plasmoquination en masse des localités malariennes et ses résultats prophylactiques . . . . . [24], 649
—, — et AZEVEDO (Antonio DE). — Résumé des observations concernant l'action plasmodicide de l'atébrine. . . . . [25], 878
BRAU (P.). — De l'*Anguillula intestinalis* en Cochinchine et de son diagnostic hémotologique . . . . . [6], 262
—. Amibiase intestinale. Diarrhée noire . . . . . [6], 367
—. Traitement de l'amibiase par l'émétique à Saïgon . . [7], 303
—. De l'urobilinurie dans les congestions hépatiques d'origine palustre . . . . [7], 596
—. Le paludisme à *Pl. falciparum*. Diagnostic et traitement. . . . . [15], 834
—. Récentes manifestations de fièvre jaune en Afrique Occidentale Française. . . [19], 237
—. Exposé de la nosologie de l'Afrique Occidentale Française . . . . . [19], 380
—. Récentes manifestations de fièvre jaune en Afrique Occidentale Française (*suite*) [19], 645
— et BILLIEMAZ (A.). — Inconvénients que peut présenter le traitement quinique appliqué avec trop de rigueur. . [11], 80
— et BRUYANT (L.). — *Gastro-*

discus hominis en Cochinchine . . . . . [4], 488
— et —. Quelques notes sur les Helminthes du porc en Cochinchine. . . . . [6], 41
— et MARQUE (J.-M.). — Paludisme à *Plasmodium falciparum* et novarsénobenzol. [13], 172
— et NOGUE. — Hémorragies intestinales et hématémèses, symptômes d'hépatite suppurée . . . . . [11], 800
BRAULT (J.). — Présentation de notes diverses sur la Pathologie tropicale . [1], 318, 383, 593
—. Un cas de rhinosclérome observé à Alger . . . [2], 66
—. Diverses publications . [3], 59
—. L'épithélioma chez les indigènes Arabes et Kabyles en Algérie . . . . . [6], 133
—. Note sur la pellagre en Algérie . . . . . [6], 198
—. Note sur une forme d'adénites subaiguës de l'aine, rencontrée en Algérie . . [6], 201
—. Note sur les cultures de *Madurella mycetomi* . . [6], 407
—. Deux cas d'épithélioma de la lèvre inférieure chez des femmes indigènes en Algérie . . . . . [6], 714
—. Note à propos de l'énantiothamnose. . . . . [7], 90
—. Note au sujet des nodosités juxta-articulaires chez les indigènes . . . . . [9], 341
— et ARGAUD (R.). — Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique et de la pathologie comparée de l'Aïnhum . . . . . [7], 371
— et MONTPELLIER (J.). — Mélanodermie physiologique des muqueuses en Algérie . [7], 216
— et —. Présence de Spirilles de la fièvre récurrente nord-africaine dans quelques liquides et excréta de l'économie. . . . . [7], 472
— et —. Essai de traitement de la fièvre récurrente nord-africaine par injections intramusculaires d'olarsol. . [7], 473
— et VIGUIER (A.). — Les champignons des teignes à Alger. . . . . [7], 554
BRÉAUDAT (L.). — Origine alimentaire et traitement du Béribéri. . . . . [3], 13, 65, 123
—. Béribéri (Discussion) . [3], 130
—. Origine alimentaire du Béribéri (*suite*) . . . . . [3], 347
—. Sur les urines et le sang des béribériques. . . . . [3], 620
—. Béribéri (Discussion) . [3], 749
—. Rôle protecteur du son de paddy dans l'alimentation par le riz blanc . . . . . [4], 498
— et DENIER. — Du son de paddy dans le traitement préventif et curatif du Béribéri . . [3], 624
BREESON (P.). — Étude de l'infection tuberculeuse dans la population indigène de Ouargla (Oasis sahariennes) par les cuti-réactions tuberculiniques . . . . . [12], 589
BRÉGEAT, SERGENT (Ed. et Et.), NÈGRE (L.) et VIVIEN. — Notes bactériologiques relevées pendant l'épidémie cholérique en 1911 en Oranie. . . . [5], 790
BRÉMONT (E.). — La syphilis à la Guyane française . . [11], 784
— et LEGER (M.). — La filariose de Bancroft à la Guyane française dans ses rapports avec les manifestations lymphatexiques . . . . . [10], 896
BRIDRÉ (J.). — Ostéopathie chevaline . . . . . [5], 697
—. Lésions dans la morve et dans la lymphangite épizootique . . . . . [5], 774
—. Sur le traitement des blastomycoses (Discussion). . [9], 73
—. Dermite ulcéreuse des Équidés (Discussion). . . . [9], 678
—. Sur l'agalaxie contagieuse en Algérie (Discussion) . . [10], 677
—. Pyovaccin (Discussion) [11], 17
— et BOQUET (A.). — L'importation en France des moutons algériens et la protection des troupeaux métropolitains contre la clavelée . . . . [7], 306
— et NÈGRE (L.). — Un cas de lymphangite épizootique chez l'homme. Traitement et guérison par le 606 . . . . [4], 384
—, NÈGRE (J.) et TROUETTE (G.). — Essai de traitement de la lymphangite épizootique par le 606 . . . . . [4], 380
BRIMONT (E.). — Pseudo-calculs intestinaux d'origine végétale. . . . . [1], 35
—. Ankylostomiase en Guyane française . . . . . [2], 413
—. Parasites intestinaux (Helminthes et Protozoaires) en Guyane française . . . [2], 423
—. Sur un cas d'orchite paludéenne. . . . . [2], 374
— et CELLIER (M.). — Sur un cas d'ankylostomiase maligne avec autopsie . . . . [2], 418
— et MESNIL. — Sur l'action de l'émétique dans les trypanosomiases. . . . . [1], 44
— et —. Essais de prévention contre les infections à *Trypanosoma gambiense* . . [1], 210
— et —. Sur la valeur curative

de l'émétique dans les diverses trypanosomiases . . . [1], 212
— et Weinberg (M.). — Lésions de l'intestin produites par un Gnasthostome . . . . [2], 104
Brochard (V.). — Un cas de diagnostic rétrospectif de la maladie du sommeil . . . [2], 40
—. Recherches sur une Microfilaire humaine des îles Wallis. . . . . [3], 138
—. L'*éléphantiasis arabum* aux îles Wallis et la théorie filarienne . . . . . [3], 401
—. L'éosinophilie dans la filariose et l'éléphantiasis . [3], 609
—. Dix cas d'administration du 606 par la voie buccale. [6], 20
—. Le salvarsan en lavement pour le traitement du Pian. . . . . [6], 308
—. Essai de suppression du « Pian » et des impotences fonctionnelles d'origine syphilitique dans les collectivités indigènes . . . . . [20], 209
— et Noc. — Sur la présence du pigment ocre dans les organes des sujets morts de Béribéri. . . . . [1], 425
Broden (A.) et Rodhain. — Le liquide cérébro-spinal dans la trypanosomiase humaine. . . . . [1], 496
— et —. Traitement de la trypanosomiase humaine par l'atoxyl et l'orpiment (Système Laveran) . . . . . [1], 500
— et —. Traitement de la trypanosomiase humaine par la solution arsenicale de Lœffler. . . . . [1], 504
— et —. Dissociation des *Trypanosoma congolense* et *T. cazalboui* par l'émétique . . [2], 125
— et —. Piroplasmose des bovidés observée au Stanley-pool. . . . . [2], 120
— et —. Action de l'émétique sur le *Trypanosoma angolense s. cazalboui* . . . . . [3]. 233
Broquet (Ch.). —. Procédé de conservation des ganglions pesteux pour le diagnostic. [1], 547
—. Présence de *Microfilaria nocturna* en Cochinchine . [1], 563
—. Contagion de la lèpre (Discussion) . . . . . [3], 414
—. Eaux de Saïgon (Discussion). . . . . [3], 463
—. Culicides de Cochinchine . . . . . [4], 395
—. Le masque dans la peste. Présentation d'un modèle . . . . . [4], 636
—. Hémorragies intestinales dans la dysenterie amibienne (Discussion) . . . . . [1], 809
—. Le Béribéri (Discussion) . . . . . [13], 199
—. Anaphylaxie à la quinine. . . . . [13], 558
—. Guérison du paludisme (Discussion) . . . . . [14], 458
—. Réceptivité du nourrisson à la peste septicémique (Discussion) . . . . . [15], 925
—. La lutte contre la peste à Phnom-Penh (Discussion) . . . . . [16], 674
—. L'azoospermie essentielle congénitale chez les Israélites marocains (Discussion) . [18], 785
—. La vaccination contre la typhoïde et la paratyphoïde avant le départ pour les colonies. . . . . [20], 44
—. Autour du « Mystère » de la fièvre quarte (Discussion). . . . . [24], 283
—. Les affections typhoïdes au Maroc (Discussion) . . [25], 460
—. Essais de désinsectisation durable du sol sablonneux des cases au Sénégal (Discussion). . . . . [25], 541
—. Quelques mots sur un traitement de la filariose *Loa* (Discussion) . . . . . [25], 693
— et Montel (R.). — Un cas de filariose autochtone chez un Annamite de Cochinchine . . . . . [2]. 6
— et Villeneuve. — Contribution à l'étude des maladies des vers à soie . . . . . [3], 766
Brouard (M.), Catanei (A.), Foley (H.) et Le Guillas (L.). — Sur la durée de l'action du stovarsol dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie. . . . . [19], 96
—, —, — et Demimuid (P.). — Parasitisme et réactions morbides dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie. . . . . [18]. 546
—, —, — et Leblanc (L.). — Action du stovarsol dans le paludisme chronique à *Pl. vivax* chez les enfants indigènes en Algérie. . . . . [18], 554
Broudin (L.). — Notes d'épidémiologie animale en Cochinchine . . . . . [16]. 425
—. La *Pasteurella* aviaire de Cochinchine. Son bactériophage. La prophylaxie de la maladie. . . . . [20], 315
—. Sur l'importance du *p*H dans la lyse des *Pasteurellæ* du barbone et du choléra aviaire. . . . . [22], 245
—, Blanchard (M.) et Borel (E.). — Surra du chien. Traitement par Bayer 205. Guérison (?).

Expériences négatives de transmission de l'affection par *Rhipicephalus sanguineus* Latr. . . . . [20], 222
— et LE LOUET (G.). — Anémie pernicieuse progressive des Bovidés de Cochinchine. Note préliminaire . . . . . [16], 575
—, — et ROMARY (A.). — Le traitement du Surra expérimental équin à *T. annamense* par le mélange de sulfarsénol et de 309 . . . . . [21], 849
—, PEYTAVIN, NGUYÊN-VAN-DÈN, KIEU-THIÊN-THÈ et NGUYÊN-TRUNG-TRUYÊN. — Contribution à l'étude du Surra d'Indochine. . . . . [19], 746
BRUG (S.-L.). — Les kystes des Amibes intestinales de l'homme . . . . . [10], 799
—. La coloration des Entamibes intestinales des selles . [12], 71
—. Les altérations des globules rouges, hôtes des parasites du paludisme . . . . . [12], 73
—. Quelques notes sur les Protozoaires, parasites intestinaux de l'homme et des animaux. . . . . [12], 628
—. Un cas grave de clonorchiase traité par l'émétique. Guérison . . . . . [14], 161
—. Quelques observations sur les Protozoaires parasites intestinaux de l'homme et des animaux . . . . . [15], 132
—. *Lophoscelomyia annandalei* var. *djajasanensis* nov. var. (*Diptera, Culicidæ*) . . [19], 804
—. Note sur deux cas d'infection balantidienne traités à la santonine . . . . . [20], 741
— et ROOK (H. DE). — *Bironella gracilis*, Theobald, 1905. [15], 305
BRUMPT (E.). — Globules géants ou « corps en demi-lune » du paludisme ; autres altérations globulaires au cours de cette maladie infectieuse . . [1], 201
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil (Discussion). . [1], 327
—. L'équilibre leucocytaire chez les Noirs atteints de trypanosomiase (Discussion) . . [1], 366
—. La lutte antipaludique en Tunisie (Discussion) . . [1], 327
—. Sur quelques altérations de la rate chez les cobayes infectés de trypanosomes (Discussion) . . . . . [1], 397
—. Existence de la « Fièvre des Tiques » en Abyssinie. Quelques mots de la biologie des *Ornithodorus moubata*, acarien qui détermine cette spirochétose . . . . . [1], 432
—. Infection naturelle de la trompe des Glossines (Discussion) . . . . . [1], 562
—. Transmission du *Spirochæta duttoni* par l'*Ornithodorus savignyi*. Transmission du *Spirochæta duttoni* et du *S. gallinarum* par l'*Ornithodorus moubata*, non transmission des Spirochètes de la fièvre récurrente américaine et algérienne par ce même parasite . [1], 577
—. Passage du *Spirochæta duttoni* dans le sang menstruel. . . . . [1], 579
—. Pratique chirurgicale des Canaques des îles Loyalty (Discussion) . . . . . [1], 588
—. Ankylostomiase au Congo (Discussion) . . . . . [2], 101
—. Dysenterie du singe (Discussion) . . . . . [2], 20
—. Eosinophilie dans la dysenterie amibienne (Discussion) . . . . . [2], 33
—. Inoculation et culture de *Trypanosoma vickersæ*, Brumpt. Culture et essais d'inoculation de *Trypanosoma minanense*. . . . . [2], 395
—. Lèpre (Discussion) . . [2], 174
—. Œsophagostome de l'homme (Discussion) . . . . . [2], 649
—. Pénétration des Spirilles par la peau et les muqueuses intactes (Discussion) . . [2], 243
—. Pseudo-Goundou pianique. . . . . [2], 219
—. Rate palustre (Discussion). . . . . [2], 39
—. Schistosomiases humaines (Discussion) . . . . . [2], 543
—. Sur un nouveau Trypanosome non pathogène du singe. . . . . [2], 267
—. Sur une nouvelle spirochétose des poules du Sénégal produite par *Spirochæta Neveuxi*, n. sp. . . . . [2], 285
—. Bilharziose (Discussion) . . . . . [3], 29
—. *Filaria volvulus* (Discussion). . . . . [3], 93
—. Paludisme (Discussion). . . . . [3], 194
—. Sur quelques particularités morphologiques et physiologiques des Trypanosomes. [3], 366
—. Bilharziose (Discussion) . . . . . [3], 448
—. Précis de parasitologie [3], 585
—. Béribéri et scorbut (Discussion) . . . . . [3], 751
—. La fièvre de Malte en Corse (Discussion) . . . . . [3], 773
—. Rapport au nom de la Commission de Prophylaxie de la Maladie du Sommeil . [4], 8

—. Parasitisme intestinal des Arabes (Discussion) . . [4], 429
—. Note sur les parasites des hématies de la taupe *Grahamella talpæ*, n. g., n. sp. . . . . [4], 514
—. Leishmaniose infantile et puces (Discussion). . . . [5], 98
—. *Schiz. cruzi* à différentes phases de son cycle évolutif [5], 261
—. Le *Trypanosoma cruzi* évolue chez *Conorhinus megistus*, *Cimex lectularius*, *Cimex boueti* et *Ornithodorus moubata*. Cycle évolutif de ce parasite. . . . . [5], 360
—. Pénétration de *Schiz. cruzi* à travers la muqueuse oculaire saine . . . . . [5], 723
—. Colite à *Tetramitus mesnili* (Wenyon, 1910) et colite à *Trichomonas intestinalis* (Leuckhart, 1897). *Blastocystis hominis* n. sp. et formes voisines . . . . . [5], 725
—. Evolution des Trypanosomes chez les puces et les punaises. . . . . [6], 167
—. Immunité partielle à *Tryp. cruzi*. Rôle régulateur des hôtes invertébrés. . . . [6], 172
—. Le caoutchouc ; sa conservation . . . . . [6], 280
—. A propos d'un cas de paludisme congénital . . . [6], 293
—. Un cas de dysenterie amibienne autochtone . . [6], 293
—. Grains rouges (Discussion). . . . . [6], 295
—. A propos d'*Hæmocytozoon brasiliense* de Franchini [6], 377
—. Enantiothamnose (Discussion) . . . . . [7], 91
—. Réduvides de l'Amérique du Nord capables de transmettre le *Tryp. cruzi* . . . . [7], 132
—. Simaroubine (Discussion) . . . . . [7], 151
—. Importance du cannibalisme et de la coprophagie chez les Réduvides hématophages (*Rhodinus*, *Triatoma*) pour la conservation des Trypanosomes pathogènes en dehors de l'hôte vertébré . . . . . [7], 702
—. Le xénodiagnostic. Application au diagnostic de quelques infections parasitaires et en particulier à la trypanosomose de Chagas . . . . . [7], 706
—. Trypanosomes humains (Discussion) . . . . . [7], 722
—. Non-transmission héréditaire de l'immunité trypanosomique (Discussion). . . . . [7], 730
—. Cycle évolutif des Opalines. . . . . [8], 397
—. Frottis colorés de poux avec *Rickettsia Prowazeki*. . [11], 60
—. Au sujet d'un parasite (*Rickettsia Prowazeki*) des poux de l'homme, considéré à tort comme l'agent causal du typhus exanthématique . . . . . [11], 249
—. Transmission de la piroplasmose canine française par le *Dermacentor reticulatus*. Embolies parasitaires dans les capillaires de l'encéphale. . . . . [12], 651
—. Une nouvelle Filaire pathogène parasite de l'homme (*Onchocerca cœcutiens*, n. sp.) . . . . . [12], 464
—. Existence de la spirochétose des Bovidés au Brésil. Transmission de cette affection par la tique *Margaropus australis* (Füller) . . . . . [12], 748
—. Transmission de la piroplasmose canine tunisienne par le *Rhipicephalus sanguineus* . . . . . [12], 757
—. Culture du *Leptomonas* de la puce du chien (Discussion). . . . . [12], 313
—. Inoculation de cultures de *Leishmania tropica* au Gecko (Discussion) . . . . . [12], 321
—. Foyers de paludisme autochtone (Discussion) . . . [12], 607
—. Au sujet des rapports entre l'*Onchocerca volvulus* et la gale filarienne . . . . . [13], 535
—. Les piroplasmes des Bovidés et leurs hôtes vecteurs. [13], 416
—. Xénodiagnostic du paludisme (Discussion) . . . . . [13], 22
—. Bouton d'Orient (Discussion). . . . . [13], 237
—. Gale filarienne (Discussion). . . . . [13], 314
— Influence du bien-être sur la régression du paludisme (Discussion) . . . . . [14], 438
—. Bilharziose mixte . . [14], 552
—. Sur un cas de bilharziose vésicale mixte (Discussion). . . . . [14], 567
—. La bilharziose au Maroc. Répartition du *Bullinus contortus* et du *Planorbis metidjensis*. Étude épidémiologique comparée du foyer tunisien de Gafsa et du foyer marocain de Marrakech . . . . . [13], 632
—. Anophèles de hautes régions de la Corse. Présence d'*A. bifurcatus* et d'*A. plumbeus* H. et S. dans l'île (Discussion). . . . . [18], 657
—. Individualité de l'*Entamœba dispar* . . . . . [19], 399

—. Prémunition et Protozooses sanguines (Discussion) . [19], 537
—. Fièvre jaune (Discussion). . . . . [19], 613
—. Sur les « corps de Balfour » du sang de la poule (Discussion) . . . . . [22], 318
—. Au sujet du mémoire de MM. Ch. Joyeux et J.-G. Baer sur les Cestodes rares de l'homme . . . . . [22], 330
—. Méthode de coloration des plasmides et des protozoaires qui persiste sans changement pendant 25 ans (Discussion) . . . . . [23], 789
—. Syndrome exanthématique au cours d'une épidémie de Dengue (Discussion) . . [25], 13
—. Le typhus exanthématique guatémaltèque doit être identifié au typhus exanthématique américain (Discussion) . [25], 57
—. Présence d'un virus exanthématique sur les rats d'un navire de guerre, au port de Brest. Rats et puces des rats à Brest (Discussion) . . [25], 286
— et GONZALEZ-LUGO. — Présentation d'un Réduvide du Vénézuéla (*Rhodnius prolixus*) chez lequel évolue *Tryp. cruzi*. . . . . [6], 382
— et JOYEUX (C.). — Infusoire nouveau, parasite du chimpanzé *Troglodytella abrassarti* n. g., n. sp. . . . . [5], 499
— et LARROUSSE (F.). — Transmission de la piroplasmose canine française par le *Dermacentor venustus* . . [15], 540
— et LAVIER (G.). — Mode d'action du « Bayer 205 » sur divers hématozoaires : Trypanosomes, Piroplasmes, Theiléries, Anaplasmes . . [15], 613
— et PEDROSO (A.). — Recherches épidémiologiques sur la leishmaniose forestière américaine dans l'État de São Paulo (Brésil) . . . . . [6], 732
— et PIRAJA DA SILVA. — Existence de *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909), à Bahia. Biologie de *Conorhinus megistus*. . . . . [5], 22
— et WERBLUNSKI (S.). — Présentation de pièces . . [11], 8
BRUCH (A.) et CONOR (A.). — Une fièvre éruptive observée en Tunisie . . . . . [3], 492
— et —. Un cas de blastomycose humaine observée en Tunisie . . . . . [4], 366
BRUCHAN (N.), BAUVALLET (H.) et AGESSY (G.). — Index épidémique palustre à Porto-Novo (Dahomey) . . . . . [23], 106
BRUN (DE). — Fièvre de Malte. Inefficacité de la quinine à dose ordinaire. Guérison rapide par la quinine à dose massive . . . . . [1], 476
—. Fièvre de Malte simulant un abcès du foie. Guérison rapide par la quinine à haute dose. . . . . [1], 544
—. Étude sur l'infantilisme palustre . . . . . [3], 685
—. Trachome (Discussion) . . . . . [10], 272
BRUN (G.) et BLANC (G.). — Nouveau cas de mycétome à grains noirs observé en Tunisie [12], 741
BRUNET. — Trois moyens simples de préservation contre le typhus. . . . . [16], 101
BRUNI (N.). — Recherches sur quelques phytoparasites de nature protozoaire . . . [18], 251
—. Observations et recherches sur *Trypanosoma lewisi* et *Schizotrypanum cruzi* . [19], 791
BRUYANT (L.) et BRAU. — *Gastrodiscus hominis* en Cochinchine . . . . . [4], 488
— et —. Quelques notes sur les Helminthes du porc en Cochinchine. . . . . [6], 41
— et JOYEUX (Ch.). — Un nouveau rouget des animaux en Guinée française . . . [6], 202
— et VERDUN (P.). — Quelques documents pour servir à l'étude de *Filaria loa* . [5], 506
BUCK (G.), DURIEUX (V.) et POISSON (H.). — Note sur un cas d'intoxication arsenicale chez le cheval . . . . . [25], 381
BÜCK et MOTTET. — Sur quelques cas d'anaplasmose chez des zébus . . . . . [24], 972
BUCK (G.) et POISSON (H.). — A propos d'un cas de tuberculose pulmonaire du chat [24], 861
BUCK (A. DE), SWELLENGREBEL (N.-H.) et SWELLENGREBEL DE GRAAF (J.-M.-H.). — Le paludisme aux Pays-Bas, contracté en automne, ne se manifeste que pendant l'été suivant . . . . . [22], 642
BUEN (E. DE). — Étude expérimentale sur quelques méthodes employées dans la lutte contre les larves d'Anophèles . . . . . [23], 402
BÜLOW (T. VON). — Le contrôle du Pian au Costa-Rica . [21], 667
—. Tuberculose latente réactivée par le passage des larves d'ankylostomes à travers le parenchyme pulmonaire [22], 26
—. Un cas de surinfection dans le Pian. . . . . [28], 869

— et FALLAS (S.). — Le pian au Costa-Rica. . . . . [18], 450
BURNET (Et.) et DURAND (P.). — Place de la fièvre exanthématique (= fièvre boutonneuse) dans le groupe des fièvres indéterminées. . . . . [22], 85
— et LAGOANÈRE (J.-L. DE). — Pouvoir pathogène du *M. melitensis* et du *B. abortus* pour le rat et la souris . . . . [17], 465
— et MASSELOT (F.). — Deuxième cas de Kala-azar chez l'adulte en Tunisie . . . . . [18], 397
— et OLMER (D.). — La maladie de Marseille est-elle un typhus exanthématique bénin ? . [20], 958
BURRON (A.), KERREST (J.) et GAMBIER (A.). — La fièvre récurrente au Soudan . . . [15], 320
BUSSIÈRE (F.). — Paludisme et drainage. Travaux exécutés dans la région d'Eksissus (Macédoine occidentale) . . [11], 517
BUSSIÈRE (A.) et NATTAN-LARRIER (L.). — Examen microbiologique de dix cas de Bouton d'Orient (Bouton de Bouchir). . . . . [1], 48
— et —. Essais de traitement du Bouton d'Orient . . . [2], 301
— et —. Répartition des *Leishmania* dans le Bouton d'Orient . . . . . [2], 26

C

CABASSU (H.) et GIRAUD (P.). — La leishmaniose canine dans la région de Marseille . . [25], 1040
CABBAL (J.) et MELLO (F. DE). — Essais de culture du bacille de Hansen. . . . . [19], 771
— et —. Les insectes sont-ils susceptibles de transmettre la lèpre ? . . . . . [19], 774
— et —. Résultats d'injections d'éparséno sur deux malades de lèpre mixte . . . . [19], 779
CABU (F.) et SCHWETZ (J.). — Note préliminaire sur les *Grahamella* et *Bartonella* des rats splénectomisés de Stanleyville (Congo belge) . . . . [23], 464
—, — et BAUMANN (H.). — Note sur la cuti-réaction à la tuberculine chez les jeunes Noirs de l'âge scolaire à Stanleyville (Congo belge) . . . . [23], 279
CADET (G.). — La peste du Sud-Annam. . . . . [10], 41
CAILLE (E.). — Cas de paludisme autochtone rennais à *Plasmodium falciparum* décelé par une injection de néosalvarsan. . . . . [11], 282
CAILLON (Louis) et BLANC (Georges). — Sur une mycose aspergillaire observée en Tunisie. . . . . [17], 343
CAIUS (F.) et PHISALIX (Marie). — Sur la toxicité comparée du sang des serpents . . . . [12], 159
CALBAIRAC. — Essai de vaccinations antiméningococciques sur un contingent annamite [16], 712
CALINESCU (J.) et MESINCESCU. — Spirillose des poules et *Argas persicus* en Roumanie . [2], 292
CALLENS (J.). — Traitement de la lèpre par injection d'une lépro-line . . . . . [23], 909
CALMETTE (A.). — Sur quelques animaux destructeurs des serpents venimeux. . . . [14], 3
—. Conférence sur l'utilisation des singes en médecine expérimentale. Le laboratoire Pasteur à Kindia (Guinée française). . . . . [17], 10
— et MASSOL. — Etude comparée des propriétés antitoxiques préventives et thérapeutiques d'un sérum antivenimeux au cours des saignées successives . . . . . [1], 90
CALO (E.) et CONOR (A.). — Troisième cas de Kala-azar algérien . . . . . [7], 42
CAMBILLET. — Un cas de Bouton d'Orient à Flatters (Alger). . . . . [2], 388
CAMAIL. — Règlement concernant la vente de la quinine du Gouvernement dans les bureaux de poste de l'Inde anglaise. [1], 531
CAMARA (Pedro DE LA) et MORALEDA (Carmen). — Observations de trente et un cas de paludisme traités par le quiniostovarsol. . . . . [24], 335
CAMINOPETROS (Jean) et BLANC (Georges). — Le cysticercoïde d'*Hemidactylus turcicus*, Lin. . . . . [14], 20
— et —. La *Tick paralysis* observée sur les moutons de la région de Sitia (Crète) . . [17], 378
— et —. Quelques mots sur le mode de conservation des *Stegomyia* en cage . . . [22], 440
—, — et JOANNIDÈS (G.). — Chronique de l'actinomycose en Grèce . . . . . [21], 432
—, — et MANOUSSAKIS (E.). — Quelques recherches expérimentales sur la Dengue . . . . . [21], 525
CAMPUS (A.) et FINZI (G.). — Anaplasmosi sul significato dei « corpi endoglobulari », « punti marginali », « anaplasmi », trovati nelle sangue degli oviri della Sardegna e del Piemonte. . . . . [10], 143

Cantacuzène (J.). — Rôle du pou dans le typhus exanthématique et temps d'incubation de la maladie . . . . . [12], 364
—. L'épidémie de typhus exanthématique en Roumanie pendant la dernière guerre. [13], 269
—, Ciuca (M.), Galacesco et Gérard (F.). — Essais de sérothérapie anti-exanthématique. . . . . [12], 367
Cardamatis (J.-P.). — Leishmanioses en Grèce (Bouton d'Orient) . . . . . [2], 257
—. Observations sur les microfilaires, trypanosomes et hémocytozoaires chez les oiseaux en Grèce . . . . . [2], 268
—. Observations microscopiques sur un Bouton d'Orient non ulcéré . . . . . [2], 391
—. Quelques mots sur l'étiologie et la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Devons-nous la traiter par la quinine ? . . . . . [3], 104
—. Leishmaniose canine . [4], 178
—. Traitement de 115 cas d'hémoglobinurie chez les paludéens . . . . . [4], 303
—. Piroplasmoses des bovidés en Grèce . . . . . [5], 87
—. Leishmaniose du chien en Grèce . . . . . [8], 88
— Quelques remarques sur l'infection des oiseaux par l'*Halteridium* de Danilewsky . [5], 171
—. Formes pigmentées de *Leucocytozoon* . . . . . [5], 333
—. Le Kala-azar est en Grèce une maladie sporadique. Mégalosplénies de cause inconnue. . . . . [5], 489
—. Les hémoglobinuries chez les paludiques, comme celles occasionnées par la consommation des fèves fraîches, peuvent-elles être des phénomènes d'anaphylaxie ? . . . . . [5], 521
—. Traité des fièvres palustres (en grec). Présentation . [7], 89
—. Rapport sur la lutte contre le choléra en Macédoine pendant la guerre gréco-bulgare. . . . . [7], 447
—. Hémoglobinurie et anaphylaxie quinique (Discussion) . . . . . [7], 549
—. Mode d'action de la quinine sur les diverses formes d'hématozoaires ; traitement prophylactique et curatif le plus efficace du paludisme . [11], 648
—. Les mégalosplénies de cause inconnue. Mégalosplénies infectieuses. . . . . [14], 168
—. La Dengue en Grèce . [22], 272
—. Méthode de coloration des plasmodes et des Protozoaires qui persiste sans changement pendant 25 ans . . . [23], 787
—. Les espèces de moustiques en Grèce et tout particulièrement à Athènes . . . . . [24], 122
—. Étude préliminaire sur les Phlébotomes en Grèce . [24], 287
— et Melissidis (A.). — Deux cas de Bouton d'Orient dont le premier très rare. Antagonisme probable du Kala-azar et du Bouton d'Orient . . . [4], 454
— et —. Rôle probable de la mouche domestique dans la transmission des *Leishmania* . . . . . [4], 459
— et —. Traitement du Bouton d'Orient . . . . . [4], 667
— et Photinos (Socrate). — Trypanosomes dans le sang des bovidés en Grèce . . . [4], 377
Carini (A.). — Reproduction expérimentale de la toxoplasmose du lapin . . . . [2], 465
—. Sur une hémogrégarine du *Leptodactylus pentadactylus* Laut. . . . . [2], 469
—. Sur une hémogrégarine du *Caïman latirostris* . . [2], 471
—. Sur la morphologie du *Toxoplasma caniculi*. . . . [2], 524
—. A propos d'une épidémie très bénigne de variole . . [4], 38
—. Présence de Trypanosomes chez les bovidés de São-Paulo. . . . . [4], 191
—. Leishmaniose de la muqueuse rhino-bucco-pharyngée . [4], 289
—. Infection spontanée du pigeon et du chien due au *Toxoplasma cuniculi* (avec *erratum*, p. 724) . . . . . [4], 518
—. Phagédénisme cutané amibien . . . . . [5], 216
—. Un autre cas de phagédénisme cutané amibien . [5], 799
—. Alastrim et variole . [6], 549
—. L'émétique dans le traitement de la leishmaniose cutanée et muqueuse . . . [7], 277
—. Corps de Graham-Smith dans les hématies du *Mus decumanus* . . . . . [8], 103
—. Sur un cas de blastomycose péritonéale à *Coccidioïdes immitis* . . . . . [8], 712
—. *Onyxis ulcereus* phagédénique . . . . . [8], 715
—. Sur un *Leucocytozoon* d'une chouette du Brésil. . . [13], 506
—. Un cas de spirochétose bronchiale au Brésil . . . [13], 500
—. Abcès de la région ombilicale dû à la pénétration à travers l'ombilic des semences de capin (*Melinis minutiflora*). . . . . [15], 215

—. Sur la dermatite verruqueuse . . . . . [17], 227
— et Botelho (C.). — Sur quelques Trypanosomes d'oiseaux du Brésil . . . . . [7], 395
— et Maciel (J.). — La pseudo-rage au Brésil . . . . [5], 576
— et —. Toxoplasmose naturelle du chien . . . . . [6], 681
— et —. Infections de toxoplasmose et de paralysie bulbaire infectieuses par les muqueuses saines . . . . . [7], 112
— et —. Existence de la maladie de Chagas dans l'Etat de São Paulo . . . . . [7], 289
— et —. Distribution des Triatomes dans l'Etat de São Paulo . . . . . [7], 292
— et —. Sur une Hémogrégarine et un Trypanosome d'un Muridé (*Akodon fuliginosus*). . . . . [8], 165
— et —. Quelques hémoparasites du Brésil . . . . . [9], 247
— et Migliano (L.). — Sur un Toxoplasme du cobaye (*Toxoplasma caviæ*, n. sp.) . [9], 435
— et Paranhos (U.). — Identification de l' « Ulcera de Bauru » avec le Bouton d'Orient . . . . . [2], 255
— et Rudolph (Max.). — Hématozoaires de lézards au Brésil. . . . . [5], 592
Caro. — Au sujet de deux cas d'œdème de Calabar . . [20], 977
Caronia (J.). — De la ponction de la rate et de la moelle osseuse . . . . . [15], 722
Caronia (G.) et di Cristina (G.). — Sulla terapia della Leishmaniosi interna. . . . . [8]. 63
Carougeau. — Trypanosomiase bovine à la Guadeloupe. [22], 246
— et Fontoynont (M.). — Abcès sous-dermique et gommes ulcérées produits par *Sporotrichum carougeaui* Langeron, 1919, associé à la tuberculose chez un enfant malgache . . . [15], 444
— et —. Étude sur le Hodipotsy, dermatomycose malgache . . . . . [15], 424
Carpentier (G.). — Note au sujet d'une affection humaine signalée à Firouzkouh (Perse) [22], 677
—. Observation d'une épizootie de trypanosomiase dans le Sud de la Perse . . . . . [24],
Carral (G.) et Chainet (P.). — Sur trois cas de bronchite sanglante de Castellani, forme nigüe, observée chez des Européens et traités avec succès par l'acétylarsan. . . . . [23], 296
Carretier et Andriantavy. — Note sur de nombreux cas d'exanthèmes, à forme d'alastrim, observés dans la région de Tuléar. . . . . [23], 346
Carrosse (J.). — A propos de l'observation de Dimitracof, *Foyers européens de bilharziose vésicale*. Enquête en Provence. . . . . [23], 731
Cartron (A.). — Note sur une épidémie de Dengue à Saint-Louis (Sénégal) en 1926. [22], 228
Casaux et Houdemer. — Note préliminaire sur les Sparganoses humaines et animales au Tonkin . . . . . [19], 802
Castel et Lafont. — Cas de peste traités par le sérum antipesteux . . . . . [2], 195
Castellani (Aldo). — L'étiologie du Tokelau . . . . . [16], 111
—. Le traitement mixte quinine-phosphore-tartre émétique dans quelques formes rebelles de malaria . . . . . [10], 287
— et Chalmers. — Manuel de médecine tropicale . . [3], 288
—, Spagnuolo (V.) et Russo (C.). — Quelques observations sur le *Spirobacillus zeylanicus* Cast. . . . . [11], 271
Castex (M. R.) et Greenway (D.-J.). — Le rôle pathogène de *Blastocystis hominis*. [18], 132
— et —. Le rôle pathogène de *Chilomastix mesnili* . . [18], 137
— et —. Les Protozoaires dans l'intoxication intestinale [18], 177
Catanei (A.). — Morphologie des *Plasmodium* dans un accès mortel de paludisme . [15], 104
—. Infections à Spirochètes, de longue durée, sans symptômes apparents chez des enfants indigènes algériens . . . [16], 392
—. Étude expérimentale de l'association de la spirochétose et du paludisme des oiseaux (Note préliminaire) . . [17], 535
—. Étude des teignes dans le Sud-Oranais (Algérie) . [21], 729
—. Les teignes du cuir chevelu chez les indigènes des environs d'Alger . . . . . [22], 60
—. Observations statistiques et parasitologiques sur les teignes chez les indigènes du Sud Constantinois (Algérie) . . . . . [22], 299
—. Étude des teignes dans la Grande Kabylie. . . . [23], 170
—. Étude des teignes dans les agglomérations européennes d'Algérie . . . . . [23], 363
—. Recherches sur les teignes dans la région d'Oran (Algérie). Deuxième observation

algérienne de microsporie due à *M. audouini* . . . . [24], 177
—. Étude d'une teigne du mouton produite par une espèce nouvelle de *Trichophyton*, *Tr. pruinosum*, n. sp. . . [24], 296
— et Sergent (Et.). — Sur l'action de la quinine, de la cinchonidine et de la cinchonine données à de faibles doses quotidiennes aux indigènes paludéens en Algérie. . [19], 185
— et —. Influence de la température extérieure sur l'évolution du *Plasmodium relictum* chez l'oiseau. . . . . [25], 416
— et Sergent (Edm. et Et.). — Étude expérimentale comparée des *Plasmodium relictum* et *rouxi* du moineau du Vieux Continent et du *Pl. cathemerum* du moineau du Nouveau Continent. . . . . [24], 327
—, Sergent (Et.) et Foley (H.). — Au sujet de l'élimination de la quinine absorbée sous forme de comprimés dragéifiés . . . . . [16], 21
Cathoire. — Lettre sur le IIe Congrès du Froid . . . . [5], 567
Catouillard (G.) et Gobert (E.). — Enquête sur l'ankylostomose et les affections helminthiques dans le Sud de la Tunisie et plus particulièrement dans le Djerid . . . . [1], 600
Cauchemez (L.). — Fréquence des Amibes iodophiles chez le porc, en France . . . [14], 321
—. Fréquence de la Coccidie du porc (*Eimeria brumpti*, n. sp.), en France. . . . . [14], 645
—. Au sujet du nom spécifique à donner à la Coccidie du porc . . . . . [15], 160
—. Présence d'Amibes non iodophiles chez des porcs français. . . . . [15], 390
Cauvin, Riou et Delpy (L.). — Contribution à l'étude de la rage en A. O. F. Transmission de la rage du chien (Oulou fato) à l'homme et au guépard . . . . . [22], 638
Cazalbou (L.). — Diarrhée cholériforme des Équidés soudanais. . . . . [1], 240
—. Souma et Baléri . . [1], 390
—. Les Stomoxes à Rennes. . . . . [2], 161
—. Notes de pathologie exotique. . . . . [3], 61
— Note sur un nouveau Favus du cheval observé à Madagascar . . . . . [6], 300
—. Au sujet des travaux de MM. L. Nègre et A. Bouet sur le parasite de la lymphangite épizootique du cheval . [8], 89
Cazanove (F.). — Considérations sur les cas de fièvre jaune observés au Sénégal en 1912. . . . . [20], 197
—. *Id.* (*Suite*) . . . . [20], 286
—. Considérations sur la dracunculose et la filariose. . [20], 445
—. Note sur l'assistance des aliénés indigènes au Sénégal et en Afrique Occidentale Française. . . . . [21], 335
—. Note sur l'assistance des aliénés européens en Afrique Occidentale Française . . . [21], 411
—. La fièvre jaune des enfants. . . . . [22], 184
—. Notes épidémiologiques sur l'épidémie de fièvre jaune du Sénégal en 1927 . . . [22], 260
—. Au sujet de la pathologie de la dengue (Discussion). [22], 421
—. Le diagnostic prophylactique et les symptômes de début de la fièvre jaune . . . . [22], 447
—. Dengue et fièvre jaune [23], 155
—. Les cas légers de fièvre jaune . . . . . [23], 161
—. Remarques sur l'interdépendance de la peste chez le rat et chez l'homme (Discussion). . . . . [23], 451
—. Les moustiques à Dakar en 1931 . . . . . [23], 797
—. Les aliénés à Dakar en 1931. . . . . [23], 820
—. L'enfance criminelle indigène . . . . . [25], 826
—, Advier, Fournials et Lambert. — Sur les événements sanitaires du mois écoulé (mars 1932) . . . . . [23], 669
—, — et Gourry. — Événements sanitaires du mois écoulé . . . . . [23], 796
—, Mathis (C.) et Bacqué (M.). — Inoculation de sang et d'urine de jauneux à des cobayes . . . . . [20], 1025
— et Robert (L.). — Empoisonnement par le phosphore et fièvre jaune . . . . . [25], 833
—, — et Long (M.). Événements sanitaires du mois de mai. . . . . [25], 837
Caseneuve (H.-J.). — L'hivernation des moustiques dans la Chine du Nord . . . [3], 155
—. Un cas de lèpre mixte chez un soldat d'infanterie coloniale . . . . . [3], 696
—. Apparition de la fièvre méditerranéenne dans l'Ariège . . . . . [4], 92
—. Les troubles rénaux dans la fièvre méditerranéenne . [4], 94

—. Ostéo-périostite post-mélitococcique . . . . . [6], 668
—. Le paludisme indigène de Lanester près de Lorient [13], 461
—. Les réactions cellulaires sanguines au cours du typhus exanthématique . . . [13], 742
—. L'hémoculture dans la peste bubonique . . . . . [13], 209
— et Defressine (C.). — Le pouvoir hémolytique des vibrions cholériques et paracholériques. . . . . [5], 455
Céard (L.). — Existence du Bouton d'Orient dans le Sahara oranais. . . . . [17], 886
Cèbe (J.). — Contribution à l'étude de l'action curative de quelques composés organiques d'antimoine, employés seuls ou associés au naganol dans le Surra expérimental . . [23], 334
—. Recherches sur l'action préventive du naganol dans le Surra expérimental équin à *Trypanosoma annamense*. . . . . [23], 893
—. Recherches sur les teignes dans quelques agglomérations de la Côte orientale de l'Algérie . . . . . [25], 101
—. Résultats de l'étude des teignes dans quelques agglomérations de la côte occidentale de l'Algérie et d'une nouvelle enquête en Oranie . . . [25], 694
—, Brouard (M.), Foley (H.) et Leblanc (L.). — Action du stovarsol dans le paludisme chronique à *Pl. vivax* chez les enfants indigènes en Algérie. . . . . [18], 646
—, —, — et —. Anophèles des hautes régions de la Corse. Présence d'*A. bifurcatus* L. et d'*A. plumbeus* H. et S. dans l'île . . . . . [18], 655
— et Foley (H.). — L'hémogrégarine de la Vipère à cornes (*Hæmogregarina seurati*, Laveran et Petit, 1911) ; ses formes de multiplication . : . [18], 393
—, —, Brouard (M.) et Demimuid (P.). — Parasitisme et réactions morbides dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie . [18], 546
—, — et Giraud (A.). — L'évolution du paludisme chez les enfants indigènes dans une région progressivement assainie par les mesures antipaludiques . . . . . [21], 886
—, —, Le Guillas (L.) et Brouard (M.). — Sur la durée de l'action du stovarsol dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie . [19], 96
—, —, Parrot (L.) et Sergent (Edm. et Et.). — De l'emploi de la quinine contre le paludisme . . . . . [18], 28
—, Grosdemange (L.) et Legroux (Ch.). — Sur un cas de mycétome du pied observé en Algérie . . . . . [20], 11
—, Gueidon (E.), Sergent (Et.) et Boquet (A.). — Existence de la leishmaniose cutanée chez le chien dans une localité du Tell algérien où le Bouton d'Orient est endémique chez l'homme . . . . . [17], 360
—, Lefranc et Montpellier (J.). — Un nouveau cas d'actinomycose de la face observé à Alger. . . . . [24], 431
—, — et —. Un nouveau cas de sporotrichose observé en Algérie . . . . . [25], 297
— et Legroux (Ch.). — Étude d'un cas d'actinomycose pleuro-pulmonaire observé en Algérie . . . . . [24], 85
— et Montpellier (J.). — Blastomycose de l'avant-bras chez une femme indigène d'Alger . . . . . [19], 586
—, — et Clapier (P.). — Étude d'un mycétome à grains noirs dû à *Glenospora clapieri* Catanei, 1927 . . . . . [20], 502
—, — et Colonieu (L.). — Sur un cas d'actinomycose de la face observé à Alger . [21], 197
— et Parrot (L.). — Sur le virus de la spirochétose aviaire en Algérie et sur la longue durée de sa conservation chez *Argas persicus* . . . . . [19], 419
Cellier (M.) et Brimont (E.). — Sur un cas d'ankylostomiase maligne avec autopsie . . [2], 418
Cernaianu (C.). — Sur la piroplasmose vraie du cheval et son traitement spécifique par une petite dose de trypanobleu. . . . . [23], 18
Certain (B.) et Leger (A.). — Recherches du Spirochète ictérohémorragique chez les rats de Dakar . . . . . [11], 19
— et —. Un cas d'intoxication par l'émétine . . . . [11], 405
Césari. — Brèves considérations sur les procédés de séro-floculation dans les maladies tropicales (Discussion) . . . [23], 34
Chabal (L.). — Conjonctivite infectieuse de Farinaud et fièvre exanthématique méditerranéenne. . . . . [24], 76
Chagas (Carlos). — Nouvelle espèce de trypanosomiase humaine . . . . . [2], 304

—. Prophylaxie du paludisme. . . . . [2], 163
—. Nouvelles espèces de Culicides brésiliens . . . . [2], 163
—. Le cycle de *Schizotrypanum cruzi* chez l'homme et les animaux de laboratoire . . [4], 467
CHAIGNEAU (Y.). — Sur le traitement de la dracunculose par la méthode de Tournier. [20], 395
CHAILLOT (L.) et MILLISCHER (P.). — Le polymorphisme du Streptocoque . . . . . [24], 761
— et SAUNIE (L.). — Observation d'un cas de leishmaniose canine cutanée rappelant le Bouton d'Orient. . . . . [24], 535
CHAINET (P.) et CARRAL (G.). — Sur trois cas de bronchite sanglante de Castellani, forme aiguë, observés chez des Européens et traités avec succès par l'acétylarsan. . . . . [23], 296
CHALMERS (A.-J.) et PEKKOLA (W.). — A Sudanese Dermatitis venerata. . . . . [10], 512
— et —. *Enteromonas hominis* da Fonseca 1915 chez un soldat anglais . . . . . [10], 756
— et CASTELLANI. — Manuel de médecine tropicale. . . [3], 288
CHALON (G.). — Présence d'*Ornithodorus savignyi* (Audouin) à Ouargla (Sahara algérien) . . . . . [16], 741
CHAMBON et JAMOT (E.). — Contribution à l'étude du pouvoir préventif du 205 Bayer-309 Fourneau, contre la maladie du sommeil . . . . . [23], 491
CHAMPAGNE (R.) et SÉVENET (G.). — Troisième cas algérien de distomatose humaine à *Fasciola hepatica*. Bons effets du stovarsol. . . . . [21], 222
CHAMPOUILLON (S.), PARROT (L.), BOSSARD (A.), PASCAL (J.-M.) et FOLEY (H.). — Étude comparative des cuti-réactions à la tuberculine de Koch et à la tuberculine B. C. G. . . [25], 298
CHANTEMESSE. — La fièvre jaune à Saint-Nazaire . . . . [1], 528
—. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dans l'Inde (Discussion) . . . . . [1], 554
—. La fièvre jaune à la Martinique . . . . . [1], 642
—. Lésions typhoïdiques de l'intestin du chimpanzé (Discussion) . . . . . [2], 17
— et RODRIGUEZ. — Un cas de dysenterie amibienne traité par le lavement créosoté . . . [2], 29
CHAPCHEFF (C.). — Les détails de la transmission de la fièvre récurrente européenne par les poux . . . . . [18], 97
CHARRIER (H.). — Au sujet de la bilharziose au Portugal et au Maroc . . . . . [16], 491
—. Le *Stegomyia fasciata* dans la région de Tanger (Maroc). . . . . [17], 570
—. Le paludisme dans la région de Tanger (Maroc). . . [17], 335
—. Les moustiques dans la région de Tanger (Maroc). [17], 570
—. Ixodes de la région de Tanger . . . . . [18], 469
—. Remarques au sujet du paludisme à Tanger durant ces vingt dernières années . [18], 558
— et REMLINGER (P.). — Contribution à l'étude de la protection de Tanger contre le paludisme . . . . . [20], 45
— et —. La Ballote ou Gland doux dans l'alimentation de l'homme au Maroc . . [24], 463
CHASSIGNEUX (André). — A propos de quelques symptômes rabiformes observés chez les chiens à Dakar . . . [17], 325
—. Absence des anses intestinales chez une poule . . [17], 508
— et BÉDIER (E.). — Au sujet de quelques accidents observés à Dakar au cours des passages de virus rabique . . . [17], 511
CHASTEL et PONS (R.). — Essais sur l'action curative du vaccin antituberculeux B. C. G. dans la lèpre . . . . . [19], 520
CHATRIEUX (A.). — A propos de la quinine préventive (Discussion) . . . . . [18], 684
—. Action manifeste du froid dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . [19], 69
CHATTON (E.). — A propos de *Rhynchomonas luciliæ* Patton. Flagellé parasite de la Lucilie sérénissime . . . . . [3], 363
—. Microsporidies considérées comme cause d'erreur dans l'étude du cycle évolutif des Trypanosomides chez les Insectes . . . . . [4], 662
—. Entamibe (*Lœschia sinici*, n. sp.) et Myxomycète (*Dictyosthelium mucoroïdes*) d'un singe . . . . . [5], 180
—. Cycle évolutif des Trypanosomes chez l'hôte Invertébré (Discussion) . . . [5], 365, 367
—. *Tetramitus mesnili* (Discussion) . . . . . [5], 499
—. Le Bouton d'Orient et le faciès rupestre du sol . [7], 30
—. Au sujet des cristalloïdes (chromidium, corps chromatoïdes, bâtonnets ou plages sidérophiles) des kystes d'Entamibes . . . . . [10], 791
—. Réalisation expérimentale

chez le cobaye de l'amibiase intestinale à *Entamœba dysenteriæ* . . . . . [10], 794
—. L'éclosion des kystes et les premiers stades de l'évolution de l'Amibe dysentérique chez le chat. . . . . [10], 834
—. La genèse des stigmates globulaires (taches de Maurer, grains de Schüffner) dans le paludisme. Leurs rapports avec l'amœboïsme hémamibien. Leur faible valeur différentielle (pl. VIII) . . . . . [10], 841
—. Les caractères de l'amibiase intestinale du cobaye à *Entamœba dysenteriæ* : localisation cæcale, absence de dysenterie, importantes réactions hyperplasiques . . . . . [11], 23
—. Mon dernier mot au sujet des enclaves kystiques des Entamibes . . . . . [11], 66
—. Observations sur le ver de Guinée. Preuve expérimentale de l'infection des Cyclops par voie digestive. . . . [11], 338
—. Microfilaire du chat domestique dans le Sud-Tunisien. . . . . [11], 571
—. Sur la culture pure d'un *Leptomonas* de la puce du chien et sur un caractère de ses formes culturales qui les distinguent de celles du Kala-azar de souche humaine ou canine. . . . . [12], 313
—. Nouvelle Filaire pathogène de l'homme (Discussion). . [12], 472
—. A propos du rôle de la membrane péritrophique des Glossines dans l'évolution du Trypanosome du crocodile, *T. grayi* (= *T. kochi*) . . [25], 573
— et Blanc (G.). — Large éclectisme parasitaire de la punaise des lits. Son entretien aux dépens des reptiles . . [11], 382
— et —. Culture du Trypanosome du Gecko chez la punaise des lits . . . . . [11], 387
— et —. Le *Leptomonas* de la Tarente dans une région indemne de Bouton d'Orient. Observations et expériences. . . . . [11], 593
— et —. Inoculations positives de cultures de *Leishmania tropica* aux Geckos . . . [12], 316
— et Lalung-Bonnaire. — Amibe limax, *Valkampfia*, n. g., dans l'intestin, son importance pour l'interprétation des Amibes de culture. . . . . [5], 135
— et Nicolle (C.). — Longue conservation de la virulence pour l'homme de la *Leishmania tropica*, en cultures . . . [7], 700
— et Roubaud (E.). — Sporogonie d'une Hémogrégarine chez une Tsé-tsé. . . . . [6], 226
Chéneveau (R.). — Quelques résultats de vaccinations antipneumococciques à Madagascar . . . . . [21], 364
Chesneau (P.) et Bédier (E.). — Distomatose hépatique à *Opistorchis* au Laos (à Ventiane et Takhek) . . . . . [22], 331
Cheyssial (M.-A.). — Expérimentation de la méthode de d'Hérelle en Guinée française pour la destruction des Acridiens. . . . . [15], 762
Chorine (V.). — Un nouveau traitement du sang en gouttes épaisses pour la recherche des parasites du paludisme . . . . . [25], 561
—. Un cas de paludisme congénital . . . . . [25], 982
— Essais de culture de *Plasmodium falciparum*. Action de l'acide carbonique . . [25], 953
— et Marchoux (E.). — Résistance du bacille de la lèpre du rat aux acides et aux alcalis . . . . . [25], 1025
Chollat-Traquet (M.). — Un cas de tuberculose pulmonaire granulique. . . . . [24], 968
Chryssoulis (A.) et Blanc (G.). — La fréquence du Ténia échinocoque (*Echinococcus granulosus*) chez les chiens d'Athènes et du Pirée. . . . [24], 49
Chuiton (Le). — Voir Le Chuiton (F.).
Cienfugos (J.-M. Alv.). — Voir Alvarez Cienfugos (J.-M.).
Ciuca (A.). — Recherches sur l'influence de la splénectomie totale sur l'évolution de la piroplasmose canine . . [5], 143
—. A propos de l'immunité active du chien vis-à-vis de la piroplasmose canine . . [6], 499
—. Action de quelques substances médicamenteuses sur le pouvoir alexique du sérum . . . . . [7], 626
—. Sur l'action protectrice et immunisante du sérum des animaux trypanosomés traités à l'émétique de potassium. . . . . [7], 670
— et Alexa (I.). — Traitement de la malaria par le stovarsol. . . . . [19], 180
—, Baltéanu (I.) et Baliff (L.). — Contribution à l'étude du traitement abortif de l'infection paludéenne intentionnellement provoquée par inocula-

tion de sang virulent de *Laverania* . . . . . [24], 645
—, Cantacuzène (J.), Galasesco et Gérard (F.). — Essais de sérothérapie anti-exanthématique . . . . . [12], 367
— et Constandache (I.). — Vaccinothérapie au vaccin sensibilisé dans la fièvre typhoïde . . . . . [19], 175
—, Irimesco (G.), Manoliu (E.), Alexa et Constantinesco. — Essais comparatifs sur l'action thérapeutique de la quinine, de la cinchonine et du quinétum dans la malaria . [18], 770
— et Slatineano (A.). — Recherches sur les vibrions isolés dans la récente épidémie de choléra en Roumanie . [5], 265
Clair. — Traitement palliatif du Dr Castellani dans l'éléphantiasis . . . . . [1], 285
—. Béribéri expérimental. Etiologie du Béribéri . . . [13], 191
Clapier (P.). — Les bilharzioses dans la région militaire de la Guinée . . . . . [9], 739
— Notes sur le Pian observé dans la région militaire de la Guinée. . . . . [10], 90
—. Les porteurs de kystes filariens (*Onchocerca volvulus*) et de nodosités juxta-articulaires en pays Toma (Région militaire de la Guinée) . . . . [10], 150
—. Note sur le parasitisme intestinal par les Nématodes dans la zone frontière du Libéria et de la Guinée. . . . . [10], 560
—. Index palustre chez les indigènes de la commune de Bangui (A. E. F.) . . . . [12], 538
—. L'iodosalyl dans la trypanosomiase et dans le Pian [13], 246
—. Ostéite hypertrophique au cours du Pian . . . . [13], 345
—. Contribution à l'étude de la répartition des bilharzioses en Afrique Equatoriale Française. . . . . [13], 804
—. Enquête démographique et état actuel de la trypanosomiase au pays Bangala. [13], 830
—. Constatation de *Trypanosoma gambiense* en grande abondance dans le liquide d'hydrocèle. . . . . [14], 378
—. Contribution à l'étude des résultats thérapeutiques fournis par l'atoxylisation prophylactique dans la trypanosomiase humaine . . . . . [14], 238
—. Evolution et état actuel de la trypanosomiase humaine dans le secteur de prophylaxie n° 11 (Moyen-Congo) . [14], 405
—. Note sur un Flagellé de la famille des *Tetramitidæ*, parasite fréquent des plaies à caractère phagédénique . [14], 208
—. Premiers essais au Gabon de l'acide oxyaminophénylarsinique (sel de soude ou 189), dans la trypanosomiase humaine . . . . . [15], 729
—. Nodosités juxta-articulaires et Tréponèmes . . . . [16], 533
—. *Schistosomum hæmatobium* à Libreville (Gabon). Bilharziose autochtone, bilharziose importée . . . . . [16], 589
— (Rapporteur). — Notice complémentaire sur la prophylaxie de la maladie du sommeil. . . . . [17], 424
— et Beurnier. — Premiers essais du 189 au Gabon (Pian, Syphilis, Ulcères phagédéniques). . . . . [15], 607
— et —. Traitement du Pian par le 189 administré par voie buccale. . . . . [15], 528
— et —. Notes sur quelques méthodes actuelles de traitement du Pian . . . . [17], 94
—, Catanei (A.) et Montpellier (J.). — Etude d'un mycétome à grains noirs dû à *Glenospora clapieri* Catanei, 1927 . [20], 502
— et Georgelin. — Un cas de « Larbisch » chez une Européenne à Libreville (Gabon). . . . . [16], 665
Clarac et Grall. — Traité de pathologie exotique . . . [5], 335
Clarenc. — Lettre accompagnant l'envoi de deux rapports sur le choléra et le paludisme à l'île Maurice . . . . . [6], 380
—. *Molluscum fibrosum*. A propos de la communication de G. Bouffard sur une chéloïde géante . . . . . [11], 712, 813
— et Lafont. — *Fibro-molluscum multiforme* . . . . . [2], 73
Claverie (J.). — Au sujet du charbon bactéridien et de la vaccination par la voie intradermique en Guinée française. . . . . [19], 864
—. Méthode pratique de classification et d'utilisation des viandes ladres, appliquée en Guinée française . . . [21], 99
Clevers (Mlle), Van den Branden (F.) et Morelas (M.). — Essai de traitement de la trypanosomiase humaine et des infections animales à *T. congolense* par le « 2754 » Hœchst (Note préliminaire) . . . . [20], 734
Cloitre (J.). — Volumineux calcul de la vessie chez une femme Hova de 21 ans. [21], 720
—. Tumeur prépubiale due à la

présence de nombreux calculs. . . . . [21], 720
—. Considérations sur l'éléphantiasis des organes génitaux externes et des membres dans la région du Sud et du Sud-Est de Madagascar . . [21], 722
—. Note sur une cause de cécité assez fréquemment observée chez les Malgaches . . [23], 254
—. Note sur la conjonctivite folliculaire dans le Sud de Madagascar . . . . . [23], 255
—. Note sur le goitre chez les indigènes des Hauts-Plateaux de Madagascar et l'énucléation endo-capsulaire. . . . . [23], 342
Cohendy (M.). — Essai de traitement de la dysenterie amibienne par les lavements au sucre . . . . . [5], 846
Colas-Belcour (J.). — Sur les Anophélines en Basse-Normandie . . . . . [18], 659
— et Roubaud (E.). — Étude sur les Ornithodores du groupe *lahorensis* dans l'Afrique du Nord. Description d'*O. delanoëi*, n. sp. . . . . [24], 948
— et —. Observations sur la biologie de l'*Anopheles plumbeus*. Le comportement larvaire . . . . . [25], 763
Collardo (G.). — Note sur le « Jen-Jen » de Fernando Poo. . . . . [24], 672
Collart (A.) et Schwetz (J.). — Notes protozoologiques. Spirochètes sanguicoles chez *Cobus vardoni* et *Gonderia mutans* chez *Cobus ellipsyprimnus* et chez *Ourebia hastata* . [22], 651
Collin (L.). — L'ankylostominose en Nouvelle-Calédonie . [5], 192
—. Petite épidémie de peste en Nouvelle-Calédonie. . . [6], 660
—. Le Pian ou « Tonga » aux îles Loyalty . . . . . [7], 180
—. Vaccine en Nouvelle-Calédonie et aux Loyalty . . [7], 503
—. Hygiène des indigènes des îles de la Loyauté . . [7], 598
—. Aperçus démographiques sur les îles de la Loyauté . [7], 600
—. Notes sur une épidémie de dysenterie dans un cantonnement de la Somme (septembre 1916) . . . . . [10], 442
—. Sur les maladies vénériennes dans la garnison de Tananarive . . . . . [16], 534
Colombier (P.). — Lésions osseuses précoces dans la lèpre constatées par la radiographie. . . . . [7], 2
— et Lagane (L.). — Formule sanguine de lépreux séjournant en France. . . . . [6], 418
Colonieu (L.), Montpellier (J.) et Catanei (A.). — Sur un cas d'actinomycose de la face observé à Alger . . . . [21], 197
Comandon, en collaboration avec Leyaditi (C.) et Metchnikoff (S.). — Mécanisme de la phagocytose des Trypanosomes. Démonstration cinématographique . . . . . [3], 363
Commes (Ch.). — Pneumocoecie à métastases pulmonaires et extra-pulmonaires chez un tirailleur sénégalais. . . [9], 7
—. Nodosités juxta-articulaires. Examen histologique. . . [9], 212
—. Traitement de la pneumonie chez les tirailleurs annamites par les injections intraveineuses d'or colloïdal . . . [9], 274
—. Mélano-sarcome de la choroïde chez une fillette Bambara . . . . . [11], 36
—. Leucocytozoon et Microfilaire d'un rapace diurne (*Astur badius*, var. *sphenurus*). [11], 31
—. *Hæmoproteus* d'oiseaux du Haut-Sénégal et Niger . [11], 443
—. Le Méningo-paludisme . . . . . [11], 694
—. La pyomyosite, pyohémie atténuée avec localisation intramusculaire chez les indigènes de la région de Bamako. [11], 822
—. Dispositif permettant de contrôler automatiquement la production de l'indol dans les milieux de culture . . [11], 868
—. Hémogrégarine et Trypanosome d'un Chélonien (*Cinixis homeana*). . . . . [12], 14
— et Cremer (J.). — Volumineux éléphantiasis de la verge . . . . . [11], 714
— et Denavelle (P.). — L'onchocercose aortique bovine dans le Haut-Sénégal-Niger . [10], 459
—. Les méningites dans la région de Bamako . . . . . [10], 568
—. L'eau du Niger et l'helminthiase intestinale . . . [10], 730
— et Vallandré (H. de). — Myxosarcome du bras chez un Bambara . . . . . [9], 702
— et Violle (R.). — Création du centre vaccinogène de Tombouctou . . . . . [11], 304
Comput (André) et Leger (André). — Nasomyiase à *Chrysomyia dux*, Esch. . . . . [17], 373
Comte et Nicolle (C.). — Origine canine du Kala-azar . . [1], 299
— et —. Sur la présence fréquente d'un pouvoir agglutinant vis-à-vis du *Micrococcus melitensis* dans le sang des malades atteints de typhus

exanthématique. Sa valeur diagnostique. . . . . [3], 214
CONDÉ (Louis). — Note au sujet de l'épidémiologie de la peste au Sénégal . . . . . [17], 718
CONIL (J.). — Considérations sur le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique [22], 739
CONOR (A.). — La bilharziose en Tunisie. . . . . [2], 486
—. Un foyer de bilharziose en Tunisie ; Gafsa et son oasis. . . . . [2], 612
—. Sources thermales et bilharziose en Tunisie . . . [3], 446
—. Quelques particularités biologiques du *miracidium* de *Schistosomum hæmatobium* . [3], 532
—. Bilharziose et 606 . . [4], 45
—. Existence de *Filaria perstans* en Tunisie . . . . . [4], 47
—. La bilharziose intestinale en Tunisie. . . . . [4], 627
—. Action de la lumière et des hypochlorites sur le vibrion cholérique . . . . . [5], 167
—. La dysenterie amibienne en Tunisie. . . . . [6], 316
— Essais de transmission de la bilharziose . . . . . [7], 202
— et BÉNAZET (L.). — Un nouveau foyer de bilharziose en Tunisie. . . . . [4], 684
— et BRUCH (A.). — Une fièvre éruptive observée en Tunisie . . . . . [3], 492
— et —. Un cas de blastomycose humaine observé en Tunisie . . . . . [4], 366
— et CALO (E.). — Troisième cas de Kala-azar algérien . [7], 42
— et HAYAT (A.). — Fièvre boutonneuse de Tunisie . . [3], 379
— et MARCHETTI (C.). — Nouveau cas de blastomycose observé en Tunisie . . . . . [6], 556
— et NICOLLE (Ch.). — Application du 606 au traitement du Kala-azar . . . . . [3], 717
— et —. Quelques expériences pratiquées avec le virus de leishmaniose naturelle du chien. Reproduction de la maladie du singe . . . . [5], 351
CONOR (Marthe) et NICOLLE (Ch.). — La toxoplasmose du Gondi naturelle et expérimentale . . . . . [6], 160
— et —. Difficulté de conservation de la leishmaniose canine par les passages . . . [7], 481
CONOS (B.). — Trois cas de cannibalisme avec psychose consécutive . . . . . [18], 778
CONSEIL (E.). — Cinq cas de peste observés à Tunis . . . [1], 167
—. Recherches sur la peste en Tunisie. . . . . [2], 323
—. A propos de quelques cas de peste observés à Tunis en 1910 . . . . . [4], 213
—. Le cancer en Tunisie . [4], 399
—. Résultats de la prophylaxie du typhus exanthématique à Tunis de 1909 à 1912. . [5], 744
—. Le galyl et le ludyl dans le traitement de la fièvre récurrente . . . . . [7], 101
— et GÉRARD (F.). — Essais de traitement du paludisme par le « Trépol » . . . . [15], 534
— et NICOLLE (Ch.). — Recherches sur la fièvre méditerranéenne entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis . . . [2], 191
— et —. Action du 606 sur le paludisme . . . . . [3], 708
—, — et BLAIZOT (L.). — Du rôle négatif des poux dans la transmission expérimentale de la fièvre des tiques . . [6], 106
—, — et LÉVY. — Application de l'arsénobenzol au traitement du Kala-azar de l'enfant. . . . . [4], 187
— et TRIBONDEAU (J.). — Application du 606 au traitement de la syphilis en pays arabe. . . . . [3], 537
CONSTANDACHE (I.) et CIUCA (M.). — Vaccinothérapie au vaccin sensibilisé dans la fièvre typhoïde . . . . . [19], 175
CORDIER (H.). — Capture en Argonne d'*Anopheles nigripes* Staeger, 1839, espèce nouvelle pour la faune française. [11], 726
CORDIER (E.) et PÉJU (G.). — Paludisme et topographie anophélienne en Argonne à propos d'une épidémie de paludisme autochtone . . . . . [12], 23
CORIN (G.). — Présence de larves de Porocéphales chez *Tragelaphus scriptus* . . . . [7], 502
— et DUBOIS (A.). — Rapport sur une petite épidémie de Béribéri à Bokala (Congo belge). . . . . [7], 402
CORNET et HEUYER. — Un cas de leishmaniose cutanée. . [11], 57
CORNIL et BOTREAU-ROUSSEL. — Considérations anatomiques sur la structure des tumeurs paranasales du Goundou . . [17], 863
CORREIA (F.), MELLO (F. DE), FERNANDES (Mlle M.) et LOBO (M.). — Sur une plasmodie du fourmilier, *Manes pentadactyla* . . . . . [21], 205
CORTESI, LÉVY et NICOLLE (Ch.). — Application de l'arsénobenzol au traitement du Kala-azar de l'enfant . . . . . [4], 187
COT et HOVASSE. — Quelques re-

marques sur les Anophélines de Macédoine . . . . [10], 890
COULOGNER. — Détermination de l'index splénique des enfants en Haute-Volta. . . . [15], 765
COULON (G.) et SAUTET (J.). — Diverses formes de paludisme en Corse. Apparition des gamètes. . . . . [24], 811
COUPUT et MONTEL (R.). — Lésions ostéo-périostiques tertiaires dans le Pian. Aspect radiologique . . . . . [25], 1032
COURREUR (Ch.). — Cachexie osseuse des Équidés. Cachexie vermineuse des Équidés. Cylicostomose. . . . . [9], 600
COUSSE (LE). — Voir LE COUSSE (E.).
COUTEAUD. — Un cas de révivisсence au bout d'un an du virus diphtérique à Madagascar . . . . . [1], 179
—. Une ordonnance chinoise dans un cas de fièvre typhoïde . . . . . [1], 180
—. L'inégalité pupillaire signe possible de l'abcès du foie. . . . . [1], 421
COUTELEN (F.). — Contribution aux essais de culture *in vivo* d'embryons de Filaires. [24], 316
—. Recherche du fer chez l'Amibe dysentérique hématophage. . . . . [21], 369
—. Parasitisme des Thysanoures. . . . . [21], 853
COUTO (M.). — Les injections endoveineuses de bleu de méthylène dans le paludisme. [1], 292
COUVY (L.). — Scorbut et Béribéri à Akjoucht (Mauritanie). . . . . [3], 745
—. Bacilles de Hansen dans les ganglions de personnes apparemment saines . . . [7], 365
—. Un cas de fièvre jaune chez un indigène de la Côte d'Ivoire . . . . . [7], 552
—. Etiologie de la fièvre à Phlébotomes . . . . . [14], 447
—. Le stovarsol dans l'angine de Vincent . . . . . [17], 530
—. Le stovarsol dans l'ulcère phagédénique . . . . [17], 531
—. Un cas de bronchite fétide traitée par le stovarsol. [17], 533
—. Note sur le traitement de la dysenterie amibienne par le stovarsol . . . . . [17], 555
—. Note sur un essai de prophylaxie antipaludique à Madagascar . . . . . [18], 36
—. Essais récents de vaccination et de sérothérapie (Discussion). . . . . [19], 637
—. Contribution à l'étude du tétanos ombilical (Discussion). . . . . [19], 657
—. Note au sujet de l'agrandissement du port de Dakar. . . . . [19], 637
—. Au sujet de la récente épidémie de dengue à Dakar. Note sur un cas de spirochétose humaine (Discussion) . . [19], 862
—. Prophylaxie de la tuberculose à Dakar . . . . . [20], 138
—. La tuberculose à Dakar. . . . . [20], 228
—. A propos de fièvre jaune . . . . . [20], 295
— Au sujet de la tuberculose à Dakar . . . . . [20], 450
—. Sur la tuberculose à Dakar. . . . . [23], 664
—. Note sur un principe lytique pour le bacille de Yersin, isolé de selles de convalescents de peste . . . . . [23], 943
—. Urotropine et perméabilité méningée. Applications thérapeutiques. . . . . [24], 587
— et MARCHOUX (E.). — Argas et Spirilles . . . . . [5], 63
— et —. Argas et Spirochètes. . . . . [5], 796
— et POPOFF (S.). — Note sur le traitement de la pneumonie par le salicylate de soude en injections intraveineuses [22], 607
— et —. Essais de traitement de la peste par le bactériophage. . . . . [23], 618
CRASTE. — Un cas autochtone de paludisme à *Plasmodium vivax* . . . . . [23], 726
CREMER (J.) et COMMES (Ch.). — Volumineux éléphantiasis de la verge . . . . . [11], 714
CRESPIN (J.) et ATHIAS (G.). — Le paludisme à Alger. Difficultés de diagnostic avec la fièvre typhoïde. Cas de *Pl. falciparum*. . . . . [12], 804
— et BÉGUET (M.). — La courbe de l'hémolyse dans le paludisme . . . . . [5], 801
CRISNA SUCTANCAR et FROILANO DE MELLO. — Morphologie et cycle évolutif d'un *Herpetomonas* de l'intestin d'*Hemidactylus brookei* Grat. . . . . [15], 795
CRISTINA (G. DI) et CARONIA (G.). — Sulla terapia della Leishmaniosi interna. . . . . [8], 63
CROVERI (Paolo). — Esperimenti di vacciniozi contro la peste bovina con il metodo siero-infezzione di Schein . . [12], 487
— Primo constatazioni di peste equina in Somalia . . [12], 485
—. Sulla recettivita alla vaccinazzione antipestosa dei vitelli nati da mare immune verso la

pesta bovina. Esperimenti di sierovaccinazzione antipestosa (metode Kolle e Turner) in vitelli lattanti e doppo la slattamento . . . . . [12], 65
—. A propos de la vaccination contre la peste bovine par le procédé de Schein. . . [14], 9
— et Salvestroni. — Rogna demodettica nel cavallo . [12], 388
Crowell (P.-C.) et Strong (R.-P.). — The etiology of beri-beri. . . . . [6], 195
Crozat (P.) et Assali (J.). — Traitement de l'ulcère phagédénique par le lipo-vaccin antiphagédénique. . . . . [23], 995
Cruz (O.). — Une nouvelle espèce du genre *Psorophora* . [2], 162
—. Un nouveau genre de la famille *Anophelinæ* . . . [2], 162
—. Peste. . . . . [2], 162
Cruz (L.-J.-C. da) et Mello (Froilano de). — Résultats du traitement expérimental de divers états d'amibiase intestinale par le *Yatren purissimum*. . . . . [21], 842
Curasson (G.). — Au sujet du traitement de la lymphangite épizootique . . . . . [13], 640
—. Essai de traitement de la microfilariose du Charognard . . . . . [13], 654
—. Sur l'infection du cheval et du mulet par le *Trypanosoma dimorphon* . . . . . [13], 241
—. Introduction de la *Blue Tongue* en Afrique Occidentale Française. . . . . [18], 215
—. Sur la toxicité du chinosol employé comme agent conservateur dans les sérums thérapeutiques. . . . . [18], 221
—. Réactions à la trypanoléine de van Saceghem et formolgélification dans la trypanosomiase à *T. pecaudi* . . [18], 352
—. La tuberculose bovine à l'abattoir de Bamako . [18], 687
—. *Ctenocephalus canis*, parasite du mouton . . . . . [18], 755
—. *Trypanosoma theileri* au Soudan français. . . . . [18], 823
—. Sur le mode de développement et sur quelques hôtes nouveaux des Porocéphales. . . . . [22], 255
—. Lès piroplasmoses au Soudan . . . . . [22], 319
—. De quelques animaux d'expérience « de remplacement » dans les laboratoires coloniaux . . . . . [24], 502
— et Andrejewsky (P.). — Sur les « corps de Balfour » du sang de la poule . . . [22], 316
— et Didier (L.). — Sur le rôle des sangsues dans la transmission de la peste bovine. [25], 44
— et —. Sur la persistance de l'ultra-virus pestique dans les viandes salées . . . . [25], 287
— et Dischamps (A.). — Au sujet de l'unicité de la rage en Afrique Occidentale Française . . . . . [24], 154
— et —. Essais de traitement et de prévention des infections à *Trypanosoma cazalboui* et à *Tryp. brucei* chez le mouton et chez la chèvre par le mélange sulfarsénol-naganol . . [24], 667
— et Noc (F.). — Contribution à l'étude de l'évolution biologique de *Porocephalus armillatus* Wyman . . . . . [13], 656
Cusset (J.) et Assali (J.). — Un cas d'appendicite chez le Noir. . . . . [23], 996

D

Dabbadie (P.). — Transmission expérimentale de la rage canine en Haute-Volta à partir du virus d'un chien « fou » de race indigène . . . [23], 837
Dalle (M.) et Joyeux (Ch.). — Notes sur l'état sanitaire dans un camp de prisonniers en Allemagne . . . . . [8], 547
Damany (P.), Guay (J.), Doré (G.) et Le Chuiton (F.). — Sur 5 cas de typhus bénin exanthématique observés sur le croiseur *Strasbourg* revenant d'une campagne au Pôle Nord. [22], 303
Da Matta (A.). — Voir Matta (A. da).
Danel (L.). — Boutons d'Orient multiples. . . . . [17], 562
Danet et Beurnier. — Note sur le traitement du Pian par les sels de bismuth . . . . . [17], 502
Dang-Huu-Chi et Dorolle (P.). — Coma palustre et grossesse. Présence de *Pl. præcox* dans le sang du cordon . . . [20], 589
— et —. Rupture spontanée de la rate au cours d'une fièvre rémittente à *Plasmodium præcox* . . . . . [20], 719
Dang-Teh-Trinh et Monnier (H.). — Note sur un Infusoire parasite et pathogène . . [23], 1049
Dang van Cuong, Tran van An et Montel (L.-R.) (de Saïgon). — Adénopathies iliaques primitives chez des Annamites de Cochinchine. Guérison par le chlorhydrate d'émétine. [17], 67
—, — et —. Tension artérielle et viscosité sanguine dans le palu-

disme chez les Annamites de Cochinchine . . . . . [17], 799
—, — et —. Tension artérielle et viscosité sanguine dans le Béribéri chez les Annamites de Cochinchine . . . . . [18], 475
— et MONTEL (R.). — Action de la quinine sur les corps en croissant . . . . . [11], 690
— et —. Paludisme et phagédénisme. Paludisme et arrêts de développement. « Infantilisme palustre ». . . . . [11], 690
D'ANFREVILLE. — Voir ANFREVILLE (D').
DANIEL (Gaston). — Inspections médicales dans l'Ituri (Congo belge) . . . . . [12], 394
—. Traitement de l'hématurie par le bleu de méthylène. . . . . [14], 80
— et ABETTI (A.). — Méningite cérébro-spinale au Congo belge . . . . . [11], 779
DANTEC (LE). — Voir LE DANTEC.
DANYSZ (J.). — Traitement du Surra par les composés arsenicaux et arséno-argentiques. Rapports entre les doses tolérées et les doses curatives. . . . . [7], 200
DARLING (S.-T.). — Equine trypanosomiasis in the Canal zone. . . . . [3], 381
—. Sarcosporidiosis in the opossum and its experimental production in the Guinea pig. (avec résumé français) . [3], 513
—. Les vers intestinaux de 300 aliénés recherchés par des méthodes spéciales (en anglais avec résumé français) . [4], 334
—. Some blood parasites (*Hæmoproteus* and *Hæmogregarina*). . . . . [5], 71
—. A note on the presence of *Linguatula serrata* in man in Central America . . . [5], 118
—. Reduction of virulence in a strain of *T. hippicum* selected from a guinea pig. (avec résumé français). . . . . [5], 184
—. The rectal inoculation of Kittens as an aid in determining the identity of pathogenic entamœbæ . . . . . [6], 149
DARRÉ (H.). — Sur un cas d'anémie ankylostomiasique avec fragilité globulaire et ictère hémolytique. . . . . [2], 97
— et GÉRY (L.). — Étude anatomo-pathologique des érythèmes trypanosomiasiques [3], 728
— et MARTIN (Louis). — Sur les symptômes nerveux du début de la maladie du sommeil. . . . . [1], 15
— et —. Trypanosomiase chez les Blancs. Traitement par l'atoxyl. Forme cérébrale de la maladie. Malades insensibles à l'atoxyl. Association de l'atoxyl et de l'émétique . . . [1], 569
— et —. Résultats éloignés du traitement dans la trypanosomiase humaine. . . . [3], 333
— et —. Remarques sur l'évolution et le pronostic de la trypanosomiase chez les Blancs. . . . . [3], 389
— et —. Documents sur la trypanosomiase humaine . [7], 711
DARTIGOLLES (R.). — Un cas de myiase nasale en Guinée [15], 416
DARUTY DE GRANDPRÉ. — Plantes médicinales de l'île Maurice et des pays intertropicaux. [5], 571
DAUDE (J.) et LEDENTU (G.). — Contribution à l'étude du produit « 309 » dans la trypanosomiase des bovidés. Action préventive et action curative. . . . . [19], 614
DAUDY (R.). — Étude épidémiologique et prophylactique de la malaria en Albanie . . [18], 320
DAVESNE (J.), URBAIN (A.) et BOURDELLE (E.). — Deux cas de gingivo-stomatite gangréneuse (Noma) due à *B. perfringens* chez le chimpanzé (*Pan chimpanze* Meyer). . . . . [24], 787
DAVID. — Étiologie et prophylaxie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [7], 509
DAWYDOFF (A.-M.), MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Modifications du sang au cours de la coccidiose des animaux . . . . . [19], 427
DEADERICK (W.-H.). — Malaria as a cause of purpura hemorrhagica. . . . . [1], 478
—. Recurrences in malaria, their cause and prevention (avec résumé français) . . . [3], 498
DEBŒUF (Mme) et MOYNE (Mlle). — La tuberculose indigène extra-hospitalière à Dakar, en 1931. . . . . [25], 663
DE BRUN. — Voir BRUN (DE).
DEFRESSINE et BARTET. — Un cas mortel de fièvre ondulante observé à Ajaccio . . . [6], 604
— et CAZENEUVE (H.). — Le pouvoir hémolytique des vibrions cholériques et paracholériques. . . . . [3], 455
DEGREEF (G.). — Symptômes nerveux et persistance des Trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien de mulets atteints de Nagana dû au *Tryp. brucei* var. *ugandæ*. . . . . [12], 17

DEGOUILLON, MONTPELLIER (J.) et LACROIX (A.). — La gale filarienne est-elle bien une manifestation de volvulose ?. [13], 530
—, — et —. Note complémentaire sur la gale filarienne et son évolution . . . . [14], 211
DEGUILLAUME (A.), DONATIEN (A.), PLANTUREUX (E.) et SERGENT (Edm.). — Notes sur les trypanosomiases (1921-1923) . [17], 130
— et SERGENT (Edm.). — Tableau généalogique d'un Trypanosome du dromadaire conservé 4 ans par passages sur cobayes. Augmentation de sa virulence. . . . . [13], 947
DEKESTER (M.). — Observations nouvelles de la lèpre dans la région de Fez (Maroc). Faits précis de contagion. Considérations prophylactiques. [17], 597
— et JEAUME (G.). — Cas multiples d'une blastomycose des voies lacrymales observée chez les ânes dans la région de Fez (Maroc). . . . . [16], 478
— et —. Isolement de l'agent pathogène de la blastomycose des voies lacrymales . . [18], 124
— et MARTIN (J.-M.). — L'éléphantiasis dans la région de Fez (Maroc) . . . . . [16], 494
— et MELNOTTE (P.). — Au sujet de la fréquence dans les selles diarrhéiques au Maroc des *Trichomonas* et autres Protozoaires . . . . . [17], 301
—. Premier cas de leishmaniose cutanée observé chez un indigène au Maroc en dehors des zones sahariennes. . . [17], 565
DELAMARE (G.). — Sur la distribution géographique des spirochétoses respiratoires, d'après quelques travaux récents . . . . . [19], 322
—. La courbe thermique de la récurrente constantinopolitaine de 1920-1921 . . . . . [22], 904
— et ACHITOUV (G.). — Hyperkératose folliculaire ; hypochromie et atrophie épidermique ; infiltration lymphoïde périfolliculaire et péri-vasculaire sans cellules géantes ; pas de bacilles acido-résistants ; Microfilaires . . . . . [18], 529
— et —. Pellagre familiale autochtone . . . . . [19], 78
— et JIMENEZ GAONA (R.). — Lignes rouges et lignes blanches, réactions nulles des lépreux . . . . . [25], 200
— et GATTI (C.). — Granulome péri-anal en plaques . . [22], 148
— et —. Mycétome du pied à grains noirs . . . . . [24], 80
— et —. Fuso-spirochétose et leishmaniose cutanées . [25], 141
—, — et GONZALEZ (D.). — Le Pied végétant du Paraguay (Leishmaniose américaine ulcéro-végétante). . . . [25], 488
— et GIAGNI. — Granulome inguino-scrotal à forme d'ulcère rubané. . . . . [22], 19
— et MOUCHET. — Dermite dyschronique marginée, d'origine filarienne . . . . . [18], 316
— et —. Calcification de la Filaire de Médine (note radiologique) . . . . . [18], 318
— et ROBIN. — Carte du paludisme des confins albano-macédoniens. . . . . [11], 483
— et SAÏD DJÉMIL. — Crises gastriques et vomissements herbacés sans hémoglobinurie (simulation). . . . . [18 . 786
— et —. Pellagre importée [19], 75
DELANOË (Mme E.). — Sur un cas d'Aïnhum chez une femme marocaine. . . . . [17], 482
—. Au sujet des dysenteries à *Trichomonas* (réponse à MM. Dekester et Melnotte). . . . . [17], 557
—. Sur un cas de maladie de Dercum généralisée à tout le corps, sauf face, mains et pieds chez un indigène . . . [18], 246
—. Sur un cas de maladie d'Aïnhum ayant intéressé la jambe droite. . . . . [18], 470
—. Étude sur le trachome au Maroc et son traitement . . . . . [19], 49
—. Essai d'un traitement mixte de la lèpre . . . . . [20], 953
—. Traitement mixte de la lèpre par injection intraveineuse de novarsénobenzol et par injections intramusculaires de vaccin B. C. G. . . . . [22], 898
—. Traitement mixte de la lèpre par les injections intramusculaires de vaccin B. C. G. La parfaite tolérance de cette méthode de traitement. La rétrocession rapide des phénomènes morbides . . . . . [23], 1005
—. Au sujet de l'emploi des arsénobenzènes au cours du traitement de la syphilis indigène. . . . . [24], 369
—. Un cas d'Aïnhum . . [25], 322
—. Eruption verruqueuse aux mains et aux pieds chez une fille musulmane . . . [25], 325
DELANOË (M. et Mme). — A propos de *Schiz. cruzi* . . [5], 599
—. De la rareté de *Pneumocystis carinii* sur les cobayes de Paris. Absence de kystes chez d'autres animaux . . . [7], 271

— et DENIS. — Leishmaniose canine au Maroc . . . [9], 202
— et FIORI (C.). — Au sujet du dimorphisme du Trypanosome de Mazagan . . . . . [9], 130
— et —. Sur un cas de trypanosomiase constaté chez un cheval à Mazagan . . . . [8], 503
— et LABOUNOTTE (X.). — Au sujet de la fièvre ondulante à Mazagan. . . . . [9], 207
DELANOË (P.). — Présence de Trypanosomes chez les bovidés en France. . . . . [4], 112
—. Variations de la virulence de *Tryp. dimorphon*. . [7], 58, 281
—. Existence chez un Saurien *Agama colonorum*, d'une Filaire et d'une Microfilaire sanguines . . . . . [7], 121
—. Le fonctionnement du service de prophylaxie des trypanosomiases animales à Bouaké (Côte d'Ivoire) . . . . . [7], 152
—. Fonctionnement du parc vaccinogène à Bouaké (Côte d'Ivoire) du 10 mars au 31 décembre 1913 . . . . . [7], 246
—. Au sujet des Trypanosomes du type *T. lewisi* Kent rencontrés chez des Muridés dans la région de Bouaké (Côte d'Ivoire) . . . . . [8], 80
—. Les variations du pouvoir infectieux et de la virulence de *Trypanosoma dimorphon* L. et M. . . . . [8], 314
—. Existence de *Phlebotomus papatasii* à Mazagan . . [9], 762
—. De l'existence à Mazagan et dans le Cercle des Doukkala (Maroc O.) de *Tryp. lewisi* Kent et de *Tryp. duttoni* Thiroux . . . . . [10], 436
—. Au sujet de l'existence dans le Cercle des Doukkala (Maroc O.) de la sangsue du cheval, *Limnatis nilotica* . . . [10], 458
—. Contribution à l'étude du pouvoir pathogène du Trypanosome de Mazagan . . . [10], 501
—. Sur les altérations des globules parasités par les Hématozoaires du paludisme . [10], 542
—. Contribution à l'étude du paludisme au Maroc occidental . . . . . [10], 586
—. Un cas d'infection spontanée du chien par *T. marocanum* Sergent, Lhéritier et Belleval, 1913. . . . . [13], 23
—. Existence, dans le Cercle des Doukkala, d'*Euphorbia thymifolia*. . . . . [13], 13
—. Au sujet d'*Hæmogregarina brendæ* Sambon et Seligmann. . . . . [14], 451
—. Au sujet de *Trypanosoma talpæ* Nabarro . . . . . [14], 453
—. De la spirochétose des Gallinacés dans le Cercle des Doukkala . . . . . [14], 316
—. Au sujet d'un piège à puces. . . . . [15], 39
—. De l'utilisation des tonneaux comme cages à animaux de laboratoire . . . . . [15], 420
—. Le mouton piège à puces. . . . . [15], 416
—. Au sujet d'*Ornithodorus marocanus*, Velu, 1919 . . [15], 418
—. De la répulsion exercée par le mouton sur les puces. [16], 96
—. De la spirochétose des oies dans le cercle des Doukkala. . . . . [16], 582
—. De l'infestation des rats de la ville de Mazagan par la puce chique de la poule (*Sarcopsylla gallinacea* W., 1875). . . . . [16], 592
—. Un cas de dysenterie amibienne grave traitée par le stovarsol . . . . . [17], 119
—. De la fréquence des *Trichomonas* dans les selles diarrhéiques du Maroc . . . . [17], 128
—. Les diverses espèces de rate constatées dans le Doukkala et plus particulièrement à Mazagan. De la rate du surmulot. . . . . [17], 584
—. Du nombre des mamelles chez le rat d'Alexandrie, *E. rattus* var. *Alexandrinus* G. . . . . [17], 589
—. Au sujet de la détermination spécifique des puces provenant des indigènes marocains (pour servir de contribution à l'étude de la peste au Maroc) . . . . . [18], 149
—. De la rareté du surmulot à Mazagan . . . . . [18], 152
—. A propos de la puce du porc. Le porc, hôte électif de la puce de l'homme (pour servir de contribution à l'étude de la peste au Maroc) . . . [18], 191
—. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes à Mazagan . [20], 481
—. Au sujet du décès d'un jeune fonctionnaire, causé par une fièvre typhoïde compliquée d'ictère franc . . . . [20], 576
—. Quatrième cas algérien de distomatose humaine à *Fasciola hepatica* L. . . . . [22], 673
—. Une observation d'infection naturelle du chacal due au Spirochète marocain, *Sp. hispanum* var. *marocanum* Nicolle et Anderson 1928, particulièrement longue. . . . . [25], 944
—. L'importance de la puce de

l'homme, *Pulex irritans* L., dans les épidémies de peste au Maroc . . . . . [25], 988
—. Au sujet de la présence chez deux carnassiers du Maroc d'une variété de la puce de l'homme, *Pulex irritans* Linné, var. *fulvus* Ioff, 1929 . [25], 960
— et LELAURIN (A.-P.). — Infestation massive d'un élevage de poulets par la puce chique (*Sarcopsylla gallinacea* W., 1875) . . . . . [16], 593
DELBREIL. — Notes sur le paludisme à Kaolack . . . [16], 272
DELORME (M.). — Transmission expérimentale de *Sarcoptes scabiei* var. *cuniculi* au Cynocéphale (*Papio sphinx*, E. Geoff.) . . . . . [19], 899
—. Association fuso-spirillaire (ulcère phagédénique tropical) chez le chien . . . . [20], 548
—, BLONDIN et WIBERT (R.). — Contribution à l'étude de la rage en A. O. F. . . . [20], 404
— et WILBERT (R.). — « Pastoria », centre de recherches biologiques et d'élevage de singes. . . . . [24], 131
—, TROISIER (P.), DESCHIENS (R.) et LIMOUSIN (H.). — L'infestation du chimpanzé par un Nématode du genre *Hepaticola* . . . . . [21], 221
DELPY (L.). — L'infection charbonneuse et la vaccination intra-cutanée en un temps avec les vaccins pastoriens en Guinée Française . . . . [19], 499
—. Epizootie de Tahaga (*Tryp. soudanense*), sur les chevaux du Niger saharien. . . [22], 662
—, CAUVIN et RIOU. — Contribution à l'étude de la rage en A. O. F. Transmission de la rage du chien (Oulou fato) à l'homme et au guépard. [22], 635
DELRIEU. — Rapport sur la lèpre. . . . . [2], 67
DEMIDOFF (A.-P.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Choléra et dysenterie amibienne. . . . . [8], 416
—, —, SCHOKHOR (N.-I.), KOSELKINE (P.-M.) et WINOGRADOFF (W.-W.). — La Microfilaire des chevaux au Turkestan . [7], 189
DEMIMUID (P.), BROUARD (M.), CATANEI (A.) et FOLEY (H.). — Parasitisme et réactions morbides dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie . . . . . [18], 546
DEMINA (N.-A.) et SCHOURENKOVA (A.-I.). — Sur les relations entre l'*Enteromonas* da Fonseca, 1915 et le *Tricercomonas intestinalis* Wenyon et O'Connor, 1917. . . . . [22], 645
DENARNAUD (P.), SERGENT (Ed.), LHÉRITIER (A.) et BOQUET (H.). — Epizootie de peste porcine avec présence de *Salmonella* à Alger. Transmission expérimentale par virus filtré . . [3], 781
DENAVELLE (P.) et COMMES (Ch.). — L'onchocercose aortique bovine dans le Haut-Sénégal-Niger . . . . . [10], 459
DENIER (A.). — Un cas de dysenterie mixte provenant de Shang-Haï . . . . [5], 468
—. La dysenterie bacillaire à Saïgon. . . . . [8], 720
— et BRÉAUDAT (L.). — Du son de Paddy dans le traitement préventif et curatif du Béribéri . . . . . [3], 624
— et HUET. — La dysenterie à Saïgon. . . . . [5], 263
— et —. La dysenterie à Saïgon. . . . . [6], 413
DENIS et DELANOË (M. et Mme). — Leishmaniose canine au Maroc . . . . . [9], 202
DENTU (R. LE). — Voir LE DENTU (R.).
DEPLANCHE (M.). — Deux années de pratique ophtalmologique en Côte d'Ivoire . . . [24], 406
DERRIEU (G.). — Les dysenteries à Salonique en 1918 . . [13], 111
— et RAYNAUD (M.). — Dysenterie chronique à flagellé nouveau . . . . . [7], 371
— et SOULIÉ (H.). — Parasitisme intestinal des enfants des écoles maternelles d'Algérie. Détermination d'un indice parasitaire. Application de cet indice à la mesure de la pureté des eaux de boisson . . . [9], 793
DERVISCH (P.) et LAIGRET (J.). — Contribution à l'étude des modes de disparition des Trypanosomes des souris sous l'action des divers médicaments actifs : émétique, 189, 205 Bayer [16], 770
DESCAZEAUX (J.). — Sur la présence de Cryptocoques dans le tube digestif d'un cheval lymphangiteux . . . . . [14], 66
—. L'anaplasmose au Chili . . . . . [17], 639
—. Essais de cuti-vaccination anticharbonneuse . . . [17], 765
—. Sur la présence au Chili de l'*Ornithodorus megnini*. [18], 408
—. Spirochétose cutanée du porc . . . . . [19], 86
—. Contribution à l'étude de l' « Entéqué » . . . . [19], 133
—. L'agriculture et l'élevage au Chili . . . . . [19], 168
— et ROUBAUD (E.). — Contribu-

tion à l'étude de la mouche domestique, agent vecteur des habronémoses d'Equidés [14], 471
— et —. Évolution de l'*Habronema muscæ* Carter chez la mouche domestique et de l'*H. microstomum* Schneider chez le Stomoxe (Note préliminaire) . . . . . [15], 372
— et —. Deuxième contribution à l'étude des mouches dans leurs rapports avec l'évolution des Habronèmes d'Equidés . . . . . [15], 978
DESCHIENS (R.). — Action antiparasitaire des sels de bismuth *per. os* et à doses massives dans les infestations à *Giardia* . . . . . [16], 737
—. Sur l'habitat et la répartition des Giardies chez les « porteurs sains » et les « porteurs malades ». . . . [16], 735
—. Variations tinctoriales et morphologiques de *Giardia intestinalis* . . . . . [16], 323
—. Variations tinctoriales et métabolisme de l'amidon chez *Giardia*. . . . . [17], 889
—. Les infections intestinales à flagellés au Maroc. . . [19], 353
—. *Chilomastix* sp. observé chez le Chimpanzé (*Antropopithecus troglodytes*) et chez le Macaque (*Macacus sinicus*) . [19], 794
—. Sur les Protozoaires intestinaux des singes . . . [20], 19
—. Un cas d'amibiase cérébrale (Discussion) . . . . . [21], 239
—. Sur un cas d'hématurie avec présence d'amibes (?) dans les urines (Discussion) . . [22], 162
—. A propos de la Lambliose (Discussion) . . . . . [22], 165
—. Les Entamibes de la bouche (*E. gingivalis*, Gros 1846) peuvent-elles être hématophages ? . . . . . [23], 177
—. Un cas de cystite aiguë amibienne (Discussion) . . [23], 458
—. Essais de déparasitage méthodique des porteurs de Nématodes intestinaux (Discussion) . . . . . [24], 41
—. Indications pratiques sur le transport des formes végétatives d'Amibes dysentériques . . . . . [25], 207
— et GOURVIL (E.). — Les Entamibes de la bouche des singes. . . . . [23], 711
—, LIMOUSIN (H.) et TROISIER (J.). — Éléments présentant les caractères d'un Protozoaire sanguicole observés chez le chimpanzé . . . . . [20], 597
—, —, TROISIER (P.) et DELORME (M.). — L'infestation du chimpanzé par un Nématode du genre *Hepaticola* . . . [24], 221
— et TAILLANDIER (O.). — Présence de larves rhabdoïdes de *Strongyloides stercoralis* (Bavay, 1877) dans le liquide duodénal recueilli par tubage (considérations cliniques sur l'anguillulose) . . . . [18], 525
DESCUNS, LEBON (J.), LEGER (Marcel) et JONCHÈRE. — Le traitement du paludisme aux Thermes d'Encausse. . . . [22], 938
DEVY. — Épidémie de peste de Pnom-Penh en 1910. Prophylaxie par l'emploi de vaccin antipesteux . . . . . [4], 220
DI CRISTINA. — Voir CRISTINA (DI).
DIDEBOULIDZÉ (G.) et MAKHILADZÉ (N.). — L'endémie d'ankylostomiase en Géorgie . . [19], 891
DIDIER (L.). — Traitement du tétanos chez le cheval. Emploi du sulfate d'atropine. . [21], 698
—. A propos d'une fracture du radius chez une gazelle. . . . . [21], 821
— et CURASSON (G.). — Sur le rôle des sangsues dans la transmission de la peste bovine. . . . . [25], 44
— et —. Sur la persistance de l'ultra-virus pestique dans les viandes salées . . . . [25], 287
DISCHAMPS (A.) et CURASSON (G.). — Au sujet de l'unicité de la rage en Afrique Occidentale Française. . . . . [24], 154
— et —. Essais de traitement et de prévention des infections à *Trypanosoma cazalboui* et à *Tryp. brucei* chez le mouton et chez la chèvre par le mélange sulfarsénol-naganol . . [24], 667
DISTASO (A.). — Sur l'étiologie de la Sprue . . . . . [7], 628
DOLLFUS (R.-Ph.). — Sur la présence en France et en Corse du *Bullinus contortus* (Michaud), hôte intermédiaire de *Schistosoma hæmatobius* (Bilharz) . . . . . [15], 549
—. Qu'est-ce que « *Distoma subflavum* Sonsino » ? . . [17], 572
DOMINICI-URBAIN (C.) et LEGER (M.). — Foyer de mélitococcie en Corse . . . . . [5], 657
— et —. Documentations relatives à l'extension de la mélitococcie en Corse . . . [6], 673
DOMINIQUE (H.) et PELTIER (M.). — Note sur l'action du mélange émétique-extrait d'organes dans le traitement de la draconculose . . . . . [17], 846
DONATIEN (A.). — Gale du dromadaire (3e note). Essais de traitement par le guétran (gou-

dron arabe) et par le pétrole sulfo-carboné . . . . [13], 545
— et Espérandieu (G.). — Le « Boukhchem », maladie enzootique des chiens kabyles [13], 811
— et Lestoquard (F.). — Le *Débab* naturel du chien. Transmission par les Stomoxes. . . . . [16], 168
— et —. Transmission expérimentale de *Piroplasma caballi* à l'âne. . . . . [19], 546
— et —. Sur l'emploi du trypanobleu dans le traitement des piroplasmoses des ruminants . . . . . [20], 64
— et —. Présence d'*Aegyptianella pullorum* chez les poules en Algérie . . . . . [24], 371
—, — et Parrot (L.). — Parasitisme anormal dans un cas de leishmaniose du chien. . . . . [22], 252
—, — et —. Bartonelloses et prémunition. . . . . [23], 173
—, — et —. Sur le développement du parasite de la leishmaniose canine viscérale chez *Phlebotomus major* var. *perniciosus* Newstead. . . [23], 724
—, Lhéritier (A.) et Sergent (Ed.). — Des étalons guéris cliniquement de Dourine peuvent rester des porteurs sains de germes pathogènes . . [13], 515
—, — et —. Du diagnostic expérimental de la Dourine . [13], 517
— et Parrot (L.). — Infection naturelle et infection expérimentale de *Phlebotomus papatasi* (Scop.) par le parasite du Bouton d'Orient . . . [19], 694
— et —. Trypanosomiase naturelle du chien au Sahara (Note préliminaire) . . . . . [15], 549
— et —. Un nouveau cas sporadique de Bouton d'Orient sur le littoral algérien . . [15], 410
—, — et Sergent (Edm.). — Une question de terminologie : *Immuniser* et *Prémunir*. . [17], 37
—, —, — et Lestoquard (F.). — Prémunition et Protozoaires sanguicoles . . . . . [19], 532
—, —, — et —. Tiques et piroplasmoses bovines d'Algérie. *Première note* . . . . . [21], 846
—, —, — et —. Sur l'existence de corps en grenade dans le cycle évolutif de *Gonderia mutans*. . . . . [22], 542
—, —, — et —. Transmission héréditaire de *Piroplasma bigeminum* chez *Rhipicephalus bursa*. Persistance du parasite chez les tiques nourries sur des chevaux . . . . . [24], 195
—, —, — et —. Le traitement de la babésiellose bovine à *Babesiella berbera* par l'ichtargan. . . . . [24], 939
—, Plantureux (Edm.), Rossi (P.) et Espérandieu (G.). — La theilériose bovine en Algérie [16], 6
— et Sergent (Ed. et Et.). — Infection expérimentale des dromadaires par le *Trypanosoma berberum* du Débab. . . . . [13], 521
— et —. Deuxième note sur l'hérédité de l'infection et de l'immunité dans la trypanosomiase des dromadaires . . . [13], 525
—, — et Parrot (L.). — Le paludisme en Corse. Étude épidémiologique . . . . . [14], 685
—, —, —, Lestoquard (F.), Plantureux (Edm.) et Rougebieff (H.). — Inoculation au mouton de l'Anaplasme du bœuf [17], 295
—, —, Plantureux (E.) et Deguillaume (A.). — Notes sur les trypanosomiases (1921-1923). . . . . [17], 130
— et Salord (Chr.). — Inoculation expérimentale de *Trypanosoma berberum* à l'âne . . . . . [17], 887
Dopter (C.). — Traitement de la dysenterie amibienne par la créosote . . . . . [1], 68
—. Éosinophilie dans la dysenterie amibienne (Discussion) . . . . . [2], 33
—. Milieu de Dieudonné (Discussion) . . . . . [5], 267
—. Amibiase et émétine . [7], 142
—. Un cas de bronchite fétide traitée par le Stovarsol (Discussion) . . . . . [17], 533
— et Ravault. — Une épidémie de dysenterie bacillaire chez des macaques . . . . [2], 17
— et Salimbeni (A.). — L'épidémie de choléra asiatique de l'asile Saint-Pierre à Marseille en 1911 . . . . . [5], 294
Doré (G.-R.). — Entérorrhagies répétées rebelles guéries par une injection unique de novarsénobenzol . . . . . [19], 903
—. La réactivation endocrinienne du paludisme . . . . . [20], 718
Dore (G.). — Disparition de l'hémato-hémoglobinurie quinique par le novarsénobenzol . [14], 78
—, Guay (J.), Le Chuiton (F.) et Damany (P.). — Sur 3 cas de typhus exanthématique bénin observés sur le croiseur *Strasbourg* revenant d'une campagne au Pôle Nord . . . [22], 303
Doreau. — Fièvre spirillaire en Abyssinie. . . . . [1], 480
Dorolle (P.). — Le paludisme à Hagiang (Tonkin) . . . [20], 895

— et Dang-Huu-Chi. — Coma palustre et grossesse. Présence de *Pl. præcox* dans le sang du cordon. . . . . [20], 589
— et —. Rupture spontanée de la rate au cours d'une fièvre rémittente à *Plasmodium præcox* . . . . . [20], 719
Drbohlav (Jaroslav) (de Prague). — Présentation d'Amibes dysentériques en culture . [18], 121
Dubois (A.). — L'auto-agglutination des hématies dans la trypanosomiase humaine . [5], 686
—. Le rôle pathogène de *Onchocerca volvulus* . . . . [9], 308
—. *Onchocerca volvulus* et l'Éléphantiasis dans le Haut-Ouellé (Congo belge) . . . . [10], 365
—. Remarques d'ordre historique à propos de la rachicentèse dans la trypanosomiase humaine . . . . . [23], 289
— et Corin (G.). — Rapport sur une petite épidémie de Béribéri à Bokala (Congo belge) . [7], 402
— et Mouchet (R.). — Le traitement du Pian et de la syphilis par le salvarsan dans la pratique indigène. . . . . [6], 14
— et —. Note sur le traitement des trypanosomiases animales. . . . . [6], 533
— et Vandenbranden (F.). — La réaction de Boveri dans la trypanosomiase humaine . [8], 261
— et —. Amibiase et son traitement par l'émétine à l'hôpital des Noirs à Léopoldville. [8], 332
— et —. Contribution à l'étude de l'étiologie du Béribéri . . . . . [10], 123
Du Bourguet. — Voir Bourguet (du).
Dubruel (C.-M.-E.). — Contribution à l'étude de l'étiologie de l'*Elephantiasis arabum* . [2], 335
—. Essai de thérapeutique de l'*Elephantiasis arabum* . [2], 360
Duchamp (J.-C.). — Contribution à la pathologie des Balkans. La fièvre spirochéto-plasmodique des Serbes . . . . [10], 827
Ducros (Mlle) et Girard (G.). — Essai de traitement de la lèpre par l'antigène tuberculeux méthylique . . . . . [21], 594
Duffau et Lallement. — Considérations sur une épidémie de peste à Oran. . . . . [22], 193
Dufougeré (W.). — Présentation d'un ouvrage sur l'Eléphantiasis . . . . . [1], 383
—. L'Éléphantiasis, ses rapports avec la lymphangite endémique des pays chauds . [1], 473
—. La fièvre jaune à Saint-Nazaire (Discussion) . . [1], 530
—. La maladie du sommeil et les trypanosomiases animales en Cazamance . . . . . [4], 189
—. La méningite à pneumocoques des tirailleurs sénégalais. . . . . [7], 466
—. Ankylostomiase et Béribéri en Guyane française. . [13], 602
—. De l'utilisation rationnelle de la main-d'œuvre pénale en Guyane . . . . . [14], 258
—. Les dermato-mycoses de la Guyane française . . . [14], 354
— et Gastou (P.). — Paludisme et fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [4], 301
— et Thiroux (A.). — Persistance de l'infection des méninges chez un singe guéri naturellement de spirillose. . . [3], 23
— et —. De la contagion de la fièvre jaune bénigne . . [3], 165
— et —. Sur un cas de *Filaria loa* . . . . . [3], 309
Dujardin-Beaumetz (E.). — Méningite pesteuse (Discussion) . . . . . [8], 96
—. Conservation du sérum antipesteux (Discussion) . . [8], 424
—. Peste du rat et destruction des rats (Discussion) . . [12], 484
—. Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine (Discussion) . . . . . [17], 66
—. Essai de vaccination antipesteuse par voie buccale chez l'homme (Discussion). . [18], 240
—. Sur la gravité de la peste pulmonaire à Madagascar (Discussion) . . . . . [19], 670
—. La contagion et la gravité de la peste pulmonaire en Émyrne (Discussion) . . [19], 826
—. Les vaccinations contre la peste à Madagascar. Les résultats obtenus (Discussion) . . . . . [22], 418
Dumas (Raoul). — Action de l'émétine sur la dysenterie bacillaire pure . . . . . [7], 140
—. Dysenterie et émétine à Saïgon. . . . . [7], 403
Dumas (R.). — Déparasitation intestinale par le tétrachlorure de carbone . . . . [19], 719
—. Résultats très favorables du traitement par la gonacrine dans trois cas de complications blennorragiques . . . [21], 487
—. Diminution d'un tiers de la mortalité à la Goutte de Lait de Tananarive, par le traitement systématique de l'H.-S. . . . . [22], 753
—. De l'action adjuvante du sulfarsénol dans deux cas de paludisme tenace . . . . [22], 1010

—. Recherches sur l'index syphilitique de Tananarive, effectuées par la méthode de floculation de Vernes . . . [23], 257
Dupont (V.). — Spasme laryngé et *Tænia* . . . . . [10], 180
—. Sur l'emploi de l'ionoïde d'arsenic dans le traitement du paludisme . . . . . [13], 504
— et Bouffard. — *Trypanosoma dimorphon* chez les chiens de la Haute-Volta noire (A. O. F.) . . . . . [5], 278
— et Lafont (A.). — Traitement de la maladie du sommeil au Sénégal par le ludyl et le galyl . . . . . [7], 160, 640
— et —. Action comparée, *in vivo*, chez le rat blanc, de l'atoxyl, du salvarsan, du néosalvarsan, du galyl et du ludyl, sur *Tr. gambiense* et *Tr. rhodesiense* . . . . . [8], 37
— et —. Affections oculaires rencontrées en A. O. F. et essais de traitement par les sérums thérapeutiques seuls ou associés aux injections intraveineuses de ludyl et de galyl. . . . . [8], 404, 537
Dupuy (H.). — Un cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique de nature nettement paludéenne, traité par le stovarsol. [21], 636
—. Un cas de rage humaine en Haute-Volta . . . . . [23], 702
—, Sicé (A.) et Vaucel (M.). — Un cas de charbon humain en Afrique Equatoriale Française. . . . . [23], 307
Durand (P.) et Burnet (Et.). — Place de la fièvre exanthématique (= fièvre boutonneuse) dans le groupe des fièvres indéterminées . . . . . [22], 85
— et Laigret (J.). — Réceptivité du rat blanc et de la gerbille au virus de la fièvre boutonneuse . . . . . [25], 106
Durieux (C.). — Cas de fièvre récurrente observés à Dakar et dans ses environs. Découverte de l'Ornithodore, agent de transmission de l'infection . . . . . [25], 13
— et Mathis (C.). — Considérations sur la tuberculose en Afrique Occidentale Française. . . . . [23], 533
— et —. Persistance de *Sp. duttoni*, var. *crociduræ*, dans le cerveau et dans la rate de la souris infectée expérimentalement . . . . . [23], 862
— et —. Entretien au laboratoire des souches de *Spirochæta duttoni* . . . . . [24], 150
— et —. Identité, à Dakar, de *Spirochæta duttoni*, var. *crociduræ* et du Spirochète infectant dans la nature *Ornithodorus erraticus*. . . . . [25], 843
—, — et Ewstifeieff (C.). — Nouveau cas de fièvre récurrente à Dakar . . . . [20], 441
—, Poisson (H.) et Buck (G.). — Note sur un cas d'intoxication arsenicale chez le cheval . . . . . [25], 381
— et Sall (M.). — Nouvelles recherches sur l'index du paludisme à Dakar durant la saison fraîche . . . . . [22], 618
Du Toit (J.-P.). — Voir Toit (J.-P. du).
Dutoit (L.). — Elevage bovin au Katanga (Congo belge). *Notes vétérinaires* . . . . . [22], 377
Dyleff (P.). — Quelques réflexions sur la disparition spontanée des Trypanosomes chez trois Européens reconnus porteurs de Trypanosomes. [25], 956

E

Ebert (G.) et Sénevet (G.). — Contribution à l'étude des myiases nord-africaines. Deux cas de myiases cutanées dus à des Sarcophaginés. . . [16], 415
Ehlers et Bourret. — Réaction de Wassermann dans la lèpre. . . . . [2], 320
—, — et With. — Recherches sur le mode de propagation et les procédés de diagnostic bactériologique de la lèpre. [4], 239
Ekrem (I.) et Lestoquard (F.). — Les piroplasmoses du mouton en Turquie . . . . . [24], 822
Emily (J.). — Note au sujet d'un ver de Guinée enkysté . [3], 740
—. Salvarsan et syphilis (Discussion) . . . . . [6], 104
—. Adénites tropicales. . [8], 416
—. A propos de la lutte antipaludique à Beyrouth . . [16], 481
—. Quininisation préventive (Discussion) . . . . . [18], 9
—. Essais de traitement des parasitoses intestinales par le tétrachlorure de carbone en capsules (Discussion). . [18], 464
—. Les parasites intestinaux chez les Indigènes du Corps d'Armée coloniale en France. Traitement et prophylaxie . [18], 694
Emin (Ahmed). — Une variété nouvelle du parasite de Laveran . . . . . [7], 388
Escomel (E.). — Le traitement d'un papillome cutané par inoculation du sang d'un *Melœ*. . . . . [11], 207

—. La Espundia . . . . [4], 489
—. Le premier cas de Pian observé au Pérou. . . . [5], 69
— Dysenterie à *Trichomonas* à Arequipa (Pérou) . . . [6], 120
—. Première découverte de *Leishmania tropica* flagellée dans le corps humain . . . . [6], 237
—. Sur l'actinomycose humaine au Pérou . . . . . [7], 380
—. Un nouveau traitement de la trichomoniase intestinale . . . . . [7], 657
—. Sur la blastomycose humaine au Pérou et en Bolivie. [8], 90
—. Sur un nouveau cas d'actinomycose au Pérou . . . [8], 571
—. A propos d'un phénomène biologique de l'Amibe dysentérique. . . . . [8], 573
—. La blastomycose humaine au Pérou et en Bolivie . . [9], 21
—. Contribution à l'étude de la leishmaniose américaine (Laveran et Nattan-Larrier). Formes et variétés cliniques . [9], 215
—. Le traitement actuel de la leishmaniose américaine . . . . . [9], 699
—. A propos d'un cas de blastomycose au Pérou . . [9], 756
—. A propos du meilleur traitement actuel des amibiases intestinale et hépatique . [10], 23
—. Le traitement de la leishmaniose américaine par l'oxyde d'antimoine . . . . . [10], 381
—. Quelques remarques à propos des trichomoniases intestinale et vaginale . . . . . [10], 553
—. *Ornithodorus megnini* du Pérou . . . . . [10], 773
—. Le *Phyllodactylus gerrhopygus* au Pérou. Son infection par une hémogrégarine . . . . . [10], 873
—. Le *Glyptocranium gasteracanthoïdes*, araignée venimeuse du Pérou. Etude clinique et expérimentale de l'action du venin . . . . . [11], 136
—. Première constatation de la dysenterie bacillaire à Arequipa (Pérou) . . . . [11], 268
—. Quatre nouveaux cas de leishmaniose américaine, guéris par l'oxyde d'antimoine . . [11], 372
—. Le *Latrodectus mactans* ou « Lucacha » au Pérou (Etude clinique et expérimentale de l'action du venin) . . [12], 702
—. Mycose s'attaquant à des rongeurs du genre *Mus*, à Arequipa (Pérou) . . . . [12], 350
—. La trypanosomiase américaine existe dans les forêts orientales du Pérou . . [12], 273
—. Contribution à l'étude de quelques mycoses au Pérou. . . . . [13], 663
—. Les hémoparasitismes et les hémoporteurs de germes [14], 291
—. A propos du traitement du paludisme dans les vallées malariennes du Pérou . . [16], 308
—. Les Pseudo-Méloïdes du Pérou et la pseudo-méloïdine. Emploi de ces insectes en thérapeutique à l'époque des Incas . . . . . [16], 615
—. Essai sur la parasitologie d'Arequipa (Pérou) et de ses environs . . . . . [17], 906
—. A propos de quelques flagellés de reptiles et de batraciens observés à Arequipa (Pérou). . . . . [18], 58
—. Batraciens conservateurs et propagateurs de certaines flagelloses intestinales de l'homme . . . . . [18], 521
—. Leishmaniose américaine des sinus frontaux. Traitement favorable par l'iodure double de quinine et bismuth . . [18], 634
—. Un nouveau Pseudo-Méloïde, insecte médicinal du Pérou. . . . . [19], 198
—. Un premier cas de trichomonose vésicale décrit au Pérou . . . . . [19], 697
—. La leishmaniose américaine et les leishmanioses en Amérique . . . . . [22], 35
—. La maladie de Carrion ou Verruga du Pérou. . . [22], 348
—. A propos des Ckara, Pinta ou Caratès dans le Sud du Pérou . . . . . [24], 215
—. Vingt-cinq cas d'abcès hépatiques amibiens guéris par l'émétine sans intervention chirurgicale . . . . . [15], 537
Espérandieu (G.) et Donatien (A.). — Le « Boukhchem », maladie enzootique des chiens kabyles. . . . . [13], 811
—, —, Rossi (P.) et Plantureux (E.). — La theilériose bovine en Algérie . . . . . [16], 6
— et Sergent (Ed.). — Etude sur les piroplasmoses et les jaunisses en Algérie . . . [13], 779
Esquier (A.). — La formule hémoleucocytaire dans le paludisme dakarois . . . . . [14], 70
—. Traitement de la fièvre récurrente par l'acétylarsan. [21]. 113
— et Noc (F.). — Tuberculose de la voûte du crâne chez un Noir du Soudan . . . . [13], 330
—, — et Henry (V.). — L'anguillule intestinale de l'homme au Sénégal. . . . . [13], 588

ESTRADE et FONTOYNONT. — Un cas de fracture du calcaneum . . . . . [22], 388
EVANNO (Ch.) et JACOTOT (H.). — Premiers cas de clavelée en Indochine. . . . . [23], 804
— et —. Premières observations d'anaplasmose en Indochine. . . . . [24], 104
EWSTIFEIEFF. — Traitement du chancre mou et du bubon par les attouchements à l'acide phénique pur, chez les indigènes du Sénégal. . . . [19], 314
—, MATHIS (C.) et DURIEUX (C.). — Nouveau cas de fièvre récurrente à Dakar . . . . [20], 441
EYRAUD (A.) et VELU (H.). — Observations sur les diverses formes de Piroplasmes rencontrées sur des bovins indigènes de la Chaouïa . . . . [8], 643
— et —. Trypanosomiase des chevaux du Maroc. Infestation d'un jeune chien par l'allaitement . . . . . [9], 567

F

FABRE (Henri). — Essai de traitement auto-hémothérapique de la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [13], 336
—. Ascaridiose à forme typhoïde . . . . . [16], 898
—. Bilharziose intestinale à forme de tuberculose abdominale . . . . . [18], 653
—. Comparateur à quatre tubes pour le dosage de la quinine dans les urines à l'aide du réactif de Tanret et d'une solution titrée de quinine (Au sujet de la note de M. Robineau). . . . . [20], 973
—. Note complémentaire sur la trypanosomiase bovine à la Guadeloupe . . . . . [22], 668
—. Sur le parasitisme intestinal à la Guadeloupe . . . [22], 671
— et BERNARD (M.). — Sur un nouveau foyer de trypanosomiase bovine observé à la Guadeloupe . . . . . [19], 435
—, MALAUSSENE et GARNODIER. — — Splénomégalie tuberculeuse primitive avec anémie du type pernicieux . . . . . [23], 16
FALCHETTI (E.). — Observations sur la localisation cutanée des *Leishmania* chez les chiens dans le Midi de la France. . . . . [25], 1036
— et FAURE BRAC (G.). — La leishmaniose canine à Nice. Étude épidémiologique . [25], 1091
FALLAS (S.) et BÜLLOW (T. VON). — Le Pian au Costa-Rica [18], 450
FANTHAM (H.-F.). — Note on the specific name of the *Herpetomonas* found in the dog-flea, *Ctenocephalus canis* (Avec résumé français) . . . . [6], 254
—. *Erratum*. . . . . [6], 376
FARINAUD (E.) et TOUMANOFF (C.). — Note sur une prospection entomologique à Chapa. Présence de deux espèces anophéliennes jusqu'ici méconnues en Indochine : *T. lindesaii* Giles et *A. gigas* var. *baileyi* Edw. . . . . [25], 245
FAUQUET. — Sur un cas d'helminthiase intestinale ayant provoqué une crise aiguë d'appendicite observé en Chine. . . . . [2], 606
FERRÉ (P.) et RAZAFINJATO. — Composition chimique de sels utilisés par les indigènes de Madagascar . . . . . [23], 118
FERRIER (P.). — Le traitement physiologique de la lèpre. . . . . [24], 852
FEYTAUD (J.) et GENDRE (E.). — Sur la répartition des gîtes d'*Anopheles maculipennis* Hoffm. et *A. bifurcatus* Meig. . . . . [12], 178
— et —. Sur la résistance des larves de Culicides dans les eaux picriquées. . . . [12], 231
FEYTE (R.). — Le diagnostic de surprise de la fièvre récurrente à tiques . . . . . [25], 368
—. Un cas de tétanos localisé suivi de guérison . . . [25], 818
—. Deux cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique. . . [25], 831
—, RUSSAOUEN et ADVIER. — La typhoïde à Tiaroye en 1923. . . . . [25], 1109
FIDAO (G.). — Au sujet de la communication du Dr Nogue sur la posologie infantile de la quinine. . . . . [16], 436
—. Forme fruste d'amibiase hépatique primitive . . . [16], 421
FINZI (G.). — Leishmaniose et tuberculose chez le chien. . . . . [9], 429
— et CAMPUS (A.). — Anaplasmosi sul significato dei « corpi endoglobulari », « punti marginali », « anaplasmi », trovati nelle sangue degli ovini della Sardegna et del Piemonte . . . . . [10], 143
— et —. Les composés du mercure dans le traitement de la lymphangite épizootique [10], 428
FIORI (C.) et DELANOË (M. et Mme). — Sur un cas de trypanoso-

miase constaté chez un cheval à Mazagan . . . . . [8], 503
— et —. Au sujet du dimorphisme du Trypanosome de Mazagan . . . . . [9], 130
FIRKET. — Béribéri . . . [2], 317
FLEURY (A.), THIBOUT (A.) et LHÉRITIER (A.). — Moutons algériens et bactéridie charbonneuse . . . . . [5], 336
FLORENS. — Doses limites auxquelles le chlorhydrate d'émétine et le chlorhydrate de quinine peuvent être employés chez le calfat . . [6], 642
FLU (P.-C.). — Mesures de prophylaxie anticholérique et antipesteuse aux Indes Néerlandaises . . . . . [17], 703
FLYE SAINTE-MARIE (P.-E.). — Organisme voisin de la *Sergentella hominis* trouvé dans des urines sanglantes . . . [21], 515
— et MANSOURI (A.). — Deux nouveaux cas de leishmaniose cutanée observés chez des Indigènes marocains dans la région de Fez . . . . . [18], 639
— et VIALATTE (Ch.). — Autour du « mystère » de la fièvre quarte (Remarques épidémiologiques). . . . . [24], 280
FOLEY (H.). — Parasitisme intestinal chez les Berbères sédentaires de Figuig. Fréquence d'*Hymenolepis nana* chez les enfants. . . . . [4], 421
—. A propos de la larve d'*Anopheles chaudoyei* . . . [11], 549
—. Présence de *Phlebotomus perniciosus*, Newstead, dans le département de la Haute-Marne . . . . . [16], 664
—. L'infection tuberculeuse chez les indigènes du Hoggar. [21], 493
—, BROUARD (M.), CATANEI (A.) et LE GUILLAS (L.). — Sur la durée de l'action du stovarsol dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie . . . . . [19], 96
— et CATANEI (A.). — L'Hémogrégarine de la Vipère à cornes (*Hæmogregarina seurati*, Laveran et Petit, 1911) ; ses formes de multiplication . . . [18], 393
—, —, BROUARD (M.) et DEMIMUID (P.). — Parasitisme et réactions morbides dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie. . [18], 546
—, BROUARD (M.), CATANEI (A.) et LEBLANC (L.). — Action du stovarsol dans le paludisme chronique à *Pl. vivax* chez les enfants indigènes en Algérie. . . . . [18], 554
—, CATANEI (A.) et GIRAUD (A.). — L'évolution du paludisme chez les enfants indigènes dans une région progressivement assainie par les mesures antipaludiques . . . . . [21], 856
—, — et SERGENT (Et.). — Au sujet de l'élimination de la quinine absorbée sous forme de comprimés dragéifiés. . [16], 21
—, —, SERGENT (Edm. et Et.) et PARROT (L.). — De l'emploi de la quinine contre le paludisme . . . . . [18], 28
— et LEDUC (H.). — Phlébotomes dans le Sud-Oranais . . . [5], 511
—, LHÉRITIER (A.), SERGENT (Ed.) et SERGENT (Et.). — De la mortalité dans le Débab, trypanosomiases des dromadaires . . . . . [11], 568
—, NÈGRE (L.) et SERGENT (Ed.). — Le rôle des bacilles pseudodysentériques dans les affections intestinales en Algérie . . . . . [9], 204
— et PARROT (L.). — Note sur les arrêts de développement et l'infantilisme d'origine paludéenne en Algérie . . [11], 839
— et —. Nodosité juxta-articulaire chez les indigènes d'Algérie . . . . . [13], 738
— et —. Remarques épidémiologiques sur le Bouton d'Orient en Algérie. . . . . [18], 485
— et —. Sur l'existence d'*Ornithodorus marocanus* Velu en Algérie (Sud-Oranais). . [22], 436
—, —, CHAMPOUILLON (S.), BOSSARD (A.) et PASCAL (J.-M.). — Étude comparative des cuti-réactions à la tuberculine de Koch et à la tuberculine B. C. G. . [25], 298
—, — et SERGENT (Edm. et Et.). — L'armature maxillaire des *Anopheles maculipennis* en pays paludéen . . . . [13], 29
— et SERGENT (Edmond). — Fièvre récurrente du Sud-Oranais et *Pediculus vestimenti*. [1], 174
— et —. Existence de *Filaria perstans* chez un indigène de l'Afrique du Nord. . . [1], 472
— et —. Exploration scientifique dans les vallées de l'extrême Sud-Oranais . . . . . [3], 471
— et —. Exploration scientifique du Sahara constantinois [7], 416
— et —. Destruction par l'essence d'Eucalyptus des poux de corps ; agents transmetteurs de la fièvre récurrente et du typhus exanthématique. [8], 378
— et —. Fièvre récurrente et ictère . . . . . [14], 632
—, — et MESLIN (R.). — Le trachome dans les régions saha-

riennes. Immunité relative des races nègres. . . . . [6], 634
— et Vialatte (C.). — Traitement de la fièvre récurrente nord-africaine par le néosalvarsan et l'olarsol . . [7], 569
— et Yvernault. — Anophélines dans l'eau salée . . . [1], 172
Fombeure (G.) et Lavier (G.). — Complications oculaires dans la piroplasmose canine expérimentale. . . . . [15], 545
Fonquernie (J.). — Note au sujet du traitement de la peste pulmonaire . . . . . [24], 600
—. Considérations sur l'épidémiologie de la peste . [23], 899
—. Observations sur un cas de *Pestis minor*. . . . . [24], 446
—. De l'influence de la sulfuration sur le riz . . . . [24], 751
—. Note sur l'épidémiologie de la peste à Tananarive . [24], 863
—. Considérations sur un cas de longue incubation de peste pulmonaire . . . . . [24], 904
—. Sur deux cas de peste pulmonaire à longue évolution. . . . . [25], 176
—. Les puces du rat à Tananarive. . . . . [25], 383
— Les puces domestiques à Tananarive . . . . . [25], 542
—. Essais de traitement de la peste par le bactériophage. . . . . [25], 677
—. Les puces domestiques à Tananarive (Note complémentaire) . . . . . [25], 710
Fontes (A.-C.). — Traitement de la tuberculose par la tuberculine T. A. O. . . . . [2], 163
Fontoynont (M.). — Le traitement de la dysenterie amibienne par le galyl . . . . . [10], 277
—. Caractéristiques de la Pathologie malgache . . . . [15], 153
—. A propos d'un aspect rare mais normal du foie . . [21], 881
—. Troubles uro-génitaux guéris par l'émétine, origine amibienne vraisemblable (Discussion) . . . . . [21], 884
—. Note sur la fièvre typhoïde en Emyrne (Discussion). [22], 54
—. Fibrome utérin et kyste de l'ovaire concomitants, hystérectomie . . . . . [22], 387
—. Présentations. . . . . [22], 1010
—. Traitement des plaies ulcéreuses et des fistules par l'héliothérapie . . . . . [22], 1013
—. Auto-sang hémolysé . [23], 120
—. La tuberculose bovine dans la région ouest Sakalave (Discussion) . . . . . [23], 234
— et Carougeau. — Abcès sous-dermiques et gommes ulcérées produits par le *Sporotrichum carougeaui*, Langeron, 1913, associé à la tuberculose chez un enfant malgache . . [15], 144
— et —. Étude sur le Hodi-potsy, dermato-mycose malgache . . . . . [15], 424
— et Estrade. — Un cas de fracture du calcaneum . . [22], 388
—, Girard (G.) et Woltz (H.). — Nouvelle conception pathogénique des « nodosités juxta-articulaires » des Malgaches, avec les déductions qu'elle comporte . . . . . [24], 209
— et Raharijoana. — La poliomyélite antérieure aiguë (paralysie infantile), à Madagascar. . . . . [23], 554
— et Razafindralalmbo. — Quelques cas de dysenteries bacillaires dont un certainement à Shiga à Tananarive . . [23], 428
— et Salvat (P.). — Contribution à l'étude des mycoses malgaches. Abcès sous-dermiques dus à l'*Endomyces molardi* (n. sp.) . . . . . [15], 311
— et —. Lésions mycosiques dues au *Saccharomyces granulatus* observées à Tananarive (Madagascar). Leur guérison par le bleu de méthylène . . [15], 53
— et —. Sur une actinomycose du rat à Madagascar. . [15], 596
Forgeot (P.). — Vaccination intradermique de la chèvre contre le charbon bactéridien. . . . . [20], 208
Forgues (M.). — Les ictères infectieux chez les Noirs. [15], 348
Fornara (L.) et Schwetz (J.). — Y a-t-il des formes d'évolution des Trypanosomes chez l'hôte vertébré ? . . . . . [22], 862
Fossey (A.-M. de). — Influence des vents dominants sur les larves de Culex et d'Anophèles. . . . . [4], 325
Fourche (J.-A). — Résultats prophylactiques comparés, donnés par deux méthodes différentes de traitement, appliquées en régions très infectées de trypanosomiase. . . . . [20], 883
— et Haveaux (G.). — Germanine et tryponarsyl appliqués préventivement contre la trypanosomiase. . . . . [24], 537
Fournials (M.). — La tuberculose dans les services de sous-officiers, soldats et indigènes, à l'Hôpital principal de Dakar en 1930. . . . . [25], 657
—. La tuberculose à l'Hôpital principal de Dakar en 1931. . . . . [25], 658
—, Lambert, Advier et Cazanove.

— Sur les événements sanitaires du mois écoulé (mars 1932) . . . . . [25], 669
FOURNEAU. — Tryparsamide (Discussion) . . . . . [19], 279
—. Essai de suppression du « Pian » et des impotences fonctionnelles d'origine syphilitique dans les collectivités d'indigènes (Discussion). [20], 213
—. Au sujet du moranyl (Discussion) . . . . . [22], 879
—. Indications pratiques sur le transport des formes végétatives d'Amibes dysentériques (Discussion) . . . . . [25], 211
—. De divers types d'arséno-résistance dans les traitements actuels (A. E. F.) de la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [25], 280
FRAISSINET et MARTIN. — Syphilis pulmonaire simulant la tuberculose cavitaire chez un Malgache . . . . . [16], 396
FRANÇA (C.). — Sur un hématozoaire nouveau de *Lacerta ocellata* Daud. . . . . [1], 301
—. Sur une piroplasmose nouvelle chez une mangouste. . . . . [1], 410
—. Sur un hématozoaire nouveau de *Psammodromus algirus* . . . . . [1], 593
—. Le choléra à Madère. [4], 358
—. *Leptomonas davidi* Lafont au Portugal . . . . . [4], 532
—. Transformation *in vitro* des formes crithidiennes de *Tr. rotatorium* et formes trypanosomiques. . . . . [4], 534
—. Quelques notes sur *Leptomonas davidi* Lafont . . . [4], 669
—. *Leucocytozoon* du geai, de l'épervier et de la bécasse. . . . . [5], 17
—. Contribution à l'étude des *Leucocytozoon* des oiseaux du Portugal . . . . . [5], 82
—. Les formes aflagellées dans l'évolution d'un Trypanosome de batracien (*T. undulans*). . . . . [5], 99
—. Contribution à l'étude des *Leucocytozoon* des oiseaux du Portugal . . . . . [5], 173
—. *Phlebotomus papatasii* Scopoli et fièvre à Pappataci au Portugal . . . . . [6], 123
—. Un cas de Chappa ? . [6], 351
—. Quelques observations sur le genre *Leucocytozoon*. . [8], 229
—. Notes sur la biologie des Hémosporidies. La schizogonie des Hémogrégarines . . [11], 171
—. Note sur les espèces portugaises du genre *Phlebotomus*. . . . . [11], 730
—. L'insecte transmetteur de *Leptomonas davidi* (Note préliminaire) . . . . . [12], 513
—. Sur la détermination spécifique d'une femelle de Phlébotome . . . . . [14], 23
—. Encore quelques considérations sur la flagellose des Euphorbes . . . . . [15], 166
—. L'hôte intermédiaire de *Schistosomum hæmatobium* au Portugal (*Planorbis dugourii* Graells) . . . . . [15], 805
—. Sur les Flagellés parasites des latex (à propos de la note de M. Franchini) . . . [15], 408
—. Au sujet de la peste pulmonaire primitive, à propos de la communication de J. Renaud. . . . . [18], 16
— et PARROT (L.). — Introduction à l'étude systématique des Diptères du genre *Phlebotomus* . . . . . [13], 695
FRANCHINI (G.). — *Leishmania* et punaises . . . . . [5], 817
—. Un nouveau Protozoaire parasite de l'homme provenant du Brésil . . . . . [6], 156
—. Un cas de leishmaniose américaine. . . . . [6], 219
—. Nouvelle contribution à l'étude de l'*Hæmocytozoon brasiliense* . . . . . [6], 333
—. Trypanosome de la chauve-souris en Italie. Formes viscérales et stades de développement chez un Acarien Gamaside, le *Leignathus laverani*, n. sp. . . . . [14], 542
—. Sur les Flagellés intestinaux du type *Herpetomonas* du *Chamæleon vulgaris* et leur culture et sur les Flagellés du type *Herpetomonas* de *Chalcides* (*Gongylus*) *ocellatus* et *Tarentola mauritanica*. . [14], 641
—. Sur un Trypanosome du latex de deux espèces d'Euphorbes . . . . . [15], 18
— Amibes et autres Protozoaires de plantes à latex du Muséum de Paris (Note préliminaire). . . . . [13], 197
—. Au sujet de la culture de l'*Herpetomonas* du *Pyrrhocoris apterus* . . . . . [15], 161
—. Essais d'inoculation au chat, d'amibes de latex de plantes. . . . . [15], 931
—. Essais d'inoculation de différents Protozoaires dans le latex des Euphorbes . . . . [15], 792
—. Flagellés et Amibes d'une Urticacée exotique, *Ficus parietalis*. . . . . [15], 399
—. Flagellose du chou et des punaises du chou . . . . [15], 163

—. *Hæmoproteus chelidonis* chez l'hirondelle *Chelidon urbica* Linn. Stades probables de développement chez la puce *Ceratophyllus hirundinis* . . [15], 13
—. Nouvelles recherches sur les Trypanosomes des Euphorbes sur leur culture . . . [15], 299
—. Particularités de culture de certains Flagellés. De la culture de *Leishmania* dans le milieu de Yoshida . . [15], 551
—. Protozoaires de Muscides divers capturés sur des Euphorbes . . . . . [15], 970
—. Remarques à propos de la note de M. França sur la *flagellose des Euphorbes* . [15], 205
—. Sur une Amibe des figuiers de plein air de la région parisienne et sa culture . . [15], 287
—. Sur une Amibe particulière des Asclépiadées *Chlorocodon whitei* . . . . . [15], 393
—. Sur un Flagellé de Lygoeide (*Crithidia oxycareni* n. sp.). . . . . [15], 113
—. Sur un Flagellé nouveau du latex de deux Apocinées [15], 109
—. Action des latex végétaux sur différents Protozoaires. Culture de Trypanosomes dans les latex (2e note) . . . [16], 256
—. Action du latex d'Euphorbes sur différents Trypanosomes. Culture des flagellés dans les latex divers . . . . . [16], 41
—. Essais d'inoculation de latex parasités aux souris blanches. Abcès du foie expérimentaux déterminés par les Amibes des latex . . . . . [16], 162
—. Hématozoaires de quelques oiseaux d'Italie. . . . [16], 118
—. Inoculation de flagellés d'insectes dans le latex des Euphorbes . . . . . [16], 646
—. Nouvelles recherches sur les Protozoaires des plantes à latex . . . . . [16], 655
—. Sur un flagellé d'une Asclépiadacée (*Araujia angustifolia*). . . . . [16], 652
—. Sur un flagellé particulier d'une Urticacée (*Ficus benjamina*) . . . . . [16], 630
—. Sur un parasite leishmaniforme du sang du merle et sur quelques Trypanosomes d'hirondelles. . . . . [16], 11
—. Sur un parasite particulier d'une tanche. Culture des Trypanosomes des poissons. [16], 410
—. Sur un Protozoaire d'*Euphorbia cereiformis* et sur sa culture. . . . . [16], 642
—. Sur des cultures très anciennes de Flagellés . . . [17], 32
—. Piroplasmose chez un petit loir (*Myoxus avellanarius*). . . . . [17], 881
—. Hématozoaires particuliers d'un oiseau (*Hypoleis hypoleis*) . . . . . [17], 884
—. Encore au sujet des Spirochètes des Euphorbes . [24], 809
—. Étude sur un Flagellé spécial du latex d'un Figuier d'Erythrée (*Ficus hochstetteri* (Mg A. Rich) . . . . . [24], 843
— et Laveran (A.). — Contribution à l'étude des « marginal points » des hématies des mammifères. . . . . [7], 580
— et —. Infections des mammifères par les flagellés d'invertébrés. . . . . [7], 605
— et —. Au sujet d'un *Herpetomonas* de *Ctenopsylla musculi* et de sa culture . . . [8], 266
— et —. Au sujet de l'*Herpetomonas ctenocephali* de la puce du chien et de sa culture . . . . . [12], 310
—. Infection des souris blanches à l'aide des cultures d'*Herpetomonas ctenocephali* . . [12], 379
—. Sur les Flagellés parasites de quelques insectes et sur les infections qu'ils peuvent produire chez les souris . . . . [12], 665
— et —. Contribution à l'étude des Flagellés, des Culicides, des Muscides, des Phlébotomes et de la Blatte orientale . [13], 138
— et —. *Herpetomonas* et *Spirochæta* de la Blatte orientale. . . . . [13], 331
— et —. Infections expérimentales des chiens et des cobayes à l'aide de cultures d'*Herpetomonas* d'Insectes . . . [13], 569
— et —. Contribution à l'étude de la flagellose des Euphorbes. . . . . [13], 796
— et —. Contribution à l'étude des insectes propagateurs de la flagellose des Euphorbes . . . . . [14], 147
— et —. Des hématozoaires du gecko et spécialement de *Herpetomonas tarentolæ*. Procédé simple de culture des *Herpetomonas* . . . . . [14], 323
— et —. Spirochétose des punaises des Euphorbes et du latex. . . . . [14], 205
— et —. Sur un *Herpetomonas* du loir. . . . . [14], 278
— et —. Expériences sur les flagellés de la punaise du chou. . . . . [16], 319
— et Mantovani (M.). — Infection expérimentale du rat et de la souris par *Herpetomonas muscæ-domesticæ* . . . [8], 109

— et Roubaud (E.). — Infection leishmaniforme produite chez la souris par l'inoculation des fèces de la puce *Ctenopsylla musculi* . . . . [15], 407
— et —. Infection naturelle de la souris par les Flagellés de la puce *Ctenopsylla musculi*, Dug. . . . . [15], 405
— et —. Culture des parasites leishmaniformes obtenus chez la souris par inoculation des fèces de la puce *Ctenopsylla musculi* . . . . . [16], 14
— et Saini (M.). — Sur la présence d'hémogrégarines chez les poissons d'eau douce de France. . . . . [16], 353
Froilano de Mello. — Une épidémie de méningite cérébro-spinale dans l'Inde portugaise. . . . . [14], 398
— et Andrade (Mario de). — Spirochétose broncho-pulmonaire au Nord du Portugal . [15], 284
— et Crisna Suctancar. — Morphologie et cycle évolutif d'un *Herpetomonas* de l'intestin d'*Hœmidactylus brookei* Gray. . . . . [15], 795
Fronville (G.) et Mouchet (R.). — Bilharziose et tumeurs . . . . . [11], 730
Fülleborn. — Die Filarien des Menschen. . . . . [6], 556
Furikoff (Mlle M.-J.), Loukianoff (W.-A.), Galouzo (J.-G.) et Yakimoff (W.-L.). — L'apiroplasmose dans le traitement de la piroplasmose bovine . [19], 18

G

Gabbi (U.). — Photographies de Bouton d'Orient en Calabre. . . . . [3], 288
— Les maladies tropicales à Tripoli. . . . . [5], 850
—. Au sujet de l'histoire du Kala-azar méditerranéen [6], 141
Gac (P. Le). — L'excitation amarile . . . . . [22], 743
—. Pianome ayant oblitéré l'orifice préputial d'un jeune indigène. . . . . [23], 104
—. La réaction de Botelho dans la lèpre suivant la technique d'Itchikawa et Baum . [23], 105
—. La réaction de Targowla dans la trypanosomiase humaine . . . . . [23], 530
—. Sur un cas de Sprue observé chez un Européen à la Côte d'Ivoire . . . . . [23], 709
—. Helminthiase chez les Lobis (A. O. F.) . . . . . [23], 727
—. Fréquence du signe de la percussion douloureuse dans la lèpre . . . . . [24], 363
—. Immunité observée chez *Cercopithecus lasiopyga petaurista* à la suite d'inoculation de *Trypanosoma gambiense*. . . . . [24], 372
Gac (P. Le) et Bouffard (G.). — Myiase à *Chrysomyia bezziana* observée chez un indigène de la Côte d'Ivoire . . [22], 48
— et Muratet (L.). — Contribution à l'étude de la formule leucocytaire du typhus récurrent. . . . . [23], 697
Gadschieff (S.), Yakimoff (W.-L.), Nezwetaieff (N.-W.) et Schmoulewitsch (A.-I.). — L'influence du virus de la peste bovine sur les piroplasmoses latentes des bovidés . . . . . [25], 728
—, —, — et —. La coccidiose des reins des oies en Russie. [25], 1044
Gaide (L.) et Mouzels (P.). — Note sur le traitement de la dysenterie amibienne par l'émétique . . . . . [6], 494
— et —. Note sur le traitement des abcès du foie par l'émétine . . . . . [6], 716
Galasesco, Cantacuzène, Ciuca et Gérard. — Essais de sérothérapie anti-exanthématique [12], 367
Galliard (H.). — Note sur les larves de *Culex hortensis* Ficalbi et *Culex apicalis* Adams. . . . . [20], 609
—. Guérison spontanée de l'infection mixte à *Trypanosoma brucei* et *Treponema crocidurœ* chez la souris blanche . [21], 315
—. Infection à *Trypanosoma cruzi* chez les animaux splénectomisés . . . . . [23], 188
—. Recherches sur les filarioses au Gabon occidental . . [25], 167
Gallen (R. Le). — Voir Le Gallen (R.).
Galloway (I.), Levaditi (C.) et Nicolau (S.). — Essais de prophylaxie des trypanosomiases par des dérivés phényl-arsiniques administrés *per os*. [19], 737
Galouzo (J.-G.), Yakimoff (W.-L.), Loukianoff (W.-A.) et Fourikoff (Mlle M.-J.). — L'apiroplasmose dans le traitement de la piroplasmose bovine. [19], 18
—, —, Markoff-Petraschewsky (Mme E.-N.), Loukianoff (W.-L.), Mlles Rastégaïeff (E.-F.), Roumiantzeff (E.-W.) et Woitzekhowsky (A.-M.). — Essais de traitement de la piroplasmose bovine par le protargol. [19], 41
—, —, Rastégaieff (Mlle E.-F.) et Loukianoff (W.-A.). — A pro-

pos de la coccidiose des porcs en Russie. . . . . [20], 215
Gambier (A.), — Index endémique paludéen de la ville de Bamako (Soudan français). . . . . [15], 933
—. Un cas probable de pseudomyiase rampante . . . [15], 1018
—. Essai de transmission aux animaux de laboratoire du Spirochète de la fièvre récurrente soudanaise . . . . . [16], 159
—. La peste au Cambodge . . . . . [21], 497
—. Un cas de mélioïdose observé à Pnom-Penh . . . . [23], 436
—. Un cas de cystite aiguë amibienne. . . . . [23], 457
—. Parasitisme intestinal au Cambodge. . . . . [23], 790
—, Bouron (A.) et Kerrest (J.). — La fièvre récurrente au Soudan . . . . . [15], 320
— et Leboeuf (A.). — Sur deux cas de spirochétose humaine observée à Brazzaville (Moyen-Congo). . . . . [11], 359
— et —. La spirochétose humaine et l'*Ornithodorus moubata* dans la colonie du Moyen-Congo . . . . . [11], 833
— et —. La formule hémoleucocytaire dans la spirochétose humaine au Moyen-Congo . . . . . [12], 497
— et —. Symptomatologie, diagnostic et traitement de la spirochétose humaine à Brazzaville (Moyen-Congo) . . [12], 372
— et —. Sur deux cas de milk-pox ou Alastrim observés au Moyen-Congo . . . . [12], 489
Gaminara (A.). — Le venin de la larve de *Megalopyge urens*. . . . . [21], 656
Garnodier, Malaussene et Fabre (Henri). — Splénomégalie tuberculeuse primitive avec anémie de type pernicieux. [23], 16
Gaschen (H.). — Influence de la température et de la nutrition larvaire sur le développement de *Culex pipiens* (race autogène) . . . . . [25], 577
— et Roubaud (E.). — Sur l'adaptation zoophile de l'*Anopheles maculipennis*. . . . . [24], 203
— et —. Concurrence larvaire et peuplements anophéliens. . . . . [25], 428
— et —. Différenciation des races biologiques de *Culex pipiens* L. par l'adaptation larvaire aux milieux ammoniacaux . . . . . [25], 1033
Gascougnolle (G.), Marque (E.) et Le Fers (F.). — Trois observations de métastases staphylococciques . . . [23], 668
Gasperi (F. de). — Présence de Spirochètes chez le cobaye. . . . . [5], 589
Gastou (P.) et Dufougeré (W.). — Paludisme et fièvre bilieuse hémoglobinurique. . . [4], 301
Gatti (C.) et Delamare (G.). — Mycétome du pied à grains noirs . . . . . [24], 80
— et —. Granulome péri-anal en plaques . . . . . [22], 148
—, — et Gonzalez (D.). — Le Pied végétant du Paraguay (Leishmaniose américaine ulcéro-végétante). . . . [25], 488
Gaubert (M.). — Au sujet d'un cas de parasitisme à *Spiroptera* chez un chien . . . . [25], 372
Gauducheau (A.). — Présence de Protozoaires dans un papier . . . . . [1], 297
—. Durée de l'immunité après variolisation (Discussion). . . . . [2], 238
—. Sur une culture amibienne. . . . . [2], 247
— Sur une culture amibienne, 2e note. . . . . [2], 370
—. Sur une culture amibienne, 3e note : corps spirillaires. . . . . [2], 568
—. Pseudo-tuberculoses mycosiques observées chez des Chinois à Canton . . . . . [3], 488
—. Le Béribéri dans le Sud de la Chine . . . . . [3], 544
—. Bactérie anthracoïde se rapprochant du bacille de Yersin. . . . . [4], 98
—. Lettre relative aux résolutions du Congrès de Hong-Kong pour le Béribéri . [5], 334
—. Exanthèmes de la variole et de la vaccine chez le singe et le bufflon. . . . . [6], 488
—. Etat parasitaire et rôle pathogène d'une petite Amibe. . . . . [6], 560
—. L'immunisation variolique du singe . . . . . [9], 699
—. Recherches sur la variole-vaccine . . . . . [10], 260
—. Dysenterie amibienne du chien (Discussion). . . [13], 162
—. Déséquilibre de l'alimentation dans les pays exotiques. Indications et salubrité des conserves . . . . . [24], 421
—. Remarques sur les Amibes cultivables parasites de l'intestin de l'homme. . . . [15], 229
—. Sur les maladies vénériennes dans la garnison de Tananarive (Discussion) . . . [16], 539
—. Sur la nourriture naturelle de l'homme d'après l'observa-

tion d'usages alimentaires exotiques primitifs. . . . [18], 368
—. Bouffissure d'Annam (Discussion) . . . . . [19], 311
—. La digestion du papier chez la chèvre d'Égypte (Discussion) . . . . . [22], 83
—. Syphilis exotique et tabès. . . . . [28], 680
—. Essais de culture de quelques ultra-virus en symbiose avec des Protozoaires (Discussion) . . . . . [25], 727
Gauthier (F.) et Nègre (L.). — Étude microbiologique des conjonctivites algériennes . [7], 18
Gedoelst (L.). — Note sur les larves parasites du genre *Cordylobia* . . . . . [1], 597
—. Un type nouveau de Dicrocœlidé parasite des Primates. . . . . [6], 256
—. Note sur un genre nouveau d'Œstride. . . . . [7], 210
—. Quelques Nématodes parasites de l'éléphant africain . [15], 122
—. Le genre *Metastrongylus*, Molin, 1861 . . . . . [16], 622
— et Surcouf. — Description d'un Œstride nouveau, parasite de l'hippopotame . [2], 615
Geerinck (Mlle) et Schwetz (J.). — Sur quelques parasites sanguicoles des rongeurs de Stanleyville (Congo belge) . [22], 657
Gendre (E.). — Sur des larves de *Mermis* parasites des larves de *Stegomyia fasciata* . [2], 106
—. Sur deux larves carnassières de moustiques . . . . . [2], 147
—. Sur un nématode nouveau, parasite des poissons . [19], 798
— et Feytaud (J.). — Sur la répartition des gîtes d'*Anopheles maculipennis* Hoffm. et *A. bifurcatus* Meig. . . . . [12], 178
— et —. Sur la résistance des larves de Culicides dans les eaux picriquées. . . . [12], 231
Genevray (J.). — La lèpre en Nouvelle-Calédonie. . . [18], 78
—. *Id.* (*Suite*) . . . . . [18], 138
—. Essais de traitement de la lèpre par les éthyl-éthers de l'huile de Chaulmoogra et l'Éparséno. . . . . [19], 441
Genevray (J.) et Hermann (R.). — Filariose chez un Européen en Nouvelle-Calédonie. . . [18], 651
— et Morin (A.). — Présence en Nouvelle-Calédonie de *Spirillum morsus muris* et de *Spirochæta recurrentis* . . . . . [19], 529
Geoffroy (P.) et Poisson (H.). — Un nouveau cas de physocéphalose de l'estomac du porc. . . . . [23], 874
— et —. Note sur une rétention anormale d'un fœtus de vache . . . . . [24], 250
— et —. Télangiectasie d'origine parasitaire du foie et de la rate du porc. . . . . [24], 611
Georgelin et Clapier. — Un cas de « Larbisch » chez une Européenne à Libreville (Gabon). . . . . [16], 665
Gérard (F.), Cantacuzène (J.), Ciuca et Galasesco. — Essai de sérothérapie anti-exanthématique . . . . . [12], 367
— et Conseil (E.). — Essais de traitement du paludisme par le « Trépol » . . . . [15], 534
Gérard (P.) et Mouchet (R.). — Contribution à l'étude des tumeurs chez les Noirs de l'Afrique Centrale . . . . . [12], 567
— et —. Le cancer et les Noirs de l'Afrique Centrale. . [19], 564
Germain (A.) et Plazy (L.). — Un cas d'urticaire palustre. [25], 882
Géry (L.) et Darré (H.). — Étude anatomo-pathologique des érythèmes trypanosomiasiques. . . . . [3], 728
Giagni et Delamare (G.). — Granulome inguino-scrotal à forme d'ulcère rubané . . . [22], 19
Giglioli (G.). — *Armillifer brumpti*, n. sp. ; nouvelle espèce de Linguatulidé de Madagascar . . . . . [15], 566
—. Observations sur la morphologie de l'œuf et de l'embryon chez *Porocephalus clavatus* (Wyman, 1845, Sambon, 1910). . . . . [20], 260
Gillot (V.) et Sergent (Ed.). — Traitement de la spirillose nord-africaine et sa transmission par les poux . . [4], 440
Giuruth (J.-A.). — Protozoaire parasite de la muqueuse de la caillette du mouton . . [3], 297
Giovanni di Donizio. — Su due Tripanosomi del Bestiame nella Somalia Italiana . . . [14], 423
— et Cabassu (H.). — La leishmaniose canine dans la région de Marseille . . . . . [25], 1040
Girard (G.). — Sur l'existence à Madagascar de la dysenterie bilharzienne à *Schistostomum americanum* (ou *mansoni*) . . . . . [11], 34
—. Paralysie mortelle observée chez un chien au cours d'un traitement antirabique prolongé . . . . . [16], 599
—. Sur la virulence de la peste murine à Tananarive . [17], 525
—. Le dépistage *post-mortem* de la peste à Madagascar. Ponc-

tion pulmonaire et ponction hépatique . . . . . [18], 603
—. La contagion et la gravité de la peste pulmonaire en Emyrne . . . . . [19], 820
—. Épidémiologie de la peste pulmonaire à Madagascar (Premier mémoire) . . . . [20], 233
—. *Id.* (Deuxième mémoire). . . . . [20], 632
—. *Id.* (*Deuxième mémoire*) (*Suite*). . . . . [20], 739
—. Septicémie à bacille de Yersin chez les lapins domestiques. Ses relations avec la peste murine. . . . . [21], 299
—. Note au sujet du traitement de la peste pulmonaire (Discussion) . . . . . [21], 602
—. Cuti-réactions tuberculiniques chez les enfants de 2 à 5 ans à Tananarive (Discussion) . . . . . [21], 879
—. Note sur la fièvre typhoïde en Emyrne . . . . [22], 50
—. Le chlorhydrate d'émétine en injections sous-cutanées dans le traitement des Bilharzioses vésicales et intestinales (Discussion) . . . . . [22], 175
—. L'enseignement de l'hémoculture dans la peste pulmonaire primitive de Madagascar [22], 234
—. Sur un cas de lèpre constaté à Paris chez un tirailleur malgache . . . . . [22], 408
—. Considérations sur un cas d'infection typhoïdique à para-B chez un nourrisson de 8 mois vacciné au B. C. G. à la naissance . . . . . [23], 116
—. La tuberculose bovine dans la région Ouest Sakalave (Discussion) . . . . . [23], 253
—. Recherches sur l'index syphilitique de Tananarive effectuées par la méthode de floculation de Vernes (Discussion) . [23], 261
—. Localisation rare d'un bubon pesteux, bubon sus-épitrochléen (Discussion) . . . . . [23], 554
—. Vaccination antituberculeuse (B. C. G.) à Arivonimamo (Discussion) . . . . . [23], 870
—. Note sur la cysticercose du chien à Madagascar et sa signification (Discussion) . . [23], 879
—. Considérations sur le traitement de la peste par le bactériophage . . . . . [23], 936
—. Au sujet de la peste murine en Emyrne . . . . . [24], 865
—. Sur deux cas de peste pulmonaire à longue évolution (Discussion) . . . . . [25], 177
— et Bouffard. — La fièvre typhoïde chez le Malgache en Emyrne . . . . . [15], 675
— et —. Le dépistage de la peste par la ponction du foie. Son importance prophylactique . . . . . [16], 501
— et Ducros (Mlle). — Essai de traitement de la lèpre par l'antigène tuberculeux méthylique. . . . . [21], 594
—, Fontoynont (M.) et Woltz (H.). — Nouvelles conceptions pathogéniques des « nodosités juxta-articulaires » des Malgaches, avec les déductions qu'elles comportent . . [24], 20
— et Hérivaux (A.). — L'enseignement de la réaction de Schick chez les Malgaches des Hauts-Plateaux. . . . [23], 1000
— et —. La recherche du bacille de Hansen au niveau de la muqueuse nasale . . . [24], 68
— et —. Recherche des porteurs sains de bacilles pesteux dans la région de Tananarive [24], 748
— et Legendre (F.). — Premières observations sur les puces de rat des régions pesteuses de Madagascar . . . . [18], 730
— et Jousset. — Un cas de méningite cérébro-spinale à bacille de Pfeiffer . . . [18], 448
— et Quimaud (J.). — Essai d'immunisation antipesteuse par cuti-vaccination chez le cobaye. . . . . [17], 741
— et Rahoerson (R.). — Vaccination antituberculeuse des nourrissons par le B. C. G. à Tananarive . . . . . [21], 282
— et Raneivo (Ch.). — Accidents anaphylactiques immédiats et graves consécutifs à une vaccination jennérienne. . [21], 270
— et Robic (J.). — La réaction d'opacification de Meinicke dans la lèpre. Comparaison avec le Wassermann. . [21], 187
—, Robic (J.) et Hérivaux (A.). — Note sur les puces de la région de Tananarive . [25], 381
—, — et —. Remarques au sujet de la communication de P. Lauzeral et P. Millischer . [25], 1022
—, — et Rahoerson (R.). — Enquête épidémiologique sur l'infection tuberculeuse. L'index tuberculinique chez l'indigène à Tananarive. . . . . [21], 716
—, — et —. L'index tuberculinique chez l'indigène en dehors de Tananarive . . . . [23], 246
Giraud (P.). — Sur l'origine canine du Kala-azar méditerranéen. . . . . [25], 558
Gnédine (Mlle A.-N.), Yakimoff (W.-L.), Markoff-Petraschewsky

(Mlle E.-R.), Rastegaïeff (Mlle E.-F.), Roumiantzeff (Mlle E.-W.) et Tourikoff (Mlle M.-F.). — L'arrhénal dans le traitement de la babésiellose bovine (Note préliminaire) . . [19], 854
Gobert (E.). — Prophylaxie du typhus en milieu indigène. . . . . [3], 764
— et Anderson (Ch.). — Un nouveau foyer de bilharziose en Tunisie. . . . . [16], 18
— et —. Note relative à la prophylaxie de bilharziose en Tunisie . . . . . [17], 35
— et Blaizot (L.). — Deux épidémies de fièvre récurrente en Tunisie, leur origine tripolitaine . . . . . [4], 613
— et Catouillard. — Enquête sur l'ankylostomiase et les affections helminthiques dans le Sud de la Tunisie et plus particulièrement dans le Djerid . . . . . [1], 600
— et Nicolle (Ch.). — Seconde enquête sur les chèvres laitières de Tunis au sujet de la fièvre méditerranéenne (Présentation). . . . . [9], 285
Godard (P.) et Porcher (Ch.). — Le lait et la fièvre méditerranéenne (Présentation) . [9], 285
Goldie (H.). — Observations sur la spirochétose bronchiale . . . . . [21], 620
—. Remarque sur la cytologie des selles . . . . . [22], 424
Golivine et Riqueau. — Essais de destruction de certains insectes avec le « Givral » . . [22], 681
Golovine (S.). — Observations sur le traitement de la syphilis aux colonies . . . [24], 639
Gontier et Huot. — Un cas de cancer primitif du foie. [17], 508
Gonzalez (D.), Delamare (G.) et Gatti (C.). — Le Pied végétant du Paraguay (Leishmaniose américaine ulcéro-végétante) . . . . . [23], 488
Gonzalez-Lugo et Brumpt (E.). — Présentation d'un Réduvide du Vénézuéla (*Rhodnius prolixus*) chez lequel évolue *Tryp. cruzi* . . . . . [6], 382
Gonzalez-Martinez (I.). — Les méthodes de laboratoire dans le diagnostic de la diarrhée chronique des pays chauds. . . . . [13], 384
Gorat (P.), Roux (G. Le), Guillot (G.) et Urbain (A.). — Sur un germe diphtériforme et chromogène isolé du castor . . . . . [24], 450
Gouillon (P.) et Montpellier (J.). — Mycétome du pied (type pied de Madura) dû à *Aleurisma apiospermum* . . [14], 283
Gourry, Advier et Riou. — Stomatites et glossites épidémiques à Dakar . . . . [25], 1110
Gourvil (E.) et Deschiens (R.). — Les Entamibes de la bouche des singes. . . . . [23], 711
Gousseff (W.), Nezwetaieff (N.) et Yakimoff (W.-L.). — Infection du zébu par les Theileries . . . . . [25], 1049
Gouzien (P.). — Au sujet du Goundou. . . . . [2], 219
—. A propos de la peste de Madagascar . . . . . [14], 610
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun en 1920 et 1921 (Discussion) . . [15], 833
—. Paludisme et quinine préventive (Discussion) . . . [16], 85
—. A propos de la lutte antipaludique à Beyrouth (Discussion) . . . . . [16], 483
—. Quininisation préventive (Discussion) . . . . . [17], 10
—. Sur un cas de Maladie d'Ainhum ayant intéressé la jambe droite (Discussion). . . . . [18], 474
—. Une épidémie de fièvre jaune au Libéria (Discussion). [18], 753
Gouzien et Abbatucci. — Note au sujet de la prophylaxie de la lèpre en France . . . [15], 827
Goyon (J. de). — Répartition du paludisme dans les territoires de Gora, Verca et d'Opara (Basse-Albanie). . . . [12], 266
—. L'épidémie de peste à Tamatave de février à avril 1921. . . . . [14], 602
— et Bouvier (J.-E.). — La lutte antipaludique dans un régiment d'infanterie coloniale en Orient, 1917 . . . . . [10], 886
Gracias (Mlle E.), Nazareth (Mlle S.) et d'Araujo (A.). — Lèpre dans l'Inde portugaise . [19], 928
Grall (Ch.). — Sur la fréquence du *Fasciolopsis buski* (Lank. 1857) en Cochinchine (Discussion). . . . . [1], 220
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil (Discussion). . [1], 329
—. Rapport sur la lèpre. [2], 67
—. Rapport sur la quinine . . . . . [2], 225
—. Béribéri (Discussion) . [3], 19
—. Lèpre (Discussion) . . [4], 71
—. Défense des colonies . [4], 650
—. Traitement de l'amibiase (Discussion) . . . . . [7], 310
—. Amibiase hépatique à l'Armée d'Orient (formes frustes). . . . . [10], 17

—. Paludisme « épidémié » . . . . . [10], 184
—. Traitement du paludisme épidémié et de l'amibiase associée . . . . . [10], 329
—. Trachome (Discussion) [10], 272
— et CLARAC. — Traité de pathologie exotique . . . . [5], 335
— et MARCHOUX. — Traité du paludisme. . . . . [2], 563
GRANJUX (E.). — Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dans l'Inde (Discussion) . . [1], 554
—. Désinfection des lettres (Discussion) . . . . . [2], 329
—. Influences diverses sur les manifestations du paludisme . . . . . [2], 576
—. Lèpre (Discussion) . . [2], 176
—. Troupes noires du Sénégal en Algérie (Discussion). [3], 212, 289
—. Introduction des troupes noires en Algérie (Discussion) . . . . . [3], 441
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil à Brazzaville et au Congo français pendant l'année 1909 (Discussion). . [3], 561
—. La fièvre typhoïde (Discussion) . . . . . [4], 105
—. Nécessité d'organiser la défense des colonies contre les maladies contagieuses . [4], 649
—. L'alcoolisme au Maroc (Discussion) . . . . . [5], 751
—. Emploi du salvarsan (Discussion) . . . . . [6], 239
GRAY (A. C. H.). — Leishmaniose naturelle du chien à Tunis . . . . . [6], 163
GREENWAY (D.-J.) et CASTEX (M.-R.). — Le rôle pathogène de *Blastocystis hominis*. . [18], 132
— et —. Le rôle pathogène de *Chilomastix mesnili*. [18], 137
— et —. Les Protozoaires dans l'intoxication intestinale . . . . . [18], 177
GRECCIO (G.). — La trypanose humaine et la natalité infantile dans la région du Kisantu (Moyen-Congo). Influence du traitement atoxylé . . [8], 752
—. Le novarsénobenzol dans quelques affections au Congo belge (avec la pl. XIV). [9], 760
—. Trypanose des porcs ; relation des porcs avec la trypanose humaine dans la vallée de l'Inkissi (Moyen-Congo belge). . . . . [10], 113
—. Note sur la lutte contre la trypanose à Kisantu (Congo belge). Résultats et espérances . . . . . [10], 398
—. Quelques observations sur la durée moyenne de vie des trypanosés en traitement. [10], 719
GRENIER (M.). — Étude expérimentale de *Spirochæta berbera* . . . . . [7], 365
—. Essai de spirochétose expérimentale chez quelques animaux avec *Spirochæta berbera* . . . . . [14], 144
— et BILLET. — Sur la fièvre récurrente au Maroc oriental. . . . . [7], 382
GRIEWANK (H.) et LAVEAU (M.). — Sur un cas de mycétome à grains rouges (Étude clinique et microscopique). . . [12], 478
GRIMAUD (L.) et MELNOTTE (P.). — Note sur le diagnostic précoce du typhus exanthématique par le laboratoire . . . . [21], 305
GRIMES (C.). — Du traitement de la peste bubonique par les injections intraveineuses d'iode colloïdal . . . . . [19], 407
GRITAI (P.-K.). — Biologie de l'*Anopheles maculipennis* Mg et mesures anti-anophéliques à la station malarique de Charkow . . . . . [23], 795
GROMIER (E.). — Cas de tumeurs fibreuses chéloïdiennes généralisées . . . . . [20], 553
GROS (H.). — Présentation d'un opuscule sur la lutte antipaludique . . . . . [1], 248
—. Sur un Acarien parasite des teignes des céréales et cause accidentelle d'éruptions cutanées chez l'homme . . [1], 249
—. Ulcère phagédénique des pays chauds chez les Kabyles [1], 303
—. L'ophtalmo-réaction à la tuberculine chez les indigènes de l'Algérie . . . . . [1], 337
—. La durée de l'immunité conférée par la variolisation vis-à-vis de la vaccine . . . [2], 237
—. Le traitement préventif de l'intolérance quinique par le chlorure de calcium. . . [2], 269
—. Cause et nature des gingivites chez les Kabyles . . . [2], 282
—. L'ulcère à *Leishmania* (Bouton d'Orient) sur le littoral algérien . . . . . [2], 298
—. Contribution à l'étude des conjonctivites en Algérie. . . . . [10], 321
—. L'unité des Protozoaires du paludisme. . . . . [11], 624
—. Fréquence des Porocéphales chez les Noirs de l'Afrique Occidentale . . . . . [12], 92
—. L'ulcération saisonnière récidivante des lèvres . . [12], 214
—. Le traitement du paludisme par le trypanobleu . . [12], 434
—. A propos d'*Anopheles chaudoyei* . . . . . [12], 53

—. Un cas sporadique de paludisme autochtone. . . [15], 191
—. Qui introduisit la syphilis à Tahiti ? . . . . . [22], 30
GROSDEMANGE (L.), CATANEI (A.) et LEGROUX (Ch.). — Sur un cas de mycétome du pied observé en Algérie . . . . . [20], 11
GUAY (J.), DORÉ (G.), LE CHUITON (F.) et DAMANY (P.). — Sur 5 cas de typhus bénin exanthématique observés sur le croiseur *Strasbourg* revenant d'une campagne au Pôle Nord. . . . . [22], 303
GUEIDON (E.), BOUGUET (A.), SERGENT (Et.) et CATANEI (A.). — Existence de la leishmaniose cutanée chez un chien dans la localité du Tell algérien où le Bouton d'Orient est endémique chez l'homme . . . . [17], 360
GUÉNOLÉ (A.) et TOURNIER (E.). — Epidémie de Dengue hivernale en Chine du Nord. . . [21], 617
GUÉRIN (F.-H.). — L'assistance médicale dans l'Inde française et l'École de Médecine de Pondichéry . . . . . [14], 134
—. Enquête sur la filariose en Cochinchine. . . . . [17], 397
—. Avitaminose et infection dans la maladie expérimentale du porcelet due à *Bacillus asthenogenes* (Recherches sur le Béribéri) (Discussion) . [18], 77
—, ADVIER (M.) et BOREL (E.). — Stovarsol et paludisme . . . . . [20], 331
—, BABLET (J.), LALUNG-BONNAIRE et PONS (R.). — Examen radioscopique du cœur dans le Béribéri . . . . . [20], 131
— et PONS (R.). — Culture d'*Entamœba dysenteriæ* par le procédé de W.-C. Bœck et Jaroslav Drbohlav. . . . . [18], 317
GUEYTAT. — Note sur le traitement du clou de Biskra. [2], 548
GUILLERM (J.). — Les troubles du métabolisme dans le Béribéri. . . . . [22], 970
— et BABLET (J.). — Les troubles du métabolisme de l'azote et du chlore dans le Béribéri sec . . . . . [18], 735
— et —. Les troubles du métabolisme de l'azote et du chlore dans le Béribéri humide [18], 739
—, — et PHAM-VAN-LU. — Deux cas de cancer primitif probable du foie en Cochinchine. . . . . [19], 569
—, — et BERNARD (P.-Noël). — Le rein et les fonctions rénales dans le Béribéri . . . [20], 39
— et BERNARD (P.-Noël). — Action de *Bacillus asthenogenes* sur les aliments (recherches sur le Béribéri) . . . [16], 743
— et —. Action du *Bacillus asthenogenes* sur les corps phosphorés organiques (Recherches sur le Béribéri) . . . [17], 153
— et —. Fermentation du contenu stomacal dans le Béribéri humain et dans la maladie expérimentale due à *B. asthenogenes* chez le porcelet. . . . . [17], 382
— et MORIN (Henry-G.-S.). — Essai de détermination statistique de la ration réelle du travailleur indigène en Cochinchine . . . . . [19], 905
GUILLET (R.). — A propos d'un suc ganglionnaire particulièrement riche en *Trypanosoma gambiense* . . . . . [18], 735
—. Au sujet de la récente épidémie de Dengue à Dakar. Note sur un cas de spirochétose humaine . . . . . [19], 860
—. Quelques cas gynécologiques et actes opératoires qu'ils ont provoqués chez les Noirs du Congo . . . . . [23], 205
— et JOUENNE (P.). — Deux cas d'améliorations de lèpre après traitement par le B. C. G. . . . . [20], 91
GUILLET et MATHIS (C.). — Sur la nature de l'épidémie de glossites observée au Sénégal . . . . . [18], 586
— et —. Réceptivité de la souris grise au Spirochète d'Obermeier . . . . . [18], 680
— et —. Réceptivité du lapin au Spirochète de la musaraigne. . . . . [19], 504
GUILLIER, JEANSELME et MAUCLAIRE. — La lèpre est-elle toujours incurable ? . . . . . [5], 196
GUILLOT (G.), URBAIN (A.), GORET (P.) et ROUX (G. LE). — Sur un germe diphtériforme et chromogène isolé du castor. . . . . [24], 450
GUYOMARC'H et RINGENBACH (J.). — La filariose au Congo . [7], 619
— et —. La lèpre et le Pian dans les territoires parcourus par la section française de la Mission de Délimitation Afrique Équatoriale Française-Cameroun en 1912-1913. [8], 124
— et —. Notes de géographie médicale de la section française de la Mission de Délimitation Afrique Équatoriale Française-Cameroun en 1912-1913. Variole ; Paludisme ; Maladies vénériennes . [8], 199
— et —. *Ibid.* Maladies du tube digestif ; Maladies cutanées ;

Appareils loco-moteur, circulatoire, nerveux, génito-urinaire ; Affections des organes des sens ; Intoxications ; Envenimations ; Affections chirurgicales . . . . . [8], 301
— et —. *Ibid.* Maladie du sommeil . . . . . [8], 517
GUYNOMARC'H, TOULLEC et ALAIN. — Episode démential et gangrène symétrique des extrémités au cours d'une infestation palustre à *Plasmodium præcox* . . . . . [25], 307
GWÉLESSIANY (J.). — Recherches sur le passage des Spirochètes à travers les muqueuses et la marche des infections mixtes spirochéto-trypanosomiennes . . . . . [20], 653

H

HAKKI (Ismaïl). — Le parasitisme intestinal en Turquie . [23], 192
HALL (G. Norman). — Action de l'halarsine et du bisantol dans le traitement des trypanosomiases des bovidés et caprins. . . . . [20], 535
HAMET (H.). — Revue des travaux récents étrangers sur la Sprue tropicale. . . . [22], 998
HANRAS (M.) et LHUERRE (H.). — Les premières greffes animales en A. O. F. . . . . [18], 353
HARTMANN (Ch.). — Traitement du paludisme par une nouvelle méthode d'injection intraveineuse de quinine . . . [13], 748
HASLÉ (G.). — La bilharziose intestinale sur les Hauts-Plateaux à Madagascar . . [21], 380
—. Du chlorure de calcium intraveineux dans le traitement de la lèpre. . . . . [22], 11
HASSAN (A.) et KHALIL (M. bey). — The Serum Globulin in Human Schistosomiasis. . [25], 149
— et —. Recherches sur la globuline du sérum au cours des schistosomoses . . . . [25], 166
HAVEAUX (G.) et FOURCHE (J.-A.). — Germanine et tryponarsyl appliqués préventivement contre la trypanosomiase . [24], 337
HAVET (J.) et LAVERAN (A.). — Contribution à l'étude de la leishmaniose viscérale naturelle du chien . . . . . [10], 386
HAYAT (A.) et CONOR (A.). — Fièvre boutonneuse de Tunisie . . . . . [3], 379
HECKENROTH (F.). — Les symptômes de la trypanosomiase humaine . . . . . [2], 264
—. La trypanosomiase humaine sur le Congo moyen et l'Oubangui . . . . . [5], 403
—. Réactions locales de début dans un nouveau cas de trypanosomiase humaine chez l'Européen. . . . . [6], 267
—. Injections sous-arachnoïdiennes de néosalvarsan (Discussion) . . . . . [7], 258
—. Au sujet des grains rouges d'un mycétome. . . . [8], 624
—. Deux nouveaux cas de leishmaniose canine à Dakar [9], 696
—. La trypanosomiase humaine au Sénégal . . . . . [9], 723
—. Mesures capables d'enrayer le paludisme à Dakar . [13], 1024
—. Sporotrichose pulmonaire (Discussion) . . . . . [13], 362
—. Sur un cas de tuberculose observé chez un zébu aux abattoirs de la Ville de Dakar (Discussion). . . . . [13], 869
—. La Peste à Dakar : étude clinique et thérapeutique. Période endémo-épidémique : octobre 1921-octobre 1922 (Discussion). . . . . [13], 906
—. Évolution de la peste au Sénégal (Discussion) . . [16], 374
—. A propos des vœux de la Société médico-chirurgicale relatifs à la lutte antipaludéenne à Dakar . . . . . [17], 103
—. Quatre mois de campagne antimurine (septembre à décembre 1924) à Cotonou (Dahomey) (Discussion). . . [18], 399
—. L'habitation indigène à Dakar . . . . . [19], 141
—. L'évacuation des matières usées à Dakar (*A suivre*) [19], 944
—. L'évacuation des matières usées à Dakar (*Suite*) . [20], 99
— et ADVIER (M.). — Un cas de distomatose hépatique à *Fasciola hepatica* en Corse. [24], 46
— et AUBERT (P.). — L'arsénophénylglycine dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [4], 411
— et —. Prophylaxie de la trypanosomiase humaine et arsénophénylglycine en injection intraveineuse . . . . [4], 419
— et —. Village d'isolement pour les indigènes trypanosomés. . . . . [4], 699
— et —. La formule leucocytaire chez les indigènes trypanosomés du Congo . . . . [5], 284
— et —. Prophylaxie de la trypanosomiase humaine et orpiment . . . . . [5], 287
— et —. L'atoxyl dans la prophylaxie chimique de la trypanosomiase humaine . . [6], 184
— et —. L'arsénophénylglycine

dans la prophylaxie chimique de la trypanosomiase humaine . . . . . [6], 272
— et —. Action de divers médicaments sur *Microfilaria perstans* et *diurna* . . . [6], 457
— et Bédier (E.). — Un cas d'encéphalite épidémique à forme myoclonique chez un Européen à Dakar . . . . [17], 275
— et Bergonier (E.). — Renseignements démographiques sur Dakar en 1922 . . . . [16], 438
— et Blanchard (M.). — Note sur la présence et l'endémicité d'une myiase furonculeuse au Congo français. . . . [6], 350
— et —. Transmission de *Tryp. gambiense* par les moustiques. . . . . [6], 442
— et —. Recherches sur les propriétés du sérum des malades du sommeil au Congo . [6], 444
— et —. Le néosalvarsan dans le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . [6], 591
— et —. Etat des méninges et injections intrarachidiennes de néosalvarsan dans la trypanosomiase humaine . . . . [7], 63
—, —, Aubert (P.) et Monfort (F.). — Le salvarsan dans la prophylaxie et le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . . [6], 632
— et Blanc (G.). — Répartition du paludisme dans la région de Koritza (Basse-Albanie). Carte des indices spléniques . [11], 470
—, Kernéis (J.) et Monfort (F.). — Quelques remarques sur le Pian au Congo français. Emploi du 606 . . . . . [6], 243
— et Lafont (A.). — Un cas de leishmaniose canine à Dakar. . . . . [8], 162
—, — et Lecomte (A.). — Une observation de méningite cérébro-spinale à Dakar, causée par le bacille de Yersin . . [8], 92
— et Lecomte (A.). — Traitement et évolution d'un mycétome à grains rouges . . . . . [9], 346
—. Nattan-Larrier et Touin. — Sur un cas de Pian-bois de la Guyane. Ulcère à *Leishmania* de la Guyane . . . . [2], 587
Hempl (Miss H.) et Sergent (Et.). — Sur l'immunité dans le paludisme des oiseaux (*Proteosoma vel Plasmodium relictum* Grassi et Feletti) . . . [10], 550
Henao et Rorledo. — Présentation d'échantillons : *Argas americanus, Compsomyia macellaria, Necator americanus* . . . . . [1], 317
Henry. — La conservation du vaccin antivariolique, sans glycérine à l'état humide . [18], 742
— et Marin. — Le charbon bactéridien dans la région de Constantine . . . . . [9], 79
Henry (A.) et Railliet (A.). — Filaire du caméléon de Madagascar. . . . . [7], 175
— et —. Sur les Nématodes du genre *Gœzia* Zeder . . [8], 270
— et —. Sur les Nématodes du genre *Camallanus* (= *Cucullanus* Auct., *non* Müller, 1777). . . . . [8], 446
— et —. Le parasite de la dermite granuleuse des Equidés. . . . . [8], 695
— et —. Les Filaires des Rapaces (Falconiiformes et Strigiformes) . . . . . [9], 364
— et —. Sur un Strongylidé vivant dans des kystes intestinaux chez les grands Félidés. . . . . [11], 86
— et —. Un Bunostomien pathogène, parasite de la vésicule biliaire d'un Rongeur africain. . . . . [11], 93
—, — et Joyeux (Ch.). — Sur deux Trématodes de Primates. . . . . [5], 833
—, — et —. Un nouveau Strongylidé des singes . . . [6], 264
—, Bauche (L.) et Railliet (A.). — Helminthes de l'éléphant d'Asie. I. Trématodes et Cestodes . . . . . [7], 78
—, — et —. Sur les Helminthes de l'éléphant d'Asie. II. Nématodes, A . . . . . [7], 129
—, — et —. Sur les Helminthes de l'éléphant d'Asie. III. Nématodes, B . . . . . [7], 206
—, — et —. Sur les Helminthes de l'éléphant d'Asie. IV. [8], 117
— ,— et —. Un nouveau Strongylidé du porc . . . . [12], 324
— et Blanc (G.). — Le Physaloptère du *Macacus cynomolgus* L. . . . . [5], 390
—, Esquier (A.) et Noc (F.). — L'anguillule intestinale de l'homme au Sénégal . . [13], 588
— et Joyeux (Ch.). — Contribution à la faune helminthologique de la Haute-Guinée française . . . . . [13], 176
—, Langeron (M.) et Raillet (A.). — Le genre *Acanthocheilonema* Cobbold, 1870, et les Filaires péritonéales des carnivores . . . . . [5], 392
— et O'Zoux. — La filaire du Foudi . . . . . [2], 544
— et Railliet (A.). — Une seconde espèce d'Œsophagostome, parasite de l'homme . . . . . [2], 643

— et —. Remarques à l'occasion de la note de M. le Docteur Antoine . . . . . [3], 91
— et —. Remarques au sujet de la note de M. Nicolas. [3], 738
— et —. Sur quelques Helminthes de *Python sebæ* (Gmelin) . . . . . [3], 94
— et —. Deux espèces du genre *Aprocta* Linstow . . . [3], 152
— et —. Sur une Filaire péritonéale des porcins . . . [4], 386
— et —. Remarque au sujet de deux notes de MM. Bauche et Bernard . . . . . [4], 485
— et —. Filaire de l'*Hyæna crocuta* (Discussion) . . . [4], 630
— et —. Helminthes du porc recueillis par M. Bauche en Annam. . . . . [4], 693
— et —. Observations sur les Strongilidés du genre *Nematodirus* . . . . . [5], 35
— et —. Nématodes vasculicoles des bovins annamites . [5], 115
— et —. Quelques Nématodes parasites des reptiles . [5], 215
— et —. *Filaria immitis* (Discussion) . . . . . [5], 732
— et —. Un *Hæmostrongylus* des bronches du léopard [6], 451
— et —. Sur les Œsophagostomes des ruminants . . [6], 506
HENRY (Mlle E.) et VAN DEN BRANDEN (F.). — Nouvelle médication du paludisme par la plasmoquine . . . . . [20], 728
HÉRELLE (D'). — La campagne contre les sautcrelles en Tunisie en 1915 . . . . . [8], 629
—. Lutte contre les sauterelles (Discussion) . . . . . [8], 640
HÉRIVAUX (A.). — Note sur la dysenterie bacillaire à Tananarive. . . . . [23], 429
—. Tuberculose de la peau avec association putride secondaire chronique. Considérations sur les formes masquées de certaines tuberculoses cutanées exotiques . . . . . [23], 672
—. Les groupes sanguins dans la lèpre . . . . . [24], 618
— et GIRARD (G.). — L'enseignement de la réaction de Schick chez les Malgaches des Hauts-Plateaux . . . . . [23], 100
— et —. La recherche du bacille de Hansen au niveau de la muqueuse nasale . . . . [24], 68
— et —. Recherche des porteurs sains de bacilles pesteux dans la région de Tananarive [24], 748
—, RAKOTOSON (J.) et RANOARIVONY (E.). — A propos d'un cas de dysenterie bacillaire dans le Sud-Ouest de Madagascar . . . . . [23], 374
— et RATAVILAHY (E.). — Éruption hansénoïde simulée, provoquée par l' « Amiana » (Uréa, Baker) . . . . [24], 166
—, ROBIC (J.) et GIRARD (G.). — Note sur les puces de la région de Tananarive . . . . [23], 381
—, — et —. Remarques au sujet de la communication de P. Lauzeral et P. Millischer. . . . . [25], 1022
— et ROHDENSON (R.). — Les groupes sanguins chez les Malgaches de l'Émyrne . . [24], 247
HÉRIVAUX et ROHDENSON. — Sondage épidémiologique sur les Shiga-infections au moyen de séro-agglutination . . [24], 612
— et —. Dépistage épidémiologique de la tuberculose pulmonaire en Emyrne par un procédé de diagnostic *post-mortem* . . . . . [24], 615
HERMANN (R.) et GENEVRAY (J.). — Filariose chez un Européen en Nouvelle-Calédonie . . [18], 651
HEUYER et CORNET. — Un cas de leishmaniose cutanée. . [11], 57
HEYMANN (P.) et MATHIS (C.). — La réaction de Wassermann dans le paludisme . . [8], 238
HILBERT (D.-N.), SERGENT (Edm.) et PARROT (L.). — Morphologie de piroplasmes observés en Algérie chez le mouton (*Gonderia ovis*) . . . . . [15], 789
HINDLE (Edward). — Attempts to transmit Fowl pest by *Argas persicus* (avec résumé français) . . . . . [5], 165
HIRSCHBERG (M.). — Dystrophie adipo-génitale (syndrome hypophysaire adipo-génital) chez un lépreux . . . . . [16], 75
HOOF (VAN). — Voir VAN HOOF.
HORTA (P.). — Les tuberculines. . . . . [2], 163
— et LANGERON (M.). — Note complémentaire sur *Cladosporidium wernecki* Horta, 1921. . . . . [15], 381
HORVATH (G.). — Hémiptères des Euphorbes parasitées de *Leptomonas davidi* . . . . [6], 292
HOSOYA (S.) et STEFANOPOULO (J.). — Recherches sur les Spirochètes ictérogènes. Les Spirochètes du « Akiyami » ou fièvre d'automne du Japon [22], 923
HOUDEMER (E.). — Parasites des animaux domestiques ou sauvages du Tonkin (*1re liste*). . . . . [18], 343
—. Note sur un Myriapode vésicant du Tonkin, *Otostigmus aculeatus* Haase . . . [19], 343
— et BABLET. — Lymphoblastome de la région inguinale chez un chien annamite [20], 344

— et —. Deux cas de tumeurs ganglionnaires malignes observées au Tonkin chez des animaux domestiques . . [20], 345
— et Casaux. — Note préliminaire sur les Sparganoses humaines et animales au Tonkin. . . . . [19], 802
Houssay (B.-A.). — Sur les propriétés hémolytiques, fermentatives et toxiques des extraits d'Araignées . . . . . [11], 217
Houssiau (J.) et Rodhain (J.). — Dermatite vésiculeuse saisonnière produite par un Coléoptère. . . . . [8], 587
Hovasse et Cot. — Quelques remarques sur les Anophélines de Macédoine . . . . [10], 890
Huard (P.) et Botreau-Roussel. — Arthrites puriformes aseptiques dans la dracunculose chez le Noir. . . . . [23], 1020
Huchard (G.). — Quelques considérations sur l'emploi du « Trépol » dans le traitement de la syphilis . . . . [15], 364
—. Évolution de la peste au Sénégal (Discussion). . . [16], 373
—. A propos de quelques cas heureux de vaccinothérapie. . . . . [16], 531
—. Hémoglobinurie et quininothérapie . . . . . [18], 289
—. A propos d'un nouveau cas d'hémoglobinurie paludéenne . . . . . [18], 590
—. Pyodermite rebelle rapidement guérie par des pansements spécifiques d'après la méthode de Besredka . [20], 846
—. Six cas de tétanos infantile traités par la sérothérapie (ancien sérum antitétanique de l'Institut Pasteur) suivis de guérison (Discussion). . [21], 82
—. Présentations de sujets atteints de malformations congénitales . . . . . [21], 289
— et Leger (M.). — Contribution à l'étude de la tuberculose au Sénégal : cuti-réaction chez les enfants de Dakar. . . . . [13], 344
—, — et Baury (A.). — Un cas de sporotrichose pulmonaire . . . . . [13], 337
Hudellet (G.). — Cataracte de Morgagni. . . . . [13], 501
—. Lèpre et Aïnhum . . [13], 648
—. Lésions osseuses dans l'Aïnhum . . . . . [13], 330
—. Néoplasmes de l'œsophage . . . . . [13], 363
—. Ossification de la choroïde. . . . . [13], 872
— Épithélioma de la paupière . . . . . [16], 270
—. Un cas de polydactylie (8 orteils) . . . . . [16], 369
—. Volumineux fibrome naso-pharyngien . . . . [16], 278
—. Présentation de radiographies . . . . . [19], 312
— et Lauret. — Un cas d'Aïnhum. . . . . [4], 364
— et Lhuerre. — Fracture de l'aileron gauche du sacrum avec diastasis de la symphise pubienne . . . . . [13], 770
— et —. Un cas d'anévrisme de l'aorte abdominale . . [16], 149
— et Moreau (G.). — Contribution au diagnostic précoce de la lèpre par les rayons X. . . . . [18], 757
—, Nogue (M.) et Leger (M.). — Un cas de leucémie lymphoïde à type splénique pur. . . . . [15], 517
Huet et Denier (A.). — La dysenterie à Saïgon . [5], 263 ; . . . . . [6], 413
Huet et Gontier. — Un cas de cancer primitif du foie . [17], 508
Huot. — A propos d'un suc ganglionnaire particulièrement riche en *Trypanosoma gambiense* (Discussion). . . . . [18], 117
Husnot (P.) et Leger (A.). — Quelques hématozoaires d'un rapace diurne (*Melierax gabar*) . . . . . [3], 74

I

Iatzenko (Th. I.). — Sur la zoophilie de l'*Anopheles maculipennis* en Ukraine . . [21], 322
Iman (T.), Noc (F.) et Stevenel (L.). — Prophylaxie et traitement de la syphilis et du Pian à la Martinique par le 606. . . . . [4], 363
Intosh (Mc) et Levaditi (C.). — Mécanisme de la création des races de Trypanosomes résistantes aux anticorps . [3], 368
Isambert. — Nouveau vaccinateur . . . . . [2], 59
Ismert (R.), Sergent (Edm.) et Lhéritier (A.). — Piroplasmose en Algérie . . . . [6], 571
Iroustéguy, Zottner (G.) et Velu (H.). — Essais de traitement de la theilériose bovine nord-africaine par l'antimosane . . . . . [25], 136
Iwanoff (Mlle P.-S.), Yakimoff (W.-L.), Kédrinsky (A.-J.), Mlles Afanassieff (J.-A.) et Swirssky (S.-A.). — Le traitement de la babésiellose des bovidés par les sels d'argent. . . . . [19], 887

Iwantchikoff (M.-F.), Wassiliewsky (Mlle W.-J.), Yakimoff (W.-L.), Rastegaieff (Mlle E.-F.), Oulassewitch (J.-S.) et Zawialoff (B.-W.). — Action de l'Ichtargan et du Luargol dans la piroplasmose bovine . . . . . [18], 51

J

Jacotot (H.). — Recherches sur la transmission par la voie digestive de la pasteurellose des grands ruminants. . . [19], 853
—. *Id.* (*Suite*) . . . . . [19], 910
—. Sur l'état d'infection inapparente dans la peste bovine. . . . . [22], 239
—. Sur les formes de l'immunité dans la peste bovine. . [22], 242
—. Sur la vaccination contre la peste bovine au moyen de pulpes organiques. . . . [22], 310
—. Essais d'utilisation des pulpes d'organes à la préparation des bœufs fournisseurs du sérum antipestique. . . . . [22], 313
—. Essais de traitement du Surra par l'emploi du 309 associé au bismuth. . . . [22], 669
—. Sur la chimiothérapie préventive du Surra équin. [23], 368
—. Recherches sur la chimiothérapie du Surra . . . [23], 393
—. Sur la sensibilité du lapin au virus de la peste bovine . . . . . [23], 904
—. Sur la teneur en virus de quelques tissus de veaux atteints de peste bovine expérimentale . . . . . [24], 21
—. Existe-t-il en Indochine des porteurs de virus pestique ? . . . . . [24], 51
—. L'infection pestique qui entraîne l'avortement peut-elle être propagée par le fœtus et par la femelle qui l'a expulsé ? . . . . . [24], 74
—. Existe-t-il en Indochine plusieurs virus pestiques ? [24], 521
—. Le traitement du Surra équin par le naganol . . . . [24], 563
—. Recherches sur la vaccination contre la peste bovine. [24], 789
—. Sur la prévention du Surra équin par le naganol en Indochine . . . . . [24], 840
— et Evanno (Ch.). — Premiers cas de clavelée en Indochine . . . . . [23], 804
— et —. Premières observations d'anaplasmose en Indochine . . . . . [24], 104
Jalabert (H.) et Velu (H.). — Toxicité des jus de férule pour le lapin et le porc . . [19], 22
Jamot (E.). — Note au sujet d'une maladie contagieuse désignée par les Bandas Lindas du Xouango (Oubanghi-Chari) sous le nom de Dacaga. [11], 862
—. Essai de prophylaxie médicale de la maladie du sommeil dans l'Oubanghi-Chari . [13], 343
—. État sanitaire et dépopulation au Congo . . . . [13], 127
—. Un nouveau foyer de trypanosomiase humaine au Tchad. . . . . [16], 93
—. La maladie du sommeil au Cameroun. . . . . [18], 762
—. Au sujet du traitement prophylactique de la maladie du sommeil . . . . . [19], 463
—. Tryparsamide (Discussion) . . . . . [19], 275
—. La maladie du sommeil au Cameroun en janvier 1929 . . . . . [22], 473
—. Note sur des essais de quininisation préventive et curative au Cameroun. . . [22], 555
—. Les arsénobenzènes aux Colonies : leur emploi raisonné et dûment contrôlé (Discussion). . . . . [24], 404
—. Infection et réinfection trypaniques chez un Européen (auto-observation) (Discussion) . . . . . [25], 666
— et Chambon. — Contribution à l'étude du pouvoir préventif du 205 Bayer-309 Fourneau, contre la maladie du sommeil. . . . . [23], 491
—, Letonturier et Marqueissac (de). — Essai de tryparsamide dans la trypanosomiase humaine à virus *gambiense* . [17], 692
—, Robert (M.-J.-F.) et Motais (F.). — Notes sur la géographie médicale du Ouadaï. . . . . [7], 522
— et Roubaud (E.). — Présence d'*Onchocerca volvulus* dans un abcès sus-pubien . . . [13], 252
— et Vernon. — Nouvel essai de la tryparsamide dans le traitement des formes avancées de la trypanosomiase humaine . . . . . [20], 689
Jannot (A.). — Infection de la souris avec le virus de la leishmaniose canine naturelle . . . . . [6], 683
Javelly (M.). — Renseignements démographiques sur Dakar en 1921. . . . . [15], 667
— et Bergonier. — Notes sur l'organisation du Service de

Prophylaxie antipesteuse à Dakar . . . . . [13], 661
— et Lebœuf (A.). — Un cas de filariose chez un Européen en Nouvelle-Calédonie . [4], 202
— et —. Sur la présence de bacilles de Hansen dans les ganglions superficiels de sujets sains en apparence . . [6], 607
Jeanselme (A.). — Alcoolisme (Discussion) . . . . . [2], 346
—. Bouton d'Orient (Discussion). . . . . [2], 93
—. Contagion de la lèpre par le coït. . . . . [2], 201
—. Le Goundou ne paraît pas d'origine pianique. . . [2], 219
—. Rapport. . . . . [2], 67
—. Lèpre (Discussion). [2], 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, ... 178, 180, 182, 183
—. Le Béribéri (Discussion) . . . . . [3], 130
—. L'enfant issu d'une lépreuse peut-il être allaité par une nourrice ? . . . . . [3], 326
—. Contagion de la lèpre (Discussion) . . . . . [3], 414
—. L'afflux des lépreux étrangers à Paris . . . . [3], 701
—. A propos du procès-verbal . . . . . [4], 1
—. Rapport au nom de la Commission de Prophylaxie de la Lèpre . . . . . [4], 9
—. Sur la lèpre pulmonaire . . . . . [4], 65
—. Opinions et travaux des médecins japonais sur l'origine du Béribéri . . . . . [4], 604
—. *Buba brasiliensis* (Discussion) . . . . . [5], 489
—. Lèpre ganglionnaire (Discussion) . . . . . [5], 702
—. Guérison de la lèpre (Discussion) . . . . . [5], 707
—. De la prophylaxie antisyphilitique réalisée par le salvarsan . . . . . [6], 102
—. Emploi du salvarsan (Discussion) . . . . . [6], 239
—. Leishmaniose cutanée à foyers multiples améliorée par le salvarsan. . . . . [7], 36
—. De l'uréthrite lépreuse [7], 537
—. Sur la structure des nodosités juxta-articulaires. . [9], 287
—. Répartition des eaux minérales et de l'endémie goitreuse au Yunnan . . . . . [9], 414
—. Note sur la fréquence de la lèpre parmi les recrues coloniales . . . . . [9], 685
—. Cas de paludisme autochtone contracté en France au contact des troupes indigènes . [9], 693
—. Nodosités juxta-articulaires, sur les tirailleurs sénégalais . . . . . [10], 137
—. La lèpre est-elle mentionnée dans les textes sacrés de l'Inde antique ? . . . . . [24], 362
—, Mauclaire et Guillier. — La lèpre est-elle toujours incurable ? . . . . . [5], 196
— et Vernes (A.). — Réaction de Wassermann et réaction d'Eitner chez les syphilitiques et les lépreux . . . . . [8], 259
Jeaume (G.). — Un cas de leishmaniose naturelle généralisée chez le chien au Maroc. [23], 225
— et Dekster (H.). — Cas multiples d'une blastomycose des voies lacrymales observée chez les ânes dans la région de Fez (Maroc) . . . . . [16], 478
— et —. Isolement de l'agent pathogène de la blastomycose des voies lacrymales. . [18], 124
Jemma (R.). — Courte notice historique sur l'emploi de l'antimoine dans le traitement de la leishmaniose interne. [10], 762
Jimenez (J.). — Observation d'une épidémie de peste dans le port de Malaga (juin-septembre 1923) . . . . . [17], 20
Jimenez Gaona (R.) et Delamare (G.). — Lignes rouges et lignes blanches, réactions nulles des lépreux . . . . . [25], 200
Joannidès (G.), Caminopetros (J.) et Blanc (G.). — Chronique de l'actinomycose en Grèce . . . . . [21], 432
—, Pangalos (G.-C.) et Blanc (G.). — La réaction de fixation du complément appliquée au sérodiagnostic de la lèpre avec un antigène méthylique du bacille de Kedrowsky . . . . [23], 568
—, Papagheorghiou (S.) et Angelo (Mlle A.). — Chronique de l'actinomycose en Grèce. . [24], 432
Jojot (Ch.). — Observation de nodosités juxta-articulaires (avec pl. VI) . . . . [9], 211
—. Note sur la lutte contre la maladie du sommeil au Cameroun 1913-1914 . . . . [9], 303
—. Aperçu médical sur la campagne du Cameroun de 1914-1916. . . . . [9], 584
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun en 1920-1921 . . . . . [15], 830
— et Laigret. — Un cas de tumeurs superficielles multiples observées au Cameroun. [15], 956
Jolly (R.). — Sur une adénite à *Nocardia* ayant simulé un bubon pesteux . . . . [12], 60
—, Allain et Toullec. — Anémie pernicieuse paludéenne. [24], 912

— et PUYHAUBERT. — Note sur un cas de mycétome à grains noirs . . . . . [12], 57
—, TEISSONNIÈRE et BÉGUET (M.). — Remarques sur les hémocultures pratiquées au Laboratoire de Bactériologie de l'Armée d'Orient du mois de juin au mois de décembre 1917. . . . . [11], 434
—. — et —. Observation d'une épidémie de grippe à l'Armée d'Orient (mai-juin 1917) [11], 738
— et TOULLEC (F.). — Le dépistage de la tuberculose chez les Noirs par la séro-floculation à la résorcine . . . . . [23], 549
— et —. Note sur la tuberculose en Côte d'Ivoire . . . [23], 679
JONCHÈRE, LEBON (J.), LEGER (Marcel et DESCUNS. — Le traitement du paludisme aux Thermes d'Encausse. . . . [22], 938
JOUENNE. — Index paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison (Discussion) . . . . . [16], 213
—. Présentation de pièces anatomiques. . . . . [18], 288
—. Un cas de mycétome à grains rouges. . . . . [8], 649
— et BAURY (A.). — Infection utérine rapidement guérie par des pansements à l'antivirus Besredka . . . . . [22], 497
— et GUILLET (R.). — Deux cas d'améliorations de lèpre après traitement par le B. C. G. . . . . [20], 91
JOUIN (A.). — De la gravité de la pneumonie chez les Noirs, les Malgaches et la fréquence de la mort subite au cours de cette infection par dilatation cardiaque aiguë consécutive à une paralysie des centres nerveux du cœur . . . . [20], 774
—. Un cas de diarrhée chronique des pays chauds guérie par l'héliothérapie marine aidée de la thermothérapie (méthode du Dr Miramond de Laroquette). . . . . [11], 18
—. De la fréquence des lipomes chez les Malgaches : leur variété, siège. Étiologie. Pathogénie . . . . . [11], 113
—. Des complications pneumococciques extra-pulmonaires chez les Noirs, les Malgaches en particulier (néphrite et hépatite toxi-infectieuses). [11], 159
—. Remarques sur la moindre résistance des gonocoques chez les Noirs. Résultats comparatifs du même traitement chez les Noirs et chez les Blancs. . . . . [11], 438
JOUKOWSKY (A.), YAKIMOFF (W.-L.) et SCHIRWIND (S.). — Epidémie d'angine de Vincent. . . . . [14], 631
—, SCHIRWIND (S.) et YAKIMOFF (W.-L.). — A propos de l'angine de Vincent . . . [16], 236
—, —et —. Au sujet de l'angine de Vincent . . . . . [18], 304
JOURDAN. — Tremblement héréditaire (Discussion) . . . [15], 758
JOUSSET et GIRARD. — Un cas de méningite cérébro-spinale à bacille de Pfeiffer . . . [18], 448
JOUVEAU-DUBREUIL (H.). — Note sur la fièvre récurrente au Setchouen (Chine Occidentale). . . . . [4], 510
—. Helminthiase intestinale et hépatique dans la population chinoise de Tchentou . [6], 704
—. Ulcère phagédénique à Tchentou (Chine) . . . . . [7], 469
—. Note sur le trachome au Sétchouen (Chine). . . [11], 815
—. Formule leucocytaire et diminution des éosinophiles dans la fièvre récurrente . . . [12], 621
—. Méningite cérébro-spinale au Setchouen (Chine occidentale). . . . . [12], 356
—. Étude clinique de la fièvre récurrente du Setchouen (Chine occidentale). . . . [13], 38
—. La variolisation au Setchouen . . . . . [14], 93
—. Le Bériberi au Setchouen. . . . . [14], 666
JOYEUX (Ch.). — Notes sur quelques cas de bilharziose observés à Kouroussa (Guinée française) . . . . . [5], 504
—. Notes sur le *Bacillus duboscqui* n. sp., de l'intestin du rat africain *Golunda campanæ* . . . . . [5], 703
—. *Necator americanus* en Haute-Guinée . . . . . [5], 843
—. Note sur quelques Protozoaires sanguicoles et intestinaux observés en Guinée française. . . . . [6], 612
—. Contribution à l'étude des nodosités juxta-articulaires. . . . . [6], 711
—. Sur quelques Arthropodes récoltés en Haute-Guinée française . . . . . [8], 636
—. Nodosités juxta-articulaires (Discussion) . . . . . [9], 290
—. Sur le cycle évolutif de quelques Cestodes. Note préliminaire . . . . . [9], 578
—. Note sur les Culicides en Macédoine. . . . . [11], 330
—. *Hymenolepis nana* v. Siebold, 1852 et *Hymenolepis*

nana var. *fraterna* Stiles, 1906. . . . . [12], 228
—. Développement direct d'un *Hymenolepis* (Ténia dés) dans les villosités intestinales du hérisson . . . . . [14], 386
—. Culicides récoltés par la Mission antipaludique de l'Armée d'Orient en 1918 . . . [13], 117
—. Enkystement d'une Cercaire du type *Cercaria armata* chez un Turbellarié d'eau douce . . . . . [13], 182
—. Recherches sur les Notocotyles . . . . . [15], 331
—. Recherches sur les Ténias des Ansériformes. Développement larvaire d'*Hymenolepis parvula* Kow. chez *Herpobdella octoculata* (L.) (Hirudinée) . . . . . [15], 46
—. Existence d'*Hymenolepis nana* (Von Siebold, 1852) en Cochinchine (Discussion) . [18], 723
—. *Diphyllobotrium mansoni* (Cobbold, 1883) (*Note préliminaire*) . . . . . [20], 226
— et BAER (J.-G.). — Sur quelques larves de Botriocéphales. . . . . [20], 921
— et —. Note sur quelques Helminthes récoltés en Macédoine. . . . . [21], 214
— et —. Les Cestodes rares de l'homme . . . . . [22], 114
— et —. *Id.* (Discussion). [22], 331
— et —. *Railletina* (*Railletina*) *celebensis* Janicki 1902 et *Raill.* (*Raill.*) *baeri* Meggit et Lubramanian 1927. . . . . [22], 675
— et —. Sur la présence du Nématode, *Crassicauda crassicauda* (Creplin, 1829) chez un dauphin des côtes de la France . . . . . [24], 198
— et —. Recherches sur les Cestodes appartenant au genre *Mesocestoides* Vaillant . [23], 993
— et BRUMPT (E.). — Infusoire nouveau, parasite du chimpanzé *Trogloditella abrassarti*, n. g., n. sp. . . . . [5], 499
— et BRUYANT (L.). — Un nouveau rouget des animaux en Guinée française . . [6], 202
— et DALLE (M.). — Notes sur l'état sanitaire dans un camp de prisonniers en Allemagne . . . . . [8], 347
— et HENRY (A.). — Contribution à la faune helminthologique de la Haute-Guinée française . . . . . [13], 176
— et MARCADE. — Larves de *Porocephalus armillatus* [11], 60
—, DU NOYER (R.) et BAER (J.-C.). — L'activité génitale des métacercaires progénétiques. . . . . [23], 967
— et PARROT (L.). — Les cysticercoïdes de *Tarentola mauritanica* L. et les Ténias du chat . . . . . [13], 687
—, RAILLET (A.) et HENRY (A.). — Sur deux Trématodes des Primates . . . . . [5], 833
—, — et —. Un nouveau Strongylidé des singes . . . [6], 264
—, TRAN-DINH-QUÉ et PHAM-QUANG-ANH. — Volumineux fibrome périostique intrathoracique et tuberculose pulmonaire concomitante . . . . . [22], 778

K

KARTULIS. — Présentation d'échantillons de *Bilharzia hæmatobia* adultes . . . . [1], 317
KATSCHAKHIDZÉ (W.-A.). — Les oiseaux rapaces et le charbon bactéridien . . . . . [19], 519
KAZANSKY (J.-J.). — Sur la résistance de *Trypanosoma equiperdum* vis-à-vis du « Bayer 205 » (Naganol) . . . [20], 413
KÉDRINSKY (W.-A.), YAKIMOFF (W.-L.), Mlles AFANASSIEFF (J.-A.), IWANOFF (P.-S.) et SWIRSSKY (S.-A.). — Le traitement de la babésiellose des bovidés par les sels d'argent . . . [19], 887
KERANDEL (J.). — Note sur la prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo (Haute-Sangha et Logone) . . [1], 261
—. Trypanosomiase des Mammifères au Congo français (Haute-Sangha, Logone, Ouhame) . . . . . [1], 515
—. Diarrhée dans la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [2], 316
—. Dyspnée tropicale . . [2], 444
—. Sur quelques hématozoaires observés au Congo . . [2], 204
—. Un cas de trypanosomiase chez un médecin . . . [3], 642
—. Insectivore réservoir de virus de la peste au Cambodge. . . . . [8], 54
—. Polynévrite palustre simulant le Béribéri (Discussion). . . . . [9], 646
—. Craw-craw (Discussion) . . . . . [10], 808
— Riziculture et distribution géographique du paludisme en Indochine. Insectes prédateurs de larves de moustiques . . . . . [18], 813
—. Sur la bouffissure d'Annam et sa pathogénie . . . [19], 302
— et MESNIL (F.). — Sur l'ac-

tion préventive et curative de l'Arsénophénylglycine dans les trypanosomiases expérimentales et en particulier dans les infections à *Tr. gambiense*. . . . . [2], 402
— et —. Action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les trypanosomiases . . . . . [3], 732
— et MORAX. — Un cas de cyclite dans la trypanosomiase humaine . . . . . [1], 398
KERMORGANT. — Présentation d'une circulaire ministérielle sur les Trypanosomiases . . . . . [1], 247
—. Rapport sur la prophylaxie de la maladie du sommeil. . . . . [1], 319
—. Historique de la fièvre jaune à la Martinique . . . [1], 630
—. L'alcoolisme dans les colonies françaises . . [2], 330, 346
—. Rapport sur la lèpre. [2], 67
—. Rapport sur la quinine . . . . . [2], 225
—. Rapport sur une lettre de M. Raynaud, au sujet de l'emploi des troupes noires du Sénégal en Algérie . . [3], 209
—. Vote des conclusions du rapport de M. Kermorgant au sujet de l'emploi des troupes noires du Sénégal en Algérie. . . . . [3], 289
—. Lèpre (Discussion) . . [4], 70
KERMORGANT et LAVERAN. — Rapport sur la prophylaxie de la maladie du sommeil . . [1], 319
KERNEIS (J.). — Observation clinique du malade qui a présenté l'infection à *Pasteurella*. . . . . [15], 495
— et BLIN (G.). — Note concernant le premier cas de maladie du sommeil constaté chez un Européen en Guinée française. . . . . [9], 231
—, MONFORT (F.) et HECKENROTH (F.). — Quelques remarques sur le Pian au Congo français. Emploi du 606 . . . . . [6], 243
KERREST (J.), BOURON (A.) et GAMBIER (A.). — La fièvre récurrente au Soudan . . . [15], 320
KERVRANN (P.). — Emploi du monochlorure d'iode en irrigation continue . . . . . [12], 54
KHALIL (M. BEY) et HASSAN (A.). — The Serum Globulin in Human Schistosomiasis . . . [25], 149
— et —. Recherches sur la globuline du sérum au cours des schistosomoses . . . . [25], 166
KHOURI (J.) (d'Alexandrie). — Recherches sur l'hématurie en Egypte. . . . . [17], 811
—. Quelques observations parasitologiques et biochimiques concernant l'urine dans la fièvre « Dengue » . . . [21], 92
—. Deux cas de bilharziose vésicale avec présence simultanée dans les urines d'œufs à éperon polaire et latéral . [21], 771
—. Sur un cas rare d'infestation intestinale simultanée par *Schistosomum mansoni* et par *Sch. hæmatobium*. . . [21], 772
—. Contribution à l'étiologie de la dysenterie en Egypte. [22], 8
—. Sur un cas d'hématurie avec présence d'Amibes (?) dans les urines. . . . . [22], 188
—. Contribution à l'étude de la rage en A. O. F. Transmission de la rage du chien (Oulou fato) à l'homme et au guépard (Discussion) . . . . . [22], 638
KIÉU-THÊN-THÌ, NGUYÊN-VAN-DÊN, NGUYÊN-TRUNG-TRUYÊN, PEYTAVIN et BROUIN. — Contribution à l'étude du Surra d'Indochine. . . . . [19], 746
KIEWIET DE JONCHE (G.-H.). — Vaccination anticholérique à Java. . . . . [5], 4
—. Travaux de GRIJNS sur le Béribéri . . . . . [5], 54
—. Notes sur les travaux publiés aux Indes Néerlandaises sur l'étiologie et la pathogénie du Béribéri. . . . . [4], 258
KIPCHIDZÉ (N.). — Recherches sur la culture de *Trichomonas elongata* . . . . . [23], 216
KNAFF-LENZ (E. VON) et LEVADITI (C.). — Sort de l'arsenic injecté dans la circulation générale des animaux neufs et trypanosomés . . . . . [2], 405
KOCK (DE) et QUINLAN. — A short preliminary communication on Anaplasmosis of sheep as observed in South Africa . [17], 651
KOHL-YAKIMOFF (Nina) et YAKIMOFF (W.-L.). — Action du 606 sur la maladie du sommeil expérimentale . . . . . [3], 526
— et —. Emploi de l'arsénobenzol 606 sous forme d'onguent . . . . . [3], 618
— et —. Nouvelle communication relative au traitement de la maladie du sommeil et de la tick-fever par le 606 . . [4], 141
— et —. Présence de Trypanosomes dans le sang des bovidés à Tunis . . . . . [4], 309
—. Piroplasmose des zébus en Tunisie. . . . . [4], 451
— et —. Leishmaniose canine à Tunis . . . . . [4], 452
— et —. Un cas de toxoplasmose canine en Allemagne . [4], 617

— et —. Sur la question des Ixodidés de Russie . . . [5], 194
— et —. Infection des souris blanches par les cultures de *Leishmania infantum* Nicolle (Ch.) . . . . . [5], 218
— et —. L'infection des animaux de laboratoire par *Leishmania infantum*. . . . . [5], 335
—, Manceaux (L.) et Yakimoff (W.-L.). — Culture et morphologie du Trypanosome du type *theileri*, des bœufs tunisiens . . . . . [4], 378
—, Yakimoff (W.-L.) et Bekensky (P.-W.). — Le Trypanosome des bovidés en Russie d'Europe . . . . . [6], 433
—, — et Schokhor (N.-J.). — Leishmaniose canine à Taschkent. . . . . [6], 432
—, — et —. Le Trypanosome des bovidés au Turkestan . [6], 434
—, — et Winogradoff (A.-A.). — *Argas persicus persicus* Fischer-Waldheim, en Russie d'Europe . . . . . [5], 39
Kolpakoff (Mlle T.-A.). — Le rôle du suc gastrique dans l'immunité naturelle des lapins dans la coccidiose. . . . . [19], 266
Kolpakoff (F.-A.) et Yakimoff (W.). — Les colites de l'homme dues aux Protozoaires. . . . . [14], 548
Kolochine (G.), Martin-Charpenel (G.) et Mathis (M.). — Adaptation du virus amaril à la souris blanche . . . . . [25], 113
—, — et —. Vérification d'une souche de virus amaril adaptée à la souris blanche . . [25], 533
Kopkes (Ayres). — Injections sous-arachnoïdiennes de néosalvarsan (Discussion) . [7], 257
—. Les troubles oculaires dans la maladie du sommeil . [15], 139
Korniloff (M.-T.), Zwietkoff (N.-L.), Yakimoff (W.-L.) et Wassiliewsky (Mlle W.-J.). — Flagellés de l'intestin des animaux de laboratoire . . . . [14], 558
Koselkine (P.-M.), Winogradoff (W.-W.), Démidoff (A.-P.), Yakimoff (W.-L.) et Schokhor (N.-I.). — La microfilariose des chevaux au Turkestan . [7], 189
—, Yakimoff (W.-L.), Schokhor (N.-J.) et coll. — Microfilaire des bovidés au Turkestan russe . . . . . [10], 104
Koulecha, Yakovlew, Zabolotny et Zlatogoreff. — Épidémie actuelle de choléra à Saint-Pétersbourg, d'après les renseignements des laboratoires municipaux . . . . . [2], 276
Koun (Dr). — Évolution du paludisme dans la ville et les environs de Hué. . . . . [19], 335
Koun (L.) et Bernard (P.-N.). — Parasitisme intestinal en Annam. . . . . [6], 343
—, Meslin (Ch.) et Bernard (N.). — Note sur la tuberculose à Hué. . . . . [4], 550
—, — et —. Épidémiologie de la tuberculose en Annam. [5], 234
— et Rafidison. — Vaccinothérapie et vaccinoprophylaxie antipneumococcique à Tananarive. . . . . [19], 521
Krick (M.). — La tuberculose bovine dans la région Ouest Sakalave . . . . . [23], 250
Krolunitzki et Ravaut (P.). — L'emploi du novarsénobenzol dans le traitement de la dysenterie amibienne . . . [9], 510

L

Labernadie (V.-G.-F.). — Quelques remarques sur le paludisme en Guyane . . [19], 213
—. Contribution à l'étude de la lèpre en Guyane française. . . . . [20], 306
—. La lèpre en Guyane française (*Deuxième mémoire*). . [20], 489
—. *Id.* (*Troisième mémoire*) . . . . . [20], 623
—. *Id.* (*Troisième mémoire*) (*Suite*). . . . . [20], 771
—. Contribution à l'étude de la première enfance à Cayenne. . . . . [20], 991
—. De l'ancienneté de la lèpre d'après les Védas. . . [21], 175
—. Parasitisme intestinal à Pondichéry . . . . . [21], 318
—. Procédé de palpation du foie . . . . . [22], 553
—. Premiers essais sur l'action antilépreuse de l'huile d'*Hydnocarpus wightiana* irradiée ou additionnée d'ergostérine irradiée . . . . . [22], 739
—. Syndrome exanthématique au cours d'une épidémie de Dengue . . . . . [25], 7
— et André (Z.). — Recherches sur la sédimentation globulaire chez les lépreux . [20], 839
— et —. Recherches sérologiques dans la lèpre (Réaction de Matefy, de Wassermann) . . . . . [20], 950
— et —. Utilisation du photomètre Vernes-Bricq-Yvon pour éviter certaines causes d'erreur dans le diagnostic du Kala-azar par la réaction de

précipitation de Choppa et Gupta . . . . . [23], 29
— et Aubin. — Le réflexe oculo-cardiaque chez les lépreux. . . . . [23], 441
— et Laffitte (N.). — Traitement de la lèpre par l'huile d'*Hydnocarpus wightiana* (Bl.) (*Note préliminaire*) . . [20], 710
— et —. Une réserve sur la valeur de la réaction de Choppa et Gupta (Kala-azar). . [22], 77
— et Marneffe (H.). — Etude sur le parasitisme intestinal à Cayenne . . . . . [22], 568
— et Peyre (E.). — Apparition de la broncho-spirochétose en Guyane française. . . [16], 476
— et —. Importance de l'examen du sang pour le diagnostic du saturnisme . . . . . [16], 348
Labounoïtte (X.) et Delanoë (M. et Mme). — Au sujet de la fièvre ondulante à Mazagan. . . . . [9], 207
Labrousse (F.). — Nouvelle espèce américaine du genre *Phlebotomus*. . . . . [13], 659
Lacassagne (A.). — Considérations pratiques sur la prophylaxie et le traitement des paludéens en Macédoine . . [10], 923
La Cava (F.). — De la leishmaniose des muqueuses et de la première découverte de la *Leishmania tropica* flagellée dans le corps humain . [5], 808
—. Sopra un caso autoctono di beriberi nell'Italia meridionale (avec résumé français). [8], 218
Lacaze (H.). — Note au sujet de l'hibernation des larves de moustiques en Macédoine . . . . . [11], 729
—. L'étude des réservoirs indigènes de virus malarique en Macédoine . . . . . [11], 759
Lacroix (A.) et Montpellier (J.). — Le Craw-craw ou gale filarienne ; son origine dans les kystes sous-cutanés à *Onchocerca volvulus* . . . . [13], 305
— et —. Encore un mycétome du pied, type du « pied de Madura » observé en Algérie et dû au *Nocardia maduræ* [14], 357
— et —. Nouvelle note au sujet de la « gale filarienne » [15], 815
—, — et Degouillon. — La gale filarienne est-elle bien une manifestation de volvulose ? . . . . . [13], 530
—, — et —. Note complémentaire sur la gale filarienne et son évolution . . . . [14], 211
—, — et Raynaud (M.). — Un cas de mycétome du pied à *Nocardia maduræ* chez un indigène algérien . . . . . [15], 379
—, — et —. Phagédénisme chronique serpigineux de l'aine (ulcère spongieux vénérien) . . . . . [15], 641
Laffitte (N.) et Labernadie (V.). — Traitement de la lèpre par l'huile d'*Hydnocarpus wightiana* (Bl.) (*Note préliminaire*). . . . . [20], 710
— et —. Une réserve sur la valeur de la réaction de Choppa et Gupta (Kala-azar). . [22], 77
Lafont (A.). — Présence de flagellés parasites dans le latex d'Euphorbes. . . . . [2], 344
—. Observations sur *Leptomonas davidi* . . . . . [4], 464
—. Mycétome à grains rouges (Discussion). . . . . [8], 628
—. Une épidémie de peste humaine à Dakar (avril 1914-février 1915). . . . . [8], 660
—. A propos d'un essai de vaccination antiméningococcique au Tonkin. . . . . [16], 715
—. A propos d'une épidémie de scarlatine à Yunnanfou [16], 767
—. Formules et numérations leucocytaires aux Colonies. Leur importance pour le diagnostic des suppurations profondes et particulièrement des abcès du foie . . . . . [16], 693
— et Castel. — Cas de peste traités par le sérum antipesteux. . . . . [2], 193
— et Clarenc. — *Fibro-molluscum multiforme* . . . [2], 73
— et Dupont (V.). — Traitement de la maladie du sommeil au Sénégal par le ludyl et le galyl . . . . . [7], 160, 640
— et —. Action comparée, *in vivo*, chez le rat blanc, de l'atoxyl, du salvarsan, du néosalvarsan, du galyl et du ludyl sur *Tr. gambiense* et *Tr. rhodesiense* . . . . . [8], 37
— et —. Affections oculaires rencontrées en A. O. F. et essais de traitement par les sérums thérapeutiques seuls ou associés aux injections intraveineuses de ludyl et de galyl . . . . . [8], 404, 537
— et Heckenroth (F.). — Un cas de leishmaniose canine à Dakar . . . . . [8], 162
—, Lecomte (A.) et Heckenroth (F.). — Une observation de méningite cérébro-spinale à Dakar, causée par le bacille de Yersin . . . . . [8], 92
— et Roubaud (E.). — Expériences de transmission des Trypa-

nosomes humains par le *Stegomyia fasciata* . . . [7], 49
LAGANE (L.). — Bacillurie provoquée dans la lèpre . . [5], 784
— et COLOMBIER (P.). — Formule sanguine de lépreux séjournant en France . . . . . [6], 418
—. Pouls lent dans la trypanosomiase humaine . . . [6], 269
— et VEILLON (A.). — Action défavorable de l'arsénobenzol dans la lèpre . . . . [6], 415
LAGOANÈRE (J.-L. DE) et ANDERSON (Ch.). — A propos de la bilharziose en Tunisie. Nouveaux essais d'infestation de *Bullimus brochii* avec des œufs de *Schistosomum hæmatobium* . . . . . [20], 23
— et BURNET (Et.). — Pouvoir pathogène du *M. melitensis* et du *B. abortus* pour le rat et la souris . . . . . [17], 465
LAGRANGE (E.). — Contribution à l'étude des Trématodes larvaires . . . . . [12], 383
—. Sur un cas de bilharziose intestinale à *Schistosomum hæmatobium* . . . . . [13], 28
—. Contribution à l'étude des piroplasmoses des bovidés . . . . . [15], 295
—. A propos d'un cas de pseudo-typhus en Annam. . . [16], 105
—. Observations sur les Trématodes d'Indochine. . . [16], 173
—. Sur un Trichocéphalidé du rat, à Shanghaï, *Hepaticola hepatica* Hall, 1916 . . [17], 658
—. A propos de quelques observations de l'abcès de la rate. . . . . [19], 421
—. Les formes pulmonaires de la fièvre récurrente . . [20], 716
—. Étude bactériologique de la *bousa* (bière indigène d'Egypte) . . . . . [21], 537
—. Études sur la phase nerveuse de la fièvre récurrente expérimentale à *Spirochæta duttoni*. . . . . [21], 804
—. Une nouvelle maladie des poules à virus filtrable observée en Égypte . . . . [22], 64
—. La digestion du papier chez la chèvre d'Egypte . . [22], 81
LACRIFFOUL (A.) et PICARD (F.). — Remarques sur le paludisme dans la XVIe Région. Cas autochtone à *Plasmodium præcox*. . . . . [10], 883
— et —. Mode d'action du climat sur la répartition géographique du paludisme . [11], 73
LAIGRET. —. Un cas d'onchocercose observé à l'hôpital de Brazzaville . . . . . [15], 303
—. Tryparsamide (Discussion). . . . . [19], 275
—. Au sujet du traitement prophylactique de la maladie du sommeil (Discussion). . [19], 471
—. Péricardite au cours d'une dysenterie amibienne . [21], 753
—. Onchocercose humaine et éléphantiasis au Soudan français. . . . . [22], 499
— et DERVISH (J.). — Contribution à l'étude des modes de disparition des Trypanosomes des souris sous l'action de divers médicaments actifs : émétique, 189, 205 Bayer. . . . . [16], 770
— et BLANCHARD (M.). — Sur quelques cas de guérison de la trypanosomiase humaine à la deuxième période. [17], 368
— et —. Recherches sur la transmission d'*Onchocerca volvulus* par divers parasites hématophages. . . . . [17], 409
— et —. Sur la prophylaxie de la maladie du sommeil. A propos de la mission Schwetz au Congo belge . . . . [17], 485
— et —. Les plaies de la face dorsale des doigts et des mains par choc sur les arcades dentaires . . . . . [17], 528
— et —. Pseudo-helminthiase intestinale . . . . . [17], 583
— et —. Premiers essais du produit 309 dans quelques trypanosomiases expérimentales et en trypanosomiase humaine . . . . . [18], 410
—, — et LEFROU. — Note préliminaire sur des cas d'ictères épidémiques observés à Brazzaville (A. E. F.) . . . [15], 385
—, — et —. Spirochétose ictérigène épidémique observée sur des indigènes à Brazzaville (A. E. F.) . . . . . [16], 184
—, BOUCHER (H. LE), CAPÉRAN (G.) et TCHERNENKO (A.). — Note sur un cas d'ictère à vomissements noirs. . . . . [22], 642
— et DURAND (P.). — Réceptivité du rat blanc et de la gerbille au virus de la fièvre boutonneuse . . . . . [25], 106
— et JOJOT. — Un cas de tumeurs superficielles multiples observé au Cameroun [15]. 956
— et LEFROU. — Les pyohémies à abcès profonds . . . [15], 459
—, OUZILLEAU et LEFROU. — Contribution à l'étude de l'*Onchocerca volvulus*. . . [14], 717
LALLEMENT et DUFFAU. — Considérations sur une épidémie de peste à Oran . . . . [22], 193
LALUNG-BONNAIRE (P.). — Un pois-

son vivant, corps étranger du pharynx . . . . . [5], 41
—. Guérison par l'émétine d'un abcès du foie constitué (Discussion) . . . . . [25], 425
— et Bablet (J.). — Premiers résultats de l'enquête sur les tumeurs en Cochinchine . . .
—, —, Guérin (F.) et Pons (R.). . . . . [18], 495
— Examen radioscopique du cœur dans le Béribéri . [20], 131
—, Bernard (P.-Noël) et Pons (R.). — Les œdèmes dans le Béribéri . . . . . [20], 30
— et Chatton (E.). — Amibe limax, *Valkampfia*, n. g., dans l'intestin, son importance pour l'interprétation des Amibes de culture. . . . . [5], 135
— et Pons (R.). — Encéphalite léthargique en Cochinchine. . . . . [16], 399
— et —. Circulation et respiration dans le Béribéri. . [20], 132
Lambert (G.). — Étude d'eaux bicarbonatées sodiques du bassin de Thuyphong, province de Binh-Thuan (Annam) . [3], 349
Lambert (P.). — La méthode biologique d'épuration des eaux d'égouts en Indochine . . [4], 330
Lambert (L.). — Action thérapeutique du quiniostovarsol sur le *Plasmodium falciparum* . . . . . [21], 760
—. La tuberculose à l'hôpital central indigène de Dakar pendant l'année 1931. . . [25], 662
—. Sur un cas d'endocardite muligne à Streptocoques . . . . . [25], 668
—. La peste à l'hôpital central indigène en 1931 . . . [25], 671
—, Advier, Fournials et Cazanove. — Sur les événements sanitaires du mois écoulé (mars 1932) . . . . . [25], 669
—, Assali (J.) et Popoff (S.). — Traitement du tétanos par l'association urotropine et sérum. . . . . [24], 390
Lamoureux (A.). — Les conditions d'isolement des lépreux dans la région du plateau central à Madagascar . [3], 160
—. Les conditions d'isolement des lépreux dans la région du plateau central à Madagascar, province Antsirabé . . [3], 328
—. Sur une variété de lépride tégumentaire observée chez quelques lépreux à Madagascar . . . . . [3], 328
—. Un cas de paludisme chronique. . . . . [4], 296
—. Trois cas de fièvre récurrente à la côte Ouest de Madagascar. Inoculation positive à la souris . . . . . [5], 135
—. Un cas d'ascaridiase mortelle . . . . . [5], 842
—. Présence d'*Ornithodorus moubata* dans un foyer de fièvre récurrente à la côte Ouest de Madagascar . . . . . [6], 146
—. Fréquence du parasite intestinal sur les habitants de la Guinée Comore. . . . [6], 455
—. La fièvre récurrente de Madagascar. Clinique . . . [6], 523
—. Le paludisme autochtone de la région du lac Presba (Albanie du Sud) . . . . . [10], 707
—. L'hygiène à la Martinique en 1921 . . . . . [15], 179
—. Essais de traitement de la lèpre par des injections intraveineuses et par ingestion d'une émulsion d'huile de Chaulmoogra. . . . . [16], 227
—. Quelques considérations sur le traitement de la lèpre (Discussion) . . . . . [25], 410
— et Porry (Émile). — L'index endémique du paludisme à la Martinique . . . . . [12], 301
Lamy (P.). — L'épidémie de fièvre jaune et de peste en 1899 à la Côte d'Ivoire. . . . . [23], 891
Landes (L.). — Étude de quelques vibrions isolés au cours des poussées épidémiques du choléra de 1911-1912 en Algérie. . . . . [5], 792
Landes (L.), Lhéritier (A.) et Sergent (Ed.). — Absence d'immunité héréditaire à l'égard du *Trypanosoma soudanense* chez un chevreau né d'une chèvre immunisée envers ce *Trypanosome* . . . . . [8], 73
Lanfranchi (A.). — Diagnostic des trypanosomiases . . . [5], 611
—. L'oftalmo e l'intrapalpebroreazzione nella diagnosi e nella differenziazione di alcune tripanosomiasi (avec résumé français). . . . . [8], 112
—. Sur le passage des Trypanosomes dans le lait. . . [8], 438
—. Recueil des travaux. Présentation . . . . . [8], 349
— et Sani (Luigi). — L'intrapalpebro-reazzione nella diagnosi del Morbo Coitale Maligne . . . . . [14], 374
Langeron (M.). — Précis de Microscopie . . . . . [6], 479
—. Un *Sterigmatocystis* nouveau, parasite de l'homme en Tunisie : *S. tunetana* n. sp. . . . . [17], 345
—. Traité de Microscopie (Présentation). . . . . [9], 203
—. Remarques sur les larves de *Culex geniculatus* et sur les

larves des Culicinés pourvus d'un long siphon . . . [9], 438
—. Les Phlébotomes dans la région parisienne . . . [9], 573
—. Remarque sur l'évolution larvaire de *Theobaldia annulata* (Schrank, 1776). . . . [9], 704
—. Morphologie et biologie de la larve de *Theobaldia spathipalpis*, Rondani, 1872 . . [11], 98
—. La larve d'*Anopheles choudoyei* (Theobald, 1903) . . . . . [11], 291, 549
—. La présence d'*Anopheles nigripes* (Staeger, 1839) dans la région parisienne. . . [11], 728
—. A propos de l'anophélisme et du paludisme en Haute-Alsace et des Phlébotomes . . [12], 54
—. Importance des papilles cervicales des Ankylostomes . . . . . [13], 539
—. Sur une Hémogrégarine d'un Macaque . . . . . [13], 165
—. Note additionnelle sur une Hémogrégarine d'un Macaque. . . . . [13], 394
—. *Hermodendron fontoynonti* (Langeron, 1913) agent de l'achromie parasitaire malgache. . . . . [13], 436
—. Sur l'anophélisme et le paludisme en France . . . [13], 30
—. Sur un champignon d'une otomycose brésilienne : *Sterigmatocystis hortai*, n. sp. [13], 383
—. Un nouveau Sporotrichum malgache : *Sporotrichum carougeaui* (Langeron, 1913) et remarques sur les Sporotrichées . . . . . [13], 453
—. *Actinomyces salvati*, n. sp., nouveau Microsiphoné malgache. . . . . [13], 526
—. A propos des comprimés des sels de quinine. . . . [13], 959
—. Présence en Corse de l'*Aëdes* (*Stegomyia*) *argenteus* (Poiret, 1887) . . . . . [18], 723
— et Horta (P.). — Note complémentaire sur le *Cladosporidium wernecki* (Horta, 1921). . . . . [13], 381
—, Nicolle (Ch.) et Blanc (Georges). — Recherches expérimentales sur le rôle du Gecko (*Tarentola mauritanica*) dans l'étiologie du Bouton d'Orient. . . . . [13], 508
—. Raillet (A.) et Henry (A.). — Le genre *Acanthocheilonema* (Cobbold, 1870) et les Filaires péritonéales des carnivores. . . . . [5], 392
Lanzenberg (A.). — Un cas de balantidiose autochtone : son traitement . . . . . [11], 538
—. Un cas de paludisme autochtone à *Plasmodium præcox*. . . . . [14], 266
Lapidus (A.). — Résultats très favorables du traitement par la gomacrine dans trois cas de complications blennorragiques (Discussion) . . . . [21], 489
—. Tétanos généralisé. Guérison par la sérothérapie intrarachidienne. . . . . [23], 244
Lapin. — Elimination urinaire de la quinine en solution ou en suspension huileuses. . [11], 662
—. A propos de l'importance du choix de l'heure dans l'administration de la quinine . . . . . [11], 871
Lapin (J.) et Senevet (G.). — La réaction de Weil-Felix dans le typhus exanthématique. Faible pouvoir agglutinant du liquide céphalo-rachidien . . . [12], 592
Laquière (E.). — Prophylaxie de la lèpre en Nouvelle-Calédonie et Dépendances . . . [24], 483
—. Inspection médicale en Nouvelle-Calédonie. . . . [24], 716
—. Un cas de lèpre . . . [25], 123
—. Les îles Loyauté. Etude démographique. . . . . [25], 431
—. Enquête sur la lèpre aux îles de la Loyauté . . . . [25], 479
—. Les îles de la Loyauté : pathologie, urbanisme et situation économique . . . [25], 585
—. La lèpre aux îles de la Loyauté . . . . . [25], 618
Larrousse (F.). — La myase oculaire à *Œstrus ovis* L. dans la région parisienne . . . [14], 595
—. Présence de *Phlebotomus perniciosus* Newst, dans le département de l'Oise . . . [16], 16
— et Brumpt (E.). — Transmission de la piroplasmose canine française par le *Dermacentor venustus* . . . . . [15], 540
Launoy. — Dérivé du diamino-arsénobenzène (Discussion) . . . . . [7], 595
Launoy (L.), Nicolle (P.) et Prieur (Mlle M.). — Recherches sur la thérapie et la prévention du Nagana expérimental de la souris et du chat avec le 205 Bayer-309 Fourneau [23], 630
—, — et —. De l'action synergique du 205 Bayer-309 Fourneau et de quelques composés organiques d'antimoine, dans la trypanosomiase expérimentale à *Trypanosoma congolense* de la souris . . . . [25], 65
—, — et —. Etude de l'action synergique par le 205 Bayer-309 Fourneau et 5 : 5' arséno-2-thiobenziminasol disodique, dans le traitement des infec-

tions expérimentales à *Trypanosoma congolense* de la souris . . . . . [25], 570
— et Prieur (Mlle M.). — Action trypanocide synergique du 205 Bayer-309 Fourneau et d'un sérum spécifique, dans la trypanosomiase expérimentale à *Trypanosoma brucei*, de la souris . . . . . [24], 311
— et —. Étude de la virulence d'une souche de *Trypanosoma congolense* (Rodhain) pour le chat adulte . . . . . [25], 21
—. — et —. Essai d'exaltation de la virulence d'une souche de *Trypanosoma congolense* pour le chat. . . . . [25], 33
Laurency, Baury et Bédier (E.). — Index endémique du paludisme à Niamey à la fin de la saison des pluies . . . [17], 327
Laurent (A.) et Martin (Noël). — Tumeurs éléphantiasiques du pied chez un indigène algérien . . . . . [5], 56
Lauret et Hudellet. — Un cas d'Aïnhum. . . . . [4], 364
Lauzeral (P.) et Millischer (P.). — A propos de la filiation de deux cas de peste, l'un à allure septicémique, l'autre à allure pneumonique . . . . [25], 935
Lavau, Ragiot, Souchard, Farinaud et Lieou. — Sur deux cas de fièvre ictéro-hémorragique observés en Cochinchine . . . . . [24], 440
Laveau (Maurice). — Épizootie pesteuse dans la région du lac Tamnah (cercle de Thiès). Développement parallèle de la peste humaine . . . . [12], 291
—. Note sur un cas de peste chronique observée chez un rat du Cayor en dehors de toute manifestation épizootique . . . . . [12], 482
— et Griewank (H.). — Sur un cas de mycétome à grains rouges (Étude clinique et microscopique). . . . . [12], 478
— et Leger (André). — Ankylostomiasiques : erreurs fréquentes des diagnostics cliniques ; nécessité des examens de laboratoire. . . . . [12], 90
Laveran (A.). — Discours d'ouverture . . . . . [1], 1
—. Sur une Hemogrégarine, un Trypanosome et un Spirille trouvés dans le sang d'un requin. . . . . [1], 148
—. Influence des passages par cobayes sur la virulence de quelques Trypanosomes. [1], 198
—. Globules géants ou « corps en demi-lune » du paludisme ; autres altérations globulaires au cours de cette maladie infectieuse (Discussion) . [1], 206
—. Sur la valeur curative de l'émétique dans les diverses trypanosomiases (Discussion) . . . . . [1], 216
—. Présentation d'un rapport au Congrès de Berlin et d'une note à l'Académie des Sciences . . . . . [1], 248
—. Contribution à l'étude des mouches piquantes de l'Afrique intertropicale . . . . [1], 252
—. Enquête étiologique dans un foyer de lèpre (Discussion). . . . . [1], 292
—. La lutte antipaludique en Tunisie (Discussion) . . [1], 388
—. Sur quelques lésions de la rate dans les trypanosomiases. . . . . [1], 393
—. Sur la présence du pigment ocre dans les sujets morts du Béribéri (Discussion). . [1], 429
—. Traitement de la trypanosomiase humaine par l'atoxyl et l'orpiment (système Laveran) (Discussion) . . . . . [1], 503
—. Présentation de deux notes à l'Académie des Sciences . . . . . [1], 527
—. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dans l'Inde (Discussion) . . . . . [1], 533
—. Pratiques chirurgicales des Canaques des îles Loyalty (Discussion) . . . . . [1], 589
—. Alcoolisme (Discussion). . . . . [2], 353
—. Au sujet de la communication de M. A. Theiler sur un nouveau Trypanosome de l'Afrique du Sud . . . . . [2], 456
—. Au sujet de *Trypanosoma congolense*, Broden . . [2], 526
—. Bouton d'Orient (Discussion). . . . . [2], 92
—. Conférence sur les progrès de la pathologie exotique . [2], 518
—. Influences diverses sur les manifestations du paludisme . . . . . [2], 576
—. Lèpre (Discussion) . . [2], 166
—. Le traitement du Bouton d'Orient (Discussion). . [2], 304
—. Pénétration du trypanosome dans la cornée (Discussion) . . . . . [2], 264
—. Rapport sur la quinine . . . . . [2], 225
— Maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [3], 46
—. Origine alimentaire et traitement du Béribéri (Discussion). . . . . [3], 70

—. Au sujet de *Trypanosoma vivax* et de *Tr. cazalboui*. . . . . [3], 80
—. Kystes fibreux et Filaires (Discussion) . . . . . [3], 92
—. Au sujet du traitement des infections produites par *Trypanosoma congolense* et *Tr. dimorphon* . . . . . [3], 218
—. Introduction des troupes noires en Algérie (Discussion) . . . . . [3], 411
—. Contagion de la lèpre (Discussion. Nomination d'une Commission). . . . . [3], 415
—. Auto-agglutination en trypanosomiase (Discussion) . [3], 442
—. Du traitement par l'orpiment des infections à *Tr. congolense* et *Tr. dimorphon* . . . [3], 443
—. 606 et maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [3], 528
—. Chocolatine et prophylaxie du paludisme (Discussion) . . . . . [3], 544
—. Au sujet de *Tr. pecorum* Bruce . . . . . [3], 718
—. Scorbut (Discussion) . [3], 750
—. Allocution . . . . . [4], 3
—. Lèpre Discussion). [4], 71, 72
—. La fièvre jaune (Discussion). . . . . [4], 103
—. Contribution à l'étude de *Trypanosoma hippicum* Darling. . . . . [4], 168
—. *Trypanosoma cazalboui* ne doit pas être identifié à *Tr. vivax*. . . . . [4], 193
—. Contribution à l'étude de *Tr. brucei* sans blépharoplaste de Werbitski . . . . [4], 233
—. Au sujet de *Tr. brucei* sans blépharoplaste de Werbitski . . . . . [4], 273
—. Piroplasmose canine (Discussion) . . . . . [4], 295
—. Paludisme chronique (Discussion . . . . . [4], 299, 300
—. Fièvre bilieuse hémoglobinurique (Discussion). . . [4], 307
—. Vents et larves de moustiques (Discussion) . . . [4], 329
—. La peste en Mandchourie (Discussion). . . . . [4], 356
—. Discussion du rapport de la Commission des Eaux de Saïgon. . . . . [4], 434
—. L'arsénobenzol dans le traitement des cobayes et des chiens infectés par *Tr. gambiense*. . . . . [4], 472
—. Trypanosomes des bovidés (Discussion) . . . . . [4], 538
—. Des infections expérimentales par le *Tr. gambiense* chez les moutons et les chèvres . [4], 619
—. Discussion des conclusions de la Commission du Béribéri. . . . . [4], 650
—. *Trypanosoma rhodesiense* (Discussion) . . . . . [4], 679
—. Essai de vaccination contre *Tr. gambiense* avec des Trypanosomes morts ; toxine de *Tr. gambiense* . . . . . [4], 680
—. Au sujet de *Tryp. rhodesiense* Stephens et Fantham. . [5], 26
—. Expériences d'immunité croisée avec *T. brucei*, *T. brucei* var. *Werbitzkii* et *T. rhodesiense* . . . . . [5], 101
—. Contribution à l'étude des infections expérimentales produites par le *Trypanosoma rhodesiense* . . . . . [5], 241
—. Orpiment et trypanosomiase. (Discussion) . . . . . [5], 293
—. Au sujet de *Trypanosoma pecorum* . . . . . [5], 372
—. Présentation de macaques inoculés avec succès au moyen d'une culture de la *Leishmania* du Bouton de Delhi . . [5], 573
—. Infections des souris et des rats dues au Kala-azar méditerranéen et au Kala-azar indien. . . . . [5]. 715
—. Essais d'immunisation contre des Trypanosomes pathogènes. . . . . [5], 877
—. Au sujet de l'historique du Kala-azar méditerranéen. . . . . [6], 23
—. Infections du cobaye, du lapin et du chat par la *Leishmania infantum* . . . . [6], 110
—. Kala-azar (Discussion). . . . . [6], 142
—. Nouveau Protozoaire (Discussion) . . . . . [6], 158
—. Conservation du caoutchouc. . . . . [6], 280
—. Un chien infecté de toxoplasmose . . . . . [6], 294
—. La régie de l'opium en Indochine . . . . . [6], 296
—. *Toxoplasma cuniculi* (Discussion) . . . . . [6], 323
—. *Hæmocytozoon brasiliense* (Discussion). . . . . [6], 335
—. Au sujet de *Trypanosoma rhodesiense* et de *Tryp brucei* . . . . . [6], 340
—. *Hæmocytozoon brasiliense* (Discussion). . . . . [6], 380
—. Émétine dans les trypanosomiases (Discussion) . [6], 427
—. Propriétés du sérum des trypanosomés (Discussion) [6], 450
—. Prophylaxie du paludisme (Discussion). . . . . [6], 476
—. Piroplasmose (Discussion) . . . . . [6], 501
—. Présentation d'un chien at-

teint de leishmaniose et de kératite . . . . . [6], 477
—. La Section de Médecine Tropicale au Congrès de Londres . . . . . [6], 546
—. Kala-azar méditerranéen et Kala-azar indien . . . [6], 574
—. Infection des souris par *T. duttoni* . . . . . [6], 626
—. Trypanotoxine. Essai d'immunisation contre les Trypanosomes . . . . . [6], 693
—. Au sujet d'échantillons de liqueurs de traite . . [7], 136
—. Au sujet d'un cas de leishmaniose canine signalé à Marseille . . . . . [7], 173
—. Leishmaniose cutanée généralisée de la souris (Discussion) . . . . . [7], 275
—. Sur la virulence de *Tryp. dimorphon* (Discussion) [7], 361
—. Unicité du paludisme (Discussion) . . . . . [7], 387
—. Sur les *Leucocytozoon* (Discussion) . . . . . [7], 461
—. Leishmaniose canine à Marseille (Discussion). . . [7], 487
—. Infections expérimentales de souris, d'un meriones, d'un rat et d'un macaque par *Leishmania tropica* . . . . [7], 663
—. Présentation d'un chien inoculé avec succès au moyen de la *Leishmania tropica* sur souris . . . . . [7], 697
—. L'immunité que confère souvent aux caprins une première atteinte de trypanosomiase peut-elle être transmise héréditairement ? . . . . [7], 724
—. Le dérivé O_1 du diaminoarsénobenzène dans les trypanosomiases du chien et du cobaye. . . . . [8], 31
—. Nouvelle contribution à l'étude du *Toxoplasma gondii* . . . . . [8], 58
—. Des Lacertiens peuvent-ils être infectés par des *Leishmania* ? . . . . . [8], 104
—. Les leishmanioses chez les animaux. Présentation. [8], 157
—. Rôle pathogène des anguillules intestinales (Discussion du mémoire de Noc) . . . [8], 217
—. Sur les *Leucocytozoon* (Discussion du mémoire de França) . . . . . [8], 240
—. Leishmaniose américaine de la peau et des muqueuses . . . . . [8], 284, 381
—. Sur une culture de *Leishmania donovani* souillée par un champignon. . . . . [8], 429
—. Au sujet d'un *Trypanosoma gambiense* qui, conservé depuis 12 ans chez des animaux, est resté résistant au sérum humain . . . . . [8], 442
—. Au sujet des trypanosomiases équines du Maroc . [8], 576
—. *Trypanosoma soudanense* et *Tryp. berberum* (Discussion) . . . . . [8], 654
—. Nouvelle contribution à l'étude des infections expérimentales de la souris par la *Leishmania tropica* : un cas d'infection de la gerbille . . . . . [8], 383, 680
—. L'infection par *Trypanosoma gambiense* chez un maki, un renard, un raton, deux loirs, un meriones et deux gerbilles. . . . . [8], 745
—. Au sujet de l'historique de la leishmaniose viscérale (Discussion) . . . . . [9], 74
—. Présentation de moustiquaires destinées spécialement aux troupes en campagne et aux voyageurs (avec pl. II à V). . . . . [9], 75, 122
—. Diminution de virulence chez les Trypanosomes ayant subi un grand nombre de passages par animaux de même espèce. . . . . [9], 109
—. Leishmaniose cutanée expérimentale chez les macaques et chez le chien. Conditions de l'immunité . . . . . [9], 265
—. Sur un cas de filariose due à *F. loa*, d'une durée de 14 années. . . . . [9], 436
—. Leishmanioses tégumentaires (Discussion). . . . . [9], 503
—. Polynévrite palustre simulant le Béribéri (Discussion) . . . . . [9], 646
—. Surra, Nagana ferox, Nagana de l'Ouganda et infections dues au *Trypanosoma rhodesiense* . . . . . [9], 731
—. Singe patas infecté du Bouton d'Orient (Discussion) . . . . . [9], 749
—. Au sujet de l'évolution des infections expérimentales des petits Rongeurs par *Leishmania tropica* . . . . . [10], 110
—. Pièces anatomiques : nécrose d'une partie des muscles fessiers à la suite d'injections hypodermiques de quinine. . . . . [10], 162
—. Sur le traitement du paludisme à propos des fièvres de Salonique . . . . . [10], 208
—. Trachome (Discussion). . . . . [10], 272
—. Boutons d'Orient expérimentaux chez un *Cercopithecus mona* et chez un *Cercocebus fuliginosus* . . . . . [10], 291

—. La prophylaxie du paludisme dans l'Armée d'Orient . [10], 450
—. Boutons d'Orient chez un Mandrill . . . . . [10], 455
—. Paludisme des oiseaux (Discussion) . . . . . [10], 552
—. Traité des leishmanioses . . . . . [10], 679
—. Fièvre spirochéto-plasmodique des Serbes (Discussion) . . . . . [10], 834
—. Identification des virus de trypanosomiase équine marocaine de deux origines. [10], 850
—. Le *Phyllodactylus gerrhopygus* et son hémogrégarine (Discussion) . . . . . [10], 878
—. Boutons d'Orient expérimentaux chez un *Cercopithecus mona*. Le *C. mona* et un mangabey, morts au cours d'infections cutanées, ne présentent pas trace d'infection viscérale . . . . . [11], 130
—. Sur les leishmanioses expérimentales et, en particulier, la leishmaniose canine, chez la souris blanche. . . . [11]. 205
—. Grande fréquence de la kératite chez les chiens infectés par *Tryp. marocanum*, un cas de kératite ulcéreuse double. . . . . [11]. 375
—. Infections du loir par *Leishmania tropica* et par l'agent de la leishmaniose naturelle du chien . . . . . [11], 445
—. Boutons d'Orient expérimentaux chez un Chimpanzé . . . . . [11], 561
—. Accès pernicieux et abcès térébenthinés (Discussion) . . . . . [11], 181
—. Pansement hypochlorité (Discussion) . . . . . [11], 832
—. Administration de la quinine (Discussion). . . . . [11], 879
—. La leishmaniose canine chez la souris . . . . . [13], 680
—. Paludisme des oiseaux (Discussion) . . . . . [14], 78
— et Franchini (G.). — Contribution à l'étude des « marginal points » des hématies des mammifères. . . . . [7], 580
— et —. Infections des mammifères par les flagellés invertébrés. . . . . [7], 605
— et —. Au sujet d'un *Herpetomonas* de *Ctenopsylla musculi* et de sa culture . . . [8], 266
— et —. Au sujet de l'*Herpetomonas ctenocephali* de la puce du chien et de sa culture . . . . . [12], 310
— et —. Infection des souris blanches à l'aide des cultures d'*Herpetomonas ctenocephali* . . . . . [12], 379
—. Sur les Flagellés parasites de quelques insectes et sur les infections qu'ils peuvent produire chez les souris. . [12], 665
— et —. Contribution à l'étude des Flagellés des Culicides, des Muscides, des Phlébotomes et de la Blatte Orientale . [13], 138
— et —. *Herpetomonas* et *Spirochæta* de la Blatte Orientale. . . . . [13], 331
— et —. Infections expérimentales de chiens et de cobayes à l'aide de cultures d'*Herpetomonas* d'Insectes . . . [13], 569
— et —. Contribution à l'étude de la flagellose des Euphorbes. . . . . [13], 796
— et —. Contribution à l'étude des insectes propagateurs de la flagellose des Euphorbes. . . . . [14], 148
— et —. Des hématozoaires du gecko et spécialement de *Herpetomonas tarentolæ*. Procédé simple de culture des *Herpetomonas*. . . . . [14], 323
— et —. Spirochétose de punaises des Euphorbes et du latex. . . . . [14], 205
— et —. Sur un *Herpetomonas* du loir. . . . . [14], 278
— et —. Expériences sur les flagellés de la punaise du chou. . . . . [16], 319
— et Havet (J.). — Contribution à l'étude de la leishmaniose viscérale naturelle du chien . . . . . [10], 386
— et Marullaz (M.). — Infection du lapin par *Toxoplasma gondii* . . . . . [6], 249
— et —. Recherches expérimentales sur *Toxoplasma gondii* . . . . . [6], 460
— et —. Sur deux Hémamibes et un Toxoplasme du *Liothrix luteus*. . . . . [7], 21
— et —. Essais d'immunisation des souris contre le Nagana expérimental . . . . [7], 53
— et —. Sur la nature des corps de Graham-Smith . . . [7], 240
— et Mesnil (F.). — Trypanosomes et trypanosomiases . . . . . [5], 702
— et Nattan-Larrier (L.). — Contribution à l'étude de la espundia . . . . . [5], 176
— et —. Séro-diagnostic des infections à *Trypanosoma gambiense* et *Tr. rhodesiense* . . . . . [5], 220
— et —. Le *Tr. rhodesiense* devenu résistant au sérum hu-

main perd assez facilement cette propriété. . . . [5], 367
— et —. Contribution à l'étude de la espundia. . . . [5], 486
— et —. Au sujet des altérations anatomiques produites par *Toxoplasma cuniculi* . . . . . [6], 158
— et PETTIT (A.). — Contribution à l'étude des hémogrégarines de *Lacerta ocellata* Daud. . . . . [2], 295
— et —. Contribution à l'étude des hémogrégarines de *Clemmis leprosa* et de *Chelodina longicollis* . . . . . [2], 377
— et —. Contribution à l'étude des hémogrégarines de quelques sauriens d'Afrique [2], 506
— et —. Infections expérimentales légères ou latentes du singe et du chien par le Kala-azar tunisien . . . . [2], 584
— et —. Sur les cultures de *Leishmania donovani* en milieu liquide. . . . . [3], 216
— et —. Contribution à l'étude du *Spirillum pitheci* . [3], 419
— et —. Des trypanotoxines. . . . . [4], 42
— et PHISALIX (Marie). — Sur une Hémogrégarine de *Lachesis alternatus* . . . . [6], 330
— et ROUBAUD (E.). — Sur un Myriapode ayant séjourné dans les fosses nasales d'un homme . . . . . [9], 244
— et ROUDSKY (D.). — Essais d'immunisation contre les Trypanosomes pathogènes. Trypanotoxines . . . [6], 176
— et —. Le galyl dans les trypanosomiases . . . . [6], 502
— et —. Contribution à l'étude de la virulence du *Tryp. lewisi* et du *Tryp. duttoni* pour quelques espèces animales . [7], 528
— et —. Sur un dérivé du diaminoarsénobenzène . . [7], 593
— et —. De l'inoculabilité de *Tr. lewisi* au loir (*Myoxus glis*) . . . . . [7], 654
— et THIROUX. — Sur le traitement des trypanosomiases. . . . . [1], 28
— et —. Traitement de la trypanosomiase humaine . [1], 617
— et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil . . [6], 381
LAVERGNE (J.) et MONIER (H.). — Utilisation de la séro-floculation de Henry dans le diagnostic et le traitement du paludisme . . . . . [24], 539
LAVIER (G.). — Hémogrégarines, *Grahamella*, Spirochète et Trypanosome du campagnol indigène *Microtus arvalis* Pallas . . . . . [14], 569
—. Flagellés parasites intestinaux du campagnol indigène *Microtus arvalis*, Pallas [14], 710
—. Sur l'habitat et la répartition des Giardias chez les « Porteurs sains » et les « Porteurs malades » (Discussion). . . . . [16], 737
—. Sur 5 cas, dont 3 mortels, d'intoxication aiguë par la quinine . . . . . [24], 184
— et BRUMPT (E.). — Mode d'action du « Bayer 205 » sur divers hématozoaires : Trypanosomes, Piroplasmes, Theileries, Anaplasmes. . . [15], 613
— et FOMBEURE (G.). — Complications oculaires dans la piroplasmose canine expérimentale . . . . . [15], 543
— et LIBERT (E.). — Sur l'habitat de *Giardia intestinalis* chez l'homme. Precisions fournies par le tubage duodénal. [16], 389
LEBLANC (L.). — Existence du Bouton d'Orient à Figuig (Maroc Oriental) . . . . [18], 146
—, CATANEI (A.), BROUARD (M.) et FOLEY (H.). — Action du stovarsol dans le paludisme chronique à *Pl. vivax* chez les enfants indigènes en Algérie. . . . . [18], 646
—, —, — et —. Anophèles des hautes régions de la Corse. Présence d'*A. bifurcatus* et d'*A. plombeus* H. et S. dans l'île . . . . . [18], 655
LEBOEUF (A.). — Ulcère phagédénique au Congo français. . . . . [1], 339
—. Présentation d'échantillons d'une larve et de deux pupes de *Glossina palpalis*. . [1], 450
—. Conception et grossesse dans la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [2], 479
—. Maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [3], 47
—. A propos du procès-verbal. Au sujet de la note de MM. THIROUX et DEFOUGERÉ . . . . . [3], 62
—. Pénétration des Trypanosomes à travers les muqueuses (Discussion). . . . . [3], 437
—. Pseudo-érythème noueux d'origine lépreuse . . [4], 278
—. Bacille de Hansen dans le mucus nasal des lépreux . . . . . [4], 609
—. Existence de *Lepra murium* (lèpre des rats) en Nouvelle-Calédonie . . . . [5], 463
—. Dans la lèpre chez l'homme comme chez le rat, on peut

trouver des bacilles spécifiques dans les ganglions superficiels. . . . . [5], 569
—. La lèpre fruste en Nouvelle-Calédonie . . . . . [5], 578
—. Recherches expérimentales sur le rôle de certains insectes hématophages dans la lèpre . . . . . [5], 667
—. La curabilité et les rémissions de la lèpre en Nouvelle-Calédonie . . . . . [5], 705
—. Dissémination du bacille de Hansen par les mouches domestiques . . . . . [5], 860
—. Épidémiologie de la lèpre dans l'archipel calédonien . . . . . [6], 551
—. Observations relatives au traitement de la lèpre et notamment à l'action de l'huile de Chaulmoogra chez les Canaques de l'archipel calédonien . . . . . [7], 535
—. Le traitement de l'amibiase intestinale par l'iodure double d'émétine et de bismuth. . . . . [10], 247
— et Gambier (A.). — Sur deux cas de spirochétose humaine observés à Brazzaville (Moyen-Congo) . . . . . [11], 359
— et —. La spirochétose humaine à *Ornithodorus moubata* dans la colonie du Moyen-Congo. . . . . [11], 835
— et —. La formule hémoleucocytaire dans la spirochétose humaine au Moyen-Congo . . . . . [12], 497
— et —. Sur deux cas de *milk-pox* ou Alastrim observés à Brazzaville (Moyen-Congo) . . . . . [12], 489
— et —. Symptomatologie, diagnostic et traitement de la spirochétose humaine à Brazzaville (Moyen-Congo) . . [12], 372
— et Javelly (E.). — Un cas de filariose chez un Européen en Nouvelle-Calédonie . . [4], 202
— et —. Sur la présence de bacilles de Hansen dans les ganglions superficiels de sujets sains en apparence . . [6], 607
— et Martin (G.). — Diagnostic microscopique de la trypanosomiase humaine. Valeur comparée de divers procédés [1], 126
— et —. De l'hypertrophie ganglionnaire dans la maladie du sommeil . . . . . [1], 221
— et —. Période d'incubation dans la maladie du sommeil. Inflammations locales à la suite de piqûres de Glossines infectées . . . . . [1], 402
— et —. Sur le traitement de la Trypanosomiase humaine . . . . . [1], 508
— et —. Nouveaux documents sur le diagnostic microscopique de la maladie du sommeil . . . . . [1], 510
— et —. Sur l'emploi de l'atoxyl seul dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [1], 624
— et —. De la présence du *Trypanosoma gambiense* dans le liquide céphalo-rachidien, le sang et les ganglions des malades du sommeil avant et après traitement . . . [2], 472
— et —. Les rechutes dans le traitement de la trypanosomiase humaine. De l'association de la couleur de benzidine, *afridol violet*, à l'atoxyl . . . . . [2], 54
—, — et Ringenbach. — L'association atoxyl-émétique chez les malades du sommeil avancés . . . . . [2], 620
—, — et —. Sur le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [2], 308
—, — et —. Traitement de la maladie du sommeil par l'orpiment seul. . . . . [3], 42
—, — et —. Le mouvement des malades trypanosomés à Brazzaville. . . . . [3], 604
—, — et —. Traitement de la maladie du sommeil par l'atoxyl-orpiment . . . . [4], 310
—, Martin (G.) et Roubaud. — Épidémie de maladie du sommeil au Congo français. La contagion par familles et par cases. . . . . [1], 144
—, — et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo français . . . . . [1], 258
—, — et —. Les trypanosomiases animales du Congo français . . . . . [1], 351
—, — et —. Expériences de transmission du « Nagana » par les Stomoxes et les Moustiques du genre *Mansonia* . . . . . [1], 355
—, — et —. Maladie du sommeil au Congo français . . [2], 344
—, — et —. Sur la répartition géographique de la maladie du sommeil et des mouches piquantes au Congo français . . . . . [2], 108
—, — et —. Trypanosomes d'animaux divers au Moyen-Congo. . . . . [2], 209
— et Salomon (E.). — Note sur la lèpre des rats en Nouvelle-Calédonie . . . . . [6], 484

— et —. La lèpre en Nouvelle-Calédonie :
I. Nombre et distribution géographique des lépreux . [7], 218
II. — Marche de la maladie. . . . . [7], 222
III. — Organisation de la prophylaxie . . . . . [7], 226
Lebon (J.), Descuns, Leger (Marcel) et Jonchère. — Le traitement du paludisme aux Thermes d'Encausse. . . . [22], 938
Le Bourdelles. — La pyothérapie aseptique dans le traitement du typhus exanthématique. . . . . [15], 387
Le Chuiton (F.). — Recherches sur l'épidémiologie de la filariose (*Filaria bancrofti*, Cobbold, 1877) en Cochinchine . . . . . [17], 405
—, Dore (G.), Guay (J.) et Damany (P.). — Sur 5 cas de typhus exanthématique bénin observés sur le croiseur *Strasbourg* revenant d'une campagne au Pôle Nord. . . [22], 303
Lecomte (A.). — Les kystes à Filaires (*Onchocerca volvulus*) au Soudan français . . [8], 653
—. Syphilis exotique et tabès (Discussion). . . . . [28] 685
—, Heckenroth (F.) et Lafont (A.). — Une observation de méningite cérébro-spinale à Dakar, causée par le bacille de Yersin . . . . . [8], 92
— et Heckenroth (F.). — Traitement et évolution d'un mycétome à grains rouges. [9], 346
Le Cousse (E.). — Recherches sur la peste au Cambodge en 1924, poursuivies au Laboratoire de Pnom-Penh . . [18], 630
Le Dantec (Alexandre). — Présence d'une levure dans la Sprue. Sa signification pathogénique . . . . . [1], 342
—. Nouveau traitement des diarrhées chroniques des pays chauds. . . . . [1], 345
—. Présence de bactéries amylozymes dans les fèces de béribériques . . . . . [3], 63
—. Contribution à l'étude du Béribéri expérimental . [3], 118
—. Isolement des bactéries amylozymes en cultures pures. . . . . [3], 122
—. Priorité de découverte du bacille du phagédénisme tropical et de la pourriture d'hôpital . . . . . [7], 262, 376
—. Accès fluxionnaires intermittents palustres. . . . [17], 773
—. Note sur un cas d'accès bilieux hémoglobinurique accompagné de syndrome de Raynaud. . . . . [19], 680
Le Dantec (Aristide). — L'École de Médecine indigène de Dakar . . . . . [13], 623
—. Tumeur mixte du maxillaire supérieur d'origine dentaire . . . . . [15], 485
—. A propos de l'épidémiologie de la peste (Discussion). [15], 504
—. Renseignements démographiques sur Dakar en 1922 (Discussion) . . . . . [16], 463
Le Dentu (A.). — Filariose humaine au Tonkin (Discussion). . . . . [2], 485
—. La contagion de la lèpre (Discussion). . . . . [3], 261
—. L'hérédité et la contagion à la léproscrie de la Désirade. . . . . [3], 412
—. La fièvre jaune (Discussion). . . . . [4], 104
Le Dentu (R.). — Au sujet du comprimé de quinine . [16], 567
—. Le traitement du Ver de Guinée par des injections intraveineuses d'émétique [16], 566
—. Les sels d'arsenic en injection intraveineuse chez les indigènes. Guérison rapide dans un cas d'hémiplégie syphilitique. . . . . [16], 430
—. Paludisme et Ver de Guinée en Haute-Volta. Prophylaxie commune. . . . . [17], 104
Ledentu (G.). — Sur le pouvoir protecteur du sérum sanguin vis-à-vis du *Tryp. gambiense*, après injection de « 309 » Fourneau . . . . . [19], 838
—. Note complémentaire sur l'action curative du « 309 » Fourneau dans la trypanosomiase bovine . . . . [19], 692
—. Au sujet des trypanotoxines . . . . . [21], 544
—. A propos de la lutte contre la maladie du sommeil. [22], 779
—. Groupes sanguins et *Trypanosoma gambiense* . . [24], 664
—. La santé des Européens au Gabon. . . . . [24], 731
— et Daude (J.). — Contribution à l'étude du produit « 309 » dans la trypanosomiase des bovidés. Action préventive et action curative. . . . [19], 614
—, Sicé (A.) et Vaucel (M.). — Formes schizogoniques d'un Sporozoaire du cobaye . [22], 323
— et Vaucel (M.). — Répartition actuelle de la trypanosomiase humaine en Afrique Equatoriale Française . [20], 511
— et —. L'acétylarsan dans la trypanosomiase humaine. . . . . [20], 524
— et —. La formol-gélification dans la trypanosomiase humaine. . . . . [20], 601

— et —. L'index du paludisme à Brazzaville . . . . [20], 722
— et —. Sur la valeur comparée de la réaction de Gaté et de l'auto-agglutination des hématies, comme signes de présomption de la maladie du sommeil. . . . . [20], 737
— et —. La réaction du benjoin colloïdal dans la trypanosomiase humaine. . . . [20], 865
— et —. Contributions aux essais du traitement de la trypanosomiase humaine par le « Tryponarsyl » (*Paraglycinamidephénylarsmate de soude*). . . . . [20], 875
LEDOUX et SERGENT (Ed. et Et.). — Le Débab dans la région de Zousfana (Sud-Oranais). [1], 25
LEDUC (H.) et FOLEY (H.). — Phlébotomes dans le Sud-Oranais . . . . . [5], 511
LEFAS et PARASKEVOPOULOS. — Un cas de leishmaniose cutanée . . . . . [11], 59
LE FERS (F.), MARQUE (E.) et GASCOUGNOLLE (G.). — Trois observations de métastases staphylococciques . . . . . [23], 668
LEFÈVRE (R.). — Le trachome au Soudan français (cercle de Mopti). . . . . [17], 716
—. La bilharziose au Soudan français (cercle de Mopti) . . . . . [17], 720
—. Note sur le paludisme au Soudan français (cercle de Mopti). . . . . [17], 939
—. Note sur les affections intestinales au Soudan français (cercle de Mopti). . . . [17], 944
LEFRANC, CATANEI (A.) et MONTPELLIER (J.). — Un nouveau cas d'actinomycose de la face observé à Alger . . . [24], 431
—, — et —. Un nouveau cas de sporotrichose humaine observé en Algérie . . . . . [23], 297
LEFROU (G.). — Considérations sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [17], 218
—. Contribution à la posologie du stovarsol : le stovarsol à doses hebdomadaires dans le Pian . . . . . [18], 661
—. Pseudo-dengue ou fièvre rouge congolaise (*Considérations générales sur les fièvres éruptives tropicales*) . . . [20], 779
—. A propos de la Dengue et de la fièvre rouge congolaise. . . . . [21], 583
—. Contribution à l'étude de la peste au Cayor en 1928. [22], 506
—. La peste à vomissements noirs . . . . . [23], 102
—. Un nouvel indice de robusticité chez les Noirs . . [24], 60
—. Contribution à l'étude du Larbish . . . . . [24], 137
—. Le diagnostic et le traitement de la dysenterie bacillaire en Afrique . . . [24], 505
—. Comment déterminer l'âge des recrues en Afrique. Importance de la chronologie des dents de sagesse chez les indigènes . . . . . [24], 595
—. Contribution au diagnostic *post mortem* de la peste. Les cadavres pesteux à foie négatif à l'examen direct . [25], 390
—. Vieux documents sur l'examen des urines dans la fièvre jaune . . . . . [25], 535
—. Considérations étiologiques sur l'épidémie de peste de 1929 à Saint-Louis du Sénégal . . . . . [25], 597
— et BLANCHARD (M.). — Le traitement de la maladie du sommeil par le « 189 ». . [15], 797
— et —. Présence dans une lésion humaine d'un Saccharomyces pathogène pour le cobaye . . . . . [15], 915
— et —. Présence de Spirochètes dans le sang d'Européens atteints de fièvre bilieuse hémoglobinurique. Le problème étiologique de cette spirochétose. . . . . [15], 699
— et —. Spirochètes de la fièvre bilieuse hémoglobinurique et pseudo-spirochètes du sang . . . . . [16], 726
— et —. Une erreur de diagnostic : fièvre récurrente à manifestation méningée, prise pour maladie du sommeil. . [16], 394
— et —. Considérations cliniques, pathogéniques et thérapeutiques sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique à Spirochètes . . . . . [19], 345
— et —. Essais du Stovarsol dans la trypanosomiase humaine. . . . . [17], 214
— et LAIGRET. — Les pyohémies à abcès profonds . . . [15], 439
—, — et BLANCHARD. — Note préliminaire sur des cas d'ictères épidémiques observés à Brazzaville (A. E. F.) . [15], 385
—, — et —. Spirochétose ictérigène épidémique observée sur des indigènes à Brazzaville (A. E. F.) . . . . . [16], 184
— et OUZILLEAU (F.). — Essai de tryparsamide dans le traitement de la maladie du sommeil . . . . . [15], 802

— et —. La thérapeutique intrarachidienne dans la maladie du sommeil . . . . . [13], 59
—, — et Laigret. — Contribution à l'étude d'*Onchocerca volvulus* . . . . . [14], 717
Le Gac (P.). — Voir Gac (P. Le).
Le Gallen (R.) et Leger (A.). — Spirochétose des poules au Sénégal. Son évolution clinique. . . . . [10], 453
— et —. Étude expérimentale du pouvoir pathogène de *Spirochæta crociduræ* . . [10], 694
— et Leger (M.). — Fréquence de *Filaria bancrofti* chez des Guadeloupéens ne présentant ni éléphantiasis, ni accidents lymphangitiques . . . [7], 125
Legendre (F.). — Inconvénients provoqués dans la lutte antilarvaire par l'emploi de demi-mesures concernant les terrains immergés . . . [21], 346
—. Note sur le fonctionnement du Service antipaludique à Madagascar [22], 1016 ; [23], 122
—. Sur un cas de diagnostic de peste par examen du sang. . . . . [25], 1012
— et Alvarez Cienfuegos (J.-M.). Sur quelques essais de traitements nouveaux du paludisme . . . . . [20], 486
— et Gérard (G.). — Premières observations sur les puces de rat des régions pesteuses de Madagascar . . . . . [18], 730
— et Mondain (A.). — L'action du quinio-stovarsol sur les schizontes de *Plasmodium falciparum* . . . . . [21], 625
—, — et Razafindramamba. — L'action du quinio-stovarsol sur *Pl. vivax* chez les hauts-plateaux de Madagascar . . . . . [22], 137
Legendre (J.) et Trillat. — Étude sur la toxicité des vapeurs de quelques substances chimiques sur les moustiques . . [1], 608
— et —. Sur la destruction des mouches par le formol [1], 610
—. Note sur la biologie de *Stegomyia fasciata* et de *Culex pipiens* . . . . . [2], 425
—. Sur la destruction des Culicides à l'aide de gîte-piège. . . . . [3], 455
—. Sur la destruction des Culicides adultes par le filet à papillons. . . . . [3], 457
—. Sur un cas de lèpre à forme anormale. . . . . [4], 24
—. Dengue et *Stegomyia*. [4], 26
—. Affiche pour la lutte antipaludique en Indochine [5], 162
—. Traitement de la fièvre récurrente par l'arsénobenzol. . . . . [5], 339
—. Un cas de fièvre paludéenne contractée à Chapa (Tonkin). . . . . [5], 345
—. De la désinfection culicidienne par la quinoléine . . . . . [5], 739
—. Destruction des Culicides à l'aide du filet . . . . [6], 43
—. La prophylaxie des affections causées par les moustiques et la destruction des insectes adultes. . . . . [6], 205
—. Prophylaxie du paludisme en Italie . . . . . [6], 468
—. Note sur les Stégomyias du Tonkin. . . . . [6], 511
—. Destruction des Culicides à l'aide du gîte-piège . . [6], 513
—. Le paludisme à Tananarive. . . . . [7], 105
—. Lutte contre le paludisme à Madagascar . . . . [7], 462
—. Destruction des poux de corps par le crésyl et le brossage . . . . . [8], 280
—. Plan de campagne antipaludique pour Madagascar . 14], 97
—. La tuberculose dans les colonies. . . . . [15], 51
—. Traitement de la conjonctivite granuleuse, au dispensaire et à l'école, dans l'État des Alaouites. . . . . [17], 391
—. L'anophélisme à Lataquié . . . . . [17], 653
—. Sur l'existence de *Phlebotomus perniciosus* en Saintonge. . . . . [17], 894
—. A propos de l'efficacité de la quininisation préventive dans le traitement de la malaria. . . . . [17], 875
—. A propos de l'efficacité de la quinine préventive . . [18], 272
—. A propos de la quinine préventive. . . . . [19], 340
—. Au sujet de la Dengue Ouest-Africaine. . . . . [20], 320
—. A propos de la dermite blastomycosique chéloïdienne . . . . . [20], 323
—. Sur l'existence de Phlébotomes à Ouagandougou (Haute-Volta). . . . . [20], 342
—. Poissons larvivores de la Haute-Volta. Technique de l'emploi des poissons contre les maladies à moustiques . . . . . [20], 476
—. A propos de la fièvre rouge congolaise. . . . . [21], 18
—. Le paludisme chez les Européens en Haute-Volta . [21], 207
—. Le paludisme chez les indigènes en Haute-Volta . [21], 309

—. Au sujet de la pathogénie de la Dengue. . . . . [22], 416
— et Louis. — Anophélisme et paludisme à Beyrouth . [16], 86
Leger (A.). — Note au sujet d'une épidémie de Bériberi à Madagascar . . . . . [3], 751
—. Contribution à l'étude de l'histopathologie du Goundou. . . . . [4], 210
—. Présence de *Leptomonas davidi* Lafont, dans *Euphorbia pilulifera* du Haut-Sénégal et Niger . . . . . [4], 626
—. Filaire à embryons sanguicoles de l'*Hyæna crocuta* Erxleben . . . . . [4], 629
—. Maladie de Raynaud d'origine palustre avec éosinophilie locale . . . . . [5], 342
—. Filariose humaine dans le Haut-Sénégal-Niger . . [5], 618
—. Un petit centre d'endémicité de la maladie du sommeil à Koulikoro. . . . . [5], 828
—. Parasite des hématies ; genre *Grahamella* Brumpt, de *Mus maurus* (Gray). . . . [6], 247
—. *Gastrodiscus polymastos*, Leuck., 1880, chez les équidés du Haut-Sénégal-Niger . [6], 261
—. Microfilaires sanguicoles de quelques oiseaux du Haut-Sénégal-Niger . . . . [6], 389
—. Le paludisme dans le Haut-Sénégal-Niger. Index endémique de la ville de Bamako. . . . . [7], 181
—. Microfilaires d'oiseaux du Sénégal . . . . . [10], 106
—. Spirochète de la musaraigne. *Crocidura stampli*, Jentink. . . . . [10], 280
—. Sur l'existence d'une éosinophilie locale dans le Larbish ou Œrbiss des Ouoloffs. [10], 294
—. Spirochétose sanguine animale à Dakar. Sa valeur au point de vue épidémiologique. . . . . [11], 64
—. Hémogrégarine de *Bufo marinus* L. . . . . [11], 687
—. Corps de Graham-Smith dans les hématies d'un Primate (*Macacus rhesus*) . . . . [13], 679
—. Le stovarsol dans le Pian. . . . . [16], 635
—. Mode de préparation simplifié d'un éosinate de méthylène . . . . . [18], 464
—. Un cas de coccidiose intestinale humaine à *Isospora belli* à Hué (Annam) . . . [19], 95
—. A propos de la rage en A. O. F. . . . . [22], 907
Leger (A. et M.). — Contribution à l'hématologie de la lèpre . . . . . [1], 489
— et —. *Leucocytozoon* d'oiseaux du Soudan . . . . [7], 391
— et —. Les *Leucocytozoon* : leur dénombrement et essai de classification. . . . . [7], 437
— et —. Hématozoaires des Reptiles du Haut-Sénégal-Niger . . . . . [7], 488
— et —. Trypanosomes et *Hæmoproteus* d'oiseaux du Haut-Sénégal-Niger . . . . [7], 493
— et —. Piroplasme de la Civette au Sénégal . . . [13], 649
— et Blanchard (M.). — Hématozoaires d'un passereau du Haut-Sénégal et Niger . [4], 526
Leger (A.) et Certain (B.). — Recherche de spirochétose ictéro-hémorragique chez les rats de Dakar . . . . . [11], 19
— et —. Un cas d'intoxication par l'émétine . . . . [11], 405
— et Comput (André). — Nasomyiase à *Chrysomyia dux*, Esch. . . . . [17], 375
— et Husnot (P.). — Quelques hématozoaires d'un rapace diurne (*Melierax gabar*) [5], 74
— et Laveau (M.). — Ankylostomiasiques : erreurs fréquentes des diagnostics cliniques ; nécessité des examens de laboratoire. . . . . [12], 90
— et Le Gallen (R.). — Spirochétose des poules au Sénégal. Son évolution clinique . [10], 435
— et —. Étude expérimentale du pouvoir pathogène de *Spirochæta crociduræ* . . . [10], 694
Leger (J.-P.). — Un aspect de l'endémie palustre en Emyrne. . . . . [25], 178
— et Raynal (J.). — Note au sujet de l'action des Pyréthrines (Chrysémine) sur les ankylostomes . . . . . [22], 23
Leger (Marcel). — Distomatose hépatique ; formule leucocytaire chez les distomés . [1], 54
—. Hépatite suppurée : modifications du rythme urinaire . . . . . [1], 236
—. Sur la présence du pigment ocre dans les organes des sujets morts de Bériberi (Discussion) . . . . . [1], 428
—. Vaccin desséché (Discussion). . . . . [4], 285
—. Vers intestinaux (Discussion) . . . . . [4], 432
—. *Leucocytozoon* de la bécasse (Discussion). . . . . [5], 21
—. Variation de l'équilibre leucocytaire dans le bufflon au cours de la vaccination jennérienne . . . . . [5], 226
—. Le paludisme en Corse. . . . . [6], 293

—. Hématozoaires d'oiseaux de la Corse . . . . . [6], 515
—. Les porteurs de bilharzies venant de la Guadeloupe. . . . . [7], 75
—. Sur les *Leucocytozoon* (Discussion) . . . . . [7], 549
—. Observations sur quelques Leucocytozoon d'oiseaux de la région de Reims . . . [10], 28
—. Résistance globulaire dans l'ankylostomiase . . . [10], 177
—. *Schisostomum mansoni* à la Guyane française. . . [10], 464
—. Considérations hématologiques sur deux cas d'accès pernicieux à *Plasmodium præcox*, traités par la quinine . [10], 492
—. Parasitisme intestinal à la Guyane française . . . [10], 557
—. La lèpre à la Guyane française et ses réglementations successives . . . . [10], 773
—. Le paludisme à la Guyane française ; index endémique des diverses localités . [10], 749
—. Tuberculose en Guyane . . . . . [10], 787
—. Documents hématologiques relatifs au paludisme à la Guyane française . . . [11], 67
—. Parasites sanguicoles d'oiseaux de la Guyane . . [11], 124
—. Épizootie chez le cobaye paraissant due à une amibiase intestinale . . . . [11], 163
—. Paludisme et coagulabilité du sang . . . . . [11], 173
—. Microfilaire et Filaire du crapaud, *Bufo marinus* L. . [11], 182
—. Accès convulsifs remplaçant les frissons dans le paludisme primaire à *Plasmodium præcox* . . . . . [11], 364
—. Flagellés intestinaux de l'homme à la Guyane. [11], 368
—. Contribution à l'étude de la faune culicidienne de la Guyane . . . . . [11], 397
—. Hémogrégarines de Crapauds à la Guyane . . [11], 687 et 788
—. La lèpre à la Guyane française dans l'élément pénal : documents statistiques . [11], 793
—. Paludisme congenital : infection sanguine du fœtus par *Plasmodium vivax* . . [11], 841
—. Hématozoaire flagellé nouveau dans une pyréxie cliniquement non classée. . [12], 80
—. Hémogrégarine et *Plasmodium* du *Tupinambis nigropunctatus*. . . . . [12], 217
—. *Lepra murium* à la Guyane française. . . . . [12], 169
—. La Guyane française : questions de salubrité et de réglementations sanitaires . [13]. 199
—. Remarques hématologiques et cliniques sur la Filariose de Bancroft à la Guyane. . . . . [13], 248
—. Essence de Niaouli (Discussion) . . . . . [13], 229
—. A propos de *Necator americanus*, Stiles, 1902 . . [14], 159
—. Parasitisme intestinal chez les enfants à la Guyane : sa relation avec la pureté des eaux de boisson . . . [14], 85
—. Présence dans les matières fécales, à la Guyane, d'œufs de Nématodes indéterminés . . . . . [14], 155
—. A propos de l'épidémiologie de la peste (Discussion). [15], 505
—. La peste à Dakar (Discussion) . . . . . [15], 907
—. Un cas probable de pseudomyiase rampante (Discussion). . . . . [15], 1019
—. La cholestérinémie chez les lépreux. . . . . [16], 57
—. Mode simplifié de préparation des éthers éthyliques de l'huile de Chaulmoogra (Discussion) . . . . . [16], 155
—. Comment concevoir la lutte contre la lèpre dans les colonies françaises ? . . . [16], 215
—. Les bilharzioses urinaire et intestinale au Sénégal . [16], 141
—. Évolution de la peste au Sénégal (Discussion). . [16], 373
—. Au sujet de la communication du Dr Nogue sur la posologie infantile de la quinine (Discussion) . . . . . [16], 437
—. Au sujet de comprimé de quinine (Discussion) . . [16], 368
—. Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine (Discussion) . . . . . [17], 65
—. Sur une épidémie de peste pulmonaire autochtone (pneumonie pesteuse primitive) au Maroc occidental (Discussion). . . . . [17], 798
—. A propos de l'efficacité de la quininisation préventive dans la prophylaxie de la Malaria (Discussion) . . . . . [17], 880
—. Essai de vaccination antipesteuse par voie buccale chez l'homme (Discussion) . [18], 239
—. Le dépistage *post mortem* de la peste à Madagascar. Ponction pulmonaire et ponction hépatique (Discussion) . [18], 617
—. Étude épidémiologique d'un foyer pesteux au Sud-Est de la Russie (Discussion) . . [18], 628
—. Bilharziose intestinale à forme de tuberculose abdominale (Discussion) . . . . . [18], 654
—. Les parasites intestinaux chez les indigènes du Corps

d'armée coloniale en France. Traitement et prophylaxie (Discussion) . . . . . [18], 700
—. Tryparsamide (Discussion). . . . . [19], 277
—. Bouffissure d'Annam (Discussion) . . . . . [19], 310
—. Peste (Discussion) . . . . . [19], 415, 672, 826
—. Contribution à l'étude du traitement des dysenteries amibiennes (Discussion). [19], 674
—. Les insectes sont-ils susceptibles de transmettre la lèpre (Discussion) . . . . . [19], 778
—. Lèpre (Discussion) . . [19], 462
—. *Plasmodium* des Roussettes (Discussion) . . . . . [19], 838
—. Remarques sur la lèpre à la Guyane française. . . [20], 311
—. Remarques cliniques sur la lèpre . . . . . [20], 577
—. La réactivation endocrinienne du Paludisme (Discussion). . . . . [20], 719
—. Le Paludisme à Hagiang (Tonkin) (Discussion). . [20], 920
—. Le Paludisme chez les Européens en Haute-Volta (Discussion) . . . . . [21], 210
—. Le Pian et sa quasi-disparition de certains pays de l'Amérique . . . . . [21], 428
—. Au sujet de la note de G. Haslé sur la bilharziose intestinale à Madagascar. [21], 435
—. Importance de diagnostic de syphilis ou tuberculose concomitantes chez les lépreux . . . . . [21], 741
—. A propos de la localisation aberrante de *Schistosomum mansoni* et de *Sch. hæmatobium* . . . . . [21], 773
—. Le chlorhydrate d'émétine en injections sous-cutanées dans le traitement des Bilharzioses vésicales et intestinales (Discussion) . . . . . [22], 173
—. La fièvre jaune des enfants (Discussion) . . . . . [22], 191
—. Contribution à l'étude de la rage en A. O. F. Transmission de la rage du chien (Oulo fato) à l'homme et au guépard . . . . . [22], 638
—. Brèves considérations sur les procédés de séro-floculation dans les maladies tropicales. . . . . [23], 31
—. Remarques sur l'interdépendance de la peste chez le rat et chez l'homme . . . [23], 448
—. Rôle non exclusif des rats comme réservoirs du virus de la peste . . . . . [23], 564
—. Le déterminisme de la guérison des paludéens . . [23], 820
—. L'épidémie de fièvre jaune et de peste en 1809 à la Côte d'Ivoire (Discussion) . . [23], 898
—. Trypanosomiase humaine méningée et tryparsamide. [23], 950
—. Association au chaulmoogra de divers autres médicaments pour le traitement de la lèpre. La trypaflavine. . . . [23], 1009
—. « Pastoria », Centre de recherches biologiques et d'élevage de singes (Discussion). . . . . [24], 148
—. Les causes de la cécité en Chine . . . . . [24], 253
—. Les dangers de l'abus des arsénobenzènes dans les colonies françaises (Discussion) . [24], 266
—. Les arsénobenzènes aux colonies : leur emploi raisonné et dûment contrôlé . . . [24], 394
—. Considérations sur le traitement de la syphilis chez les indigènes de nos colonies . . . . . [24], 434, 439
—. A propos de la communication de Fonquernie sur des cas de *Pestis minor* . . . [24], 448
—. Les leishmanioses autochtones en France et la lutte contre leur extension (Discussion) . . . . . [24], 482
—. Observations sur le traitement de la syphilis aux colonies (Discussion) . . . [24], 643
—. La classification classique de première période sanguine et de deuxième période méningée, dans la trypanosomiase est-elle justifiée ? . . . . . [24], 833
—. Séro-floculation au péréthynol chez les lépreux . . [25], 128
—. Quelques derniers mots au sujet de la « Cure standard » de la maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [25], 43
—. Quelques documents sur l'indice plasmodial du paludisme à la Guadeloupe . . . [25], 211
—. Spirochétose ictéro-hémorragique à la Guadeloupe . [25], 304
—. Essai d'application de la réaction de Henry à l'étude épidémiologique du paludisme (Discussion) . . . . . [25], 314
—. Excès d'urée sanguine et paludisme ancien. A propos de la note de H. Woltz . . . [25], 426
—. Procédé commode de mise en évidence des bacilles de la lèpre . . . . . [25], 546
—. Recherches sur la pathogénie et le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique (Discussion) . . . . . [25], 747
—. Un signe de l'amibiase intestinale chez l'enfant (Discussion) . . . . . [25], 951
— et ARLO (J.). — Le paludisme en Corse (Présentation). [7], 366

— et Baury (A.). — Indice du paludisme à Dakar en saison fraîche. . . . . [15], 510
— et —. Indice endémique du paludisme au Sénégal durant la saison sèche . . . [15], 760
— et —. Parasitisme intestinal au Sénégal . . . . . [15], 1020
—. *Pestis minor* expérimentale des rats blancs. . . . [15], 506
— et —. Pseudo-méningocoque pyogène isolé d'un abcès de la fosse iliaque. . . . . [15], 652
— et —. Recherches sur l'indice endémique du paludisme en Guinée. . . . . [15], 497
—. Septicémie avec localisation hépatique suppurée, due à un germe à l'aspect morphologique de *Pasteurella* . . [15], 491
—. Un coccobacille pseudo-pesteux extrêmement virulent . . . . . [15], 862
— et —. De la peste chez les Muridés et les Musaraignes à Dakar . . . . . [16], 133
— et —. De l'emploi de la chauve-souris comme animal réactif de la peste . . [16], 78
— et —. Souche pesteuse isolée des porteurs sains humains et sa virulence comparée . [16], 54
— et —. Vaccination contre la peste par la voie buccale [16], 469
— et Bédier (E.). — La quinine sous forme de comprimés et son élimination par l'urine . . . . . [15], 870
—. Morphologie du *Pl. præcox* à propos d'un cas d'accès pernicieux . . . . . [15], 1010
— et —. Indice bilharzien (*Schistosomum hæmatobium*) chez les enfants de Dakar . [16], 276
— et —. Indice endémique du paludisme à Ouagadougou en saison sèche. . . . . [16], 383
— et —. La quinine agit-elle sur les schizontes de *Pl. vivax* au stade intraglobulaire ? . [16], 433
— et —. Notes brèves sur l'indice endémique du paludisme dans la Haute-Volta . . [16], 556
— et — Piroplasmose à *Gonderia mutans* chez les Bovidés du Sénégal . . . . . [16], 60
— et —. Résultat d'un essai de prophylaxie quinique du paludisme dans les écoles de Dakar . . . . . [17], 101
—, — et Baury (A.). — Dakar et ses environs : indice du paludisme aux diverses saisons. . . . . [15], 1006
—, — et —. Indice paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison . . . . . [16], 208
— et Boulay (A.). — Recherches sur l'élimination du Calcium dans la lèpre chez les Noirs . . . . . [15], 865
— et —. Élimination du Calcium et du Phosphore chez les lépreux . . . . . [15], 1002
— et —. Évaluation de la quantité de sang rendue par l'urine dans un cas de bilharziose vésicale . . . . . [16], 63
— et Brémont (E.). — La filariose de Bancroft à la Guyane française dans ses rapports avec les manifestations lymphatexiques . . . . . [10], 896
— et Dominici-Urbani (C.). — Foyer de mélitococcie en Corse . . . . . [5], 657
— et —. Documentations relatives à l'extension de la mélitococcie en Corse . . . [6], 673
— et Le Gallen (R.). — Fréquence de *Filaria bancrofti* chez des Guadeloupéens ne présentant ni éléphantiasis, ni accidents lymphangitiques . . . . . [7], 125
— et Huchard (G.). — Contribution à l'étude de la tuberculose au Sénégal : cuti-réaction chez les enfants de Dakar . . . . . [15], 344
—, — et Baury (A.). — Un cas de sporotrichose pulmonaire . . . . . [15], 357
—, Hudellet (G.) et Nogue (M.). — Un cas de leucémie lymphoïde à type splénique pur . . . . . [15], 517
—, Lebon (J.), Jonchère et Descuns. — Le traitement du paludisme aux Thermes d'Encausse. . . . . [22], 938
— et Leger (A.). — Contribution à l'hématologie de la lèpre . . . . . [1], 489
— et —. *Leucocytozoon* d'oiseaux du Soudan . . . . . [7], 391
— et —. Les *Leucocytozoon* : leur dénombrement et essai de classification . . . . [7], 437
— et —. Hématozoaires des Reptiles du Haut-Sénégal-Niger . . . . . [7], 488
— et —. Trypanosomes et *Hæmoproteus* d'oiseaux du Haut-Sénégal-Niger . . . . [7], 493
— et —. Piroplasme de la Civette au Sénégal . . . [13], 649
— et Lhuerre. — Persistance anormale du bacille de Yersin chez un pesteux bubonique. . . . . [15], 759
— et —. Sur un cas de peste pulmonaire à évolution atypique . . . . . [16], 203
— et Mathis (C.). — Foyers endémiques de filariose humaine au Tonkin . . . . . [2], 483

— et —. Helminthiase intestinale et hépatique chez les indigènes du Tonkin et du Nord-Annam. . . . . [2], 488
— et —. Le paludisme au Tonkin. . . . . [2], 577
— et —. Les porteurs d'Ankylostomes au Tonkin et dans le Nord-Annam. . . . . [3], 32
— et —. Sensibilité de la souris blanche au Spirochète de la fièvre récurrente au Tonkin . . . . . [3], 73
— et —. Distribution géographique de la filariose humaine dans l'Indochine du Nord . . . . . [3], 142
— et —. Douve oculaire de la poule . . . . . [3], 243
— et —. A propos de la présence de bactéries amylozymes dans les fèces des béribériques . . . . . [3], 352
— et —. Immunité conférée au Macaque par le Spirochète de la récurrente du Tonkin [3], 422
— et —. Le paludisme au Tonkin. Indice endémique pendant la saison fraîche . . . [3], 465
— et —. Nouvelles recherches sur le *Leucocytozoon sabrazesi* et *L. caulleryi* de la poule domestique du Tonkin. . [3], 504
— et —. Paludisme et Anophélines dans la vallée de la Rivière Claire, de Tuyen-Quang à Hagiang . . . . . [3], 632
— et —. *Hæmoproteus* de quelques oiseaux du Tonkin [3], 704
— et —. *Fasciolopsis buskii* au Tonkin. Son extrême rareté chez l'homme, sa fréquence chez le porc . . . . . [4], 200
— et —. Contribution à l'hématologie du Béribéri et du scorbut. . . . . [4], 315
— et —. De l'image d'Arneth dans le Béribéri . . . . [4], 320
— et —. Traitement du Surra d'Indochine par l'arsénophénylglycine d'Ehrlich. . [4], 403
— et —. Hémogrégarines de reptiles et de batraciens du Tonkin . . . . . [4], 446
— et —. Nature des cellules-hôtes des *Leucocytozoon*. . . . . [5], 77
— et Mesnil (F.). — Documents relatifs au Surra des caprins et à leur immunité . . [5], 31
— et Mouzels (P.). — *Plasmodium* de *Iguana nudicollis* . . . . . [10], 98
— et —. Piroplasme et Microfilaire d'un Édenté, le *Bradipus tridactylus* Linné . [10], 173
— et —. Hémogrégarine intraleucocytaire d'un saurien, *Tupinambis nigropunctatus* . [10], 283
— et —. Hématozoaire endoglobulaire non pigmenté d'une Anatidée . . . . . [10], 699
— et —. Dermatose prurigineuse déterminée par des papillons saturnides du genre *Hylesia* . . . . . [11], 104
—, — et Ryckewaert (P.). — Le Pian à la Guyane française. . . . . [10], 528
— et Nogue (M.). — Mycose à *Scopulariopsis* chez deux malades ayant des lésions cutanées rappelant la lèpre. [15], 654
— et —. Essais de traitement de la dysenterie amibienne aiguë par le Stovarsol . . . [16], 557
— et —. Le paludisme chez les Noirs adultes de l'Ouest-Africain. Étude parasitologique et clinique . . . . . [16], 281
— et Pezet (O.). — Quelques documents sur la cuti-réaction à la tuberculose en Guinée française . . . . . [13], 354
—, Pinaud (J.) et Bédier (E.). — — Le paludisme à Zinder : indice hématologique . . [16], 137
— et Pringault (E.). — Helminthiase intestinale et bilharziose à *Schistosomum mansoni* à Madagascar . . . . . [14], 247
— et Queinnec (P.). — Quelques mots sur un traitement de la filariose Loa. . . . . [25], 690
—, Remlinger (P.) et Teppaz. — Contribution à l'étude de la rage au Sénégal . . . [16], 4
— et Roubaud (E.). — Observations sur le paludisme en Corse (mars-avril 1921) . . . [14], 340
— et Ryckewaert (P.). — Hématozoaire de la fièvre quarte et accès pernicieux mortel [10], 879
— et Sauvet (Ch.). — Helminthiase à la Guadeloupe. [7], 71
— et Séguinaud (J.). — Fièvre de pappataci en Corse . [5], 710
— et Sicé (A.). — Note complémentaire sur le début de l'évolution nerveuse de la trypanosomiase humaine . [24], 828
— et —. Considérations sur les modifications pathologiques tardives du liquide céphalo-rachidien dans la trypanosomiase humaine. . . . [25], 340
— et Téjera (É.). — Contribution à l'étude du *Trypanosoma venezuelense*, Mesnil, 1910. . . . . [13], 376
—, Vassal (P.) et Falconnier. — Teneur du sérum sanguin des paludéens en matières minérales, en matières azotées et en cholestérine . . . . . [24], 34
—, — et —. Modification du chimisme sanguin sous l'influence

de la cure hydro-minérale d'Encausse-les-Thermes . . . . . [24], 222
— et VIENNE (M.). — Épizootie à Trypanosomes chez les bovidés de la Guyane française. [12], 258
— et WEINBERG. — Recherches cliniques et expérimentales sur l'ankylostomiase. Ankylostomés et ankylostomiasiques . . . . . [1], 229
LEGRAS (Mlle S.). — Sur les formes hémogrégariniennes vues dans le sang et dans le tissu ganglionnaire des bovidés d'Algérie . . . . . [11], 274
LEGROUX (R.). — Sur la destruction des poux . . . . [8], 470
—. Présentation du matériel de prophylaxie antipaludique destiné à l'Armée d'Orient. [10], 421
LEGROUX (Ch.) et CATANEI (A.). — Étude d'un cas d'actinomycose pleuro-pulmonaire observé en Algérie . . . . . [24], 85
—, — et GROSDEMANGE (L.). — Sur un cas de mycétome du pied observé en Algérie. [20], 11
LE GUILLAS (L.), CATANEI (A.), FOLEY (H.) et BROUARD (M.). — Sur la durée de l'action du stovarsol dans le paludisme chronique des enfants indigènes en Algérie . . . . [19], 96
LELAURIN (A.-P.) et DELANOË (P.). — Infestation massive d'un élevage de poulets par la puce chique (*Sarcopsylla gallinacea*, Westwood, 1875) . . . [16], 593
LE LOUET (G.) et BROUDIN (L.). — Anémie pernicieuse progressive des Bovidés en Cochinchine (Note préliminaire) . . [16], 575
LEMAIRE. — Kala-azar infantile en Algérie. . . . . [4], 346
—. Petite épidémie de typhus récurrent observée à Alger en 1910. . . . . [4], 435
—. Premier cas de leishmaniose algérienne. . . . . [4], 554
—. Sur la dénomination de « fièvre exanthématique » . [24], 934
—, ARMAND-DELILLE (P.) et PAISSEAU (G.). — Note sur les constatations positives d'hématozoaires au Laboratoire de Bactériologie de l'Armée d'Orient pendant l'année 1916 . [10], 284
— et BARDENAT (E.). — Quelques complications rares au cours de la peste bubonique (Alger, 1930). . . . . [24], 274
—, SERGENT (Ed. et Et.) et LHÉRITIER. — Transmission de la leishmaniose canine par la puce . . . . . [5], 595
—, — et —. Leishmaniose du chien en Algérie . . . [6], 579
—, — et —. Spécificité de la kératite observée chez les chiens atteints de leishmaniose naturelle . . . . . [7], 193
—, — et SÉNEVET (G.). — Insecte transmetteur et réservoir du clou de Biskra . . . . [7], 277
LE MEILLOUR, MESNARD et STEFANI. — Un cas d'affection pulmonaire subaiguë simulant la tuberculose guéri par la quinine. . . . . [20], 113
LEMOINE. — Le Kho-Sam et le traitement de la dysenterie amibienne . . . . . [1], 72
LÉPINE (Pierre). — Trois cas syriens de Kala-azar infantile. . . . . [19], 429
—. Contribution clinique et expérimentale à l'étude de la fièvre de trois jours en Syrie. . . . . [20], 251
—, MARKIANOS (J.) et PAPAYOANNOU (A.). — Valeur pratique de la réaction de Rubino pour le séro-diagnostic de la lèpre. . . . . [25], 543
LERAT (R.). — La guérison du Bouton d'Orient par une nouvelle thérapeutique du « Synectol » . . . . . [21], 764
LE ROUX (G.). — Voir ROUX.
LEROY (D.) et VOIZARD (F.). — Un cas de pied de Madura traité avec succès par des injections intraveineuses de lugol. [21], 511
LESAGE. — Note sur les Entamibes dans la dysenterie amibienne des pays chauds. [1], 104
LESTOQUARD (F.). — Les piroplasmoses du mouton en Algérie (Note préliminaire) . . [17], 122
—. Deuxième note sur la piroplasmose du mouton en Algérie. L'anaplasmose : *Anaplasma ovis* n. sp. . [17], 784
—. Troisième note sur les piroplasmoses du mouton en Algérie. La piroplasmose vraie *Piroplasma* (s. str.) *ovis* (nov. sp.). Comparaison avec *Babesiella ovis*. . . . . [18], 140
—. Les Piroplasmoses des bovins en Turquie . . . . [24], 817
—. Transmission au buffle des Piroplasmes du bœuf. Modifications subies par *Anaplasma marginale*. . . . . [24], 820
— et DONATIEN (A.). — Le *Débab* naturel du chien. Transmission par les Stomoxes . . . [16], 168
— et —. Transmission expérimentale de *Piroplasma caballi* à l'âne. . . . . [19], 546
— et —. Sur l'emploi du trypanobleu dans le traitement des piroplasmoses des ruminants. . . . . [20], 64
— et —. Présence d'*Aegyptia-*

nella pullorum chez les poules en Algérie . . . . . [24], 371
—, — et PARROT (L.). — Bartonelloses et prémunition. [23], 173
—, — et —. Sur le développement du parasite de la leishmaniose canine viscérale chez *Phlebotomus major* var. *perniciosus* Newstead . . . [23], 724
— et EKREM (I.). — Les piroplasmoses du mouton en Turquie. . . . . [24], 822
— et PARROT (L.). — Sur quelques détails de la structure des *Leishmania*. . . . [18], 341
—, —, SERGENT (Edm.) et DONATIEN (A.). — Prémunition et protozooses sanguines . [19], 532
—, —, — et —. Tiques et piroplasmoses bovines d'Algérie. *Première note* . . . . [21], 846
—, —, — et —. Transmission héréditaire de *Piroplasma bigeminum* chez *Rhipicephalus bursa*. Persistance du parasite chez les tiques nourries sur des chevaux. . . . . [24], 195
—, —, — et —. Le traitement de la babesiellose bovine à *Babesiella berbera* par l'ichtargan. . . . . [24], 939
—, —, —, —, PLANTUREUX (E.) et ROUGEBIEFF (H.). — Inoculation au mouton de l'anaplasmose du bœuf . . . . . [17], 293
LETONTURIER, MARQUIESSAC (DE) et JAMOT. — Essai de tryparsamide dans la trypanosomiase humaine à virus *gambiense*. . . . . [17], 692
—, MARTIN et SOUCHARD. — Un nouveau cas de mélioïdose observé en Cochinchine. [23], 273
LETULLE (M.). — Bilharziose urinaire chez un nègre du Congo. Modes de dissémination des lésions parasitaires. . . [1], 280
—. Goundou (Discussion). [4], 154
— et NATTAN-LARRIER. — Sclérose paludéenne du sommet du poumon . . . . . [1], 536
— et —. Lésions du foie dans les schistosomiases humaines . . . . . [2], 538
— et —. Etude histologique du bubon climatérique . . [3], 751
LEVADITI (C.). — Elimination de l'arsenic (Discussion). . . [2], 143
—. La *frambœsia tropica* au Brésil (Discussion). . . . [11], 462
—. Mécanisme d'action des composés arsenicaux dans les trypanosomiases . . . . [2], 45
—. Pénétration du Trypanosome dans la cornée (Discussion). . . . . [2], 263
—. Pouvoir hémolytique de l'extrait d'ankylostomes (Discussion) . . . . . [2], 102
—. Paludisme (Discussion) [4], 300
—. Streptocoques (Discussion) . . . . . [5], 60
—. Intervention de l'organisme dans la guérison médicamenteuse des maladies à Spirilles. . . . . [3], 324
—. Propriétés du sérum des malades du sommeil (Discussion). . . . . [6], 447
—. A propos du mode d'action des médicaments parasiticides. . . . . [7], 299
—, ANDERSON (T.-E.) et MANIN (Mlle Y.). — Le rôle du glutathion dans la production du trypanotoxyl et du bismoxyl. . . . . [21], 676
— et ARZT (L.). — Mode d'action du salvarsan dans la fièvre récurrente du rat . [5], 320
— et INTOSH (Mc). — Mécanisme de la création des races de Trypanosomes résistantes aux anticorps . . . . . [3], 368
— et —. Le Béribéri (Discussion) . . . . . [3], 130
— et —. L'enfant issu d'une lépreuse peut-il être allaité par une nourrice ? . . . . [3], 326
— et —. Contagion de la lèpre (Discussion) . . . . . [3], 414
— et —. L'afflux des lépreux étrangers à Paris. . . [3], 701
— et MUTTERMILCH (St.). — Recherches sur la production des anticorps chez les animaux trypanosomés et traités par le salvarsan. . . . . [6], 699
— et —. Ambocepteurs et arsénobenzol . . . . . [7], 633
— et NATTAN-LARRIER. — A propos de la note de M. Ch. Nicolas sur le Pian . . . [1], 487
— et —. Traitement de la piroplasmose canine par l'arsénobenzol. . . . . [4], 291
—, NICOLAU (S.) et GALLOWAY (I.). — Essais de prophylaxie des trypanosomiases par les dérivés phényl-arsiniques administrés *per os* . . . . [19], 737
— et ROSENBAUM. — Action des substances hémolytiques sur les Spirochètes, les Protozoaires et les Vibrions . . [1], 117
— et STANESCO. — Immunisation des Spirilles par action des anticorps *in vitro*. . . [3], 353
— et VON KNAFF-LENZ (E.). — Sort de l'arsenic injecté dans la circulation générale des animaux neufs et trypanosomés. . . . . [2], 405
— et YAMANOUCHI. — La réaction de la déviation du complément dans la maladie du sommeil. . . . . [4], 26
— et —. La réaction des lipoïdes

dans les trypanosomiases et les spirilloses expérimentales . . . . . [1], 140
— et —. Transmission des spirilloses humaines aux poussins et aux embryons de poulet. . . . . [1], 415
Lévy (P.-P.). — Sur l'hématologie du Kala-azar infantile (à propos d'un cas observé à Paris et terminé par la guérison) . . . . . [17], 477
Lévy (E.) et Nicolle (Ch.). — Un cas de Kala-azar terminé par la guérison . . . . . [4], 138
—, — et Cortesi. — Application de l'arsénobenzol au traitement du Kala-azar de l'enfant. . . . . [4], 187
Lhuerre (H.). — La peste à Dakar : étude clinique et thérapeutique. Période endémo-épidémique : octobre 1921-octobre 1922 . . . . . [15], 874
— Lésions osseuses dans l'ainhum (Discussion). . . [15], 352
—. *Pestis minor* expérimentale des rats blancs (Discussion). . . . . [15], 508
—. Évolution de la peste au Sénégal (Discussion). . . [16], 376
—. Sur l'emploi abusif de la quinine dans le traitement des pyréxies . . . . . [17], 941
—. Sur l'emploi des appareils plâtrés dans les pays chauds. . . . . [18], 118
—. De la rareté des luxations chez les indigènes de l'A. O. F. . . . . [18], 293
—. Cas déclarés de tétanos guéris par la sérothérapie (Discussion) . . . . . [18], 436
—. Sulfate d'atropine et sérothérapie dans le traitement du tétanos. . . . . [19], 66
—. Six cas de tétanos infantile traités par la sérothérapie (ancien sérum antitétanique de l'Institut Pasteur) suivis de guérison (Discussion). . [21], 83
—. Note sur le fonctionnement de l'Institut d'Hygiène Sociale de Dakar . . . . . [21], 329
—. Les Œuvres de sauvetage de l'enfance à Dakar . . [21], 401
—. Sulfate d'atropine et sérothérapie dans le traitement du tétanos. . . . . [21], 694
—. Sur la prostitution à Dakar. . . . . [21], 703
—. La prophylaxie individuelle des maladies vénériennes. . . . . [21], 817
— et Affre (M.). — Sur un cas de dyspepsie périostale. [17], 514
—, Boulay (A.) et Mitard (Mlle L.). — Sur le passage de la quinine dans le lait maternel. . . . . [21], 466
— et Hanras (M.). — Les premières greffes animales en A. O. F. . . . . [18], 333
— et Hudellet. — Fracture de l'aileron gauche du sacrum avec diastasis de la symphyse pubienne . . . . . [18], 770
— et —. Un cas d'anévrisme de l'aorte abdominale. . . [16], 149
— et Leger (M.). — Persistance anormale du bacille de Yersin chez un pesteux bubonique. . . . . [15], 759
— et —. Sur un cas de peste pulmonaire à évolution atypique. . . . . [16], 203
— et Nogue (M.). — Un cas de syphilis indigène . . . [18], 431
Lhéritier (A.), Béguet (M.) et Sergent (Ed. et Et.). — Comparaison entre le *Trypanosoma soudanense* et le *Tryp. berberum*. . . . . [8], 650
—, Belleval (G.) et Sergent (Ed.). — Sur le *Tryp. marocanum* n. sp., agent d'une épizootie équine à Casablanca en 1911. . . . . [8], 433
—, Boquet (A.) et Sergent (Ed.). — Études sur les piroplasmoses en Algérie. Infection par les piroplasmes de bovins arrivant de France en Algérie pendant l'hiver . . . . . [7], 699
—, —, — et Denarnaud (P.). — Épizootie de peste porcine avec présence de *Salmonella* à Alger. Transmission expérimentale par virus filtré . . [5], 781
—, Fleury (A.) et Thibout (A.). — Moutons algériens et bactéridie charbonneuse . . [5], 336
—, Lemaire (G.) et Sergent (É.). — Leishmaniose du chien en Algérie. . . . . [6], 579
—, — et Sergent (Ed. et Et.). — Transmission de la leishmaniose canine par la puce. . . . . [5], 595
—, — et —. Spécificité de la kératite observée chez les chiens atteints de leishmaniose naturelle . . . . . [7], 193
— et Pasteur Vallery-Radot. — Étude sur la pathologie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique des bovins en Algérie . . . . . [12], 202
— et Sergent (Edm.). — Études sur les piroplasmes en Algérie. Infection piroplasmique intense chez les bovidés sans symptômes morbides . . . [6], 622
— et —. Longue incubation ou latence d'infections à Trypanosomes chez des chiens inoculés

avec des virus provenant de chèvres . . . . . [8], 653
— et —. Gale du dromadaire (Première note). . . . [12], 94
—, — et Donatien (A.). — Des étalons guéris cliniquement de Dourine peuvent rester des porteurs sains de germes pathogènes . . . . . [13], 515
—, — et —. Du diagnostic expérimental de la Dourine. [13], 517
— et Sergent (Ed. et Ét.). — Etude comparative du Débab et de quelques autres trypanosomiases . . . . . [5], 274
— et —. Dromadaires immunisés contre la trypanosomiase « Débab » . . . . . [12], 86
— et —. Fièvre bilieuse hémoglobinurique du bœuf d'Algérie, maladie distincte des piroplasmoses. . . . . [12], 108
— et —. Passage de Trypanosomes de la mère au fœtus dans le « Débab ». . . . . [12], 177
—, — et Foley (H.). — De la mortalité dans le Débab, trypanosomiase des dromadaires. . . . . [11], 568
Libert (E.) et Lavier (G.). — Sur l'habitat de *Giardia intestinalis* chez l'homme. Précisions fournies par le tubage duodénal . . . . . [16], 589
Lieurade (M.). — Les « enfants rouges » du Cameroun . [25], 46
Lignières (J.). — Piroplasmes ; unaplasmes et grains chromatiques . . . . . [12], 558
—. Contribution à l'étude de l'anaplasmose bovine. Expériences d'inoculation d'*Anaplasma argentinum* à plusieurs espèces animales. Les moutons et les chèvres sont nettement réceptifs . . . . . [12], 641
—. La vaccination des bovidés contre l'anaplasmose. . [12], 765
—. L'isolement et la recherche des *Anaplasma* par l'inoculation du sang suspect au mouton et à la chèvre . . [12], 774
—. Sur l'évolution des *Anaplasma* dans le sang des bovidés . . . . . [13], 19
—. Vaccination des bovidés contre l'anaplasmose. Quelques observations sur les résultats des inoculations aux reproducteurs fins, du sang de mouton et de chèvre infectés, par passages successifs . . . [14], 449
—. Démonstration en France de la réceptivité des ovins à l'*Anaplasma argentinum*, par injection à des bovidés, du sang d'un mouton apporté de Buenos-Ayres. Quelques réflexions sur les résultats obtenus. . . . . [17], 642
—. Nouvelles preuves de l'inoculation de l'*Anaplasma* du bœuf au mouton, puis du mouton au mouton. Comparaison des résultats obtenus avec ceux publiés par l'Institut Pasteur d'Algérie . . . . [17], 647
—. Sur la vaccination des bovidés contre la piroplasmose, la babésiellose et l'anaplasmose. Comparaison des procédés employés en Argentine et en Algérie . . . . . [21], 371
—. A propos des expériences comparatives faites en Algérie. Anaplasma argentin et Anaplasma algérien . . . [21], 378
Lignos (A.). — Quinze cas de Kala-azar infantile observés à Hydra . . . . . [4], 664
—. Un cas de Kala-azar infantile se terminant par la guérison. . . . . [5], 91
—. La gangrène de la bouche et du nez dans le Kala-azar infantile d'Hydra . . . . . [5], 270
—. Déplacement de la rate chez un enfant atteint de Kala-azar . . . . . [5], 271
—. Absence de *Leishmania* à l'autopsie d'un enfant mort de Kala-azar. . . . . [5], 349
—. Un cas de fièvre réellement noire (Kala-azar) observé à Hydra . . . . . [6], 114
—. L'infection par *Leishmania* des chiens de l'île Hydra. . . . . [6], 117
—. Deuxième cas de guérison de Kala-azar infantile observé à Hydra . . . . . [6], 430
—. Troisième cas de guérison du Kala-azar infantile observé à Hydra . . . . . [7], 43
—. Époque d'apparition du Kala-azar à Hydra . . . . [7], 45
—. La mortalité par Kala-azar à Hydra en 1911 . . . . [7], 193
—. Quelques nouveaux cas de guérison du Kala-azar infantile observés à Hydra . . . [8], 25
—. La leishmaniose canine à Hydra . . . . . [9], 302
—. Note sur le traitement du Kala-azar infantile. . . [25], 1043
Lima (R.). — Peste de Manquiera ou charbon symptomatique. . . . . [2], 162
Limousin (H.), Deschiens (R.) et Troisier (J.). — Éléments présentant les caractères d'un Protozoaire sanguicole observés chez le chimpanzé . . [20], 597
—, Troisier (P.), Deschiens (R.) et Delorme (M.). — L'infestation du chimpanzé par un

Nématode du genre *Hepaticola*. . . . . [21], 221
LINDBERG (K.). — Traitement préventif par la plasmoquine dans un milieu de haute endémicité paludéenne . . . . . [25], 912
LINDENBERG (A.). — L'Ulcère de Bauru ou le Bouton d'Orient au Brésil . . . . . [2], 459
LIODT. — Contribution à l'étude de l'helminthiase intestinale en A. O. F. (La répartition du parasitisme chez les travailleurs du Congo-Océan et la cure de déparasitisation par le tétrachlorure de carbone) . . . . . [20], 743
LISSOVSKY (L.-L.) et SCHOURENKOWA (A.-I.). — Contribution à la question de la culture des *Trichomonas*. . . . . [21], 651
LOCÉ et BIZARD (G.). — Sur quatre cas de piroplasmose équine (*Piroplasma caballi*) observés dans le département de la Loire-Inférieure. . . . [17], 347
LOMBARD, QUILLICHINI et SERGENT (Ed. et Et.). — La leishmaniose à Alger. Infection d'un enfant, d'un chien et d'un chat dans la même habitation . . [5], 93
LOOSS. — Maladies vermineuses. Bilharziose (Présentation) . . . . . [7], 366
—. Cycle évolutif de l'ankylostome (Présentation) . . [7], 463
LOPEZ-NEYRA (C.-R.). — Considérations sur le genre *Dipylidium* Leuckart. . . . [20], 434
—. Recherches sur le genre *Dipylidium*, avec description de quatre espèces nouvelles [21], 239
LORANDO (N.-I.). — Néphrite et dégénérescence amyloïde d'origine palustre . . . . [23], 584
—. Étude critique sur l'épidémie de l'île de Syra. Dengue et spirochétose. . . . . [25], 552
LORANDO (W.-J.). — Sur quelques facteurs dans la fièvre pernicieuse palustre . . . . [23], 927
LOSTIE (L.). — Surra en Basse-Cochinchine . . . . . [5], 371
LOUBRIEU et PAISSEAU (G.). — Paludisme autochtone à *Plasmodium præcox* . . . . . [14], 268
LE LOUET (G.), BROUDIN (L.) et ROMARY (A.). — Le traitement du Surra expérimental équin à *T. annamense* par le mélange de sulfarsénol et de 309. [21], 849
LOUIS et LEGENDRE (J.) — Anophélisme et paludisme à Beyrouth. . . . . [16], 86
LOUKIANOFF (W.-A.), FURIKOFF (Mlle M.-J.), GALOUZO (J.-G.) et YAKIMOFF (W.-L.). — L'apiroplasmose dans le traitement de la piroplasmose bovine . [19], 18
LOUKIANOFF (W.-A.), GALOUZO (J.-G.), YAKIMOFF (W.-L.) et RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.). — A propos de la coccidiose des porcs en Russie . . . . . [20], 215
—, YAKIMOFF (W.-L.) et MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.). — A propos de l'immunisation des bovidés vis-à-vis de *Babesiella bovis* en Russie. [19], 550
— , —, —, GALOUZO (J.-P.), Mlles RASTÉGAÏEFF (E.-F.), ROUMIANTZEFF (E.-W.) et WOITZEKHOWSKY (A.-M.). — Essais de traitement de la piroplasmose bovine par le protargol. [19], 41
—, —, —, —, WOITZEKHOWSKY (Mlle A.-M.) et YAKOWLEFF (S.-P.). — Le traitement de la piroplasmose bovine par le salvarsan à l'argent (Silbersalvarsan). . . . . [19], 34
LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (S.). — Séquelles chirurgicales des entérites dysentériformes. . [18], 825
LWOFF (A.). — Chytridinées parasites des Amibes de l'homme. Possibilité de leur utilisation comme moyen biologique de lutte contre la dysenterie amibienne. . . . . [18], 18
—. Infections à *Trypanosoma cruzi* chez les animaux splénectomisés (Discussion). [23], 192
—. A propos des *Grahamella* et des *Bartonella* des rats splénectomisés de Stanleyville (Discussion) . . . . . [23], 916
—. *Grahamella* et *Bartonella*. Remarques à propos de la note de MM. Schwetz et Cabu. . . . . [23], 473
— et NICOLAU (S.). — Essais de culture de quelques ultra-virus en symbiose avec des Protozoaires. . . . . [25], 721
LWOFF (Marguerite). — Culture de *Leptomonas ctenocephali* Fantham var. *chattoni* Laveran et Franchini, en milieux privés de sang frais ; milieux liquides au sang chauffé . . . . . [22], 247
—. Milieux d'isolement et d'entretien pour *Schizotrypanum cruzi* Chagas . . . . [22], 909

M

MACIEL (J.-J.) et CARINI (A.). — La pseudo-rage au Brésil . . . . . [5], 376
— et —. Toxoplasmose naturelle du chien . . . . . [6], 681
— et —. Infections de toxoplasmose et de paralysie bulbaire

infectieuse par les muqueuses saines . . . . . [7], 112
— et —. Existence de la maladie de Chagas dans l'État de São-Paulo . . . . . [7], 259
— et —. Distribution des Triatomes dans l'Etat de São-Paulo. . . . . [7], 297
— et —. Sur une Hémogrégarine et un Trypanosome d'un Muridé (*Akodon fuliginosus*) . . . . . [8], 165
— et —. Quelques hémoparasites du Brésil . . . . . [9], 247
MAGALHAËS (R. DE A.). — Note sur la présence de *Treponema pallidum* dans un fœtus syphilitique. . . . . [2], 163
MAGNEVILLE (A.). — Un cas de theilériose bovine congénitale. . . . . [18], 721
MAILLE et BONNEFOY. — Abcès du foie amibien avec association de bacilles de Koch . . [7], 473
MAKHILADZÉ (N.) et DIDEBOULIDZÉ (G.). — L'endémie d'ankylostomiase en Géorgie . . [19], 891
MALAUSSÈNE. — Le paludisme en Gorée . . . . . [19], 507
—, FABRE (Henri) et GARNODIER. — Splénomégalie tuberculeuse primitive avec anémie du type pernicicux. . . . . [23], 16
MALBRANT (R.) et SICÉ (A.). — Nouveaux essais de préservation des bovidés contre les Trypanosomes par le 309 Fourneau. . . . . [22], 776
MALDONADO (A.). — Rôle probable de quelques plantes caractéristiques de la région verruqueuse sur l'étiologie de la Verruga du Pérou . . . . . [24], 27
MALLOIZEL et BONNARD. — Note sur le paludisme autochtone dans la presqu'île de Langle (golfe du Morbihan) . . . . [10], 805
MALOUVIER. — Une épidémie de paludisme au Tonkin . [6], 745
MANAUD (A.). — Fibromes cutanés simples. Observation recueillie au Cambodge . [1], 51
—. Prophylaxie de la peste par la désinfection publique [4], 224
— Traitement de la dysenterie amibienne par la poudre d'ipéca désémétinisée . . . [4], 322
—. La peste au Siam . . [4], 351
—. Prophylaxie de la peste bubonique au Siam . . . [4], 492
—. Phénomènes tardifs d'envenimation guéris par le sérum antivenimeux . . . . . [5], 43
—. Une observation de contagion du Béribéri . . . . . [5], 514
MANCEAUX (L.). — Procédé de coloration rapide par la teinture de Giemsa . . . . . [4], 230
—. Technique de culture des *Leishmania* . . . . . [4], 286
—. Hémogrégarines du lézard vert *Lacerta ocellata* (var. *pater*). . . . . [5], 347
— et NICOLLE (Ch.). — Sur les conditions de formation des corps en anneau du sang . . . . . [2], 281
— et —. Données expérimentales nouvelles sur le Bouton d'Orient (1re note). . . . . [4], 134
— et —. Application de l'arsénobenzol au traitement du Bouton d'Orient. . . . . [4], 185
—, YAKIMOFF (W.-L.) et YAKIMOFF (N.-K.). — Culture et morphologie du Trypanosome du type *Tr. theileri*, des bœufs tunisiens . . . . . [4], 378
MANDOUL (H.). — Une mission antipaludique dans la XVIIe région (1917-1918) . . . [12], 779
MANGABAEIRA-ALBERNAZ (P.). — L'ulcère phagédénique tropical et son traitement par les insufflations de bismuth . [19], 115
MANGENIE (S.-E.). — Leprosy at Rodrigues. . . . . [13], 644
MANGIN. — Au sujet du traitement du Bouton d'Alep. [17], 361
MANIN (Mlle Y.), LEVADITI (C.) et ANDERSON (T.-E.). — Le rôle du glutathion dans la production du trypanotoxyl et de bismoxyl . . . . . [21], 676
MANOLIU (E.), CIUCA (M.), IRIMESCO (G.), ALEXA et CONSTANTINESCO. — Essais comparatifs sur l'action thérapeutique de la quinine, de la cinchonine et du quinétum dans la malaria . . . . . [18], 770
MANOUSSAKIS (E.). — Recherches étiologiques sur la Dengue . . . . . [21], 200
—. Quelques recherches expérimentales sur la Dengue. [22], [illegible]
MANSION (J.). — Les Phlébotomes en Corse . . . . . [6], 637
—. Les Phlébotomes européens . . . . . [7], 584
—. Une nouvelle station de Phlébotomes en France . . [13], 735
MANSOURI (A.) et FLYE SAINTE-MARIE (P.-E.). — Deux nouveaux cas de leishmaniose cutanée observés chez des Indigènes marocains dans la région de Fez . . . . . [18], 830
MANTOVANI (M.) et FRANCHINI (G.). — Infection expérimentale du rat et de la souris par *Herpetomonas muscæ-domesticæ* . . . . . [8], 109
MARCADE et JOYEUX. — Larves de *Porocephalus armillatus* [11], 60
MARCHADO (Astr.). — Nouvelle

Coccidie de l'intestin d'un Hémiptère. . . . . [4], 616
MARCANDIER (A.). — Note sur les vaccinations contre la peste faites pendant et après l'épidémie de Dakar (1914-15-16). . . . . [9], 592
—. La résistance globulaire dans le paludisme, la fièvre bilieuse hémoglobinurique et la maladie du sommeil . . . [9], 647
— et PIROT (R.). — Étude sur les ectoparasites des rats de Toulon . . . . . [23], 237
— et —. Fréquence du virus du typhus endémique (typhus murin) dans l'encéphale des rats des navires de guerre à Toulon . . . . . [23], 673
— et PLAZY (L.). — A propos d'un essai de classification des fièvres typho-exanthématiques . . . . . [23], 560
MARCHAND (H.). — La cholestérinémie des lépreux . . [15], 139
MARCENAC (M.). — Innocuité de *Galeodes olivieri* au Maroc. . . . . [18], 781
— et PHISALIX (Mme M.). — La soi-disant immunité naturelle du chien Sloughi aux venins de scorpion et de vipère, ainsi qu'au virus rabique . . [19], 438
— et —. Arachnides, myriapodes et serpents de la région du Tadla (Maroc) . . . . [19], 560
MARCHOUX (E.). — Une observation d'abcès du foie . . [1], 38
—. Accès paludéens à formes pneumonique et dysentérique. . . . . [1], 224
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil (Discussion). . [1], 328
—. Destruction des larves de mouches par les poules. [1], 612
—. Causes d'endémicité de la fièvre jaune . . . . . [1], 642
—. Deux remarques à propos de la lèpre (Discussion). . [1], 495
—. Contagion de la lèpre par le coït (Discussion) . . . [2], 201
—. Désinfection des lettres (Discussion) . . . . . [2], 329
—. Index endémique et épidémique . . . . . [2], 583
—. Influences diverses sur les manifestations du paludisme. . . . . [2], 575
—. Lèpre (Discussion). [2], 166, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 182
—. Mesures de protection sanitaire maritime contre la fièvre jaune . . . . . [2], 131
—. Pénétration du virus de la peste aviaire dans la peau et les muqueuses . . . . [2], 243
—. Virulence des spirilles (Discussion) . . . . . [2], 244
—. Le Béribéri. . . . . [3], 116
—. Troupes noires du Sénégal en Algérie (Discussion). [3], 212, 289
—. Eaux de Saïgon (Discussion). . . . . [3], 464
—. Observations faites sur un cas de filariose à *Mf. diurna*. . . . . [3], 613
—. Ver de Guinée. Dépôt au nom de M. Emily . . . . . [3], 741
—. L'hygiène à Grand-Bassam (Discussion) . . . . . [3], 785
—. Alastrim et variole (Discussion) . . . . . [4], 37
—. Thérapeutique de la lèpre (Discussion) . . . . . [4], 55
—. Culture d'un bacille acido-résistant provenant du mucus nasal des lépreux . . . [4], 89
—. Diarrhée de Cochinchine (Discussion . . . . . [4], 162
—. La peste en Mandchourie (Discussion). . . . . [4], 357
—. Formes d'involution en boule des bacilles acido-résistants . . . . . [5], 13
—. Rôle des infections secondaires dans le développement de la lèpre du rat . . . [5], 466
—. Destruction des moustiques dans les lieux mal clos (Discussion) . . . . . [5], 637
—. Lèpre ganglionnaire . [5], 773
—. Bacilles de la lèpre . [5], 63
—. Emploi du salvarsan (Discussion). . . . . [6], 239
—. Conservation du caoutchouc. . . . . [6], 280
—. Le chlorhydrate d'émétine dans la dysenterie amibienne. . . . . [6], 313
—. Lymphangite à répétition (Discussion). . . . . [6], 667
—. Quinine et fièvre bilieuse hémoglobinurique (Discussion) . . . . . [8], 603
—. Influence du milieu extérieur sur la résistance de l'organisme au paludisme . . [11], 1
—. Climat et répartition géographique du paludisme (Discussion) . . . . . [11], 77
—. L'Amibe dysentérique est-elle bien la cause de la dysenterie ? . . . . . [11], 837
—. Tous les alcaloïdes du quinquina possèdent la même action curative sur le paludisme. . . . . [12], 307
—. Granules des Spirochètes (Discussion) . . . . . [12], 600
—. Béribéri et avitaminose . . . . . [13], 196
—. Influence du bien-être sur la régression du paludisme [14], 455
—. Traitement de la lèpre par les savons d'huile de foie de morue et d'huile de Chaulmoogra. . . . . [14], 520

—. Le paludisme en Corse y est fonction de la misère . [14], 654
—. Multiplicité des races dans les trois formes de parasite du paludisme. . . . . [15], 108
—. Mycose pulmonaire. . [15], 919
—. Phlébotomes en France (Discussion) . . . . . [15], 694
—. Action du Stovarsol contre les Lamblias. . . . . [16], 325
—. Le Stovarsol guérit rapidement de la dysenterie amibienne . . . . . [16], 79
—. La prophylaxie pratique du paludisme. . . . . [18], 40
—. Modes divers d'hibernation d'*Anopheles maculipennis* . . . . . [18], 405
—. Individualité de l'*Entamœba dispar* (Discussion) . . [19], 403
—. Remarques sur la lèpre à la Guyane française (Discussion). . . . . [20], 314
—. De la valeur technique de la méthode de Rubino dans la recherche de la sédimentation globulaire chez les lépreux (Discussion) . . . . . [21], 838
—. Rechute de paludisme six ans après le départ du pays d'endémie (Discussion). . . [22], 76
—. La fièvre jaune des enfants (Discussion). . . . . [22], 192
—. Le diagnostic prophylactique et les symptômes de début de la fièvre jaune (Discussion) . . . . . [22], 473
—. Considérations sur l'épidémiologie du béribéri dans la province de Tanan en 1927 (Discussion) . . . . . [22], 994
—. Transport à longue distance du spirochète hispano-marocain pour les besoins de la récurrentothérapie (Discussion) . . . . . [23], 135
—. Dengue et fièvre jaune (Discussion) . . . . . [23], 139
—. Méthode de coloration des plasmides et des protozoaires qui persiste sans changement pendant 25 ans (Discussion). . . . . [23], 789
—. L'orsanine dans le traitement des états intestinaux . [23], 933
—. Autour du « Mystère » de la fièvre quarte (Discussion) . . . . . [24], 282
—. Commission de la Maladie du sommeil (Discussion). . [24], 760
—. Darmous (dystrophie dentaire) du mouton et solubilité du principe actif des phosphates naturels qui le provoque (Discussion) . . . . . [24], 851
—. Le chimpanzé est-il réceptif au virus amaril ? (Discussion). . . . . [25], 191
—. Les verrues vulgaires des lépreux (Discussion) . . [25], 303
—. Essais de désinsectisation durable du sol (Discussion) [25], 541
— et Bourret. — Enquête étiologique dans un foyer de lèpre. . . . . [1], 288
— et —. L'iodure de potassium dans la lèpre . . . . [1], 347
— et —. Essai d'inoculation de la lèpre au chimpanzé . [1], 416
— et Chorine. — Résistance du bacille de la lèpre du rat aux acides et aux alcalis . [25], 1025
— et Couvy (L.). — Argas et Spirilles . . . . . [5], 63
— et —. Argas et Spirochètes . . . . . [5], 796
— et Grall. — Traité du paludisme . . . . . [2], 563
— et Mesnil (F.). — Ostéite hypertrophique généralisée des singes avec lésions rappelant le Goundou . . . . . [4], 150
— et Quilici (P.). — Le stovarsolate de quinine dans la tierce maligne . . . . . [19], 782
Marçon (L.-H.). — Sur un cas de fièvre exanthématique après inoculation intra-oculaire accidentelle du sang d'une tique. . . . . [23], 889
— et Audoye. — Au sujet de quelques cas de typhus endémique observés à bord du cuirassé *Paris* . . . . . [25], 390
Marin et Henry. — Le charbon bactéridien dans la région de Constantine . . . . . [9], 79
Marinot (J.), Morin (H.-G.-S.) et Advier (M.). — Note préliminaire sur les polynévrites observées à l'hôpital indigène de Cholon en janvier-août 1926. . . . . [20], 33
Markianos (J.). — L'Alépol dans le traitement de la lèpre des rats. . . . . [22], 17
—. Réaction de sédimentation des globules de mouton formolés dans la lèpre . . . [22], 152
—. L'Alépol dans le traitement de la lèpre humaine . . [22], 155
—. Filtration du virus de la lèpre des rats . . . . . [22], 410
—. Le développement du virus filtrant avant sa transformation en bacille de la lèpre des rats. . . . . [22], 537
—. Le rôle des poux dans la transmission de la lèpre [22], 633
—. Développement rapide du virus filtrant de la lèpre des rats après inoculation aux jeunes rats . . . . . [22], 758
—. L'ultra-virus de la lèpre des rats. . . . . [22], 896
—. Essai de traitement de la lè-

pre des rats par les bacilles dégraissés. . . . . [23], 145
—. Recherches sur l'action préventive, sur la lèpre des rats, de l'antigène de bacilles dégraissés . . . . . [23], 149
—. Application de l'antigène dégraissé de bacilles de la lèpre murine, dans le traitement de la lèpre humaine . . . [23], 150
—. Essai de traitement de la lèpre murine . . . . . [23], 268
—. Recherche du bacille de Hansen par le procédé de la goutte épaisse. . . . . [24], 172
—. Les verrues vulgaires des lépreux . . . . . [25], 302
—, LÉPINE (P.) et PAPAYOANNOU (A.). — Valeur pratique de la réaction de Rubino pour le séro-diagnostic de la lèpre . . . . . [25], 543
MARKOFF (Mme E.-N.), OULASSEVITCH (J.-S.), RASTEGAÏEFF (Mlle E.-F.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Sur la répartition géographique du *Trypanosoma theileri* en Russie . . . . . [18], 57
MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.), RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Sur l'hémoglobinurie au cours de la babésiellose bovine . . [20], 415
—, YAKIMOFF (W.-L.) et DAWYDOFF (A.-M.). — Modifications du sang au cours de coccidiose des animaux . . . . [19], 427
—, —, GALOUZO (J.-P.), LOUKIANOFF (W.-L.), Mlles RASTEGAÏEFF (E.-F.), ROUMIANTZEFF (E.-W.) et WOITZEKHOWSKY (A.-M.). — Essais de traitement de la piroplasmose bovine par le protargol . . . . . [19], 44
—, —, —, —, WOITZEKHOWSKY (Mlle A.-M.) et YAKOWLEFF (S.-P.). — Le traitement de la piroplasmose bovine par le salvarsan à l'argent (Silbersalvarsan). . . . . [19], 160
—, —, Mlles GNÉDINE (A.-N.), RASTÉGAÏEFF (M.-F.), ROUMIANTZEFF (E.-W.) et TOURIKOFF (N.-F.). — L'arrhénal dans le traitement de la babésiellose bovine (Note préliminaire). [19], 554
—, — et LOUKIANOFF (W.-A.). — A propos de l'immunisation des bovidés vis-à-vis de *Babesiella bovis* en Russie. [19], 550
MARKOFF (Mme E.-N.), YAKIMOFF (W.-L.), WASSILIEWSKY (Mlle W. J.) et RASTEGAÏEFF (Mlle E.-F.). — La coccidiose des porcs en Russie . . . . . [19], 263
MARNEFFE (H.). — Sur deux cas de névrite aiguë du cubital au cours de la lèpre . . . [21], 735
—. Erythèmes noueux chez une lépreuse en cours de traitement . . . . . [21], 737
—. Influence du traitement par les éthers éthyliques de Chaulmoogra sur la desquamation des éléments éruptifs de la lèpre . . . . . [21], 831
— et LABERNADIE (V.). — Étude sur le parasitisme intestinal à Cayenne. . . . . [22], 568
—, SOUCHARD (L.) et LIROU. — Étude expérimentale d'un virus exanthématique isolé d'un cas de typhus, présentant la symptomatologie de la fièvre fluviale du Japon . . . [24], 678
MARQUAND (G.). — Double cas d'asphyxie mortelle causée par manioc insuffisamment sec . . . . . [21], 879
MARQUE (J.-M.) et BRAU (P.). — Paludisme à *Pl. falciparum* et novarsénobenzol . . . [13], 172
MARQUE (E.), LE FERS (F.) et GASCOUGNOLLE (G.). — Trois observations de métastases staphylococciques . . . . . [23], 668
MARQUEISSAC (H. DE). — Contribution à l'étude de l'emploi du 270 Fourneau (orsanine) dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . [25], 252
—. Note sur les modifications que peuvent subir le sang et le liquide céphalo-rachidien des malades atteints de trypanosomiase à virus *gambiense* lorsqu'ils sont laissés sans traitement . . . . . [25], 317
—. Contribution à l'emploi du moranyl (205 Bayer-309 Fourneau) donné à titre préventif dans la trypanosomiase humaine (secteur de Pagouda, Togo) . . . . . [25], 347
—. Propriétés du 205 Bayer-309 Fourneau (moranyl) dans la thérapeutique curative de la trypanosomiase humaine . . . . . [25], 898
—. Emploi du 270 Fourneau (orsanine) en prophylaxie itinérante dans le secteur de Pagouda (Togo) . . . . [25], 902
—. Enquête et sondages démographiques en pays Kabré (Nord-Togo) . . . . . [25], 986
—, LETONTURIER et JAMOT. — Essai de tryparsamide dans la trypanosomiase humaine à virus *gambiense* . . . . [17], 692
MARTIAL (R.) et SÉNEVET (G.). — Présence à Fez d'*Ornithodorus talaje* (Guérin-Méneville, 1849). Action pathogène sur l'homme. . . . . [14], 24
MARTIN (A.) et FRAISSINET. — Syphilis pulmonaire simulant la

tuberculose cavitaire chez un Malgache. . . . . [16], 396
—. Souchard et Letonturier. — Un nouveau cas de mélioïdose observé en Cochinchine. [23], 273
Martin (Gustave). — L'équilibre leucocytaire chez les Noirs atteints de trypanosomiase (Discussion) . . . . . [1], 366
—. Sur les résultats du traitement de la trypanosomiase humaine chez le Blanc (Discussion) . . . . . [1], 623
—. Proposition de vœux à émettre (Discussion). . . . [3], 593
—. Note sur la récolte du vaccin ensemencé sur génisse et sur les résultats obtenus avec le vaccin sec au Cameroun [11], 593
—. La lèpre au Cameroun [12], 613
—. L'organisation médicale allemande au Cameroun . [12], 531
— et Lebœuf. — Diagnostic microscopique de la trypanosomiase humaine. Valeur comparée des divers procédés . . . . . [1], 126
—. De l'hypertrophie ganglionnaire dans la maladie du sommeil. Inflammations locales à la suite de piqûres de Glossines infectées. . . . . [1], 402
— et —. Sur le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . . [1], 508
— et —. Nouveaux documents sur le diagnostic microscopique de la maladie du sommeil. . . . . [1], 510
— et —. Sur l'emploi de l'Atoxyl seul dans le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . . [1], 624
— et —. De la présence du *Trypanosoma gambiense* dans le liquide céphalo-rachidien, le sang et les ganglions des malades du sommeil avant et après traitement . . . . . [2], 472
— et —. Les rechutes dans le traitement de la trypanosomiase humaine. De l'association de la couleur de benzidine, *afridol violet*, à l'atoxyl [2], 54
—, — et Ringenbach. — L'association atoxyl-émétique chez les malades du sommeil avancés . . . . . [2], 620
—, — et —. Sur le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [2], 308
—, — et —. Traitement de la maladie du sommeil par l'orpiment seul. . . . . [3], 42
—, — et —. Le mouvement des malades trypanosomés à Brazzaville. . . . . [3], 604
—, — et —. Traitement de la maladie du sommeil par l'atoxyl-orpiment. . . . . [4], 310
—, — et Roubaud. — Epidémie de maladie du sommeil au Congo français. La contagion par familles et par cases [1], 144
—, — et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo français . . . . . [1], 258
—, — et —. Les trypanosomiases animales du Congo français . . . . . [1], 351
—, — et —. Expériences de transmission du « Nagana » par les Stomoxes et les moustiques du genre *Mansonia* . . . . . [1], 353
—, — et —. Maladie du sommeil au Congo français. . . [2], 344
—, — et —. Trypanosomes d'animaux divers au Moyen-Congo. . . . . [2], 209
—, — et —. Sur la répartition géographique de la maladie du sommeil et des mouches piquantes au Congo français. . . . . [2], 108
— et Ringenbach. — La solution de Lœffler dans le traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine . . . [2], 409
— et —. Un nouveau cas de trypanosomiase humaine chez l'Européen . . . . . [2], 480
— et —. Premiers résultats du traitement de la trypanosomiase humaine par l'arsénophénylglycine . . . . [3], 222
— et —. Sur le traitement de la maladie du sommeil par l'émétique d'aniline seul ou associé à l'atoxyl . . . [3], 228
— et —. Essai de traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine par l'emploi du tryparosane. . . . [3], 330
— et —. Pénétration de *Trypanosoma gambiense* à travers les téguments et les muqueuses intactes . . . . . [3], 433
— et —. Troubles psychiques dans la maladie du sommeil . . . . . [3], 486
— et —. Nouveaux documents sur la distribution de la maladie du sommeil et des Glossines au Congo français . . . . . [3], 529
— et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil à Brazzaville et au Congo français pendant l'année 1909. . . . . [3], 561
— et —. Étude expérimentale du *Tryp. congolense* . . . [4], 196
Martin (J.-M.) et Dekester. — L'éléphantiasis dans la région de Fez (Maroc) . . . . [16], 494

MARTIN (Louis). — Lèpre (Discussion). . . . . [2], 175
—. Troupes noires du Sénégal en Algérie (Discussion) . [3], 212
—. Sur l'emploi du salvarsan. . . . . [6], 384
—. Maladie du sommeil (Discussion). . . . . [6], 631
—. Etat des méninges et leur perméabilité (Discussion). . . . . [7], 68
—. Réinjections sériques (Présentation). . . . . [8], 709
— et DARRÉ (H.). — Résultats éloignés du traitement dans la trypanosomiase humaine. . . . . [3], 333
— et —. Remarques sur l'évolution et le pronostic de la trypanosomiase chez les Blancs . . . . . [3], 389
— et —. Documents sur la trypanosomiase humaine . [7], 711
MARTIN (L.). — Aperçu technique sur les travaux antilarvaires à exécuter sur le terrain [11], 503
MARTIN (Noël) et LAURENT (A.). — Tumeurs éléphantiasiques du pied chez un indigène algérien. . . . . [5], 56
MARTIN (R.) et MONIER (H.-M.). — Sur un cas de trypanosomiase humaine . . . . . [24], 657
MARTIN-CHARPENEL (G.), KOLOCHINE (G.) et MATHIS (M.). — Adaptation du virus amaril à la souris blanche . . . . . [25], 113
—, — et —. Vérification d'une souche de virus amaril adaptée à la souris blanche . . [25], 533
MARTINAUD (G.). — Quelques observations sur les différentes méthodes de traitement des Vers de Guinée . . . . [17], 146
MARTINEZ (F.-F.). — La dysenterie tropicale en Espagne . [10], 904
MARTY (L.). — Agglutination et désagglutination des globules rouges dans la trypanosomiase . . . . . [10], 392
—. Émétine et histolyse des Amibes dysentériques. . . [10], 445
—. De la pseudo-agglutination des globules rouges dans quelques affections à parasites sanguicoles . . . . . [10], 484
—. Émétine et *Amœba coli*. . . . . [10], 539
—. Craw-craw et *Leishmania*. . . . . [10], 806
MARULLAZ (M.). — Au sujet d'un Toxoplasme des oiseaux . [6], 323
—. Contribution à l'étude des Trypanosomes d'oiseaux. Deux espèces nouvelles. . . [7], 115
— et LAVERAN (A.). — Infection du lapin par le *Toxoplasma gondii*. . . . . [6], 249
— et —. Recherches expérimentales sur *Toxoplasma gondii* . . . . . [6], 460
— et —. Sur deux Hémamibes et un Toxoplasme du *Liothrix luteus* . . . . . [7], 21
— et —. Essais d'immunisation des souris contre le Nagana expérimental . . . [7], 53
— et —. Sur la nature des corps de GRAHAM-SMITH . . . [7], 240
— et RAILLET (A.). — Sur un Cénure nouveau du Bonnet Chinois (*Macacus sinicus*) . . . . . [12], 223
MARZINOWSKY (E.-J.). — Cultures de *Leishmania tropica* parasite du Bouton d'Orient . . [2], 591
—. Maladies voisines de la malaria en Russie . . . [5], 868
—. Bibliographie du paludisme. . . . . [7], 462
—. De l'existence de *Stegomyia fasciata* en Russie. . . [7], 390
—. L'immunité dans le Bouton d'Orient . . . . . [21], 638
—. Sur la lutte contre la Dengue . . . . . [23], 797
MASSELOT (F.) et BURNET (Et.). — Deuxième cas de Kala-azar chez l'adulte en Tunisie . . . . . [18], 397
MASSIAS (Ch.). — Myiases humaines en Indochine. Deux cas de myiases génitales chez la femme. . . . . [23], 595
—. Le quiniostovarsol dans le traitement du paludisme à *Plasmodium vivax* et *Plasmodium præcox*. . . . . [23], 651
MASSOL et CALMETTE. — Étude comparée des propriétés antitoxiques préventives et thérapeutiques d'un sérum antivenimeux au cours des saignées successives . . . . . [1], 90
MASSON et PINOY (E.). — Mycétome du poumon de l'âne . . . . . [8], 11
MATHIEU (J.). — L'infection tuberculeuse révélée par les cutiréactions à la tuberculine chez les indigènes de Figuig (Maroc Oriental) . . . . . [21], 10
MATHIS (C.). — La *Microfilaria nocturna* au Tonkin . . [2], 483
—. La piroplasmose canine au Tonkin. . . . . [2], 380
—. Au sujet de *Leptomonas davidi* (Discussion) . . . [4], 464
—. Epidémie de paludisme ayant sévi, dans la province de Son-tay, durant l'été 1913 . [7], 388
—. Réceptivité des nourrissons à la peste septicémique . [15], 920

—. La musaraigne, réservoir de virus pesteux au Cambodge . . . . . [16], 158
— Le dépistage de la peste par la ponction du foie. Son importance prophylactique (Discussion) . . . . . [16], 523
—. La lutte contre la peste à Pnom-Penh (Cambodge). [16], 668
—. Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine (Discussion) . . . . . [16], 61
—. A propos de la vaccination des nourrissons Noirs contre la tuberculose par le B. C. G. . . . . [17], 938
—. Quatre mois de campagne antimurine (sept. à déc. 1924) à Cotonou (Dahomey) (Discussion). . . . . [18], 600
—. Récentes manifestations de fièvre jaune en Afrique Occidentale française (Discussion). . . . . [19], 242
—. La maladie du sommeil dans la Guinée Portugaise (Discussion). . . . . [19], 317
—. Individualité de l'*Entamœba dispar* (Discussion) . . [19], 402
—. Le paludisme à Gorée (Discussion) . . . . . [19], 511
—. Pyodermite rebelle rapidement guérie par des pansements spécifiques d'après la méthode de Besredka (Discussion). . . . . [20], 547
—. Foyer endémique de typhus récurrent à Dakar . . [20], 700
—. Réceptivité des animaux de laboratoire vis-à-vis du Spirochète récurrent humain à Dakar. . . . . [20], 826
— Immunité conférée à la souris grise par diverses souches de virus récurrent humain isolées à Dakar . . . . [20], 1038
—. Transmission expérimentale au singe du Spirochète de la musaraigne par le pou . [21], 173
—. Au sujet des précautions à prendre dans l'étude expérimentale des virus récurrents . . . . . [21], 179
—. Identité, à Dakar, du Spirochète des rats, du Spirochète de la musaraigne et du Spirochète récurrent humain . . . . . [21], 138
—. Identité du Spirochète de la fièvre des tiques (*Sp. duttoni*) et des diverses souches de Spirochètes récurrents dakarois . . . . . [21], 385
—. Cas de fièvre récurrente observés à Dakar et dans ses environs. Découverte de l'Ornithodore, agent de transmission de l'infection (Discussion) . . . . . [25]. 17
—. Sur les événements sanitaires du mois écoulé (mars 1932) (Discussion). . . . . [25], 671
— et Advier (M.). — Considérations épidémiologiques sur la peste au Sénégal . . . [25], 941
—, Bacqué (M.) et Cazanove (F.). — Inoculation de sang et d'urine de jauneux à des cobayes . . . . . [20], 1025
— et Baury (A.). — Pyodermite rebelle de la barbe rapidement guérie par l'antivirus de Besredka . . . . . [22], 731
— et Baujean (R.). — La réaction de Wassermann dans la lèpre. . . . . [8], 252
— et Durieux (C.). — Considérations sur la tuberculose en Afrique Occidentale Française. . . . . [23], 533
— et —. Persistance de *Sp. duttoni*, var. *crociduræ*, dans le cerveau et dans la rate de la souris infectée expérimentalement . . . . . [23], 862
— et —. Entretien au laboratoire des souches de *Spirochæta duttoni*. . . . . [24], 150
— et —. Identité, à Dakar, de *Spirochæta duttoni*, var. *crociduræ* et du Spirochète infectant dans la nature *Ornithodorus erraticus*. . . . . [25], 843
—, — et Ewstifeieff (C.). — Nouveau cas de fièvre récurrente à Dakar . . . . [20], 441
— et Guillet. — Sur la nature de l'épidémie de glossites observée au Sénégal . . [18], 586
— et —. Réceptivité de la souris grise au Spirochète d'Obermeier . . . . . [18], 680
— et —. Réceptivité du lapin au Spirochète de la musaraigne . . . . . [19], 304
— et Heymann (P.). — La réaction de Wassermann dans le paludisme. . . . . [8], 258
— et Leger (M.). — Foyers endémiques de filariose humaine au Tonkin . . . . . [2], 483
— et —. Helminthiase intestinale et hépatique chez les indigènes du Tonkin et du Nord-Annam. . . . . [2], 488
— et —. Les porteurs d'ankylostomes au Tonkin et dans le Nord-Annam . . . . [3], 32
— et —. Sensibilité de la souris blanche au Spirochète de la fièvre récurrente au Tonkin . . . . . [3], 75
— et —. Distribution géographique de la filariose humaine dans l'Indochine du Nord . . . . . [3], 142

-- et —. Douve oculaire de la poule . . . . . [3], 245
— et —. A propos de la présence de bactéries amylozymes dans les fèces des béribériques . . . . . [3], 352
— et —. Immunité conférée au Macaque par le Spirochète de la fièvre récurrente du Tonkin. . . . . [3], 422
— et —. Le paludisme au Tonkin. Indice endémique pendant la saison fraîche . . . . [3], 465
— et —. Nouvelles recherches sur le *Leucocytozoon sabrazesi* et *L. caulleryi* de la poule domestique du Tonkin . . . [3], 504
— et —. Paludisme et Anophélines dans la vallée de la rivière Claire, de Tuyen-Quang à Hagiang . . . . . [3], 632
— et —. *Fasciolopsis buskii* au Tonkin. Son extrême rareté chez l'homme, sa fréquence chez le porc . . . . . [4], 200
— et —. Contribution à l'hématologie du Béribéri et du scorbut . . . . . [4], 315
— et —. De l'image d'Arneth dans le Béribéri . . [4], 320
— et —. Traitement du Surra d'Indochine par l'arsénophénylglycine d'Ehrlich . [4], 403
— et —. Hémogrégarines de reptiles et de batraciens du Tonkin. . . . . [4], 446
— et —. Nature des cellules-hôtes des *Leucocytozoon* . . . . . [5], 77
— et Mercier (L.). — Existe-t-il des kystes à plus de quatre noyaux chez *Entamœba dysenteriæ* ? . . . . . [10], 165
— et —. La schizogonie chez les Entamibes intestinales de l'homme . . . . . [10], 311
— et —. A propos du soi-disant *chromidium* des kystes des Entamibes . . . . . [10], 866
— et — Kystes gamogoniques et schizogoniques chez *Entamœba ranarum*. . . . [11], 47
—, Nicolau (S.) et Constantinesco (Mme A.). — Sur un virus de l'Oulou-fato (maladie du chien fou) isolé chez l'homme. [24], 931
Mathis (M.). — Biologie d'un moustique côtier du Var, *Aedes desbansi* Seguy, 1923 . [22], 179
—, Martin-Charpenel (G.) et Kolochine (G.). — Adaptation du virus amaril à la souris blanche . . . . . [25], 113
Mathon (Ch.) et Audain (L.). — Paludisme larvé . . . [4], 688
Matignon (J.-J.). — Traitement de la Dysenterie par la « méthode chinoise » . . . . . [1], 307
—. Les émanations des selles dysentériques renferment-elles des principes toxiques ? [1], 358
—. Note sur le laquage des dents en Indochine . . . . . [5], 401
Matikaschwiti (I.) et Yakimoff (W.-L.). — La Coccidie du hibou . . . . . [25], 1045
— et —. Sur la Coccidie du porc sauvage . . . . . [25], 1046
— et —. La coccidiose du daim. . . . . [25], 1048
Matta (A. de). — Sur les leishmanioses tégumentaires. Classification générale des leishmanioses (avec les pl. XI et XII). . . . . [9], 494
—. Tableau synoptique de la classification des leishmanioses . . . . . [9], 761
—. Émétiothérapie dans la leishmaniose tégumentaire . [10], 34
— La tréponémose de Castellani (Boubas) et son traitement par les arsenicaux et l'émétique . . . . . [10], 836
—. Considérations sur l'entérotrichocéphalose et la trichocéphalose appendiculaire. [10], 932
—. Sur la spirochétose hépatorénale (spirochétose ictéro-hémorragique) et son traitement. . . . . [12], 128
—. Un nouveau Réduvide de l'Amazone, *Rhodnius brethesi* n. sp. . . . . [12], 611
Matte (E.) et Sanz (B.). — Quelques essais de vaccination préventive contre la fièvre aphteuse . . . . . [14], 523
Matweieff (W.-N.) et Yakimoff (W.-L.). — Distribution de la Dourine en Russie. . . [18], 54
Mauclaire, Guillier et Jeanselme. — La lèpre est-elle toujours incurable ? . . . . . [5], 196
Maya (E.) et Barbeau (G.). — La vaccination antituberculeuse par le B. C. G. à l'Ile Maurice . . . . . [21], 190
Mazza (S.). — Phagocytose des Bacilles de Stephansky dans le péritoine des rats et des cobayes . . . . . [17], 208
—. *Triatoma geniculata*, agent de transport de *T. cruzi*. Nouveaux cas de fièvre de Malte en Argentine . . . . [25], 145
Medeiros (Mauricio). — Contribution brésilienne à la connaissance de certaines mycoses tropicales. . . . . [21], 449
Meillour (Le). — Voir Le Meillour.
Meirelles (Z.). — Diarrhées des enfants. . . . . [3], 47

—. Épidémiologie de la variole. I. Étiologie et prophylaxie . . . . . [3], 98
—. Épidémiologie de la variole. II. Vaccine et variole . [3], 167
MELANDINI (C.), BLANC (G.) et STYLIANOPOULO (M.). — La variole des chèvres en Grèce. . [20], 583
MELENEY (H.-E.). — Schistosomiase et Kala-azar en Chine . . . . . [18], 364
MELISSIDIS (A.) et CARDAMATIS (J.). — Deux cas de Bouton d'Orient dont le premier très rare. Antagonisme probable du Kala-Azar et du Bouton d'Orient. . . . . [4], 454
— et —. Rôle probable de la mouche domestique dans la transmission des *Leishmania*. . . . . [4], 459
MELLO (Froilano DE). — Caractères du *Spirochæta bronchialis* Cast . . . . . [17], 899
—. Parasites intestinaux de l'Inde Portugaise . . . [20], 608
—. Sur une méthode pour délimiter l'étendue des splénomégalies et enregistrer d'une façon précise leurs oscillations ultérieures . . . . . [22], 788
—. Un cas d'anémie grave (pernicieuse plastique ?). Résultats brillants du traitement par la ventriculine . . . . . [24], 475
—. Sur une nouvelle espèce de *Scopulariopsis* trouvée aux Indes Portugaises . . . [25], 293
— et AZEVEDO (Antonio DE). — Note préliminaire sur l'action plasmodicide de l'atébrine . . . . . [25], 874
— et BARRETO (F.). — Contribution à l'étude de la valeur diagnostique de la réaction de Gaté et Papacostas et de quelques autres réactions alliées . . . . . [19], 127
— et BRAS DE SA. — La plasmoquination en masse des localités malariennes et ses résultats prophylactiques. . . . [24], 649
—, — et AZEVEDO (Antonio DE). Résumé des observations concernant l'action plasmodicide de l'atébrine. . . . . [25], 878
— et CABBAL (J.). — Essais de culture du bacille de Hansen. . . . . [19], 771
— et —. Les insectes sont-ils susceptibles de transmettre la lèpre ? . . . . . [19], 774
— et —. Résultats d'injections d'éparséno sur deux malades de lèpre mixte . . . . [19], 779
—, CORREIA (F.), FERNANDES (Mlle M.) et LOBO (M.). — Sur une plasmodie du fourmilier, *Manes pentadactyla* . . [21], 205
— et CRUZ (L.-J.-C. DA). — Résultats du traitement expérimental de divers états d'amibiase intestinale par le Yatren puissimum. . . . . [21], 842
— et MESQUITA (B.-P.). — Sur les spirochétoses intestinales humaines dans l'Inde Portugaise . . . . . [17], 857
— et REBELLO (F.). — Anaplasmose du *Bos brachyceros* d'Angola. . . . . [16], 167
— et RODRIGUES (A.). — Sur un cas de blastomycose à placards multiples végétants verruqueux ou pustulo-ulcérés . . . . . [22], 142
— et VARNEGAR (H.-M.-P.). — Effets du traitement par la *Smalarina cremonese* sur six malades atteints de malaria chronique avec récidives fébriles (*1re communication*) [20], 323
— et —. Nouvelles études sur les résultats de la *Smalarina cremonese* . . . . . [20], 966
MELLO (L.-R.). — La prophylaxie du tétanos ombilical à Saïgon (Cochinchine) . . [22], 6
MELLO (Ugo). — Un cas de toxoplasmose du chien observé à Turin. . . . . [3], 359
—. Le *Trypanosoma gambiense* a-t-il une affinité pour le testicule ? . . . . . [6], 383
— et WEINBERG. — Recherches expérimentales sur l'origine de l'éosinophilie dans les helminthiases . . . . . [1], 463
— et —. Un cas de paratyphoïde avec lésions d'aspect typhique chez le chimpanzé . . [2], 11
MELNOTTE (P.). — Contribution à l'étude de la pathologie intestinale au Maroc . . . [21], 440
—. Contribution à l'étude des atteintes rénales au cours du paludisme . . . . . [23], 958
—. Les affections typhoïdes au Maroc. Statistique générale et épidémiologie . . . . [25], 447
—. Caractères cliniques des affections typhoïdes au Maroc . . . . . [25], 461
—. La fièvre typhoïde au Maroc. Ses complications et associations . . . . . [25], 626
— et GRIMAUD (L.). — Note sur le diagnostic précoce du typhus exanthématique par le Laboratoire. . . . . [21], 305
— et DEKESTER (M.). — Au sujet de la fréquence dans les selles diarrhéiques au Maroc des *Trichomonas* et autres Protozoaires. . . . . [17], 301

Mercier. — Index endémique du Paludisme au Sénégal durant la saison sèche (Discussion) . . . . . [15], 770
—. Index paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison (Discussion). . . . . [16], 212
Mercier (L.) et Mathis (C.). — Existe-t-il des kystes à plus de quatre noyaux chez *Entamœba dysenteriæ* ? . . . . [10], 165
— et —. La schizogonie des Entamibes intestinales de l'homme. . . . . [10], 311
— et —. A propos du soi-disant *chromidium* des kystes des Entamibes . . . . . [10], 866
— et —. Kystes gamogoniques et schizogoniques chez *Entamœba ranarum* . . . [11], 47
Mesincescu et Calinescu (J.). — Spirillose des poules et *Argas persicus* en Roumanie . [2], 292
Mesnard (J.). — Un cas de leishmaniose cutanée (Bouton d'Orient). Incubation particulièrement longue. Auto-observation. . . . . [24], 761
— et Bablet (J.). — Syndrome rabiforme dans un cas de typhus exanthématique chez l'Annamite . . . . . [20], 318
—, — et Polidori. — Premiers résultats d'une enquête sur le typhus exanthématique au Tonkin . . . . . [19], 766
—, — et Stefani. — Note sur un cas d'abcès amibien du poumon gauche . . . [19], 884
— et Bordes (L.-A.). — L'importance du réservoir de virus autochtone dans la lutte contre le paludisme en Indochine. . . . . [23], 811
— et Morin (H.). — Réceptivité naturelle de *Anopheles* (*Myzomyia*) *aconitus* à l'infection par l'Hématozoaire du paludisme en Cochinchine . [24], 554
— et —. Nouveaux faits relatifs à la réceptivité naturelle des Anophèles d'Indochine à l'Hématozoaire du paludisme. . . . . [24], 919
—, Stefani et Le Meillour. — Un cas d'affection pulmonaire subaiguë simulant la tuberculose guéri par la quinine. . . . . [20], 113
Meslin (Ch.), Bernard (N.) et Koun (L.). — Note sur la tuberculose à Hué . . . [4], 550
—, — et —. Épidémiologie de la tuberculose en Annam . . . . . [5], 234
—, Foley (H.) et Sergent (Edm.). — Le trachome dans les régions sahariennes. Immunité relative des races nègres . . . . . [6], 634
Mesnil (F.). — Sur le traitement de la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [1], 510
—. Trypanosomiase des Mammifères au Congo français (Haute-Sangha, Logone, Ouhame) (Discussion) . . . [1], 519
—. Présence de *Microfilaria nocturna* en Cochinchine (Discussion) . . . . . [1], 564
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [1], 328
—. Courbes thermiques dans la Dourine . . . . . [2], 213
—. Filariose au Tonkin (Discussion). . . . . [2], 486
—. *Leucocytozoon* des Perdrix du Tonkin (Discussion). [2], 208
—. Pénétration des Trypanosomes par la peau et les muqueuses . . . . . [2], 244
—. Sérum des animaux trypanosomés (Discussion). . [2], 139
—. *Trypanosoma dimorphon* (Discussion). . . . . [2], 457
—. A propos du procès-verbal. Au sujet de la note de MM. Thiroux et Dufougéré . . . . . [3], 62
—. *Trypanosoma vivax* et *Trypanosoma cazalboui* (Discussion) . . . . . [3], 82
—. Résumé français de : « Experimental infection of the Madras bazaar fly, *Musca nebulo* Fabr. with *Herpetomonas muscæ domesticæ* (Burnett) », par W.-S. Patton. . . . . [3], 273
—. Résumé français de : « Preliminary report on a new piroplasm (*Piroplasma gibsoni* sp. nov.) found in the blood of the hounds of the Madras hunt and subsequently discovered in the blood of the jackal *Canis aureus* », par W.-S. Patton. . . . . [3], 281
—. Protozoaires du mouton (Discussion) . . . . . [3], 298
—. *Rynchomonas luciliæ* (Discussion) . . . . . [3], 303
—. Sur l'identification de quelques Trypanosomes pathogènes. . . . . [3], 376
—. Résumé français de la note de Darling . . . . . [3], 385
—. Auto-agglutination en trypanosomiase (Discussion). . . . . [3], 443
—. *Leptomonas* dans les Euphorbes (Discussion) . [4], 200
—. Piroplasmose canine (Discussion) . . . . . [4], 295

—. Filaire des porcins (Discussion) . . . . . [4], 389
—. Au sujet de *Leptomonas davidi* (Discussion) . . . [4], 464
—. Au sujet du traitement des infections à *Tr. gambiense* par le 606 (Discussion) . . [4], 476
—. Trypanosomes des bovidés (Discussion) . . . . [4], 539
—. *Trypanosoma gambiense* et *Tr. rhodesiense* (Discussion) . . . . . [4], 623
—. *Tryp. rhodesiense* (Discussion) . . . . . [5], 30
—. Lésions de l'œil chez les poules trypanosomées . [5], 213
—. Séro-diagnostic des trypanosomiases (Discussion). [5], 225
—. Variations de virulence du *Tryp. gambiense* de deux origines humaines . . . [5], 373
—. Cycle évolutif de *Schizotrypanum cruzi* (Discussion) . . . . . [5], 364
—. Stomoxes et *Trypanosoma cazalboui* (Discussion) . [5], 385
—. *Tryp. rhodesiense* et sérum humain (Discussion). . [5], 370
—. Déplacement des Microfilaires dans le champ du microscope (Discussion). . . [5], 450
—. Piroplasmose (Discussion). . . . . [5], 485
—. Rhizoplastes de *Leishmania* (Discussion). . . . . [5], 842
—. Trypanosomiase de laboratoire (Discussion). . . [5], 890
—. *Toxoplasma gondii* (Discussion) . . . . . [6], 254
—. Émétine dans les trypanosomiases (Discussion) . [6], 427
—. A propos du pouvoir protecteur du sérum des malades du sommeil . . . . . [6], 447
—. Toxoplasme (Discussion) . . . . . [6], 468
—. Guérison et immunité en piroplasmose . . . . . [6], 541
—. Pouvoir attachant du sérum des trypanosomés. . . [6], 541
—. Note sur le Nagana de l'Ouganda. . . . . [6], 685
—. Dérivé du diaminoarsénobenzène (Discussion) . [7], 595
—. Xénodiagnostic (Discussion). . . . . [7], 710
—. Documents sur la Trypanosomiase humaine (Discussion). . . . . [7], 715
—. Sur la position systématique des Hémosporidies (Discussion du mémoire de França) . . . . . [8], 241
—. A propos de l'agent de la dermatose contagieuse (Discussion) . . . . . [8], 359
—. *Trypanosoma wrublewski* (Discussion). . . . . [8], 433
—. A propos du flagellé nouveau décrit par MM. Derrieu et Raynaud (*Pentatrichomonas = Hexamastix* D. et R. nec Alexeieff) . . . . [8], 574
—. Atténuation de la virulence des Trypanosomes (Discussion) . . . . . [9], 117
—. Trypanobleu et infections à Trypanosomes (Discussion). . . . . [9], 241
—. Nagana du Zoulouland et Nagana de l'Ouganda ; comparaison (Discussion) . . . [9], 737
—. *Entamœba coli* Lœsch (Discussion) . . . . . [10], 136
—. Trachome (Discussion) [10], 272
—. Goundou (Discussion) . . . . . [10], 483
—. Destruction des rats (Discussion) . . . . . [12], 484
—. Diminution des éosinophiles dans les spirochétoses (Discussion) . . . . . [12], 627
—. Variété des voies d'accès des parasites sanguicoles à leurs hôtes . . . . . [14], 310
—. Contribution à l'étude des modes de disparition des Trypanosomes des souris sous l'action de divers médicaments actifs : émétique, 189, 205 Bayer (Discussion) . . [16], 780
—. Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine (Discussion) . . . . . [17], 65
—. Sur 4 cas de piroplasmose équine (*Piroplasma caballi*) observés dans le département de la Loire-Inférieure (Discussion) . . . . . [17], 353
—. A propos de l'efficacité de la quinine préventive (Discussion) . . . . . [18], 278
—. Sur quelques détails de la structure des *Leishmania* (Discussion) . . . . . [18], 346
—. Individualité de l'*Entamœba dispar* (Discussion) . . [19], 403
—. Sur un nouveau foyer de trypanosomiase bovine observé à la Guadeloupe (Discussion) . . . . . [19], 437
—. Note préliminaire sur les essais de traitement de la trypanosomiase humaine chronique par l'acétylarsan (Discussion) . . . . . [20], 221
—. Présentation d'un squelette de Cercocèbe atteint de « Goundou des Singes » (Discussion) . . . . . [23], 482
—. Sur l'adaptation des Trypanosomes à l'homme . . [23], 719
—. Essais de culture de quelques ultra-virus en symbiose

avec des Protozoaires (Discussion) . . . . . [25], 728
— et BLANCHARD (M.). — Infection comparée des porcs par *Trypanosoma gambiense* et *Tr. rhodesiense* . . . . . [5], 492
— et —. Sur l'identification du virus d'un cas de trypanosomiase humaine de laboratoire. . . . . [7], 196
— et —. Sensibilité au sérum humain normal de Trypanosomes d'origine humaine. [9], 81
— et BOURRET (G.). — Sur un Trypanosome humain du Sénégal . . . . . [7], 716
— et BRIMONT. — Sur l'action de l'émétique dans les trypanosomiases . . . . . [1], 44
— et —. Essais de prévention contre les infections à *Trypanosoma gambiense* . . [1], 210
— et —. Sur la valeur curative de l'émétique dans les diverses trypanosomiases . . . [1], 212
— et KERANDEL (J.). — Sur l'action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les trypanosomiases expérimentales et en particulier dans les infections à *Tr. gambiense*. . . . . [2], 402
— et —. Action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les trypanosomiases. . . . . [3], 732
— et LAVERAN (A.). — Trypanosomes et trypanosomiases . . . . . [5], 702
— et LEGER (M.). — Documents relatifs au Surra des caprins et à leur immunité . . [5], 31
— et MARCHOUX (E.). — Ostéite hypertrophique généralisée des singes avec lésions rappelant le Goundou . . . . . [4], 130
— et MOTAIS (F.). — Sur l'action trypanocide *in vivo* d'un dérivé (OK_1) du diaminoarsénobenzène . . . . . [8], 32
—, NICOLLE (M.) et REMLINGER. — Recherche du Protozoaire de J.-H. Wright dans 16 cas de bouton d'Alep . . . . . [1], 41
— et RINGENBACH (J.). — Action pathogène de *Trypanosoma rhodesiense* . . . . . [4], 675
— et —. Observation d'une chèvre infectée de *Tr. rhodesiense* . . . . . [5], 105
— et —. Sur le *Trypanosoma rhodesiense* et ses affinités avec le *Trypanosoma gambiense*. . . . . [7], 612
— et ROUBAUD (E.). — Rapport sur la prophylaxie des trypanosomiases . . . . . [7], 1
MESQUITA (B.-P.) et MELLO (F. DE). — Sur les spirochétoses intestinales humaines dans l'Inde Portugaise . . . . . [17], 857
MESSIMY (Robert). — Vitiligo géant chez les indigènes du Maroc. . . . . [23], 576
—. A propos de quelques cas de lèpre, observés au Maroc, dans la région de Marrakech. [23], 600
METELKINE (A.-J.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Sur la question de l'isotonie des solutions des remèdes chimiothérapeutiques . . . . . [19], 584
MICHAILIDIS (N.) et ARAVANTINOS (A.). — Un cas de cystite amibienne. . . . . [11], 685
MICHELI (M.) et AUBERT (P.). — Essais de traitement des infections expérimentales à *Trypanosoma gambiense* et *dimorphon* avec des « suspensions huileuses » d'arsenic et d'antimoine (Métoléine). . . [8], 28
MIEGEVILLE. — Note clinique sur la blastomycose oculaire de l'âne . . . . . [17], 543
MIGLIANO (L.) et CARINI (A.). — Sur un Toxoplasme du cobaye (*Toxoplasma caviæ*, n. sp.) . . . . . [9], 435
MIGONE (L.-E.). — Le rôle des Carpinchos comme réservoirs de virus dans la conservation du Mal de Caderas . . [3], 524
—. Un cas de Kala-azar à Assuncion (Paraguay) . . [6], 118
—. La Buba du Paraguay, leishmaniose américaine . . [6], 210
—. Un nouveau flagellé des plantes : *Leptomonas elmassiani* . . . . . [9], 356
—. Parasitologie de certains animaux du Paraguay . [9], 359
— et PENA (R.). — Le Mal de Caderas des bovidés du Paraguay . . . . . [25], 590
MIKÉLADZÉ (Ch.). — La sprue en Géorgie . . . . . [19], 201
—. Sur la relation entre les pressions artérielles et la viscosité sanguine chez les paludéens . . . . . [19], 540
MILLER (G.-A.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Les Protozoaires de l'intestin de l'homme en dehors de l'organisme de l'homme. L'examen de l'intestin de *Periplaneta orientalis* . . . . . [15], 8
— et —. Les Protozoaires de l'intestin de l'homme en dehors de l'organisme de l'homme (L'examen de l'intestin des grenouilles de Pétrograd) . . . . . [18], 306

— et —. Les Protozoaires de l'intestin des rats d'égout . . . . . [18], 314
Millischer (P.) et Chaillot (L.). — Le polymorphisme du Streptocoque . . . . . [24], 761
— et Lauzeral (P.). — A propos de la filiation de deux cas de peste, l'une à allure septicémique, l'autre à allure pneumonique . . . . . [23], 935
Millous, Raboisson et Pluchon. — Observations cliniques sur un cas isolé de fièvre jaune traité par le sérum de Pettit. . . . . [25], 362
Miramond de la Roquette. — Sur l'absorption du rayonnement solaire par la peau et son utilisation dans l'économie animale . . . . . [7], 406
Mitard (Mlle L.), Lhuerre (H.) et Boulay (A.). — Sur le passage de la quinine dans le lait maternel . . . . [21], 466
Mitter (S.-N.). — *Filaria immitis* in Calcutta. . . . [5], 731
Miyajima (E.). — Vingt-cinq années de parasitologie au Japon . . . . . [23], 688
Mochkovski (Ch.). — Les principes du traitement quinique du paludisme . . . . [17], 310
—. Critérium leucocytaire de la persistance de la malaria . . . . . [24], 544
Moldovan (J.). — Sur le développement de *Leucocytozoon ziemanni*. . . . . [6], 428
Mondain (A.) et Legendre (F.-M.-A.). — L'action du quinio-stovarsol sur les schizontes de *Plasmodium falciparum* . . . . . [21], 625
Monfort (L.). — Essais de traitement des trypanosomiases expérimentales par l'arsénophénylglycine . . . . [6], 588
Monfort (F.), Blanchard (M.), Aubert (P.) et Heckenroth (F.). — Le salvarsan dans la prophylaxie et le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [6], 632
—, Heckenroth (F.) et Kernéis (J.). — Quelques remarques sur le Pian au Congo français. Emploi du 606 . . [6], 243
Monier (H.-M.). — Essai d'un dérivé de la quinoléine (664 Fourneau) dans la malaria expérimentale . . . . [24], 93
—. Essais thérapeutiques du 710 Fourneau dans quelques cas de paludisme . . . [24], 97
—. Action de la plasmoquine simple dans un cas de paludisme à *Pl. præcox* . . [24], 101
—. Association du 710 Fourneau avec la quinine et le stovarsol . . . . . [24], 378
—. Renseignements recueillis sur le paludisme à Thakhek (Laos) au cours d'une visite effectuée en février 1932. . . . [25], 419
—. Evolution d'un foyer de lèpre circonscrit dans la province de Cammon (Laos) . . . [25], 606
— et Dang-Teh-Trinh. — Note sur un Infusoire parasite et pathogène . . . . . [25], 1049
— et Martin (R.). — Sur un cas de trypanosomiase humaine . . . . . [24], 657
Monier (H.) et Lavergne (J.). — Utilisation de la séro-floculation de Henry dans le diagnostic et le traitement du paludisme . . . . . [24], 539
Monnerot-Dumaine (M.). — Un signe de l'amibiase intestinale chez l'enfant . . . . [25], 947
Monnier. — Au sujet d'un pied de Madura observé à Fort-Dauphin, Madagascar (avec la pl. VII) . . . . . [11], 407
Monod (Th.) et Velu (H.). — Quelques faits relatifs à la prophylaxie vaccinale contre le charbon bactéridien au Maroc . . . . . [13], 14
Montel (G.-M.-H.) et Montel (M.-L.-R.). — Un nouveau cas d'adénopathie iliaque d'origine probablement amibienne. . . . . [17], 629
Montel (M.-L.-R.). — Mortalité des Européens à Saïgon. Maladies intestinales. Eaux de boisson. . . . . [3], 459
—. Un essai de quinine préventive à Hatien (Cochinchine). . . . . [3], 626
—. Quinine et grossesse . [3], 629
—. Notes de thérapeutique sur la lèpre (Discussion). . [4], 48
—. Lèpre (Discussion). . [4], 71
—. La fièvre jaune (Discussion). . . . . [4], 103
—. Rapport fait au nom de la Commission des Eaux de Saïgon. . . . . [4], 347
—. Le IIIe Congrès de la Far-Eastern Association of tropical medicine. . . . . [7], 10
—. Nodosités juxta-articulaires chez les Annamites. Traitement par le novarsénobenzol . . . . . [13], 354
—. Un cas d'anaphylaxie à la quinine . . . . . [13], 394
—. Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine (Discussion) . . . . . [17], 64
—. Note sur la fièvre typhoïde

à Saïgon. Fréquence des formes septicémiques pures . . . . . [17], 163
—. Études de pathologie annamite en Cochinchine. . [17], 434
—. Erythème toxique par le stovarsol. . . . . [17], 630
—. Du traitement du paludisme, maladie essentiellement curable (Discussion) . . . [17], 691
—. Administration du sérum antidysentérique *per os* et en lavements dans le traitement de la dysenterie bacillaire . . . . . [21], 16
—. Le paludisme chez les Européens en Haute-Volta (Discussion) . . . . . [21], 209
—. Conférence sur l'évolution clinique du Pian . . . [21], 277
—. Sur un cas de dysenterie amibienne récidivante traité par le « Yatren ». . . [21], 367
—. Sur le traitement du Pian (Discussion) . . . . . [21], 747
—. Le chancre pianique. « Lésion primaire d'inoculation ». . . . . [21], 785
—. Rechute de paludisme six ans après le départ de pays d'endémie (Discussion) . [22], 75
—. Place de la fièvre exanthématique (= fièvre boutonneuse) dans le groupe des fièvres indéterminées (Discussion) . . . . . [22], 94
—. Quelques considérations sur le traitement de la lèpre . . . . . [23], 404
—. Guérison par l'émétine d'un abcès du foie constitué (Discussion) . . . . . [23], 425
—. Excès d'urée sanguine et paludisme ancien (Discussion) . . . . . [23], 427
—. Action vaccinante réciproque des venins d'abeille et de vipère aspic (Discussion) . . . . . [23], 584
—. Syphilis exotique et tabès (Discussion) . . . . . [23], 684
—. A propos de la communication de T. von Büllow sur un cas de surinfection dans le Pian . . . . . [23], 946
— et Broquet. — Un cas de filariose autochtone chez un Annamite de Cochinchine . . . . . [2], 6
— et Couput. — Lésions ostéopériostiques tertiaires dans le Pian. Aspect radiologique . . . . . [23], 1032
— et Dang Van Cuong. — Action de la quinine sur les corps en croissant . . . . . [11], 690
— et —. Paludisme et Phagédénisme. Paludisme et arrêt de développement. « Infantilisme palustre » . . . . . [11], 690
— et Pons (R.). — Dermatite blastomycosique chéloïdienne . . . . . [19], 876
—, Tran van An et Dang van Cuong. — Adénopathies iliaques primitives chez les Annamites de Cochinchine. Guérison par le chlorhydrate d'émétine. . . . . [17], 67
—, — et —. Tension artérielle et viscosité sanguine dans le paludisme chez les Annamites de Cochinchine . . . [17], 799
—, — et —. Tension artérielle et viscosité sanguine dans le Béribéri chez les Annamites de Cochinchine. . . . [18], 475
— et Vielle (A.). — Un cas d'amibiase cérébrale. . [21], 231
Montestruc (E.). — Infection et réinfection trypanique chez un Européen (auto-observation) . . . . . [23], 664
Montgomery. — Coccidiose des bovidés de l'Afrique orientale. . . . . [3], 293
Monthus et Nattan-Larrier. — Iritis et trypanosomiase chez l'homme . . . . . [1], 277
Montpellier (J.). — Observations nouvelles de lèpre recueillies à Alger . . . [11], 435
—. Les trichophyties à Alger. . . . . [11], 350
—. Les tumeurs malignes de la peau chez les indigènes de l'Algérie (Epithéliomes et sarcomes) . . . . . [12], 184
—. Un nouveau cas de lèpre rencontré à Alger (Lèpre d'importation) . . . . . [12], 61
—. Encore trois cas de lèpre rencontrés à Alger . . [14], 15
—. Note biologique au sujet des mycétomes. Essais de vaccinothérapie . . . . . [15], 7
—. Deuxième cas algérien de mycétome du pied (type « pied de Madura ») dû à l'*Aleurisma apiospermum*. . [17], 735
—. « Clou de Biskra » observé dans les environs d'Alger . . . . . [18], 249
— et Ardoin. — La cure arsénobenzolée dans la dracunculose . . . . . [12], 730
— et Brault (J.). — Mélanodermie physiologique des muqueuses en Algérie . . [7], 216
— et —. Présence de Spirilles de la fièvre récurrente nord-africaine dans quelques liquides et excréta de l'économie . . . . . [7], 472
— et —. Essai de traitement de

la fièvre récurrente nord-africaine par injections intra-musculaires d'olarsol. . . [7], 473
— et CATANEI (A.). — Blastomycose de l'avant-bras chez une femme indigène d'Alger . . . . . [19], 586
—, — et CLAPIER (P.). — Étude d'un mycétome à grains noirs dû à *Glenospora clapieri* Catanei, 1927 . . . . . [20], 802
—, — et COLONIEU (L.). — Sur un cas d'actinomycose de la face observé à Alger. . [21], 197
—, — et LEFRANC. — Un nouveau cas d'actinomycose de la face observé à Alger. . [24], 431
—, — et —. Un nouveau cas de sporotrichose humaine observé en Algérie . . . . . [25], 297
—, DEGOUILLON et LACROIX (A.). — La gale filarienne est-elle bien une manifestation de volvulose ? . . . . . [13], 530
—, — et —. Note complémentaire sur la gale filarienne et son évolution . . . . [14], 211
— et GOUILLON (P.). — Mycétome du pied (type « pied de Madura ») dû à *Aleurisma apiospermum* . . . . [14], 285
— et LACROIX (A.). — Le Crawcraw ou gale filarienne ; son origine dans les kystes sous-cutanés à *Onchocerca volvulus* . . . . . [13], 305
— et —. Encore un mycétome du pied, type « pied de Madura » observé en Algérie et dû au *Nocardia maduræ* [14], 357
— et —. Nouvelle note au sujet de la « gale filarienne » [15], 815
—, — et BOUTIN (P.). — Note hématologique concernant les sujets infestés par *Onchocerca volvulus* . . . . . [14], 653
—, — et RAYNAUD (M.). — Phagédénisme chronique serpigineux de l'aine (ulcère serpigineux vénérien). . . . . [15], 641
—, — et —. Un cas de mycétome du pied à *Nocardia maduræ* chez un indigène algérien . . . . . [15], 379
MOORE et WEINBERG. — Quelques données sur l'éosinophilie dans les helminthiases. . . . [1], 439
MORALEDA (Carmen) et CAMARA (Pedro de la). — Observations de trente et un cas de paludisme traités par le quiniostovarsol. . . . . [24], 333
MORAX (V.). — L'inégalité pupillaire signe possible de l'abcès du foie (Discussion) . . [1], 424
—. Inoculation intra-cornéenne des Trypanosomes . . [2], 261
—. Choriorétinite et trypanosomiase humaine . . . [3], 305
—. Kératites leishmaniosiques et toxoplasmiques . . . [6], 478
—. Choléra des singes (Discussion) . . . . . [6], 484
—. Essais de traitement des affections oculaires par les sérums (Discussion) . . [8], 415
—. Arthrite d'origine dysentérique et manifestations oculaires (Discussion) . . . . . [10], 12
—. Le trachome des travailleurs coloniaux . . . . . [10], 296
—. Contamination trachomateuse . . . . . [10], 373
—. Les troubles oculaires dans la maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [15], 146
— et KÉRANDEL. — Un cas de cyclite dans la trypanosomiase humaine . . . . . [1], 398
MOREAU (G.). — Épidémie de paludisme sur un navire. [18], 218
— et HUDELLET (G.). — Contribution au diagnostic précoce de la lèpre par les rayons X. . . . . [18], 757
MOREAU (L.). — Prophylaxie du paludisme dans l'Afrique Orientale allemande. [6], 569
—. A propos de la prophylaxie de la lèpre. Les léproseries des îles Comores . . . . [7], 91
—. Arthrites du genou d'origine dysentérique . . . [10], 10
—. Sur un cas d'amibiase hépatique autochtone. Abcès du lobe gauche. Intervention chirurgicale. Guérison . . [10], 696
—. Sur deux cas de gangrène du pied et de la jambe, ayant pour cause une artérite d'origine palustre . . . . [11], 28
MOREELS (M.), VAN DEN BRANDEN (F.) et CLEVERS (Mlle). — Essai de traitement de la trypanosomiase humaine et des affections animales à *T. congolense* par le « 2754 » Hœchst (*Note préliminaire*) . . . . [20], 734
MORENAS. — Un cas de filariose dû à *Acanthocheilonema perstans* avec manifestations cliniques à grosse éosinophilie . . . . . [22], 325
MORIN (A.) et GENEVRAY (J.). — Présence en Nouvelle-Calédonie de *Spirillum morsus muris* et de *Spirochæta recurrentis* . . . . . [19], 529
MORIN (Henry-G.-S.). — Syndromes dysentériques guéris par le seul traitement antihelminthique. . . . . [16], 330
—. Sur la présence d'œufs de *Schistosomum mansoni* à Madagascar dans les selles d'individus sains cliniquement . . . . . [14], 229

—. Sur un procédé technique de recherche des œufs de *Schistosomum mansoni* . . [14], 328
—. Lésions osseuses dans l'aïnhum (Discussion) . . [15], 352
—. Action de la quinine sur les schizontes de *Pl. malariæ* . . . . . [18], 710
—. Sur la syphilis nerveuse en Cochinchine. . . . . [20], 116
—. Recherches sur l'index paludéen de la population indigène dans la région de Kontum (Centre Annam) . [21], 26
—. Sur la présence de *A.* (*Myzomyia*) *kanwari* en Cochinchine . . . . . [22], 253
—. Sur quelques cas de septicémie à Entérocoques de Thiercelin . . . . . [22], 690
—, Marinot (J.) et Advier (M.). — Note préliminaire sur les polynévrites observées à l'hôpital indigène de Cholon en janvier-août 1926 . . . [20], 33
— et Guielerm (M.-J.). — Essai de détermination statistique de la ration réelle du travailleur indigène en Cochinchine. . . . . [19], 903
— et Mesnard (J.). — Réceptivité naturelle de *Anopheles* (*Myzomyia*) *aconitus* à l'infection par l'Hématozoaire du paludisme en Cochinchine . . . . . [24], 554
— et —. Nouveaux faits relatifs à la réceptivité naturelle des Anophèles d'Indochine à l'Hématozoaire du paludisme . . . . . [24], 949
Morin (J.). — Index paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison (Discussion) . . . . . [16], 214
—. La lèpre dans le Djoloff (Sénégal) . . . . . [17], 592
Morsly (T.). — Nouveau traitement du typhus exanthématique par les abcès de fixation. . . . . [2], 497 ; [3], 172
—. 50 cas nouveaux de typhus exanthématique traités par les abcès de fixation . . . [3], 455
Morvan, Baize et Voizard (F.). — Le parasitisme intestinal des Malgaches (Parasitologie, Hématologie) . . . . . [21], 20
Moselli. — Observations sur la fièvre récurrente au Soudan . . . . . [16], 272
Motais (François). — Du parasitisme intestinal en Annam . . . . . [13], 596
—. La sparganose oculaire en Annam . . . . . [13], 215
—. Nouvel éosinate de méthylène. . . . . [13], 206
—. Le tabès en Cochinchine. . . . . [19], 31
—. Tryparsamide (Discussion) . . . . . [19], 277
— Bouffissure d'Annam (Discussion) . . . . . [19], 310
—. Considérations sur la pathogénie de la sparganose oculaire . . . . . [24], 945
— et Bauche (J.). — Sur un nouveau cas de dysenterie amibienne du chien . . . [13], 161
— et Mesnil (F.). — Sur l'action trypanocide *in vivo* d'un dérivé (OX_1) du diaminoarsénobenzène . . . . . [8], 32
Motas. — La Dourine en Roumanie. . . . . [2], 211
Mottet et Bück. — Sur quelques cas d'anaplasmose chez des zébus . . . . . [14], 972
Moty. — Élimination de l'arsenic (Discussion) . . . [2], 143
—. Influence des altitudes et des latitudes sur les manifestations aiguës du paludisme . . . . . [2], 372
—. Rate palustre (Discussion) . . . . . [2], 39
—. Schistosomiases humaines (Discussion). . . . . [2], 542
—. Sur le traitement du clou de Biskra (Discussion) . . [2], 549
—. Bilharziose (Discussion) . . . . . [3], 29
—. Rapport de M. Kermorgant sur une lettre de M. Raynaud, au sujet de l'emploi des troupes noires du Sénégal en Algérie (Discussion) . . . [3], 212
—. Destruction des moustiques (Discussion) . . . . . [3], 459
—. Scorbut (Discussion) . [3], 750
—. Paludisme (Discussion) . . . . . [4], 300, 301
—. Parasitisme intestinal des Arabes (Discussion) . . [4], 430
Mouchet (R.). — Myiase intestinale chez l'homme . . [5], 508
—. La tuberculose à Léopoldville (Congo belge) . . . . [6], 55
—. Note sur le *Porocephalus moniliformis*. . . . . [7], 497
—. Contribution à l'étude des myiases . . . . . [10], 467
—. Bilharziose à localisation appendiculaire. . . . . [11], 297
—. Lésions anatomiques produites par des Nématodes . [11], 573
—. Hydarthrose du genou gauche ; voile apical droit ; placards dyschromiques et analgésiques ; absence du bacille de Hansen dans le mucus nasal et le suc ganglionnaire. [18], 527
— et Delamarre (G.). — Dermite dyschronique marginée, d'origine filarienne . . . . [18], 346

— et —. Calcification de la Filaire de Médine (note radiologique). . . . . [18], 318
— et DUBOIS (A.). — Le traitement du Pian et de la syphilis par le salvarsan dans la pratique indigène. . . [6], 14
— et —. Note sur le traitement des trypanosomiases animales. . . . . [6], 533
— et FRONVILLE (G.). — Bilharziose et tumeurs . . . [11], 710
— et GÉRARD (P.). — Contribution à l'étude des tumeurs chez les Noirs de l'Afrique Centrale . . . . . [12], 567
MOUILLAC. — Note sur une épidémie de scarlatine à Yunnanfou (mars 1921-mai 1922). . . . . [16], 760
MOUQUET (A.). — Ostéite hypertrophique rappelant le goundou chez un *Cercocebus æthiops* vivant. . . . [22], 918
—. Présentation d'un squelette de Cercocèbe atteint de « Goundou des singes » . . . [23], 478
MOUSTARDIER (G.). — L'ulcère phagédénique des pays chauds et son traitement par l'émétique. . . . . [23], 333
MOUZELS (P.) et GAIDE (L.). — Note sur le traitement de la dysenterie amibienne par l'émétique . . . . . [6], 491
— et —. Note sur le traitement des abcès du foie par l'émétique . . . . . [6], 716
— et LEGER (M.). — Piroplasme et Microfilaire d'un Edenté, le *Bradypus tridactylus* Linné . . . . . [10], 173
— et —. *Plasmodium* de *Iguana nudicollis*. . . . . [10], 95
— et —. Hémogrégarine intra-leucocytaire d'un Saurien, *Tupinambis nigropunctatus*. . . . . [10], 283
— et —. Hématozoaire endoglobulaire non pigmenté d'une Anatidée . . . . . [10], 699
— et —. Dermatose purigineuse déterminée par des papillons saturnides du genre *Ilylesia* . . . . . [11], 104
—, RYCKEWAERT (P.) et LEGER (M.). — Le Pian à la Guyane française . . . . . [10], 528
MOUZON (DE) et SERGENT (Ét.). — Ankylostomiase endémique dans une localité d'Algérie . . . . . [3], 449
— et SERGENT (Éd. et Ét.). — Quatrième observation algérienne de Kala-azar . . [9], 694
MOYNE (Mlle) et DEBŒUF (Mme). — La tuberculose indigène extra-hospitalière à Dakar, en 1931 . . . . . [25], 663
MUNOZ (Fernando R.). — Le cyanure de mercure dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [13], 35
MURATET (L.) et GAC (P. LE). — Contribution à l'étude de la formule leucocytaire du typhus récurrent. . . . [23], 697
MURAZ (G.). — Foyer de trypanosomiase humaine à Tchoa (Territoire du Tchad) . [13], 789
—. Essai de détermination de la limite Nord de la maladie du sommeil en Afrique Equatoriale Française. . . . [15], 253
—. Résumé de l'action, en Afrique Equatoriale Française, pendant huit ans (1920-1927), d'un secteur de prophylaxie de la maladie du sommeil. [21], 54
—. *Id.* (*Suite*). . . . . [21], 141
—. Réorganisation du service de la maladie du sommeil en Afrique Equatoriale Française . . . . . [23], 331
—. A propos de la « cure standard » appliquée en Afrique Equatoriale Française, aux trypanosomés . . . . [23], 917
—. Le « traitement standard » de la maladie du sommeil . . . . . [24], 530
—. Thérapeutique et Prophylaxie de la Trypanosomiase (Discussion) . . . . . [24], 839
—. Quelques derniers mots au sujet de la « cure standard » de la maladie du sommeil . . . . . [23], 39
— et VAISSEAU (G.). — De divers types d'arséno-résistance dans les traitements actuels (A. E. F.) de la trypanosomiase humaine . . . . . [25], 260
MUSSO (L.). — Traitement de la gale du dromadaire par le goudron de coloquinte (Deuxième note) . . . . . [13], 29
—, SERGENT (Ét.) et BÉGUET (M.). — Troisième campagne contre les Acridiens (*Schistocerca peregrina* Ol.) en Algérie au moyen du *Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle . . . [8], 634
MUTERMILCH (St.) et LEVADITI (C.). — Recherches sur la production des anticorps chez les animaux trypanosomés et traités par le salvarsan . . [6], 699
— et —. Ambocepteurs et arsénobenzol . . . . . [7], 633

N

NAINSOUTA (Q.). — Sur un cas de tuberculose observé chez un zébu aux abattoirs de la ville de Dakar. . . . . [15], 868

—. Piroplasmose à *Gonderia mutans* chez les Bovidés du Sénégal (Discussion) . . . [16], 62

—. Un nouveau cas de tuberculose bovine aux abattoirs de Dakar. . . . . [16], 207

—. Index paludéen de diverses localités du Sénégal durant la mauvaise saison (Discussion) . . . . . [16], 214

—. Énorme distension de la paroi du gésier chez la poule. . . . . [16], 221

—. Action spécifique du Biiodure de mercure contre la lymphangite épizootique. . [19], 762

—. Au sujet du traitement de la lymphangite épizootique par le biiodure de mercure . . . . . [20], 829

NATTAN-LARRIER (L.). — Prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo français (Discussion). . . . . [1], 261

—. Sur la présence du pigment ocre dans les organes des sujets morts du béribéri . [1], 429

—. Le liquide cérébro-spinal dans la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . [1], 499

—. Sur les résultats du traitement de la trypanosomiase humaine. . . . . [1], 620

—. Ankylostomiase au Congo (Discussion). . . . . [2], 101

—. Deux cas de nodules à *Leishmania* (résumé) . . . . [2], 642

—. Diarrhée dans la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [2], 316

—. Goundou et Pian . . . [2], 219

—. La framboesia du Brésil (Discussion) . . . . . [2], 462

—. Pénétration du spirille de la fièvre récurrente à travers les téguments et les muqueuses intacts. . . . . [2], 239

—. Trypanosomiase humaine chez l'Européen (Discussion) . . . . . [2], 482

—. Ulcère de Bauru (Discussion) . . . . . [2], 257

—. Goundou (Discussion). [4], 154

—. Spirilles de la fièvre récurrente et mouches . . . [4], 276

—. Auto-agglutination des hématies dans la piroplasmose canine. . . . . [4], 370

—. Développement et morphologie des embryons de *Filaria loa* . . . . . [4], 710

—. *Filaria volvulus* (Discussion). . . . . [3], 93

—. Le Béribéri (Discussion) . . . . . [3], 130

—. Sur quelques cas de névrite périphérique observés chez des sujets ayant résidé au Congo français . . . . . [3], 251

—. Contagion de la lèpre (Discussion) . . . . . [3], 415

—. Exposé de titres . . [3], 418

—. L'auto-agglutination des hématies dans la spirillose expérimentale . . . . . [3], 425

—. Auto-agglutination en trypanosomiase (Discussion) [3], 442

—. Lèpre (Discussion) . . [3], 704

—. Infection humaine à *Tetramitus mesnili* . . . . [5], 495

—. Non-transmission des trypanosomiases de la mère au fœtus . . . . . [5], 550

—. Contribution à l'étude de l'action de la bile sur les Trypanosomes . . . . . [6], 24

—. *Porocephalus armillatus* (Présentation) . . . . . [13], 639

—. Sur la présence d'œufs de *Schistosomum Mansoni* à Madagascar, dans les selles d'individus sains cliniquement (Discussion) . . . . . [14], 231

—. Hérédité des infections expérimentales à *Schizotrypanum cruzi* . . . . . [14], 232

—. Essais de transmission héréditaire de la Dourine . [13], 273

—. Trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [14], 423

—. Infections à *Trypanosoma equiperdum* chez la souris et chez le rat . . . . . [14], 433

—. Infections à *Trypanosoma* et voies de pénétration des virus. . . . . [14], 527

—. La thrombo-lymphite filarienne du canal thoracique . . . . . [15], 412

—. Prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun en 1920 et 1921 (Discussion) . . . . . [15], 833

—. Sur une hémogrégarine de l'homme (Note préliminaire) . . . . . [15], 943

—. Infection sanguine à spirochètes, de longue durée, sans symptômes apparents chez des enfants indigènes algériens (Discussion). . . . . [16], 394

—. Sur une hémogrégarine de l'homme . . . . . [16], 403

—. Peste pulmonaire (Discussion) . . . . . [19], 827

—. Méthode de coloration des plasmides et des protozoaires qui persiste sans changement

pendant 25 ans (Discussion) . . . . . [23], 789
—. Les leishmanioses autochtones en France et la lutte contre leur extension . . [24], 477
—. Quelques mots sur un traitement de la filariose *Loa* (Discussion) . . . . . [25], 693
— et Allain. — Équilibre leucocytaire chez les Noirs atteints de trypanosomiase . . . . . [1], 360
— et Bussière (A.). — Examen microbiologique de dix cas de Bouton d'Orient (Bouton de Bouchir) . . . . . [1], 48
— et —. Essais de traitement du Bouton d'Orient . [2], 301
— et —. Répartition des *Leishmania* dans le Bouton d'Orient . . . . . [2], 26
— et Laveran (A.). — Au sujet des altérations anatomiques produites par *Toxoplasma cuniculi* . . . . . [6], 158
— et Letulle. — Lésions du foie dans les schistosomiases humaines. . . . . [2], 538
— et —. Étude histologique du bubon climatérique . . [3], 751
— et Levaditi. — A propos de la note de M. Ch. Nicolas sur le Pian. . . . . [1], 487
— et —. Traitement de la piroplasmose canine par l'arsénobenzol. . . . . [4], 291
— et Monthus. — Iritis et trypanosomiase chez l'homme. . . . . [1], 277
— et Noyer (B.). — Trypanosome du dromadaire et Trypanosome du cheval au Maroc . . . . . [23], 747 ; [24], 112
— et —. Le Trypanosome du Débab égyptien. . . . [25], 563
— et —. *Id.* (2e *note*) . . [25], 748
— et Parvu. — Résistance globulaire et piroplasmose canine . . . . . [4], 320
— et Richard (L.). — Les lésions histologiques de la peste pulmonaire primitive . . [24], 388
— et —. Trypanosome du dromadaire et Trypanosome du cheval au Maroc . . . [24], 569
— et Ringenbach (J.). — Sur un cas de maladie du sommeil . . . . . [3], 187
—, Touin et Heckenroth (F.). — Sur un cas de pian-bois de la Guyane. Ulcère à *Leishmania* de la Guyane . . . . [2], 387
Nazareth (Mlle S.) et Araujo (A. d') et Gracias (Mlle E.). — Lèpre dans l'Inde Portugaise . . . . . [19], 289
Nègre (L.) et Boquet (A.). — Nature mycosique du parasite de la lymphangite épizootique. . . . . [7], 464
— et —. Sur la culture du parasite de la lymphangite épizootique . . . . . [8], 49
— et —. Sur l'évolution du parasite de la lymphangite épizootique chez le cheval. [8], 248
— et —. Sur la culture du parasite de la lymphangite épizootique . . . . . [10], 274
— et —. Bacilles paradysentériques isolés en Algérie . [10], 438
— et —. Sur le traitement spécifique de la lymphangite épizootique par les cultures stérilisées de cryptocoques [13], 777
—, — et Roig (G.). — Mycothérapie de la lymphangite épizootique . . . . . [11], 609
—, — et —. Premiers essais de vaccination préventive contre la lymphangite épizootique . . . . . [11], 551
—, Bories (L.) et Sergent (Ed.). — Épidémie de fièvre ondulante à Arzew et Saint-Leu (département d'Oran) en 1913. . . . . [9], 351
— et Bridré (J.). — Un cas de lymphangite épizootique chez l'homme. Traitement et guérison par le 606 . . . . [4], 384
— et Gauthier (F.). — Étude microbiologique des conjonctivites algériennes . . . [7], 18
— et Raynaud (M.). — Chauffage du sérum dans le séro-diagnostic de la fièvre ondulante. . . . . [12], 171
— et —. Race de *M. paramelitensis* isolé par hémoculture . . . . . [12], 173
—, Sergent (Ed. et Et.), Brégeat et Vivien. — Notes bactériologiques relevées pendant l'épidémie cholérique de 1911 en Oranie. . . . . [5], 790
—, Sergent (Ed.) et Foley (H.). — Le rôle des bacilles pseudo-dysentériques dans les affections intestinales en Algérie . . . . . [9], 204
—, Trouette (G.) et Bridré (J.). — Essai de traitement de la lymphangite épizootique par le 606. . . . . [4], 380
Neiva (A.). — Une nouvelle espèce d'Anophèle brésilien . . . . . [2], 163
Nepveux et Orticoni (A.). — Sur l'étiologie de quelques diarrhées et dysenteries rebelles . . . . . [9], 293
Netter (L.). — Un cas de paludisme accidentel . . . [22], 318
Neveu-Lemaire. — *Crossophorus collaris* Hemprich et Ehren-

berg, Ascaride parasite des Damans . . . . . [14], 390
—. Observation clinique de Boutons d'Orient multiples. [18], 44
Neveux. — L'emploi du singe comme animal de passage pour purifier le vaccin. [3], 496
—. L'inoculation à l'homme de la pustule de variole du singe . . . . . [3], 497
—. Présence de l'ankylostomiase à la Côte d'Ivoire. . . [3], 745
— et Bouffard. — Bilharziose dans le Haut-Sénégal et le Haut-Niger . . . . . [1], 430
Newstead (R.). — Phlebotomus from West Africa . . [6], 124
Nezwetatieff (N.-W.), Schmoulewitsch (A.-I.), Gadschieff (S.) et Yakimoff (W.-L.). — L'influence du virus de la peste bovine sur les piroplasmoses latentes des bovidés . . . . . [25], 728
—, —, — et —. La coccidiose des reins des oies en Russie. . . . . [23], 1044
—, Yakimoff (W.-L.) et Gousseff (W.). — Infection du zébu par les Theiléries. . . [25], 1049
Nguyèn-Trung-Truyèn, Broudin, Peytavin, Nguyèn-van-Dèn et Kièu-Thiên-Thè. — Contribution à l'étude du Surra d'Indochine . . . . . [19], 746
Nguyèn-van-Dèn, Nguyèn-Trung-Truyèn, Kièu-Thiên-Thè, Peytavin et Broudin. — Contribution à l'étude du Surra d'Indochine . . . . . [19], 746
Nguyên-van-Khai. — Considérations sur l'épidémiologie du Béribéri dans la province de Tanan en 1927. . . . [22], 982
Nguyen-van-Lieng et Bordes (L.-A.). — Note sur les albumines et la cholestérine du sérum sanguin chez les paludéens chroniques de race annamite. . . . . [24], 724
Niclot (V.). — La peste à Oran en 1907 ; ectoparasites des rats pesteux et multiplication du bacille de Yersin dans leur tube digestif. . . . . [1], 367
—. Anophélisme et paludisme dans la division d'Oran au cours de 1907 . . . . [1], 437
—. A propos d'un cas de filariose, *Microfilaria bancrofti* . . . . . [3], 399
—. Un chapitre de l'histoire du paludisme à Bordeaux : sol marécageux, population palustre ; faune anophélienne . . . . . [3], 663
—. Sur un cas d'évolution simultanée de fièvre de Malte et de paludisme . . . . [4], 106
—. A propos de la contagiosité de la pneumonie pesteuse. . . . . [4], 349
—. A propos de la fièvre à papataci . . . . . [5], 780
—. Des enquêtes et de l'appréciation des statistiques en matière de paludisme . . [7], 411
—. L'anophélisme macédonien dans ses rapports avec le paludisme au cours de 1916 . . . . . [10], 323
—. Anophélisme et paludisme en Haute-Alsace. . . . . [11], 848
—. A propos de l'emploi préventif de la quinine dans le paludisme . . . . . [18], 268
Nicolas (Ch.). — A propos du Pian. . . . . [1], 484
—. Deux remarques à propos de la lèpre . . . . . [1], 493
—. Pratiques chirurgicales des Canaques des îles Loyalty . . . . . [1], 582
—. Crânes de Canaques trépanés par les indigènes. Présentation . . . . . [1], 593
—. État actuel de la lèpre dans l'archipel des îles Loyalty . . . . . [2], 493
—. Contagion possible de la lèpre par le coït (Discussion) . . . . . [2], 200
—. Comment on peut installer à peu de frais une infirmerie indigène . . . . . [2], 157
—. Pratiques obstétricales chez les Canaques. . . . . [2], 502
—. Remarques sur quelques poisons dits vénéneux . . [2], 214
—. Tumeur éléphantiasique de la vulve du poids de 14 kg. 300 . . . . . [2], 8
—. Accidents mortels sur la volaille par ingestion répétée de Lantana . . . . . [3], 52
—. Alcoolisme en Nouvelle-Calédonie . . . . . [3], 175
—. Trois observations du Bouton d'Orient en Nouvelle-Calédonie . . . . . [3], 323
—. Contribution à l'étude des filarioses en Nouvelle-Calédonie . . . . . [3], 737
—. A propos d'une petite épidémie de peste . . . . [4], 31
—. Puériculture et lait condensé en Nouvelle-Calédonie . [5], 231
—. Observation clinique d'une affection chevaline sévissant à Nindiah et Nindivin (Houailou) . . . . . [5], 518
—. Ostéopathie des chevaux en Nouvelle-Calédonie . . [5], 643
—. Quelques cas de fièvre d'origine indéterminée, simulant le

paludisme, en Nouvelle-Calédonie . . . . . [7], 133
—. A propos de la peste en Nouvelle-Calédonie. . . . [8], 422
—. A propos d'un cas de tétanos. Emploi de sérum desséché et de fortes doses . . . . . [13], 159
—. Contribution à l'étude de l'ostéoporose chevaline, dite « Big head », en Nouvelle-Calédonie . . . . . [13], 263
—. L'essence de Niaouli . [13], 222
—. L'essence de Niaouli menacée dans sa production en Nouvelle-Calédonie. . . . [14], 337
—. Contribution à l'étude de la stéphanurose du porc . [15], 819
—. A propos du Lambo . [20], 4
—. Six cas d'orchites ou ovarites, complications de Dengue. . . . . [20], 402
—. Étude des causes de la disparition progressive d'une intéressante race d'indigènes . . . . . [21], 433
—. A propos d'une épidémie de Dengue compliquée d'ictère. La Dengue serait-elle une fièvre amarile atténuée ? . [21], 748
Nicolas (E.) et Sacegheim (R. van). — L'émétique dans le traitement des trypanosomiases . . . . . [9], 813
Nicolau (S.). — L'Oulou-fato n'est-il qu'une rage atténuée ? (Discussion) . . . . . [25], 122
— et Lwoff (A.). — Essais de culture de quelques ultra-virus en symbiose avec des Protozoaires. . . . . [25], 721
—, Mathis (C.) et Constantinesco (Mme A.). — Sur un virus de l'Oulou-fato (maladie du chien fou) isolé chez l'homme [24], 931
Nicolle (Ch.). — Culture des corps de Leishman isolés de la rate dans trois cas d'anémie splénique infantile . . [1], 121
—. La peste en Tunisie pendant l'année 1907. . . . . [1], 163
—. Reproduction expérimentale du Kala-azar infantile . [1], 602
—. Quelques données nouvelles relatives au Kala-azar infantile . . . . . [2], 437
—. Sur la technique de la ponction de la rate . . . [2], 444
—. A propos de leishmaniose canine en Afrique Mineure . . . . . [4], 40
—. De l'importance du choix strict de l'espèce dans les expériences d'infections pratiquées chez les singes . [5], 469
—. Chronique du Kala-azar en Tunisie . . . . . [7], 479
—. Quelques points concernant le typhus exanthématique . . . . . [8], 160
—. Le rôle des moustiques dans la transmission du paludisme suspecté en 1774 . . . [8], 279
—. Chronique du Kala-azar en Tunisie. . . . . [9], 126
—. Identité des virus exanthématiques africain et balkanique. . . . . [9], 402
—. Quelques faits et observations d'ordre expérimental relatifs au typhus exanthématique, en particulier à l'entretien du virus par passages . . . . . [9], 487
—. Cent passages successifs du virus exanthématique par cobayes . . . . . [10], 526
—. Chronique du Kala-azar en Tunisie. . . . . [10], 715
—. A propos de la technique de la ponction de la rate . [11], 814
— et Collaborateurs. — Sur dix cas de *Xeroderma pigmentosum* observés en Tunisie. . . . . [12], 391
—. La question du réservoir de virus du Bouton d'Orient . . . . . [13], 511
— et Anderson (Ch.). — Conservation du virus de la leishmaniose canine sur les chiens dans les laboratoires . [16], 171
— et Blaizot (L.). — Réceptivité des animaux de laboratoire au Spirochète du Nord de l'Afrique. . . . . [4], 658
— et —. Nouveaux points de l'étude expérimentale du Spirochète de la fièvre récurrente nord-africaine. Réceptivité du lapin . . . . . [5], 472
—. Virulence des cultures de *Leishmania infantum* ; sensibilité du chacal au virus du Kala-azar tunisien . . [5], 721
— et —. Courte durée de l'immunité dans la fièvre récurrente expérimentale. L'épreuve croisée est sans valeur pour différencier les Spirochètes . . . . . [6], 107
— et —. Deuxième note sur la courte durée de l'immunité dans la fièvre récurrente . . . . . [6], 242
— et —. Technique de la préparation du sérum anti-exanthématique à l'Institut Pasteur de Paris (Démonstration) . . . . . [9], 750
—, — et Conseil (E.). — Du rôle négatif des poux dans la transmission expérimentale de la fièvre des tiques . . [6], 106
— et Blanc (G.). — Extension de

la « région à Bouton d'Orient » tunisienne . . . . . [10], 378
—, — et Lingeron (M.). — Recherches expérimentales sur le rôle du gecko (*Tarentola mauritanica*) dans l'étiologie du Bouton d'Orient . . . [13], 508
— et Chatton (E.). — Longue conservation de la virulence pour l'homme de la *Leishmania tropica*, en cultures [7], 700
— et Comte. — Origine canine du Kala-azar . . . . [1], 299
— et —. Sur la présence fréquente d'un pouvoir agglutinant vis-à-vis du *Micrococcus melitensis* dans le sang des malades atteints de typhus exanthématique. Sa valeur diagnostique. . . . . [3], 214
— et Conor (A.). — Application du 606 au traitement du Kala-azar. . . . . [3], 717
— et —. Quelques expériences pratiquées avec le virus de leishmaniose naturelle du chien. Reproduction de la maladie du singe . . . . [5], 351
— et Conor (Marthe). — Difficulté de conservation de la leishmaniose canine par les passages . . . . . [7], 481
— et Conseil (E.). — Recherches sur la fièvre méditerranéenne entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis . . . [2], 191
— et Conseil (A.). — Action du 606 sur le paludisme . [3], 708
—; — et Lévy. — Application de l'arsénobenzol au traitement du Kala-azar de l'enfant . . . . . [4], 187
— et Gobert (E.). — Seconde enquête sur les chèvres laitières de Tunis au sujet de la fièvre méditerranéenne (Présentation). . . . . [9], 285
— et Lévy (E.). — Un cas de Kala-azar terminé par la guérison . . . . . [4], 138
—, — et Cortesi. — Application de l'arsénobenzol au traitement du Kala-azar de l'enfant . . . . . [4], 187
— et Manceaux (L.). — Sur les conditions de formation des corps en anneau du sang . . . . . [2], 238
— et —. Données expérimentales nouvelles sur le Bouton d'Orient (*1re note*) . [4], 134
— et —. Application de l'arsénobenzol au traitement du Bouton d'Orient. . . . . [4], 185
— et Pinoy. — Un cas de mycétome à grains noirs. Culture et inoculation expérimentale. . . . . [1], 93
— et Wetterlé (Louis). — A propos de trois naissances dans la singerie de l'Institut Pasteur de Tunis . . . [23], 596
Nicolle (M.), Mesnil et Remlinger. — Recherche du Protozoaire de J.-H. Wright dans 16 cas de Bouton d'Alep [1], 41
Nicolle (P.), Prieur (Mlle M.) et Launoy (L.). — Recherches sur la thérapie et la prévention du Nagana expérimental de la souris et du chat avec le 205 Bayer-309 Fourneau [23], 630
—, — et —. De l'action synergique du 205 Bayer-309 Fourneau et de quelques composés organiques d'antimoine, dans la trypanosomiase expérimentale à *Trypanosoma congolense* de la souris. . . [25], 65
—, — et —. Étude de l'action synergique exercée par le 205 Bayer-309 Fourneau et 5 : 5′ arséno-2-thiobenziminasol disodique, dans le traitement des infections expérimentales à *Trypanosoma congolense* de la souris . . . . . [25], 570
Nicolsky (N.-S.). — La coccidiose des bovidés et des moutons dans le Caucase du Nord . . . . . [22], 71
—, Yakimoff (W.-L.), Belawine (W.-S.) et Rastégaïeff (Mme E.-F.). — La répartition géographique des Piroplasmes et des tiques au Nord du Caucase . . . . . [21], 644
—, —, Rastégaïeff (Mlle E.-F.) et Tolstoff (Mme A.-N.). — L'anaplasmose des bovidés en Russie . . . . . [21], 642
Nikitinsky, Sebenzow et Adova. — Biologie et constitution physico-chimique des tourbières et conditions qui y règlent le stationnement des larves d'Anophèles. . . . . [20], 192
—, — et —. *Id.* (*Suite*) . [20], 271
Nimier. — Sur l'aide apportée au diagnostic et à la localisation des abcès dysentériques du foie par l'exploration radiologique (Discussion). [1], 84
Ninaud (M.). — Sur un cas de typhus amaril traité par le sérum de Noguchi . . [20], 394
Nitzulescu (V.). — Sur la constitution du canal alimentaire chez les Phlébotomes . [19], 709
—. Sur le stylet médian de l'appareil buccal de la puce . . . . . [20], 467
—. Contribution à l'étude de la pompe salivaire des Simulidés . . . . . [20], 748
—. Contribution à l'étude de la

pompe salivaire des Tabanidés . . . . . [20], 846
—. Contribution à l'étude de la pompe salivaire des Culicides. . . . . [20], 851
—. Contribution à l'étude de la pompe salivaire chez ces Insectes . . . . . [20], 980
Noc (F.). — Filaires de l'Indochine . . . . . [1], 369
—. Observations sur le cycle évolutif de *Lamblia intestinalis* . . . . . [2], 93
—. Béribéri (Discussion) [3], 18, 19
La bilharziose à la Martinique. . . . . [3], 26
—. Un cas d'ankylostomiase maligne compliqué de bilharziose rectale . . . . [3], 30
—. Lantana et volailles (Discussion) . . . . . [3], 55
—. Divers échantillons . [3], 58
—. Nouvelle contribution à l'étude du Béribéri en Cochinchine . . . . . [3], 345
—. Prophylaxie de la peste à la Martinique . . . . . [4], 164
—. Les parasites intestinaux à la Martinique . . . . [4], 390
—. Bulletin trimestriel de la Société d'Hygiène de la Martinique . . . . . [5], 572
—. Remarques et observations sur le rôle du moustique dans la propagation de la lèpre . . . . . [5], 787
—. Première conférence intercoloniale de la tuberculose réunie à Port of Spain (Trinidad) . . . . . [6], 290
—. Prophylaxie de la tuberculose à la Martinique . . [6], 368
—. Parasitisme intestinal en Cochinchine. Contribution à l'étude des dysenteries indochinoises. . . . . [8], 208
—. Parasitisme intestinal en Cochinchine (nouvelle contribution à l'étude des dysenteries indochinoises) . . . . [9], 15
—. Parasitisme intestinal en Cochinchine (diagnostic de l'amibiase intestinale chronique) . . . . . [9], 125
—. Amibiase intestinale, émétine, novarsénobenzol . [9], 345
—. Dysenterie bacillaire, dysenterie amibo-bacillaire et diarrhée chronique en Cochinchine . . . . . [9], 709
—. Prophylaxie de l'amibiase intestinale par l'ipéca total glutinisé . . . . . [10], 868
—. Lymphangite à répétition (Discussion) . . . . . [10], 900
—. Les spirochétoses humaines à Dakar (Sénégal). . . [13], 672
—. Nouveau cas de coccidiose humaine à *Isospora* . . [13], 785
—. Au sujet de la peste murine à Dakar . . . . . [14], 516
—. Formes hémogrégariniennes observées dans un cas d'anémie pernicieuse autochtone . . . . . [15], 936
—. Infestation massive naturelle de la Genette du Sénégal par des larves de Porocéphales . . . . . [15], 621
—. Chimiothérapie des filarioses. Action de l'aminoarsénobenzol (132) sur *Microfilaria bancrofti* . . . . . [16], 126
—. Sur l'embryon acariforme et les stades larvaires des Linguatulidés . . . . . [16], 340
—. Le dépistage de la peste par la ponction du foie. Son importance prophylactique (Discussion) . . . . . [16], 524
— et Curasson (G.). — Contribution à l'étude de l'évolution biologique de *Porocephalus armillatus* Wyman. . . [13], 656
— et Esquier (A.). — Tuberculose de la voûte du crâne chez un Noir du Soudan [13], 330
—, Henry (A.) et Esquier (A.). — L'anguillule intestinale de l'homme au Sénégal. . [13], 588
—, Iman (T.) et Stévenel (L.). — Prophylaxie et traitement de la syphilis et du Pian à la Martinique par le 606 . [4], 563
— et Nogue (M.). — Ictères épidémiques et Spirochètes au Sénégal . . . . . [14], 406
— et Pons (R.). — Porocéphaliase ganglionnaire et lymphadénie tuberculeuse à évolution rapide chez un tirailleur Sénégalais . . . . . [15], 951
—, Simond (P.-L.) et Aubert. — Filariose à la Martinique . . . . . [2], 319
— et Stévenel (L.). — Présence à la Martinique de *Leptomonas davidi* Lafont. . . . [4], 461
— et —. Masque léonin d'origine syphilitique . . . . . [5], 170
— et —. Filariose, lymphangite et éléphantiasis à la Martinique. . . . . [6], 708
Nogue (M.). — Un cas de Sporotrichose pulmonaire (Discussion) . . . . . [15], 361
—. Malade atteint de nodosités juxta-articulaires et non guéri par l'arsénobenzol . . [15], 488
—. Tremblement héréditaire (Discussion) . . . . . [15], 757
—. La peste à Dakar : Étude clinique et thérapeutique. Période endémo-épidémique :

octobre 1921-octobre 1922 (Discussion) . . . . . [15], 909
—. Observation clinique de l'accès pernicieux étudié ci-dessus au point de vue bactériologique. Posologie de la quinine chez les enfants du premier âge. . . . . [15], 1016
—. Evaluation de la quantité de sang rendue par l'urine dans un cas de Bilharziose vésicale (Discussion) . . . . . [16], 65
—. Kystes hydatiques du foie, de la rate et du péritoine chez un Noir du Congo . . [16], 144
—. Un cas d'insuffisance hépatique avec ictère à la suite d'une série d'injections de novarsénobenzol . . . . [16], 146
—. Un cas de méningite pesteuse . . . . . [16], 378
—. Comment concevoir la lutte contre la lèpre dans les Colonies françaises (Discussion) . . . . . [16], 220
—. Hémoglobinurie et quininothérapie (Discussion). . [18], 292
—. Un cas de noma très amélioré par le stovarsol . [18], 433
—. Epidémie de glossites observée au Sénégal . . . [18], 501
— et Boulay. — Note préliminaire sur l'insuffisance rénale chez les bilharziens. Essais de traitement par l'émétique . . . . . [16], 564
— et Brau. — Hémorragies intestinales et hématémèses, symptômes d'hépatite suppurée . . . . . [11], 800
— et Leger (M.). — Mycose à *Scopulariopsis* chez deux malades ayant des lésions cutanées rappelant la lèpre. [15], 654
— et —. Essais de traitement de la dysenterie amibienne aiguë par le stovarsol . [16], 557
— et —. Le paludisme chez les Noirs adultes de l'Ouest-Africain. Etude parasitologique et clinique . . . . . [16], 281
—, — et Hudellet (G.). — Un cas de leucémie lymphoïde à type splénique pur. . [15], 517
— et Lhuerre (H.). — Un cas de syphilis indigène . . [18], 431
— et Noc (F.). — Ictères épidémiques et Spirochètes au Sénégal . . . . . [14], 460
Normet (M.). — Une épidémie de Béribéri dans un bataillon malgache à Granville. . . [17], 896
—. La « bouffissure d'Annam ». . . . . [19], 207
Nossina (V.) et Schourenkowa (A.). — La culture de *Balantidium coli* Malm. d'origine humaine . . . . . [23], 780
Novy (F.-G.). — Sur *Leishmania infantum* . . . . . [2], 385
Noyer (B.) et Nattan-Larrier (L.). — Trypanosome du dromadaire et Trypanosome du cheval au Maroc. [23], 747 ; . . . . . [24], 112
— et —. Le Trypanosome du Débab égyption. . . . [25], 563
— et —. *Id.* (2e *note*) . . [25], 748
Noyer (R. Du), Joyeux (Ch.) et Baer (J.-C.). — L'activité génitale des métacercaires progénétiques . . . . . [23], 967
Nuttall (H.-F.). — Russian Ixodoidea. . . . . [5], 120

O

Ohtawara (Toyoichi). — Voir Toyoichi Ohtawara.
Oldt (F.). — La peste à Sin-Lam, district de Heung-Shan, province de Kouang-Tong (Chine), surtout au point de vue de la vaccination (En anglais avec résumé français) . . . . . [5], 303
Oliveau (A.). — Sur un petit foyer de paludisme reconnu pendant les années de 1919-20 au centre d'aviation maritime de Saint-Raphaël (Var). [13], 729
Olmer (D.) et Burnet (Et.). — La maladie de Marseille est-elle un typhus exanthématique bénin ? . . . . . [20], 958
Onorato (R.). — Sur le phagédénisme à symbiose spiro-bacillaire . . . . . [20], 145
Ortholan. — La lèpre en Nouvelle-Calédonie. . . . [4], 253
—. Un cas de trypanosomiase humaine. . . . . [4], 624
Orticoni (A.). — La dysenterie amibienne et le chlorhydrate d'émétine. . . . . [6], 609
—. Contribution à l'étude de la séro-réaction et de la fixation du complément avec le *B. proteus* dans le *typhus exanthématique* . . . . . [13], 108
—. La lutte épidémique chez les réfugiés russes de Crimée à Constantinople en décembre 1920. . . . . [14], 187
—. Ictère dans la fièvre récurrente (Discussion). . . [14], 470
—. Les ravages du paludisme en Corse . . . . . [15], 683
—. Note sur le traitement de la dysenterie amibienne par le stovarsol (Discussion) . [17], 556
— et Nepveux. — Sur l'étiologie de quelques diarrhées et dysenteries rebelles . . . [9], 293
— et Salimbeni (A.). — Essais

de traitement des porteurs sains de vibrions cholériques dans les lavements de sérum spécifique. . . . . [6], 306

OTA (M.). — Sur deux espèces nouvelles de Dermatophytes en Mandchourie : *Microsporum ferrugineum* et *Trichophyton pedis* n. sp. . . . . [15], 588

OTT. — Recherches sur la pathogénie et le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique . . . . . [25], 494, 735

OUFTUGEANINOFF (W.). — Un cas de résistance péritonéale marquée chez un indigène de la Côte d'Ivoire . . . . [21], 177

OULASSÉVITCH (J.-S.), RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.), ZAWIALOFF (B.-W.), IWANTCHIKOFF (M.-F.), WASSILIEWSKY (Mlle W.-J.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Action de l'Ichtargol et du Luargol dans la piroplasmose bovine. [18], 51

OUZILLEAU (F.). — Note sur la maladie du sommeil dans la Haute-Sangha (1909). . [4], 624

—. Les Filaires humaines de la région de Mbomou (A. E. F.). Pathogénie de l'éléphantiasis de cette région. Rôle de la *Filaria volvulus* . . . [6], 80

—. Rapport d'ensemble sur la maladie du sommeil dans le Bas-M'Bomou (1912-1913) . . . . . [8], 138, 178

—. Enquête sur la trypanosomiase au Moyen-Oubanghi (Ibenga-Motaba) en 1914. . . . . [13], 817

—. Un cas de myiase urinaire. . . . . [21], 502

—, LAIGRET et LEFROU. — Contribution à l'étude d'*Onchocerca volvulus* . . . . . [14], 717

— et LEFROU (G.). — Essai de tryparsamide dans le traitement de la maladie du sommeil . . . . . [15], 802

— et —. La thérapeutique intrarachidienne dans la maladie du sommeil . . . . . [15], 59

O'ZOUX (L.-L.). — La dyspnée tropicale. . . . . [2], 544

—. Note sur le Béribéri à la Réunion . . . . . [3], 131

—. L'Oxyspirure de Manson à la Réunion . . . . . [3], 670

—. 34 cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique à Saint-Denis de la Réunion. . . [4], 118

—. Maladie de dépigmentation chez l'homme à la Réunion. . . . . [4], 227

— et HENRY (A.). — La filaire du Foudi . . . . . [2], 544

P

PAIS (A.). — La radiothérapie employée comme excitant dans le traitement du paludisme. Sa fonction sociale . . [16], 244

PAISSEAU (G.), ARMAND-DELILLE (P.) et LEMAIRE (H.). — Note sur les constatations positives d'hématozoaires au Laboratoire de Bactériologie de l'Armée d'Orient pendant l'année 1916 . . . . . [10], 284

—, — et —. Une entreprise d'assainissement antipalustre au Maroc. . . . . [12], 274

—, — et —. Paludisme et novarsénobenzol . . . . [13], 502

— et LOUBRIEU. — Paludisme autochtone à *Plasmodium præcox* . . . . . [14], 268

— et BERTRAND-FONTAINE (Mme). — Sur un cas d'amibiase bronchique. . . . . [19], 176

PAPAGHEORGHIOU (S.), ANGELO (Mlle A.) et JOANNIDÈS (G.). — Chronique de l'actinomycose en Grèce . . . . . [24], 432

PANAYOTATOU (Mme A.). — Quelques cas de splénomégalie et de Kala-azar autochtone chez les indigènes en Égypte . . . . . [15], 843

—. Émétine et amibiase en Égypte . . . . . [16], 263

—. Sur quelques cas nouveaux d'amibiase extra-intestinale . . . . . [17], 211

—. Trois cas d'entérite à *Trichomonas* guéris par le stovarsol. . . . . [18], 647

—. Abcès amibien extra-péritonéal simulant l'appendicite (opération ; guérison) . [18], 704

—. Sur un cas d'amibiase généralisée. . . . . [19], 88

—. Expérimentations biologiques sur le chat concernant la pathogénie des *amibes des crachats* et des *amibes des urines* d'un même malade, selon la méthode de Bœck et Drbohlav . . . . . [19], 92

—. Sur la blastomycose. Trois cas d'entérite à *Bastocystis hominis* . . . . . [21], 755

—. L'amiphène contre les infections dysentériques . . [24], 28

—. Les phénomènes d'hématolyse et d'hémato-agglutination des vibrions. . . . . [24], 907

—. Les phénomènes d'agglutination des vibrions. Quelques expériences biologiques sur quatre vibrions de l'épidémie de Basrah. . . . . [24], 909

—. Sur l'action protectrice de certains sérums normaux con-

tre la fixation du « bactériophage » . . . . . [23], 397
PANGALOS (G.-C.), JOANNIDÈS (G.) BLANC (G.). — La réaction de fixation du complément appliquée au séro-diagnostic de la lèpre avec un antigène méthylique de bacilles de Kedrowsky . . . . . [23], 568
PANISSET (G.). — Trois mois de dératisation prophylactique dans la vallée du Sous . [23], 442
PAPAYOANNOU (A.), MARKIANOS (J.) et LÉPINE (P.). — Valeur pratique de la réaction de Rubino pour le séro-diagnostic de la lèpre . . . . . [25], 764
PARANIOS (U.). — Considérations sur le *mal d'engasgo* . [6], 47
— et CARINI. — Identification de l' « Ulcera de Bauru » avec le Bouton d'Orient . . . [2], 235
PARASKEVOPOULOS et LEFAS. — Un cas de leishmaniose cutanée. . . . . [11], 59
PARFENTJEF (I.). — Les insectes nuisibles aux plantes médicinales en Crimée . . . [14], 164
PARROT (L.). — Cuti-réaction à la tuberculine chez les indigènes du Duzerville (dép. de Constantine). . . . . [5], 852
—. Parasitisme intestinal chez les Arabes du Tell Algérien. . . . . [7], 301
—. Petit manuel du paludisme (Présentation). . . . [7], 350
—. L'infection tuberculeuse dans la région de Gambetta (Hauts-Plateaux Constantinois). . . . . [8], 425
—. Sur un nouveau Phlébotome algérien, *Phleb. sergenti*, sp. nov. (Note préliminaire) . . . . . [10], 564
—. Du délire et des réactions psychomotrices dans la fièvre récurrente algérienne . [10], [illegible]
—. L'infection tuberculeuse dans le Hodna Oriental (Steppe Constantinois) . . . . . [10], 860
—. Eclampsie infantile et paludisme . . . . . [11], 560
—. Sur la rareté de la conjonctivite phlycténulaire chez les indigènes algériens . . [11], 578
—. Répartition géographique de *Phlebotomus minutus*, var. *africanus* dans le département de Constantine. . . . [11], 794
—. La cure du paludisme par le quinquina en nature chez les paludéens hémoglobinuriques . . . . . [11], 845
—. Trois observations de Bouton d'Orient avec des réflexions sur les circonstances de la contamination. . [12], 607
—. Un type de cabine-étuve à désinfection pour infirmeries indigènes. . . . . [12], 535
—. Spirochétose naturelle du canard domestique . . [13], 647
—. A propos de l'identification des Phlébotomes de France. . . . . [14], 21
—. Présence de *Phlebotomus perniciosus* Newstead dans la région parisienne . . . [15], 694
—. Recherches sur l'étiologie du Bouton d'Orient (Clou de Biskra). Etude sur la biologie des Phlébotomes en milieu endémique . . . . . [15], 80
—. Un Ornithodore nouveau du Sahara algérien *Ornithodorus foleyi* n. sp. . . . . [21], 520
— et CATANEI (A.). — Sur le virus de la spirochétose aviaire en Algérie et sur la longue durée de sa conservation chez *Argas persicus* [19], 419
—, —, FOLEY (H.) et SERGENT (Ed. et Et.). — De l'emploi de la quinine contre le paludisme . . . . . [18], 28
— et DONATIEN (A.). — Trypanosomiase naturelle du chien au Sahara (Note préliminaire). . . . . [13], 549
— et —. Un nouveau cas sporadique de Bouton d'Orient sur le littoral algérien . . [15], 418
— et —. Infection naturelle et infection expérimentale de *Phlebotomus papatasi* (Scop.) par le parasite du Bouton d'Orient . . . . . [19], 694
—, — et LESTOQUARD (F.). — Parasitisme anormal dans un cas de leishmaniose du chien. . . . . [22], 252
—, — et —. Bartonelloses et prémunition. . . . . [23], 173
—, — et —. Sur le développement du parasite de la leishmaniose canine viscérale chez *Phlebotomus major* var. *perniciosus* Newstead. . . [23], 724
—, —, SERGENT (Ed.) et LESTOQUARD (F.). — Prémunition et Protozoaires sanguicoles [19], 532
—, —, — et —. Tiques et piroplasmoses bovines d'Algérie. *Première note* . . . . [21], 846
—, —, — et —. Transmission héréditaire de *Piroplasma bigeminum* chez *Rhipicephalus bursa*. Persistance du parasite chez les tiques nourries sur des chevaux. . . . . [24], 193
—, —, — et —. Le traitement de la babésiellose bovine à *Babesiella berbera* par l'ichtargan. . . . . [24], 939
— et FOLEY (H.). — Note sur les

arrêts de développement et l'infantilisme d'origine paludéenne en Algérie . . [11], 839
— et —. Nodosités juxta-articulaires chez les indigènes d'Algérie . . . . . [13], 738
— et —. Remarques épidémiologiques sur le Bouton d'Orient en Algérie . . . . . [18], 485
— et —. Sur l'existence d'*Ornithodorus marocanus* Velu en Algérie (Sud-Oranais) . [22], 436
—, —, Champouillon (S.), Bossard (A.) et Pascal (J.-M.). — Étude comparative des cutiréactions à la tuberculine de Koch et à la tuberculine B. C. G. . . . . [25], 298
—, — et Sergent (Edm. et Et.). — L'armature maxillaire des *Anopheles maculipennis* en pays paludéen . . . . [15], 29
— et França (Carlos). — Introduction à l'étude systématique des Diptères du genre *Phlebotomus* . . . . . [13], 695
—, Hilbert (D.-N.) et Sergent (Edm.). — Morphologie de Piroplasmes observés en Algérie chez le mouton (*Gonderia ovis*) . . . . . [15], 789
— et Joyeux (Ch.). — Les cysticercoïdes de *Tarentola mauritanica* L. et les Ténias du chat . . . . . [13], 687
— et Lestoquard (F.). — Sur quelques détails de la structure des *Leishmania*. . [18], 541
—, Donatien (A.), Sergent (Edm.), Lestoquard (F.), Plantureux (E.) et Rougebieff (H.). — Inoculation au mouton de l'Anaplasme du bœuf . [17], 295
— et Sergent (Edm. et Et.). — Sur une hémogrégarine de l'homme observée en Corse . . . . . [15], 193
— et —. Sur la répartition géographique de l'*Ornithodorus marocanus* Velu, en Algérie . . . . . [22], 436
— et —. Sur l'existence de *Phlebotomus papatasi* (Scop.) et de *Phlebotomus minutus* Rondani en rase campagne . . [22], 544
—, — et Donatien (A.). — Le paludisme en Corse. Etude épidémiologique . . . [14], 685
—, — et —. Une question de terminologie : *Immuniser* et *Prémunir*. . . . . [17], 37
— et Vialatte (Ch.). — Phlébotomes au Maroc . . . [14], 566
Parvu et Nattan-Larrier (L.). — Résistance globulaire et piroplasmose canine . . . [4], 520
Pascal (J.-M.), Bossard (A.), Champouillon (S.), Parrot (L.) et Foley (H.). — Étude comparative des cuti-réactions à la tuberculine de Koch et à la tuberculine B. C. G. [25], 298
Pasteur (F.) et Phisalix (Mme M.). — Les rayons infrarouges ne modifient pas la toxicité globale du venin de la Vipère aspic, mais en diminuent légèrement l'action vaccinante . . . . . [25], 320
— et —. Action vaccinante réciproque des venins d'abeille et de Vipère aspic . . [25], 581
— et —. La papillonite guyanaise (Discussion). . . [25], 1107
Pasteur Vallery-Radot. — A propos de l'anaphylaxie à la quinine. Anti-anaphylaxie et désensibilisation . . . . [13], 556
— et Lhéritier (A.). — Étude sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique des bovins en Algérie. . . [12], 202
— et Simond (P.-L.) avec collaboration de Kiamil Bey et Asseo (Raphaël). — Notes sur le choléra à Constantinople et en Thrace, de 1910 à 1913. . . . . [7], 313
Patay (R.). — Sur l'extension aux Flagellés d'un fixateur de Noguchi pour Spirochètes . . . . . [18], 305
Patton (W.-S.). — Experimental infection of the Madras bazaar fly, *Musca nebulo*, Fabr. with *Herpetomonas muscæ domesticæ* (Burnett) . . . . [3], 264
—. Découverte d'un Piroplasme nouveau chez le chacal. [3], 57
—. Lettre sur une nouvelle Hémogrégarine . . . . . [3], 115
—. Preliminary report on a new piroplasm (*Piroplasma gibsoni* sp. nov.) found in the blood of the hounds of the Madras hunt and subsequently discovered in the blood of the jackal *Canis aureus* . . [3], 274
—. *Rynchomonas luciliæ*, n. g., n. sp. . . . . [3], 300, 400
—. Note on the Etiology of Oriental Sore in Mesopotamia . . . . . [12], 500
Paucot (M.). — Action de l'atoxyl et du salvarsan sur la fièvre récurrente . . . . [6], 68
Pawlowsky (E.). — Au sujet de pseudo-parasites . . . [15], 825
—. Structure de l'appareil génital mâle du *Phtirius inguinalis* . . . . . [16], 416
— et Stein (A.-R.). — Des causes de l'apparition des taches bleues chez l'homme . [15], 558
— et —. Nouveau cas de *cree-*

ping disease (*Myiasis linearis*) en Russie . . . . [15], 555
— et —. Taches bleues et glandes salivaires de *Phlebotomus ingunalis* . . . . . [15], 826
— et —. Sur les causes de l'action des Insectes du genre *Pediculus* sur le derme de l'homme . . . . . [17], 143
PÉCAUD (G.). — Étiologie de la Souma . . . . . [2], 330
—. Note sur les trypanosomiases des petits animaux domestiques du Bas-Dahomey . . . . . [2], 127
—. Trypanosomiases du Dahomey . . . . . [2], 551
—. Trypanosomiases animales du Haut-Dahomey (V. *Erratum*, p. 796 . . . . . [3], 551
—. Contribution au traitement des trypanosomiases animales . . . . . [5], 385
—. La piroplasmose bovine au Dahomey. . . . . [3], 482
—. Ostéomalacie (Discussion). . . . . [5], 520
—. Contribution à l'étude de la Pathologie Vétérinaire de la Colonie du Tchad . . . . [17], 196
PEDROSO (A.) et BRUMPT (E.). — Recherches épidémiologiques sur la leishmaniose forestière américaine dans l'État de São Paulo (Brésil) . . . . [6], 752
PEEL, SCHWETZ (J.), DROESHAUT (Mlles) et BAUMANN (H.). — Sur l'infection malarienne trouvée chez les enfants d'Angumu (district de Stanleyville, Congo belge) . . . . . [25], 885
—, —, — et —. Sur la trypanosomiase virulente du porc . . . . . 25], 906
—. —, — et —. Le « mystère » de la fièvre quarte et de la tierce bénigne en Afrique Equatoriale et Centrale. . . . . [25], 1062
PÉJU (G.). — Foyers d'Anophèles dans les Ardennes . [13], 559
— et CORDIER (E.). — Paludisme et topographie anophélienne en Argonne à propos d'une épidémie de paludisme autochtone . . . . . [12], 23
PEIRIER. — Soluté de chaulmoograte de soude pour injections intraveineuses . . . . [24], 772
—. Le principe actif des huiles de Chaulmoogra . . . [14], 778
— et ADVIER. — Mode d'action des huiles de *Caloncoba* et de leurs dérivés sur les bacilles acido-résistants. . . . [23], 767
PEKKOLA (W.) et CHALMERS (A.-J.). — A Sudanese Dermatitis venenata. . . . . [10], 512
— et —. *Enteromonas hominis* da Fonseca 1915 chez un soldat anglais . . . . . [10], 736
PELLETIER (J.). — Éléphantiasis du scrotum observé au Sénégal . . . . . [5], 628
—. Injections intraveineuses d'hexaméthylènetétramine (urotropine) contre la trypanosomiase humaine. . . [13], 148
—. Un cas curieux d'intoxication due au salicylate de soude . . . . . [19], 859
— et QUEMENER. — Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique par des injections intraveineuses de cyanure de mercure . . . . . [14], 226
— et THIROUX (A.). — De la méningite aiguë dans la trypanosomiase humaine . . [2], 400
— et —. Mycétome à grains rouges de la paroi thoracique . . . . . [5], 585
PELTIER (M.). — La bilharziose au Togo . . . . . [18], 592
—. De la valeur technique de la méthode de Rubino dans la recherche de la sédimentation globulaire chez les lépreux . . . . . [21], 836
— et DOMINIQUE (H.). — Note sur l'action du mélange émétique-extrait d'organes dans le traitement de la dracunculose . . . . . [17], 846
— et RAYNAL (J.). — Le chlorhydrate d'émétine en injections sous-cutanées dans le traitement des bilharzioses vésicales et intestinales . . [22], 168
PENA (R.) et MIGONE (L.-E.). — Le Mal de Caderas des bovidés du Paraguay . . . . [23], 590
PÉRARD (C.) et ROUBAUD (E.). — Étude sur l'Hypoderme ou Varron des bœufs. Les extraits d'œstres et l'immunisation . . . . . [17], 259
PERFILIEV (P.-P.). — Sur l'anatomie des Phlébotomes . . . . . [21], 159, 254
—. Sur les Phlébotomes du Turkestan et sur *Phlebotomus sergenti* var. *alexandri* Sinton. . . . . [22], 545
PEROES. — Épidémie de « Dengue » à la marine de Dakar. . . . . [20], 92
PERONI (Giacomo). — Sur le traitement du paludisme par la *Smalarina cremonese* (A propos de la communication de M. E.-W. Sudley). . . [20], 304
PERRONCITO. — La malattia dei minatori. . . . . [3], 59
PERROT (E.). — L'œuvre scienti-

fique et sociale de la mission de Kisantu (Présentation) . . . . . [8], 560
PESCHER (W.-J.). — Les applications pratiques de l'entraînement respiratoire par la méthode spiroscopique . . [23], 137
PETIT (G.) et TOURNAIRE (P.). — Sur la répartition des gîtes d'Anophèles dans l'arrondissement de Bergerac (Dordogne) . . . . . [12], 332
PETTIT (A.). — Lésions osseuses chez deux singes (*Cebus fatuellus* et *Gorilla gorilla*). . . . . [2], 220
—. Spirochétose humaine (Discussion) . . . . . [13], 679
—. Typhus exanthématique (Discussion) . . . . . [13], 747
— et AGUESSY (C.-D.). — Le chimpanzé est-il réceptif au virus amaril ? . . . . [25], 190
— et LAVERAN (A.). — Contribution à l'étude des Hémogrégarines de *Lacerta ocellata* Daud. . . . . [2], 295
— et —. Contribution à l'étude des Hémogrégarines de *Clemmis leprosa* et de *Chelodina longicollis* . . . . . [2], 377
— et —. Contribution à l'étude des Hémogrégarines de quelques sauriens d'Afrique [2], 506
— et —. Infections expérimentales légères ou latentes du singe et du chien par le Kala-azar tunisien . . . . [2], 584
— et —. Sur les cultures de *Leishmania donovani* en milieu liquide . . . . . [3], 216
— et —. Contribution à l'étude du *Spirillum pitheci*. . [3], 419
— et —. Des trypanotoxines . . . . . [4], 42
PETZETAKIS (M.). — A propos des bronchites amibiennes . [17], 553
—. Amibiase urinaire . . [18], 478
—. L'urétbrite à *Pasteurella* . . . . . [21], 839
—. A propos d'une épidémie de spirochétose ictéro-hémorragique à l'île de Syra. Origine hydrique de l'épidémie. Présence des Spirochètes chez les rats d'égouts en Grèce . [25, 411
—. A propos de la nature de l'épidémie de Syra . . [25], 1058
PEYRE (E.-L.). — Contribution à la thérapeutique et la prophylaxie de l'ankylostomiase . . . . . [16], 98
—. Le tétrachlorure de carbone dans le traitement de l'ankylostomiase. . . . . [17], 145
—. Fistule entéro-pulmonaire d'origine amibienne . . [20], 213
—. Posologie de l'antigène méthylique tuberculeux et son emploi dans la lèpre . [21], 14
— et LABERNADIE (V.). — Apparition de la broncho-spirochétose en Guyane française . . . . . [16], 476
PEYTAVIN, NGUYÊN-TRUNG-TRUYÊN, NGUYÊN-VAN-DÈN, KIÈU-THIÈN-THÈ et BROUDIN. — Contribution à l'étude du Surra d'Indochine. . . . . [19], 746
PEZET (O.) et LEGER (M.). — Quelques documents sur la cuti-réaction à la tuberculine en Guinée française . . . [15], 354
PHAM-QUANG-ANH, TRAN-DINH-QUÉ et JOYEUX (Ch.). — Volumineux fibrome périostique intrathoracique et tuberculose pulmonaire concomitante . [22], 778
PHAM-VAN-LU, BABLET (J.) et GUILLERM (J.). — Deux cas de cancer primitif probable du foie en Cochinchine. . . . [19], 569
PHIPPS (F.-E.). — Les trypanosomiases dans la région de Carnot (Haute-Sangha). [12], 416
PHIQUEPAL D'ARUSMONT (L.). — Les tumeurs malignes dans la race noire . . . . . [23], 109
PHISALIX (Marie). — Effets réciproques des morsures de l'*Heloderma suspectum* Cope et de la *Vipera aspic* Laur (avec *erratum*, p. 721) . [4], 631
—. Récolte, conservation et envoi des animaux venimeux et de leur venin . . . [5], 2
—. Propriétés vaccinantes du venin muqueux de la peau des Batraciens contre lui-même et contre le venin de la Vipère aspic . . . . . [6], 190
—. *Erratum* . . . . . [6], 241
—. Anatomie comparée de la tête et de l'appareil venimeux chez les serpents . . . [7], 345
—. Note sur les précautions à prendre dans la récolte, la conservation et l'envoi des animaux venimeux et de leur venin . . . . . [7], 517
—. Sur une Hémogrégarine nouvelle, parasite de *Boodon fuliginosus* Boïe et ses formes de multiplication endogène [7], 575
—. Mécanisme de la résistance des Batraciens et des serpents au virus rabique . . [8], 13
—. Les propriétés vaccinantes de la sécrétion muqueuse des Batraciens contre le virus rabique sont indépendantes de celles qu'elle possède contre sa propre action et contre celle du venin de la Vipère aspic . . . . . [8], 730
—. Propriétés venimeuses de la

salive parotidienne chez les Colubridés aglyphes. . [9], 369
—. Propriétés venimeuses de la sécrétion parotidienne chez les Colubridés aglyphes des espèces *Lycodon aulicus*, *Dendrophis pictus* et *Zamenis mucosus* . . . . . [10], 474
—. Les venins cutanés de *Spelerpes fuscus* Gray . . [11], 108
—. Symptômes graves déterminés chez une jeune femme par la piqûre d'une seule abeille. . . . . [11], 839
—. Coccidiose observée sur deux Crotales de la ménagerie des reptiles du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris . . [12], 11
—. Coccidiose des serpents . . . . . [14], 82
—. Hérisson et virus rabique . . . . . [15], 779
—. Coccidiose des voies biliaires d'un lézard de la famille des Scincidés, le *Scincus officinalis* Laur . . . . . [16], 408
—. Coccidiose intestinale de la Vipère aspic à *Cyclospora viperæ* n. sp. . . . . [16], 637
—. Les venins cutanés de *Bombinator pachypus* Fitz., var. *brevipes* Blasius . . . [16], 541
—. Note complémentaire sur *Cyclospora viperæ*, Coccidie parasite de l'intestin de la Vipère aspic . . . . . [17], 539
—. Coccidiose intestinale de *Vipera berus* à *Cyclospora babaulti* n. sp. . . . . [17], 868
—. *Cyclospora tropidonoti* ; Coccidie intestinale de la Couleuvre à collier. . . . . [17], 871
—. *Coccidium persicum*, n. sp., parasite des voies biliaires de *Tropidonotus natrix*, var. *persa*, Pallas . . . . . [00], 000
—. *Cyclospora viperæ*, Coccidie parasite de l'intestin de la Vipère aspic, infecte également nos autres serpents indigènes, et spécialement la Couleuvre d'Esculape et la Couleuvre de Montpellier . . . . . [18], 707
—. Innocuité de *Galeodes olivieri* au Maroc (Discussion) . [18], 783
—. Note sur un Myriapode vésicant du Tonkin, *Otostigmus aculeatus* Haase (Discussion) . . . . . [19], 344
—. Indépendance des propriétés antirabiques et antivenimeuses du sang des Couleuvres aglyphes appartenant au genre *Coluber* Lin. . . . . [20], 986
—. Coccidiose intestinale de la Salamandre noire (*Salamandra atra* Laur.) . . . . . [20], 964
—. Coccidiose des voies biliaires d'un lézard du Nord de l'Afrique, *Acanthodactylus scutellatus* Audouin. . . . . [23], 186
—. Les hémogrégarines du *Bufo agua* Latr. (Syn. *Bufo marinus* L.) . . . . . [23], 372
—. *Hæmogregarina cenchridis*, nov. sp., parasite d'un serpent Boïdé, *Epicrates cenchris* Lin. . . . . [24], 187
—. Les Hémogrégarines de *Crotalus terrificus*, Lam. . [24], 190
— et Achalme (P.). — Contribution à l'étude de la conservation du vaccin dans les pays chauds. . . . . [2], 431
— et Caius (F.). — Sur la toxicité comparée du sang des serpents . . . . . [12], 159
— et Laveran (A.). — Sur une Hémogrégarine de *Lachesis alternatus* . . . . . [6], 330
— et Marcenac (M.). — La soi-disant immunité naturelle du chien Sloughi aux venins de scorpion et de vipère, ainsi qu'au virus rabique . . [19], 438
— et —. Arachnides, Myriapodes et serpents de la région du Tadla (Maroc) . . . . [19], 560
— et Pasteur (F.). — Les rayons infra-rouges ne modifient pas la toxicité globale du venin de la Vipère aspic, mais en diminuent légèrement l'action vaccinante . . . . . [25], 320
— et —. Action vaccinante réciproque des venins d'abeille et de Vipère aspic . . . [25], 881
— et —. La papillonite guyanaise (Discussion). . . [25], 1107
— et Téjera (E.). — Sur une hémogrégarine et ses kystes de multiplication chez un lézard iguanidé, *Tropidurus torquatus* . . . . . [13], 783
Photinos (Georges Th.). — Un nouveau traitement du Bouton d'Orient (de Crète) par des injections locales de chlorhydrate d'émétine. . . . . [13], 290
Photinos (Socrate) et Cardamatis. — Trypanosomes dans le sang des bovidés en Grèce . [4], 377
Picard (F.) et Lagriffoul (A.). — Remarques sur le paludisme dans la XVIe Région. Cas autochtone à *Pl. præcox* . [10], 883
— et —. Mode d'action du climat sur la répartition géographique du paludisme . [11], 73
Picard et Surcouf. — Note sur les Diptères du genre *Stomoxys* en Abyssinie . . [1], 193
Pignet (M.). — Essais d'inoculation du typhus exanthématique aux petits animaux de laboratoire . . . . . [2], 564

PIN (M.) et BLANCHARD (M.). — Rechute de paludisme six ans après le départ de pays d'endémie . . . . . [22], 73
PINOY (E.). — Conservation et envoi des cultures de champignons inférieurs . . . [2], 60
—. *Epidermophyton* du singe. . . . . [5], 60
—. Mycétome à grains rouges (Discussion) . . . . . [5], 589
—. Grains rouges et grains noirs . . . . . [6], 294
—. Un traitement des mycétomes . . . . . [6], 710
—. Parasite des nodosités juxta-articulaires (Discussion) [9], 214
—. Traitement de la pelade et considérations sur son étiologie . . . . . [14], 280
PINAUD (J.), BÉDIER (E.) et LEGER (M.). — Le paludisme à Zinder : indice hématologique . . . . . [16], 137
PINOY (E.) et MASSON. — Mycétome du poumon de l'âne . . [8], 11
— et MESNIL (F.). — A propos de l'agent de la dermatose contagieuse (Discussion). . . . . [8], 359
— et NICOLLE (Ch.). — Un cas de mycétome à grains noirs. Culture et inoculation expérimentale . . . . . [1], 95
— et RAVAUT. — Sur un cas d'actinobacillose humaine observée à Paris chez un malade venant d'Argentine . . [3], 598
PINTO (César). — *Xenopsylla cheopis* (Roth.), hôte intermédiaire probable de *Gongylonema neoplasticum* (Fibiger et Ditlevsen) ou de *Protospirura muris* (Gmelin). . . . [21], 104
PIOT (A.). — Sur le fonctionnement d'un secteur de prophylaxie contre la trypanosomiase au Congo français (1919). . . . . [13], 376
PIOT-BEY. — Destruction des rats (Discussion) . . . . . [12], 484
PIOT-BEY (J.-B.). — Endozootie inédite en Egypte sur les ovidés caprins . . . . . [2], 154
PIRAJA DA SILVA. — Deux cas d'Ainhum observés à Bahia. . . . . [4], 692
— et BRUMPT (E.). — Existence de *Schizotrypanum cruzi* (Chagas, 1909, à Bahia). Biologie de *Conorhinus megistus*. . [5], 22
PIROT (R.). — Le parasitisme intestinal dans la région de Toulon . . . . . [25], 78
— et MARCANDIER (M.). — Étude sur les ectoparasites des rats de Toulon. . . . . [25], 237
— et —. Fréquence du virus du typhus endémique (typhus murin) dans l'encéphale des rats des navires de guerre à Toulon . . . . . [25], 673
PITTALUGA (G.). — Maladie du sommeil dans les possessions espagnoles du golfe de Guinée . . . . . [10], 161
PLANTIER. — Erythème ortié, d'origine acarienne chez un Algérien . . . . . [1], 177
—, SERGENT (Ed. et Et.) et BÉGUET (M.). — Observations microscopiques au cours d'un accès pernicieux paludéen . . [6], 615
PLANTUREUX (E.), DEGUILLAUME (A.), DONATIEN (A.) et SERGENT (Edm.). — Notes sur les trypanosomiases (1921-1923) . [17], 130
—, LESTOQUARD (F.), PARROT (L.), DONATIEN (A.), SERGENT (Edm.) et ROUGEBIEFF (H.). — Inoculation au mouton de l'anaplasmose du bœuf . . . . [17], 295
—, ROSSI (P.), ESPÉRANDIEU (G.) et DONATIEN (A.). — La theilériose bovine en Algérie. [16], 6
PLAZY (L.) et GERMAIN (A.). — Un cas d'urticaire palustre. . . . . [25], 882
— et MARCANDIER (A.). — A propos d'un essai de classification des fièvres typho-exanthématiques . . . . . [23], 560
PLUCHON, RABOISSON et MILLOUS. — Observations cliniques sur un cas isolé de fièvre jaune traité par le sérum de Pettit. . . . . [25], 362
POISSON (H.). — Un cas de pseudo-parasitisme intestinal par larves de charançon . . . . . [10], 383
—. Pica chez le canard. Présence de corps étrangers dans le gésier . . . . . [22], 230
—. Note sur la distomatose des moutons de Madagascar [22], 521
—. Note sur les lésions du foie des moutons de Madagascar. . . . . [22], 525
—. Dentition anormale chez un cheval, mauvaise nutrition et ingestion stomacale. Lésions cérébelleuses consécutives . . . . . [22], 1013
—. Achondroplasie bovine. . . . . [22], 1018
—. Note sur la syngamose des volailles de Madagascar . . . . . [23], 681
—. Note sur la cysticercose du chien à Madagascar et sa signification . . . . . [23], 877
—. Echinococcose massive du poumon du bœuf . . . [23], 871
—. Sur un cas de gale psoroptique du bœuf . . . . [23], 873

—. Infestation ladrique massive chez le porc . . . . . [23], 880
—. Parasitisme multiple et cachexie chez un poulet . [24], 167
—. Note sur un Diptère parasite des pigeons . . . . . [24], 358
—. Corps étrangers du foie de porc . . . . . [24], 620
—. L'hydronéphrose du porc à Madagascar . . . . . [25], 378
—. Contribution à l'histoire de la rage au point de vue vétérinaire à Madagascar . [25], 790
— et ADVIER (M.). — Note sur une Limnée de Madagascar et sur les cercaires de Trématodes qu'elle héberge . . [22], 523
— et BOURDIN. — Néoformation osseuse de nature métaplasique chez le porc . . . [24], 619
— et BUCK (G.). — A propos d'un cas de tuberculose pulmonaire du chat . . . . . [24], 861
—, DURIEUX (V.) et BUCK (G.). — Note sur un cas d'intoxication arsenicale chez le cheval . . . . . [25], 381
— et GEOFFROY (P.). — Un nouveau cas de physocéphalose de l'estomac du porc . . . [23], 874
— et —. Note sur une rétention anormale d'un fœtus de vache . . . . . [24], 250
— et —. Télangiectasie d'origine parasitaire du foie et de la rate du porc . . . . . [24], 611
POISSON (A.) et RANDIAMBELONA. — Note sur la cysticercose bovine à Madagascar . . . . [21], 272
POLIDORI, BABLET (J.) et MESNARD. — Premiers résultats d'une enquête sur le typhus exanthématique au Tonkin . . [19], 766
POMARET et ANDREANI-CONSTANTINI (Mme). — Sur un cas de bilharziose vésicale mixte . . [14], 567
POMME et SABACH (Abdel-Kader). — Un cas de bilharziose vésicale à Damas traité par l'antimoine en injections intraveineuses . . . . . [15], 695
PONS (C.), VANDENBRANDEN (F.), RODHAIN (J.) et BEQUAERT (J.). — *Leptomonas* dans l'intestin de divers insectes du Katanga . . . . . [4], 528
—, —, — et —. Les trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les Glossines. . . . . [5], 45, 281
—, —, — et —. *Leptomonas pangoniæ* . . . . . [5], 604
—, —, — et —. Trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les Glossines. *Tr. denysi* de l'écureuil volant. . . . . [5], 608
—, —, — et —. Essais de transmission de *Trypanosoma gambiense* par la *Glossina morsitans* . . . . . [5], 762
—, —, — et —. Note sur les trypanoses animales du Haut-Katanga . . . . . [5], 819
—, —, — et —. Note sur les Trypanosomides intestinaux d'*Hæmatopota* au Congo belge. . . . . [6], 182
PONS (R.). — Description de deux Microfilaires sanguicoles parasites d'un oiseau (*Merganser serrator*) vivant dans les régions froides. . . . . [13], 652
—. Note sur un coccobacille constituant la flore dominante de diarrhées infantiles considérées comme dysentériques. . [16], 708
—. Notes sur la spirochétose bronchique . . . . . [17], 170
—. Sur l'existence dans les liquides souillés de sang de filaments, non organisés, pouvant être confondus avec des Spirochètes . . . . . [17], 307
—. Infection secondaire de l'utérus *post-partum* par *Chilomastix mesnili* . . . . . [18], 258
—. Vaccinothérapie antispirillaire dans les affections à association fuso-spirochétienne de la peau et des muqueuses. [18], 380
—. Coccidiose intestinale humaine à *Isospora belli* (Wenyon, 1922). Considérations générales (étude de deux nouveaux cas observés à Saïgon) . . [18], 370
—. Existence d'*Hymenolepis nana* (von Siebold, 1852) en Cochinchine. . . . . [18], 722
—. Procédés de diagnostic de la peste *post mortem* chez l'homme et chez les animaux . . . . . [19], 405
—. Essais de mise en culture d'*Entamœba dysenteriæ* en partant du pus d'abcès hépatique d'origine amibienne . . . . . [22], 768
—. La mélioïdose, maladie commune à l'homme, aux rongeurs et aux équidés . . . . [23], 210
—. Guérison par l'émétine d'un abcès du foie constitué (Discussion). . . . . [25], 425
—. Le bactériophage antipesteux *in vivo* chez l'homme et le cobaye et chez la souris . [25], 437
—. Essais de désinsectisation durable du sol sablonneux des cases au Sénégal . . . [25], 539
—. Sur les événements sanitaires du mois écoulé (mars 1932) (Discussion) . . . . . [25], 670
—, BABLET (J.) et BERNARD (P.-Noël). — Les vers intestinaux en Cochinchine . [17], 377

— et Bernard (P.-Noël). — Recherches sur les formes anormales de la peste au Cambodge et en Cochinchine. . . [17], 57
—, — et Lalung-Bonnaire. — Les œdèmes dans le Béribéri . . . . . [20], 30
— et Borel (E.). — Recherches sur l'étiologie du Béribéri, au cours d'une épidémie survenue dans une plantation en Cochinchine (juillet-décembre 1925) . . . . . [19], 620
— et Chastel. — Essais sur l'action curative du vaccin antituberculeux B. C. G. dans la lèpre . . . . . [19], 520
— et Lalung-Bonnaire. — Encéphalite léthargique en Cochinchine . . . . . [16], 399
— et —. Circulation et respiration dans le Béribéri. [20], 132
— et Montel (R.). — Dermatite blastomycosique chloïdienne . . . . . [19], 876
— et Noc (F.). — Porocéphaliase ganglionnaire et lymphadénie tuberculeuse à évolution rapide chez un tirailleur sénégalais . . . . . [15], 951
Popoff (S.) et Assali (J.). — Adéno-phlegmon à bacilles pesteux et à évolution chronique. . . . . [23], 997
— et Couvy (L.). — Note sur le traitement de la pneumonie par le salicylate de soude en injections intraveineuses. . . . . [22], 607
— et —. Essais de traitement de la peste par le bactériophage. . . . . [23], 618
—, Lambert (L.) et Assali (J.). — Traitement du tétanos par l'association urotropine et sérum. . . . . [24], 590
Porcher (Ch.) et Godard (P.). — — Le lait et la fièvre méditerranéenne (Présentation) . . . . . [9], 285
Porot (A.). — Délire et réactions psychomotrices dans la fièvre récurrente de l'Indigène [10], 332
Porry (Émile) et Lamoureux (A.). — L'index endémique du paludisme à la Martinique . [12], 301
Pottevin (H.). — Orpiment (Discussion) . . . . . [2], 54
—. Action des différents bacilles dysentériques sur la mannite . . . . . [3], 20
—. Béribéri (Discussion) . [3], 50
—. Origine alimentaire du Béribéri. Réponse à M. Bréaudat. . . . . [3], 128
—. Le Béribéri (Discussion) . . . . . [3], 130
—. Contagion de la lèpre (Discussion) . . . . . [3], 415
—. Notes sur l'épidémie cholérique des Pouilles . . . . [3], 636
—. Lèpre (Discussion) . [4], 71, 78
—. Toxine et antitoxine cholériques. . . . . [6], 409
—. Instructions pour le prélèvement, l'envoi et l'examen des fèces en vue de la recherche du virus cholérique . . . . . [8], 98
— et Violle (H.). — Transmission du choléra aux singes par la voie gastro-intestinale . . . . . [6], 232
Poujol (Jean) et Sergent (Ed.). — L'infection tuberculeuse chez les indigènes de la région d'Ain-Bessem (Tell Algérois) . . . . . [8], 250
Poumeyrac. — Epidémie de peste de Langson en 1909. . [4], 219
Poupelain. — Les nodosités juxta-articulaires . . . . . [13], 548
Prade (J.-V.) et Quérangal des Essarts (J.). — Un cas de fièvre exanthématique observé à Brest . . . . . [25], 109
— et —. Présence du virus exanthématique sur les rats d'un navire de guerre au port de Brest. Rats et puces des rats à Brest . . . . . [25], 283
Prates (M.-M.). — La myiase oculaire de l'île de Sal (Archipel du Cap Vert) . . . [12], 736
Prévôt. — Béribéri (Discussion) . . . . . [3], 19
Prieur (Mlle M.) et Launoy (L.). — Action trypanocide synergique du 205 Bayer-309 Fourneau et d'un sérum spécifique, dans la trypanosomiase expérimentale à *Trypanosoma brucei* de la souris . . . [24], 311
— et —. Etude de la virulence d'une souche de *Trypanosoma congolense* (Rodhain) pour le chat adulte . . . . . [25], 21
— et —. Essai d'exaltation de la virulence d'une souche de *Trypanosoma congolense* pour le chat . . . . . [25], 33
—, Nicolle (P.) et Launoy (L.). — Recherches sur la thérapie et la prévention du Nagana expérimental de la souris et du chat avec le 205 Bayer-309 Fourneau. . . . . [23], 630
Primet. — Eaux de Saïgon (Discussion) . . . . . [3], 464
—. Sur l'emploi du vaccin antipesteux en Indochine . [4], 217
—. Rapport de la Commission du Béribéri . . . [4], 575, 656
—. La théorie du phosphore organique (Discussion) . [5], 134
—. Emploi du salvarsan aux colonies . . . . . [6], 137

—. Emploi du salvarsan (Discussion) . . . . . [6], 239
PRINGAULT (E.). — La leishmaniose canine à Marseille . . . . . [7], 41, 484 ; [9], 697
—. Étude biologique de *Trichomonas intestinalis* . . [13], 800
—. Les Phlébotomes dans la région marseillaise . . . [13], 809
—. Capture dans les Bouches-du-Rhône de *Theobaldia spathipalpis*, Rondhani . . [14], 163
—. Étude histo-pathologique d'un cas de malaria primaire . . . . . [14], 38
—. Le parasitisme intestinal dans la région marseillaise . . . . . [14], 151
— et LEGER (M.). — Helminthiase intestinale et bilharziose à *Schistostomum mansoni* à Madagascar . . . . . [14], 247
— et VIGNE (P.). — Sur quelques cas de parasitisme par *Rhipicephalus sanguineus*, Latreille, 1806. . . . . [14], 91
PRUDOT D'AVIGNY (G.). — Évolution de la formule leucocytaire chez les malades atteints de fièvre récurrente au cours d'une épidémie (Soudan 1923). . . . . [17], 115
PRUNNELLE (M.) et SÉNEVET (G.). — Circulation et respiration dans le Béribéri . . . [20], 131
PUYHAUBERT et JOLLY (R.). — Note sur un cas de mycétome à grains noirs . . . . [12], 57

Q

QUARELLI (G.). — Sur la production des anticorps par *Monilia balcanica*, Cast. . [11], 820
QUEINNEC (P.) et LEGER (M.). — Quelques mots sur un traitement de la filariose Loa . . . . . [25], 690
QUÉMÉNER (E.). — Contribution à l'étude du traitement des dysenteries amibiennes. [19], 672
—. Contribution à l'étude de la « formol-gélification » dans la syphilis et le Kala-azar. [20], 600
—. Épidémie de choléra dans l'Établissement français de Karikal (juin-juillet-août 1927) . . . . . [20], 708
— et PELLETIER (J.). — Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique par des injections intraveineuses de cyanure de mercure . . . [14], 226
QUÉRANGAL DES ESSARTS (J.) et PRADE (J.-V.). — Un cas de fièvre exanthématique observé à Brest . . . . . [25], 109
— et —. Présence d'un virus exanthématique sur les rats d'un navire de guerre au port de Brest. Rats et puces des rats à Brest . . . . . [25], 283
QUILICHINI. — Un cas de leishmaniose infantile guérie. Formule leucocytaire. . . [6], 495
—, SERGENT (Ed. et Et.) et LOMBARD. — La leishmaniose à Alger. Infection d'un enfant, d'un chien et d'un chat dans la même habitation . . [5], 93
QUILICI (P.) et MARCHOUX (E.). — Le stovarsolate de quinine dans la tierce maligne . [19], 782
QUIMAUD (J.) et GIRARD (G.). — Essai d'immunisation antipesteuse par cuti-vaccination chez le cobaye. . . . . [17], 741
QUINLAN et KOCH (DE). — A short preliminary communication on Anaplasmosis of sheep as observed in South Africa. [17], 651

R

RABELLO (Ed.). — Formes cliniques de la leishmaniose tégumentaire . . . . . [11], 153
RABOISSON, MILLOUS et PLUCHON. — Observations cliniques sur un cas isolé de fièvre jaune traité par le sérum de Pettit. . . . . [25], 362
RAFIDISON et KOUN (L.). — Vaccinothérapie et vaccinoprophylaxie antipneumococcique à Tananarive . . . . [19], 521
RAGIOT, LAVAU, SOUCHARD, FARINAUD et LIEOU. — Sur deux cas de fièvre ictéro-hémorragique observés en Cochinchine . . . . . [24], 440
RAHARIJOANA (M.). — Arthrite gonococcique du poignet droit chez une jeune femme malgache de 21 ans (Radiographie faite 13 mois après la disparition de tout phénomène inflammatoire). . . . . [21], 486
—. Accident mortel causé par le courant alternatif de 110 volts. . . . . [23], 345
—. A propos de corps étrangers du tube digestif . . . [25], 380
— et ADVIER. — Note sur un cas de pyopneumothorax tuberculeux à signes cliniques et radiologiques atypiques . [21], 349
— et FONTOYNONT. — La poliomyélite antérieure aiguë (paralysie infantile) à Madagascar . . . . . [23], 55
— et GIRARD (G.). — Vaccination antituberculeuse des nourris-

sons par le B. C. G. à Tananarive. . . . . [24], 282
—, — et Robic (J.). — L'index tuberculinique chez l'indigène en dehors de Tananarive . . . . . [23], 246
Railliet (A.). — Sur les Filaires de Batraciens . . . . [9], 137
—. Onchocercose aortique bovine (Discussion) . . . . . [10], 461
—. Nématodes parasites du Congo belge. . . . . [11], 82
—, Bauche (J.) et Henry (A.). — Sur les Helminthes de l'éléphant d'Asie. I. Trématodes et Cestodes . . . . . [7], 78
—, — et —. Sur les Helminthes de l'éléphant d'Asie. II. Nématodes. A . . . . . [7], 129
—, — et —. Sur les Helminthes de l'éléphant d'Asie. III. Nématodes. B . . . . . [7], 206
—, — et —. Sur les Helminthes de l'éléphant l'Asie, IV. . . . . [8], 177
—, — et —. Un nouveau Strongylidé du porc . . . [12], 324
— et —. Une seconde espèce d'Œsophagostome, parasite de l'homme . . . . . [2], 643
— et —. Remarques à l'occasion de la note de M. le Docteur Antoine . . . . . [3], 91
— et —. Remarques au sujet de la note de M. Nicolas . [3], 738
— et —. Sur quelques Helminthes de *Python sebæ* (Gmelin). . . . . [3], 94
— et —. Deux espèces du genre *Aprocta* Linstow . . . [3], 152
— et —. Sur une Filaire péritonéale des porcins . . . [4], 386
— et —. Remarque au sujet de deux notes de MM. Bauche et Bernard . . . . . [4], 488
— et —. Filaire de l'*Hyœna crocuta* (Discussion) . . . [4], 630
— et —. Helminthes du porc recueillis par M. Bauche en Annam. . . . . [4], 693
— et —. Observations sur les Strongilidés du genre *Nematodirus* . . . . . [5], 33
— et —. Nématodes vasculicoles des bovins annamites . [5], 115
— et —. Quelques Nématodes parasites des reptiles . . [5], 215
— et —. *Filaria immitis* (Discussion). . . . . [5], 73
— et —. Un *Hæmostrongylus* des bronches du léopard . . . . . [6], 431
— et —. Sur les Œsophagostomes des ruminants . . [6], 506
— et —. Filaire du caméléon de Madagascar . . . . . [7], 175
— et —. Sur les Nématodes du genre *Goezia* Zeder . . [8], 270
— et —. Sur les Nématodes du genre *Camallanus* (= *Cucullanus* Auct., non Müller, 1777). . . . . [8], 446
— et —. Le parasite de la dermite granuleuse des Equidés. . . . . [8], 695
— et —. Les Filaires des Rapaces (Falconiiformes et Strigiformes). . . . . [9], 364
— et —. Sur un Strongylidé vivant dans des kystes intestinaux chez les grands Félidés. . . . . [11], 86
— et —. Un Bunostomien pathogène, parasite de la vésicule biliaire d'un rongeur africain. . . . . [11], 93
—, — et Joyeux (C.). — Sur deux Trématodes de Primates. . . . . [5], 833
—, — et —. Un nouveau Strongylidé des singes . . . [6], 264
—, — et Langeron (A.). — Le genre *Acanthocheilonema* Cobbold, 1870 et les Filaires péritonéales des carnivores. . . . . [5], 42
— et Marullaz (M.). — Sur un Cénure nouveau du Bonnet Chinois (*Macacus sinicus*) . . . . . [12], 223
Rajaofera (A.). — Observation d'un cas de dystocie, dû à un hymen insuffisamment perforé . . . . . [22], 754
Rakotomalala. — Adhérence intime du placenta. Délivrance 36 jours après avortement. Absence d'infection . . [23], 869
Rakotoson (J.), Hérivaux (A.) et Ranoarivony (E.). — A propos d'un cas de dysenterie bacillaire dans le Sud-Ouest de Madagascar . . . . . [23], 374
Ramanoelina. — Vaccination antituberculeuse (B. C. G.) à Arivonimamo . . . . [23], 870
Randria (Stanislas). — Localisation rare d'un bubon pesteux, bubon sus-épitrochléen. [23], 883
Randriambelona. — Notes sur l'échinococcose à Madagascar . . . . . [24], 972
Raneivo (Ch.) et Girard (G.). — Accidents anaphylactiques immédiats et graves consécutifs à une vaccination jennérienne . . . . . [21], 270
Ranoarivony (E.), Hérivaux (A.) et Rakotoson (J.). — A propos d'un cas de dysenterie bacillaire dans le Sud-Ouest de Madagascar . . . . . [23], 374
Rasoamanana (G.). — Sur un cas d'angine pesteuse avec présence d'un bubon sus-claviculaire . . . . . [24], 164

RASTÉGAÏEFF (Mme E.-F.). — Sur une espèce nouvelle de Coccidies . . . . . [22], 69
—. *Eimeria mesnili* n. sp. chez *Canis lagopus* . . . . [22], 640
—. Coccidiose chez le tigre . . . . . [22], 640
—. *Eimeria felina* Niesch. chez la lionne . . . . . [22], 641
—. La coccidiose chez le bison. . . . . [22], 641
—. A propos des Coccidies des renards . . . . . [22], 909
—, GALOUZO (J.-G.), YAKIMOFF (W.-L.) et LOUKIANOFF (W.-A.). — A propos de la coccidiose des porcs en Russie . . [20], 215
—, MARKOFF (Mme E.-N.), OULASSEVITCH (J.-S.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Sur la répartition géographique du *Trypanosoma theileri* en Russie. . . [18], 57
—, NICOLSKY (S.-N.), YAKIMOFF (W.-L.) et BELAWINE (W.-S.). — La répartition géographique des Piroplasmes et des tiques au Nord du Caucase . . [21], 644
—, OULASSEVITCH (J.-S.), ZAWIALOFF (B.-W.), IWANTSCHIKOFF (M.-P.), WASSILEWSKY (Mlle W.-J.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Action de l'Ichtargol et du Luargol dans la piroplasmose bovine. . . . . [18], 51
—, TOLSTOFF (Mme A.-N.), YAKIMOFF (W.-L.) et NICOLSKY (S.-N.). — L'anaplasmose des bovidés en Russie . . . [21], 642
— et YAKIMOFF (W.-L.). — Sur la question des leucocytes des chameaux. . . . . [19], 582
— et —. Les maladies à Protozoaires des animaux domestiques en Crimée . . . [20], 418
— et —. Epizootie de spirochétose des poules à Piatigorsk (Nord du Caucase) . . [22], 764
— et —. Sur la question des variations cytologiques du sang des poules . . . [22], 766
— et —. Sur les Coccidies des poules en Russie (U. R. S. S.) . . . . . [23], 714
— et —. Sur la bartonellose des chiens en Russie (U. R. S. S.) . . . . . [24], 471
—, — et MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.). — Sur l'hémoglobinurie au cours de la babésiellose bovine . . . . [20], 415
—, —, —, GALOUSO (J.-C.), LOUKIANOFF (W.-L.), Mlles ROUMIANTZEFF (E.-W.) et WOITZEKHOWSYK (A.-M.). — Essais de traitement de la piroplamose bovine par le protargol . . . [19], 41
—, —, —, GNÉDINE (Mlle A.-N.), ROUMIANTZEFF (Mlle E.-W.) et TURIKOFF (Mlle M.-F.). — L'arrhénal dans le traitement de la babésiellose bovine (Note préliminaire) . . . . [19], 554
—, —, WASSILIEWSKY (Mlle W.-J.) et MARKOFF (Mme E.-N.). — La coccidiose des porcs en Russie. . . . . [19], 263
RATAVILAHY (E.) et HÉRIVAUX (A.). — Éruption hansénoïde simulée, provoquée par l' « Amiana » (Uréa, Baker) . . [24], 166
RATSIMAMANGA, AGUESSY (D.) et THIROUX (A.). — Sur l'existence de tuberculoses externes ou larvées chez les indigènes africains et sur leur diagnostic par la résorcino-réaction de Vernes . . . . . [24], 793
RAULT (M.). — Quelques faits relatifs au paludisme . . [17], 503
RAVAUT (P.). — Deux cas de Bouton d'Orient contractés en Espagne et en France . . [13], 235
— et DOPTER. — Une épidémie de dysenterie bacillaire chez des macaques . . . . [2], 17
— et KROLUNITZKI. — L'emploi du novarsénobenzol dans le traitement de la dysenterie amibienne . . . . . [9], 510
— et PINOY. — Sur un cas d'actinobacillose humaine observée à Paris chez un malade venant d'Argentine. . . . . [3], 598
RAYMOND (A. DE). — Essai d'un savon total de Chaulmoogra dans le traitement de la lèpre. . . . . [24], 770
—. Le traitement des lépreux au Japon par injections intraveineuses d'un savon total de Chaulmoogra. . . . . [24], 780
—. Note thérapeutique sur le traitement des syndromes cholériformes par la trypaflavine. . . . . [24], 783
—. Note thérapeutique sur le traitement des diarrhées choléri formes et éventuellement du choléra . . . . . [25], 196
—. Note thérapeutique sur le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique par le chlorhydrate de choline . . [25], 215
RAYNAL (H.) et VIALATTE (Ch.). — Du contrôle de la quininisation préventive au moyen du réactif de Tanret . . . . [19], 190
RAYNAL (J.). — Essai de vaccination antipesteuse par voie buccale chez l'homme . . [18], 235
—. Épidémie de peste bubonique de Diégo-Suarez (juin-octobre 1924) : dépistage *post-mortem* ; sérothérapie et vaccination . . . . . [19], 592
—. Contribution à l'étude du

stovarsolate de quinine dans la tierce maligne . . . [20], 408
—. Essais de traitement des tierces bénigne et maligne par le stovarsolate de quinine. [20], 665
—. Enquête sanitaire à la Grande-Comore en 1925. Observation de paludisme à forme épidémique . . . . . [21], 35
—. *Id.* (*Suite*). . . . . [21], 132
—. Le paludisme dans la province de Diégo-Suarez ; quelques index spléniques . [21], 629
—. Helminthiases intestinales chez le Malgache . . . [21], 868
—. Sérologie syphilitique : quelques résultats comparés de déviation du complément et de floculation par les méthodes de Meinicke, en particulier par sa méthode d'éclaircissement (*M. Klarungs Reaktion*, octobre 1929) . . . . . [24], 798
—. Le typhus exanthématique guatémalesque doit être identifié au typhus exanthématique mexicain . . . . . [25], 49
— et LEGER (J.). — Note au sujet de l'action des Pyréthrines (Chrysémine) sur les Ankylostomes . . . . . [22], 23
— et PELTIER (M.) — Le chlorhydrate d'émétine en injections sous-cutanées dans le traitement des bilharzioses vésicales et intestinales . [22], 168
RAYNAUD. — Présentation d'ouvrages de médecine exotique . . . . . [1], 394
—. Typhus exanthématique en Algérie. . . . . [2], 342
—. Prophylaxie de la peste en Algérie. . . . . [3], 39
—. Rapport sur la lèpre en Algérie . . . . . [3], 39
—. Lettre . . . . . [3], 114
RAYNAUD (L.) et SERGENT (Edm.). — Multiplication intraganglionnaire d'un staphylocoque dans un cas rapidement mortel rappelant le bubon climatique. . . . . [14], 137
RAYNAUD (M.) et DERRIEU. — Dysenterie chronique à flagellé nouveau . . . . . [7], 571
—, MONTPELLIER (J.) et LACROIX (A.). — Phagédénisme chronique serpigineux de l'aine (ulcère serpigineux vénérien) . . . . . [13], 641
—, — et —. Un cas de mycétome du pied à *Nocardia maduræ*, chez un indigène algérien. . . . . [13], 379
— et NÈGRE (L.). — Chauffage du sérum dans le séro-diagnostic de la fièvre ondulante . . . . . [12], 171
— et —. Race de *M. paramelitensis* isolée par hémoculture. . . . . [12], 173
RAZAFINDRALAMBO et FONTOYNONT. — Quelques cas de dysenteries bacillaires dont un certainement à Shiga, à Tananarive . . . . . [23], 428
RAZAFINDRALAMBO, LEGENDRE (A.) et MONDAIN (A.). — L'action du quiniostovarsol sur *Pl. vivax* chez les hauts-plateaux de Madagascar . . . . . [22], 137
RAZAFINJATO et FERRÉ (P.). — Composition chimique de sels utilisés par les indigènes de Madagascar . . . . . [23], 118
REBELLO (F.) et MELLO (F. DE). — Anaplasmose de *Bos brachyceros* d'Angola. . . . . [16], 167
REDKO (S.-A.). — Le charbon bactéridien chez un ours . [19], 518
REGNAULT (Félix). — La culture des lentilles d'eau dans la lutte contre le paludisme . . [12], 735
—. A propos du paludisme en Corse . . . . . [15], 935
REMLINGER (P.). — Note sur les avantages que présenterait en médecine coloniale un sérum plécio-thérapeutique . . [2], 349
—. Un cas de pied de Madura observé au Maroc. . . . [5], 707
—. Les progrès de l'alcoolisme au Maroc. . . . . [5], 747
—. La fièvre de Tanger ou Tangérine n'est pas une entité morbide . . . . . [6], 599
—. Note sur l'état de la lèpre au Maroc . . . . . [9], 563
—. Un cas de Sodoku observé au Maroc. . . . . [10], 130
—. Deux cas de Chylurie hydatique recueillis au Maroc. . . . . [11], 452
—. L'éléphantiasis au Maroc . . . . . [16], 422
—. Un cas de nodosités juxta-articulaires observé au Maroc chez un Européen. . . [16], 346
—. Sur le géophagisme au Maroc . . . . . [17], 149
—. Sur un virus de la rue renforcé recueilli au Maroc. [17], 538
—. Sur la fréquence des staphylococcies cutanées à Tanger . . . . . [17], 737
—. Sur la fréquence de l'asthme à Tanger . . . . . [18], 421
—. L'azoospermie essentielle congénitale chez les Israélites Marocains. . . . . [18], 784
—. Sur l'absence de la bilharziose et de la rareté de la filariose à Tanger . . . . [19], 487
—. Sur la vaccination antirabique au moyen de moelles gly-

cérinées fraîches (méthode de Calmette-Remlinger). . [20], 843
—. Sur la fréquence à Tanger de l'hématurie dite essentielle . . . . . [20], 989
—. Quelques réflexions sur l'amibiase au Maroc et à Fez [21], 94
—. Sur un virus herpétique d'origine marocaine . . [18], 623
—. La main-d'œuvre marocaine en France et la propagation de la tuberculose au Maroc . . . . . [21], 192
—. Le « signe de la langue » dans le typhus exanthématique . . . . . [21], 302
—. L'état de la lèpre au Maroc. . . . . [21], 611
—. Quelques considérations sur la rage et le traitement antirabique dans les pays tropicaux. . . . . [21], 790
—. Utilité au Maroc de l'assistance dentaire et de la création de « Maisons des Dents » (Moustasfa el Asnan) . [23], 58
—. A propos de la rage en A. O. F. . . . . [23], 167
—. L'Oulou-fato n'est-il qu'une rage atténuée ? . . . [25], 118
— et Bailly (J.). — Essai de traitement de la lèpre par le B. C. G. Innocuité absolue de doses très élevées du bacille. . . . . [21], 283
— et —. La fièvre récurrente au Maroc. Le Spirochète marocain . . . . . [22], 818
— et —. Transport à longue distance du Spirochète hispano-marocain pour les besoins de la récurrentothérapie . . . . . [23], 153
— et —. La rage et le virus rabique au Maroc . . . [25], 289
— et Bernard (M.). — Le trachome à Tanger . . . [17], 92
— et Charrier (H.). — Contribution à l'étude de la protection de Tanger contre le paludisme . . . . . [20], 45
— et —. La Ballote ou Gland doux dans l'alimentation de l'homme au Maroc . . [24], 463
—, Leger (Marcel) et Teppaz. — Contribution à l'étude de la rage au Sénégal . . . [16] 4
—, Mesnil et Nicolle (M.). — Recherche du Protozoaire de J.-H. Wright dans 16 cas de Bouton d'Alep . . . . [1], 41
Remontet (E.) et Vialatte (Ch.). — Paludisme viscéral, prémunition et réaction de floculation d'Henry . . . . [23], 590
—. Guérison par l'émétine d'un abcès du foie constitué . [25], 421
Rémy (F.-J.). — Le Débab dans la région de Barika . . [1], 22
Renaud (H.-P.-J.). — Sur une épidémie de peste pulmonaire autochtone (pneumonie pesteuse primitive) au Maroc Occidental . . . . . [17], 791
Renaud (M.). — Syndrome pseudo-tétanique observé chez un enfant atteint d'ascaridiose. . . . . [22], 747
Rencurel. — Note au sujet du traitement de la peste pulmonaire (Discussion). . . [21], 601
Répin. — Un procédé de conservation du vaccin . . . [3], 159
—. Nouveaux appareils cryogènes de laboratoire . . [3], 173
—. Distribution géographique du goitre en Algérie . . . [5], 299
Ribeyro (R.-E.). — Sur la *Verruga Peruana* (*Unicité* ou *dualité*). . . . . [20], 790
Richard (G.) et Biot (R.). — De la possibilité d'inoculer *Tr. lewisi* à d'autres animaux que le rat . . . . . [5], 826
Richard (L.) et Nattan-Larrier (L.). — Les lésions histologiques de la peste pulmonaire primitive. . . . . [24], 388
— et —. Trypanosome du dromadaire et Trypanosome du cheval au Maroc . . . [24], 569
Ricou (D.). — Six cas de tétanos infantile traités par la sérothérapie (ancien sérum antitétanique de l'Institut Pasteur) suivis de guérison . . [21], 73
—. Contribution à l'étude de la vaccination pré-opératoire . . . . . [21], 260
—. A propos d'une fracture du radius chez une gazelle (Discussion) . . . . . [21], 823
—. Extraction par simple expression d'un gros calcul salivaire de la glande sublinguale . . . . . [16], 601
Rieux (J.). — Mode d'action de la quinine sur *Plasmodium vivax* . . . . . [6], 133
—. Données hématologiques et cliniques de la guérison du paludisme chez les paludéens rapatriés . . . . . [14], 101
—. Influence du bien-être sur la régression du Paludisme (Discussion) . . . . . [14], 437
—. Paludisme et quinine préventive (note clinique et hématologique) . . . . . [16], 81
Rigollet. — Menace d'avortement dans le cours d'un accès pernicieux. Guérison par le traitement quinique . . [14], 535
—. Note sur la peste à Dakar en 1921 . . . . . [14], 627

—. Le traitement du pian par les injections sous-cutanées de novarsénobenzol (Discussion) . . . . . [15], 490
—. A propos de l'épidémiologie de la peste . . . . . [15], 502
—. Au sujet de la répartition de la puce en Afrique Occidentale . . . . . [15], 1018
—. Quelques faits relatifs au paludisme (Discussion) . . [17], 507
—. Note au sujet de l'épidémiologie de la peste au Sénégal (Discussion) . . . . . [17], 720
—. Note sur l'organisation de la prophylaxie paludique en Afrique Occidentale Française . . . . . [18], 32
—. Cas déclarés de tétanos guéris par la sérothérapie (Discussion) . . . . . [18], 437
—. Origine du typhus récurrent en Afrique Occidentale Française . . . . . [18], 679
—. Le Paludisme à Hagiang (Tonkin) (Discussion) . [20], 921
—. Le paludisme chez les Européens en Haute-Volta (Discussion) . . . . . [21], 210
—. Considérations sur l'épidémiologie du béribéri dans la province de Tanan en 1927 (Discussion) . . . . . [22], 994
—. Les arsénobenzènes aux Colonies : leur emploi raisonné et dûment contrôlé (Discussion) . . . . . [24], 405
Ringenbach (J.). — Contribution à l'étude de la distribution de la maladie du sommeil en Afrique Equatoriale Française . . . . . [6], 34
—. Sur un cas de maladie du sommeil chez l'Européen avec phénomènes cutanés particuliers. . . . . [6], 628
—. Emploi du vaccin sec au Congo . . . . . [7], 17
—. Émétique par voie sous-arachnoïdienne (Discussion). . . . . [7], 17
—. Quelques Hématozoaires du Congo . . . . . [7], 296
—. L'opothérapie rénale dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique avec anurie . . . [8], 119
— et Guyomarc'h. — La filariose au Congo . . . . . [7], 619
— et —. La lèpre et le Pian dans les territoires parcourus par la section française de la Mission de Délimitation Afrique Équatoriale Française-Cameroun en 1912-1913. [8], 124
— et —. Notes de géographie médicale de la section française de la Mission de Délimitation Afrique Équatoriale Française-Cameroun en 1912-1913 ; Variole, Paludisme, Maladies vénériennes . . [8], 199
— et —. *Ibid.* Maladies du tube digestif, maladies cutanées, appareils locomoteur, circulatoire, nerveux, génito-urinaire, affections des organes des sens, intoxications, envenimations, affections chirurgicales. [8], 304
— et —. *Ibid.* Maladie du sommeil. . . . . [8], 517
—, Lebœuf, et Martin (G.). — L'association atoxyl-émétique chez les malades du sommeil avancés . . . . . [2], 620
—, — et —. Sur le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [2], 308
—, — et —. Traitement de la maladie du sommeil par l'orpiment seul. . . . . [3], 42
—, — et —. Le mouvement des malades trypanosomés à Brazzaville. . . . . [3], 604
—, — et —. Traitement de la maladie du sommeil par l'atoxyl-orpiment . . . . [4], 310
— et Martin (G.). — La solution de Lœffler dans le traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine . . . . . [2], 409
— et —. Un nouveau cas de trypanosomiase humaine chez l'Européen . . . . . [2], 480
— et —. Premiers résultats du traitement de la trypanosomiase humaine par l'arsénophénylglycine . . . . [3], 222
— et —. Sur le traitement de la maladie du sommeil par l'émétique d'aniline seul ou associé à l'atoxyl . . . . . [3], 228
— et —. Essai de traitement prophylactique de la trypanosomiase humaine par l'emploi du tryparosane . . . . . [3], 330
— et —. Pénétration de *Trypanosoma gambiense* à travers les téguments et les muqueuses intactes . . . . . [3], 433
— et —. Troubles psychiques dans la maladie du sommeil . . . . . [3], 486
— et —. Nouveaux documents sur la distribution de la maladie du sommeil et des Glossines au Congo français . [3], 529
— et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil à Brazzaville et au Congo français pendant l'année 1909. . . . [3], 564
— et —. Étude expérimentale du *Tryp. congolense*. . [4], 196
— et Mesnil. — Action pathogène de *Trypanosoma rhodesiense* . . . . . [4], 675

— et —. Observation d'une chèvre infectée de *Tr. rhodesiense* . . . . . [5], 105
— et —. Sur le *Trypanosoma rhodesiense* et ses affinités avec le *Trypanosoma gambiense* . . . . . [7], 612
— et Nattan-Larrier (L.). — Sur un cas de maladie du sommeil . . . . . [5], 187
Riou, Advier et Gourry. — Stomatites et glossites épidémiques à Dakar . . . . [25], 1110
—, Delpy et Cauvin. — Contribution à l'étude de la rage en A. O. F. Transmission de la rage du chien (Oulou-fato) à l'homme et au guépard . . . . . [22], 635
— et Toullec (F.). — Le tubage duodénal dans les affections à *Clonorchis sinensis* . . [24], 286
— et —. Le tubage duodénal dans les distomatoses hépatiques à *Clonorchis sinensis*. Essais thérapeutiques . [25], 147
Riqueau. — Les trous de crabes, gîtes à larves . . . . [22], 175
— et Golivine. — Essais de destruction de certains insectes avec le « Givral ». . . [22], 681
Risquez (J.-R.). — Note sur la distomatose et la bilharziose humaines au Vénézuéla. [14], 382
Rivière (J.-A.). — Réclamation de priorité . . . . . [2], 4
Rizzuti (G.) et Scordo (F.). — Recherches bactériologiques et séro-diagnostiques à propos du typhus exanthématique . . . . . [5], 778
Robert (J.). — Un cas de bilharziose intestinale à *Schistosoma hæmatobium* chez un Européen . . . . . [25], 829
Robert (M.-J.-F.), Jamot (E.) et Motais (F.). — Notes sur la géographie médicale du Ouadaï . . . . . [7], 522
Robert. — Rapport sur la quinine. . . . . [2], 225
Robert (Léopold). — Deux cas de Chéloïdes géantes du bras et du tronc. Un cas de *Molluscum fibrosum* géant de la face . . . . . [12], 188
—. L'Institut Pasteur de Bangkok. . . . . [13], 720
—. La gnathostomose humaine. Œdème ambulant siamois dû à *Gnathostomum spinigerum* (R. Owen, 1836) . . . [15], 854
—. Un cas d'anaphylaxie locale à l'émétine. Œdème envahissant, prurit intense, puis érythèmes vésiculeux consécutifs à des injections d'émétine . . . . . [15], 680
—. Accidents paralytiques et hyperesthésie cutanée (rage atténuée) au cours du traitement antirabique. Guérison. . . . . [16], 417
—. Épidémiologie de la peste pulmonaire à Madagascar (Discussion) . . . . . [20], 770
— et Cazanove (P.). — Empoisonnement par le phosphore et fièvre jaune . . . . . [25], 853
—, — et Long (M.). — Événements sanitaires du mois de mai. . . . . [25], 837
Robert (Vital). — Cas déclarés de tétanos guéri par la sérothérapie . . . . . [18], 435
Robic (J.). — Une épidémie de dysenterie bacillaire à Madagascar (1927-1928). . . [21], 709
—. Sur la recrudescence de la diphtérie à Tananarive et sur l'utilité de la création d'un centre de prophylaxie antidiphtérique . . . . . [22], 748
—. Notes sur les infections à déterminations gastro-intestinales observées à Tananarive, pendant la saison chaude 1931-1932. . . . . [25], 790
— et Girard (G.). — La réaction d'opacification de Meinicke dans la lèpre. Comparaison avec le Wassermann . [21], 187
—, — et Hérivaux (A.). — Note sur les puces de la région de Tananarive . . . . . [25], 381
—, — et —. Remarques au sujet de la communication de P. Lauzeral et P. Millischer . . . . . [25], 1022
—, — et Rohoerson (R.). — Enquête épidémiologique sur l'infection tuberculeuse. L'index tuberculinique chez l'indigène à Tananarive . . . . [21], 716
—, — et —. L'index tuberculinique chez l'indigène en dehors de Tananarive . . . . [23], 246
Robin (L.-A.). — Perfectionnement apporté à une méthode d'enrichissement des selles . . . . . [25], 700
— et Delamare (G.). — Carte du paludisme des confins albano-macédoniens . . . . [11], 483
Robineau (M.). — La lèpre dans la circonscription d'Ebolowa (Cameroun) . . . . . [16], 193
—. La lutte contre la lèpre au Cameroun. . . . . [16], 253
—. Quelques remarques cliniques sur la lèpre observée à Ebolowa (Cameroun). . [16], 231
—. La prophylaxie antipaludique dans le secteur Est du front riffain (Taza, juillet-novembre 1925) . . . . . [18], 794

—. Dosage instantané de la quinine dans l'urine à l'aide d'une échelle opacimétrique étalonnée . . . . . [18], 773
—. Comparateur à quatre tubes pour le dosage de la quinine dans les urines, à l'aide du réactif de Tanret et d'une solution titrée de quinine . [20], 591
—. La lèpre en Afrique Occidentale Française et sa prophylaxie . . . . . [24], 708
ROBLEDO (E.). — Deux cas de Pian en Colombie . . . [2], 248
—. Fièvre récurrente en Colombie . . . . . [2], 117
—. L'uncinariose en Colombie . . . . . [2], 703
—. Latex parasiticide de *Ficus glabrata* . . . . . [3], 453
— et HENAO. — Présentation d'échantillons : *Argas americanus, Compsomya macellaria, Necator americanus* . . [1], 317
ROBLES (R.). — Onchocercose humaine au Guatémala produisant la cécité et « l'érysipèle du littoral » (Erisipela de la costa) . . . . . [12], 442
ROBLIN. — Foyer de paludisme autochtone en Seine-et-Marne. . . . . [12], 605
RODET (A.), RUBINSTEIN (Mlle) et BADER. — Trypanosomiase et infections bactériennes : influence réciproque ; étude expérimentale. . . . . [3], 83
— et VALLET. — Sur le pouvoir bactéricide du sang dans le Nagana expérimental . [1], 136
RODHAIN (J.). — A propos de *Leptomonas pangoniæ* et *Tryp. denysi*. . . . . [6], 181
—. Note sur la ponte des Œstrides des genres *Gyrostigma* et *Cobboldia*. . . . . [8], 275
—. *Herpetomonas* parasites de larves d'Œstrides cavicoles. . . . . [8], 369
—. Quelques Hématozoaires de petits mammifères de l'Uélé (Ouellé), Congo belge . [8], 726
—. Quelques aspects de la pathologie indigène dans l'Ouellé. . . . . [8], 734
—. La maladie du sommeil dans l'Ouellé (Congo belge) à la fin de 1914 . . . . . [9], 38
—. Note sur les trypanoses et les piroplasmoses des grands animaux de l'Ouellé . . [9], 95
—. Sensibilité du Rongeur africain, *Tachyorectes annectens* Th., au *Trypanosoma pecaudi*. . . . . [12], 84
—. Symptômes nerveux dans les trypanosomiases animales (Discussion) . . . . . [12], 21
—. Larves de Sarcophagides probablement parasites accidentels de *Glossina palpalis* en captivité. . . . . [12], 104
—. Note sur deux Choeromyies de l'Afrique Orientale . [12], 106
—. Observations médicales recueillies parmi les troupes coloniales belges pendant leur campagne en Afrique Orientale, 1914-1917 . . . . [12], 137
—. Observations diverses concernant *Onchocerca volvulus* . . . . . [13], 848
—. La subsistance de l'*Ornithodorus moubata* sur des reptiles et des sauriens . . . [15], 560
—. Les Roussettes africaines comme animaux de laboratoire . . . . . [15], 212
—. L'ubiquisme parasitaire de l'*Ornithodorus moubata* peut-il influer sur son infection par le Spirochète de Dutton ? . . . . . [15], 564
—. Sur la réceptivité des Roussettes épaulières, *Epomophorus wahlbergi haldemani* (Hallowel) et d'*Epomophorus pusillus* (Peters) au *Trypanosoma gambiense* (Dutton) et au *Tryp. congolense* (Broden) . . [15], 246
—. Trypanosome d'un Cheiroptère insectivore *Nycteris hispida* Schreber au Congo belge. . . . . [16], 659
—. Sur la réceptivité des Roussettes épaulières, *Epomophorus wahlbergi haldemani* (Hallowel) et *Micropterus pusillus* (Peters) au *Spirochæta duttoni* (Todd) . . . . . [16], 729
—. Larve de Diptère parasite cuticole de l'éléphant d'Afrique . . . . . [17], 86
—. Existence d'un foyer de Glossines du groupe *morsitans* dans le Bas-Ouellé . . [19], 197
—. Le recul de la Tsé-tsé : *Glossina morsitans*, devant l'occupation européenne au Katanga. . . . . [19], 222
—. Plasmodium de *Nyctoteris hispida* (Schreber) au Congo belge . . . . . [19], 780
—. *Plasmodium epomophori*, n. sp., parasite commun des Roussettes épaulières au Congo belge . . . . . [19], 828
—. Note au sujet d'une dermo-épidermite papuleuse épidémique du Bas-Congo. . . [21], 383
—. A propos de quelques échecs de l'action trypanocide des composés arsenicaux (Discussion) . . . . . [24], 663
—. Les Filaires de l'Afrique tropicale ; leur rôle pathogène.

Les réactions allergiques qu'elles provoquent et le diagnostic de celles-ci . . . . . [24], 882
— et Bequaert (J.). — Présence de *Leptomonas* dans le latex d'une Euphorbe congolaise . . . . . [4], 198
— et —. Sur quelques Œstrides du Congo . . [8], 452, 687, 765
— et Broden (A.). — Dissociation des *Trypanosoma congolense* et *cazalboui* par l'émétique. . . . . [2], 125
— et —. Piroplasmose des bovidés observée au Stanley-poil . . . . . [2], 120
— et —. Action de l'émétique sur le *Trypanosoma angolense s. cazalboui* . . . . . [3], 233
— et Houssiau (J.). — Dermatite vésiculeuse saisonnière produite par un Coléoptère . . . . . [8], 587
—, Pons (C.). Van den Branden (F.) et Bequaert (J.). — *Leptomonas* dans l'intestin de divers insectes du Katanga . . . . . [4], 528
—, —, — et —. Les trypanoses animales au Bas-Katanga et leurs rapports avec les Glossines . . . . . [5], 45, 281
—, —, — et —. *Leptomonas pangoniæ* . . . . . [5], 604
—, —, — et —. Trypanoses animales au Bas-Katanga. Rapport avec les Glossines. *Tr. denysi* de l'écureuil volant. . . . . [5], 608
—, —, — et —. Essai de transmission du *Trypanosoma gambiense* par la *Glossina morsitans*. . . . . [5], 762
—, —, — et —. Note sur les trypanoses animales du Haut-Katanga . . . . . [5], 819
—, —, — et —. Note sur les trypanosomides intestinaux d'*Hæmatopota* au Congo belge . . . . . [6], 182
— et Van den Branden (F.). — Recherches diverses sur *Filaria* (*Onchocerca*) *volvulus* . . . . . [9], 186
— et —. Sur la réceptivité de la roussette, *Cynonycteris straminea*, aux différents virus de Trypanosomes africains . . . . . [9], 234
— et —. Action comparative des matières colorantes : tryparosan et trypanobleu et des arsenicaux, salvarsan cuprique, sur les Trypanosomes animaux africains du groupe *congolense* et du groupe *angolense cazalboui-vivax*) . [9], 236
— et —. Essais de transmission des parasites de la malaria à la roussette, *Cynonycteris straminea* (Note préliminaire) . . . . . [10], 704
— et —. Essais sur la pluralité des espèces flagellées parasitant le tube digestif des Invertébrés. Note préliminaire . . . . . [10], 811
— et Villeneuve (J.). — *Passeromyia*, genre nouveau du groupe des *Anthomyidæ* (Dipt.) à larve hématophage parasite des jeunes oiseaux . . [8], 591
Rodrigues (A.) et Mello (Froilano de). — Sur un cas de blastomycose à placards multiples végétants verruqueux ou pustulo-ulcérés. . . [22], 142
Rodriguez et Chantemesse. — Un cas de dysenterie amibienne traité par le lavement créosoté . . . . . [2], 29
Roger (V.) et Bonardel (Mme). — Sur un cas d'avortement provoqué pour bassin vicié chez une naine . . . . . [22], 732
Rohoerson (R.) et Hérivaux (A.). — Les groupes sanguins chez les Malgaches de l'Emyrne . . . . . [24], 247
— et —. Sondage épidémiologique sur les Shiga-infections au moyen de séro-agglutination . . . . . [24], 612
— et —. Dépistage épidémiologique de la tuberculose pulmonaire en Emyrne par un procédé de diagnostic *post-mortem*. . . . . [24], 615
—, Robic (J.) et Girard (G.). Enquête épidémiologique sur l'infection tuberculeuse. L'index tuberculinique chez l'indigène à Tananarive. . [21], 716
Roig (G.), Boquet (A.) et Nègre (L.). — Premiers essais de vaccination préventive contre la lymphangite épizootique . . . . . [11], 551
—, — et —. Mycothérapie de la lymphangite épizootique . . . . . [11], 609
— et Sergent (Ed.). — Sur l'existence de l'agalaxie contagieuse des chèvres en Algérie et sur une infection surajoutée [10], 575
Romanovitch. — Infections polymicrobiennes causées par l'œsophagostome . . . [4], 148
Romanowitch et Weinberg. — Helminthiases de l'intestin grêle du chimpanzé et des singes inférieurs . . . . [1], 181
Romary (A.), Le Louet (G.) et Broudin (L.). — Le traitement du Surra expérimental équin

à *T. annamense* par le mélange sulfarsénol et 309 [21], 849
—. Le 914 comme adjuvant de certains traitements chimiques ou sériques des animaux en Indochine. . . . . [22], 166
Romero (N.). — Un cas d'ostéite paratyphique survenu, à la suite d'un traumatisme, chez homme sain. . . . . [15], 5
Rook (H. de) et Brug (S.-L.). — *Bironella gracilis*, Theobald, 1903. . . . . [15], 305
— et Swellengrebel (N.-H.). — Effets comparés du « Vert de Paris » et de la paraffine liquide, comme larvicides [20], 123
— et —. Effet comparé de quelques larvicides. . . . [21], 109
Roques (P.). — Note au sujet de la sérothérapie préventive de la peste pulmonaire (Observations faites au camp d'isolement de Mahazoarivo, Tananarive, du 1er janvier au 25 mai 1927) . . . . . [20], 579
—. Un cas de peste pulmonaire primitive survenu à Tamatave. . . . . [21], 876
—. Calculs préputiaux multiples (Observation) . . . . [22], 623
—. Cysticercose humaine (Observation). . . . . [22], 624
Roques (Xavier). — Analyses d'échantillons de spiritueux provenant de Grand-Bassam . . . . . [7], 137
— et Bouffard. — Un cas de Goundou chez le cynocéphale. . . . . [1], 295
Rosenbaum et Levaditi. — Action des substances hémolytiques sur les Spirochètes, les Protozoaires et les Vibrions [1], 117
Ross (Ph.-H.). — Expériences relatives au vaccin d'Achalme-Phisalix (en anglais, avec résumé français) . . . . [4], 283
—. A further experiment with vaccine prepared according to the method of Achalme-Phisalix . . . . . [6], 144
Rossi. — Un cas d'accès pernicieux traité par le séroquinol. . . . . [23], 842
Rossi (P.), Espérandieu (G.), Donatien et Plantureux (Edm.). — La theilériose bovine en Algérie . . . . . [16], 6
— et Sénevet (G.). — *Ixodes ricinus*, Tique des régions froides ou tempérées . . . [19], 538
Roubaud. — Contribution à la biologie de *Glossina palpalis* . . . . . [1], 255
—. Infection naturelle de la trompe des Glossines . [1], 564
—. Description d'une Simulie nouvelle du Pérou . . [2], 428
—. Études sur les Stomoxydes du Dahomey. . . . . [4], 122
—. Stomoxes nouveaux du Soudan. . . . . [4], 396
—. Compléments biologiques sur quelques Stomoxydes de l'Afrique Occidentale . . . [4], 544
—. Désinfection antimoustique (Discussion) . . . . . [5], 561
—. Lutte contre les moustiques à Saint-Louis (Discussion) . . . . . [5], 640
—. Relations bio-géographiques des Glossines et des Trypanosomes . . . . . [6], 28
—. Quelques mots sur les Phlébotomes de l'Afrique Occidentale Française . . . . [6], 126
—. Étude biologique sur les Auchméromyies . . . [6], 128
—. Observations sur la biologie du Ver de Guinée. Infection intestinale des *Cyclops* . [6], 281
—. Supplément à la répartition et à la variation géographique des Glossines . . . . [6], 435
—. Exemplaire vivant de *Glossina morsitans* . . . . [7], 2
—. Parasitisme chez les Reptiles du *Phlebotomus minutus africanus* . . . . . [7], 83
—. Œstrides gastricoles et cavicoles de l'Afrique Occidentale Française. . . . . [7], 212
—. Le Larbish des Ouoloffs, pseudomyiase rampante sous-cutanée du Sénégal . . [7], 398
—. Agents parasitaires producteurs de myiases ou d'affections similaires chez les animaux et chez l'homme (Présentation) . . . . . [8], 2
—. Sur un essai d'élevage des Glossines dans les laboratoires d'Europe . . . . . [8], 34
—. Hématophagie larvaire et affinités parasitaires d'une mouche calliphorine, *Phormia sordida* Meig., parasite des jeunes oiseaux . . . . . [8], 77
—. Les zones à Tsé-tsés de la Petite-Côte et du Bas-Saloum (Sénégal). . . . . [8], 130
—. Auchméromyies (Discussion). . . . . [8], 461
—. Dispersion des Glossines (Discussion) . . . . . [8], 466
—. Coléoptères vésicants (Discussion) . . . . . [8], 591
—. Présentation d'un *Anopheles maculipennis* capturé à Paris. . . . . [9], 203
—. Les Porcins et la conservation des ectoparasites humains dans les régions chaudes . . . . . [9], 768

—. Cas de paludisme autochtone contracté dans l'Aisne . . . . . [10], 171
—. A propos de la communication de M. Mouchet sur les myiases . . . . . [10], 472
—. Histoire d'un élevage de *Glossina morsitans* à l'Institut Pasteur de Paris . . . [10], 629
—. Méthodes rapides pour les examens de sang paludéen en goutte épaisse . . . . [10], 702
—. Nouveau cas de paludisme contracté sur le front français. . . . . [10], 706
—. Climat et répartition géographique du paludisme (Discussion) . . . . . [11], 78
—. Le rôle des mouches dans la dispersion des Amibes dysentériques et autres Protozoaires intestinaux . . . . . [11], 166
—. Infestation des Cyclops par voie digestive (Discussion) . . . . . [11], 348
—. Destruction des larves de mouches de fumier (Discussion) . . . . . [11], 578
—. Pseudo-myiase rampante (Discussion) . . . . . [11], 724
—. Acarien sarcoptide (Discussion) . . . . . [11], 724
—. Recherches sur la transmission de la bilharziose en France. Essais d'infection de mollusques autochtones . . . . . [11], 854
—. Un deuxième type d'Hémogrégarine humaine . . [12], 76
—. Nouvelle contribution à l'histoire du Ver de Guinée . . . . . [13], 234
—. Diagnostic du paludisme (Discussion) . . . . . [13], 22
—. Phlébotomes en France (Discussion) . . . . . [13], 738
—. La différenciation des races zootropiques d'Anophèles et la régression spontanée du paludisme. . . . . [14], 577
—. Les Diptères et la Pathologie exotique. . . . . [14], 58
—. Le bien-être dans le paludisme et les maladies à Trypanosomes . . . . . [14], 662
—. Phlébotomes en France (Discussion) . . . . . [14], 24
—. Paludisme autochtone à *Plasmodium præcox* (Discussion). . . . . [14], 272
—. A propos des races zoophiles d'Anophèles . . . . . [15], 36
—. Fréquence saisonnière des anophèles impaludés aux environs d'Amsterdam (Discussion) . . . . . [15], 119
—. Flagellose des Euphorbes (Discussion) . . . . . [15], 207
—. Flagellose du chou (Discussion) . . . . . [15], 165
—. A propos du Paludisme en Corse (Discussion) . . [15], 936
—. Hémogrégarine humaine (Discussion) . . . . [15], 942, 947
—. Sur un procédé destiné à empêcher l'infestation du sol par les larves d'ankylostomes dans les pays chauds (Discussion) . . . . . [17], 306
—. A propos de la Puce du porc. Le porc, hôte électif de la puce de l'homme (Discussion) [18], 198
—. Les principes directeurs de la Prophylaxie pratique du paludisme . . . . [18], 199
—. Les raisons de l'absence en Europe septentrionale de l'endémie palustre estivo-automnale (*Plasmodium præcox*) . . . . . [18], 279
—. Le paludisme à Oudé (Géorgie) (Étude sur le paludisme en montagne) (Discussion) . . . . . [18], 388
—. Une nouvelle espèce de Puce-chique pénétrante, parasite des rats en Chine : *Dermatophilus lagrangei*, n. sp. . . . [18], 399
—. Peuplements humains et peuplements animaux comme facteurs économiques comparés de la déviation anophélienne palustre . . . . . [18], 728
—. Note sur un procédé simple pour empêcher la ponte des moustiques dans les collections d'eaux familiales indigènes (Discussion) . . . . . [18], 781
—. *Glossina morsitans* (Discussion) . . . . . [19], 222
—. Le recul de la Tsé-tsé : *Glossina morsitans* devant l'occupation européenne au Katanga (Discussion) . . . . . [19], 235
—. Sur quelques phénomènes peu connus de la vie des moustiques. . . . . [19], 259
—. L'emploi des poudres larvicides légères dans la lutte contre les moustiques . . [19], 287
—. Sur un champignon entomophyte parasite des fourmis en Afrique Equatoriale . . [19], 815
—. La signification du nombre relatif des mâles dans les abris des Anophèles adultes (Discussion) . . . . . [20], 123
—. Effets comparés du « Vert de Paris » et de la paraffine liquide, comme larvicides (Discussion) . . . . . [20], 127
—. La Bilharziose au Portugal (Discussion) . . . . . [20], 350
—. L'hétérodynamie et le rôle de l'athermobiose dans le cycle

évolutif de *Phlebotomus papatasii* . . . . . [20], 613
—. Longue durée de l'asthénobiose pseudo-hivernale chez *Phlebotomus papatasii* ; action réactivante de l'athermobiose prolongée. . . . . [21], 107
—. Effet comparé de quelques larvicides (Discussion) . [21], 112
—. Adaptation spontanée de la punaise des lits (*Cimex lectularius* Merret) en milieu obscuricole, aux Rongeurs domestiques. . . . . [21], 224
—. Foyer de développement de *Xenopsylla cheopis* à Paris. Observations sur la biologie de cette puce. . . . . [21], 227
—. Asthénobiose et hibernation obligatoire provoquées chez *Phlebotomus papatasii* Scop. . . . . [21], 436
—. Un cas de myiase urinaire (Discussion). . . . . [21], 853
—. Les trous de Crabes, gîtes à larves (Discussion) . . [22], 178
—. Remarques sur les conditions de la reproduction chez *Culex pipiens* L. pendant la période hivernale (Discussion) . [22], 553
—. Quelques remarques à propos de l'interprétation théorique des index maxillaires . . . . . [23], 47
—. A propos de l'emploi des hypochlorites dans la lutte contre la fièvre jaune (Discussion) . . . . . [23], 204
—. Nouvelle contribution à l'étude du zootropisme anophélien (*A. maculipennis*). . . [24], 229
—. Invasion domiciliaire spontanée produite par la puce des Rongeurs indigènes *Ceratophyllus fasciatus* Bosc. [24], 383
—. Sur l'autogenèse chez *Culex pipiens*. . . . . [24], 384
—. Prédominance de *Synosternus pallidus* Taschenb. (*Xenopsylla pallida*) comme puce domestique, dans certaines régions pesteuses du Sénégal . . . . . [24], 551
—. Recherches sur les variations trophiques et biologiques des peuplements d'*Anopheles maculipennis* . . . . . [25], 755
— et Abbatucci (S.). — Expériences sur un liquide insecticide commercial à base de pétrole et de pyrèthre . [19], 901
— et Blanchard (M.). — Deux cas de Ver de Cayor chez l'homme observés à la Côte d'Ivoire . . . . . [4], 687
— et Bouet (G.). — Expériences diverses de transmission des Trypanosomes par les Glossines. III . . . . . [3], 599
— et —. Expériences de transmission des Trypanosomes par les Glossines. IV . . . [3], 722
— et —. Expériences de transmission des Trypanosomes par les Glossines. . . . . [4], 539
— et —. Expériences diverses de transmission des Trypanosomes par les Glossines . . . . . [5], 204
— et —. Expériences de transmission des trypanosomiases animales de l'Afrique Occidentale Française par les Stomoxes . . . . . [5], 544
— et —. Désinfection stégomycide par le crésyl . . [5], 627
— et —. L'œstre des moutons au Sénégal . . . . . [5], 733
— et —. Myiase prévaginale chez la vache à *Chrysomyia* (*Pycnosoma*) *megacephala* Fabr. en Afrique Occidentale. Spécificité parasitaire des larves cuticoles de cette mouche . . . [5], 737
— et —. La piroplasmose (Nuttaliose) de l'âne en Afrique Occidentale. . . . . [5], 806
— et —. Bilharziose au Dahomey et en Haute Casamance . . . . . [5], 837
— et —. Nouvelles observations sur les Chéromyies de l'Afrique Occidentale . . . [8], 462
— et —. Nouvelle contribution à l'étude des Chéromyies de l'Afrique Occidentale Française . . . . . [9], 242
— et —. Répartition des Glossines à la Côte d'Ivoire . [10], 37
— et Chatton (E.). — Sporogonie d'une Hémogrégarine chez une Tsé-tsé. . . . . [6], 226
— et Colas-Belcour (J.). — Etude sur les Ornithodores du groupe *lahorensis* dans l'Afrique du Nord. Description d'*O. delanoei* n. sp. . . . . [24], 948
— et —. Observations sur la biologie de l'*Anopheles plumbeus*. Le comportement larvaire . . . . . [25], 763
— et Descazeaux (J.). — Contribution à l'Histoire de la mouche domestique comme agent vecteur des habronémoses d'Equidés . . . . [14], 471
— et —. Évolution d'*Habronema muscae* Carter chez la mouche domestique et de l'*H. microstomum* Schneideer chez le Stomoxe (Note préliminaire) . . . . . [13], 572
— et —. Deuxième contribution à l'étude des mouches dans leurs rapports avec l'évolution

des Habronèmes d'Équidés . . . . . [15], 978
— et Gaschen (H.). — Sur l'adaptation zoophile de l'*Anopheles maculipennis* . . [24], 203
— et —. Concurrence larvaire et peuplements anophéliens . . . . . [25], 428
— et —. Différenciation des races biologiques de *Culex pipiens* L. par l'adaptation larvaire aux milieux ammoniacaux . . . . . [25], 1033
— et Franchini (G.). — Infection leishmaniforme produite chez la souris par l'inoculation des fèces de la puce *Ctenopsylla musculi* . . . [15], 407
— et —. Infection naturelle de la souris par les Flagellés de la puce *Ctenopsylla musculi*, Dug. . . . . [15], 405
— et —. Culture des parasites leishmaniformes obtenus chez la souris par inoculation des fèces de la puce *Ctenopsylla musculi* . . . . . [16], 14
— et Jamot (E.). — Présence d'*Onchocerca volvulus* dans un abcès sus-pubien . . . [13], 282
— et Lafont (A.). — Expériences de transmission des Trypanosomes humains par le *Stegomyia fasciata* . . . . [7], 49
— et Laveran (A.). — Sur un Myriapode ayant séjourné dans les fosses nasales d'un homme. . . . . [9], 244
—, Lebœuf et Martin (G.). — Épidémie de maladie du sommeil au Congo française. La contagion par familles et par cases . . . . . [1], 144
—, — et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo français . . . . . [1], 258
—, — et —. Les trypanosomiases animales du Congo français. . . . . [1], 351
—, — et —. Expériences de transmision du « Nagana » par les Stomoxes et les Moustiques du genre *Mansonia* . . [1], 335
—, — et —. Maladie du sommeil au Congo français . . [2], 344
—, — et —. Sur la répartition géographique de la maladie du sommeil et des mouches piquantes au Congo français. . . . . [2], 108
—, — et —. Trypanosomes d'animaux divers au Moyen-Congo . . . . . [2], 209
— et Leger (M.). — Observations sur le paludisme en Corse (mars-avril 1921) . . . [14], 340
— et Mesnil (F.). — Rapport sur la prophylaxie des trypanosomiases . . . . [7], 1
— et Pérard (C.). — Étude sur l'Hypoderme ou Varron des bœufs. Les extraits d'œstres et l'immunisation . . . [17], 259
— et Toumanoff (C.). — Sur une race physiologique suractive du moustique commun, *Culex pipiens* L. . . . . [23], 196
— et —. Intoxication d'encombrement chez les larves de *Culex* vivant en milieu non renouvelé. . . . . [23], 978
— et —. Essais d'infection expérimentale de larves de Culicides par quelques champignons entomophytes . . . . [23], 1025
— et Van Saceghem (R.). — Observations sur quelques Insectes et Acariens parasites du bétail au Congo belge . [9], 763
— et Wagner (J.). — Sur un Pulicide nouveau, parasite des rats domestiques à Madagascar . . . . . [25], 327
— et —. Sur un Pulicide, nouveau parasite des Rongeurs et Insectivores de Madagascar . . . . . [15], 962
Roudsky (D.) et Laveran (A.). — Contribution à l'étude de la virulence du *Tryp. lewisi* et du *Tryp. duttoni* pour quelques espèces animales . [7], 528
— et —. Sur un dérivé du diaminoarsénobenzène . . [7], 593
— et —. De l'inoculabilité de *Tr. lewisi* au loir (*Myoxus glis*). . . . . [7], 654
— et —. Essais d'immunisation contre les Trypanosomes pathogènes. Trypanotoxines . . . . . [6], 176
— et —. Le galyl dans les trypanosomiases . . . . [6], 502
Rougebieff (H.), Parrot (L.), Donatien (A.), Sergent (Edm.), Lestoquard (F.) et Plantureux (E.). — Inoculation au mouton de l'Anaplasme du bœuf. . . . . [17], 295
Rouffiandis (V.). — Note sur la filariose dans l'archipel des Comores . . . . . [3], 145
—. Un cas d'intoxication par ingestion de fruits de Lantana . . . . . [3], 261
Roukhadzé (N.). — La parasitologie et l'épidémiologie du paludisme en Abkhasie (Géorgie). . . . . [18], 327
—. Le paludisme à Oudé (Géorgie) (Étude sur le paludisme en montagne) . . . . [18], 383
—. La campagne antipaludique à Gagry en 1923 et 1924 [18], 389
—. Un exemple de l'influence de

la stabulation des animaux sur la diminution du paludisme en Géorgie . . . [19], 100
—. *Anopheles nigripes*, Staeg. (1839) en Abhasie (Géorgie) . . . . . [19], 337
—. L'hibernation des Anophèles et des *Stegomyia* en Abhasie (Géorgie maritime) . . [19], 480
—. La stabulation du bétail, comme facteur de réduction du paludisme dans certaines contrées d'Abhasie (Géorgie) . . . . . [20], 153
ROULE (L.). — *Chamæleo oustaleti*. . . . . [7], 175
ROUMIANTZEFF (E.-W.), GALOUZO (J.-G.), YAKIMOFF (W.-L.), MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.), LOUKIANOFF (W.-L.), Mlles RASTÉGAÏEFF (E.-F.) et WOÏTZEKHOWSKY (A.-M.). — Essais de traitement de la piroplasmose bovine par le protargol. . . . . [19], 41
—, GNÉDINE (Mlle A.-N.), YAKIMOFF (W.-L.), MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mlle E.-R.), RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.) et TURIKOFF (Mlle M.-F.). — L'arrhénal dans le traitement de la babésiellose bovine (Note préliminaire) . . . . . [19], 534
ROUSSEAU (L.). — Sur la transmission de la lèpre . . [8], 57
—. Recherches sur l'endémie paludéenne à Douala (Cameroun) en 1917 . . . . . [11], 286
—. Un cas de parasitisme vulvo-vaginal par un Acarien sarcoptide au Cameroun . [11], 722
—. Note sur la fabrication du vaccin à Douala . . . [11], 733
—. Maladies parasitaires à Douala (Cameroun) . . . . [11], 744
—. Alimentation de Douala en eau potable. . . . . [12], 192
—. Filariose au Cameroun . . . . . [12], 35
—. Notes sur la syphilis et le Pian au Cameroun . . [12], 407
—. Parasitisme intestinal à Douala et dans la région forestière du Cameroun. Nématodes, Protozoaires, Cestodes . . . . . [12], 244
—. Quelques observations relatives au traitement des ulcères phagédéniques. . . . [12], 495
—. *Ankylostomum duodenale* Dubini, 1843, existe en Guyane française à côté de *Necator americanus*, Stiles, 1902 [14], 89
—. Le parasitisme des anguillules en Guyane . . . . [14], 124
—. Notes relatives à *Strongyloides intestinalis*. Caractères et biologie de ces larves strongyloïdes . . . . . [14], 214
—. *Stephanurus dentatus* parasite des porcs en Guyane. . . . . [14], 219
—. Quelques observations relatives au traitement de l'ankylostomiase . . . . . [15], 127
ROUX (E.). — Prophylaxie de la maladie du sommeil (Discussion) . . . . . [1], 328
ROUX (G. LE), GORET (P.), GUILLOT (G.) et URBAIN (A.). — Sur un germe diphtériforme et chromogène isolé du castor. . . . . [24], 480
ROUX (G.) et TRIBONDEAU (L.). — Action de l'émétine dans quelques formes spéciales d'amibiase et dans la syphilis . . . . . [6], 424
ROW (R.). — Generalized Leishmaniasis induced in a mouse with the culture of *Leishmania tropica* of oriental sore. . . . . [7], 272
—. Cutaneous spirochaetosis produced by rat bite in Bombay. . . . . [11], 188
—. Observations sur le paludisme et la forme des gamètes de *Plasmodium* en cultures. . . . . [21], 607
RUBINO (C.). — Séro-diagnostic de la lèpre par agglutino-sédimentation des globules rouges de mouton formolés . . [24], 519
RUBINSTEIN (Mlle), BADER et RODET (A.). — Trypanosomiase et infections bactériennes : influence réciproque ; étude expérimentale . . . . . [3], 83
RUDLER. — Enquête sur l'alcoolisme dans la population scolaire indigène de l'Algérie . . . . . [9], 773
RUDOLPH (MAX) et CARINI (A.). — Hématozoaires de lézards au Brésil . . . . . [5], 592
RUSSAOUAN (J.), ADVIER et FEYTES (R.). — La typhoïde à Tiaroye en 1923 . . . . . [28], 1109
RUSSO (C.), CASTELLANI (A.) et SPAGNUOLO (V.). — Quelques observations sur *Spirobacillus zeylanicus* Cast. . . . . [11], 271
RYCKEWAERT (P.) et LEGER (M.). — Hématozoaire de la fièvre quarte et accès pernicieux mortel . . . . . [10], 879
—, — et MOUZELS (P.). — Le Pian à la Guyané française. . . . . [10], 528

S

SABACH (Abdel-Kader) et POMME. — Un cas de bilharziose vési-

cale à Damas, traité par l'antimoine en injections intraveineuses. . . . . [15], 695
—. Deux cas de Bouton d'Alep observés à Damas . . [22], 774
Saceghem (R. van). — Voir Van Saceghem (R.).
Sacquépée (E.). — Les infections paratyphoïdes dans l'Afrique du Nord . . . . . [6], 598
Saïd Djemil. — Kératoses pilaires préscorbutiques . . [19], 6
— et Delamarre (G.). — Crises gastriques et vomissements herbacés sans hémoglobinurie (simulation) . . . . . [18], 786
— et —. Pellagre importée. . . . . [19], 75
Saini (M.) et Franchini (G.). — — Sur la présence d'Hémogrégarines chez les poissons d'eau douce de France . . . [16], 535
Salanoue-Ipin. — Précis de pathologie tropicale . . . . [3], 6
Salaün (G.), Boisseau (R.) et Vaucel (M.). — *Streptothrix* pathogène isolé au cours d'essai de transmission au lapin du virus d'un « chien fou ». . . . . [24], 631
— et Vaucel (M.). — Thérapeutique et prophylaxie de la trypanosomiase en A. E. F. . . . . [24], 834
— et —. Contribution à l'étude du pneumocoque en Afrique Equatoriale Française . [25], 58
— et —. Rage canine en Afrique Equatoriale Française . [25], 1018
—, — et Pales (L.). — Premiers cas de fièvre typhoïde à Brazzaville. . . . . [24], 902
Salimbeni. — Nouvelles recherches sur la toxine cholérique . . . . . [1], 32
—. N'diank (Discussion) . [5], 760
—. Recherches sur la vaccination préventive contre le choléra asiatique . . . . [8], 17
—. Méningite pestcuse (Discussion) . . . . . [8], 97
— et Dopter. — L'épidémie de choléra asiatique de l'asile Saint-Pierre à Marseille en 1911 . . . . . [5], 294
— et Orticoni (A.). — Essais de traitement des porteurs sains de vibrions cholériques par les lavements de sérum spécifique . . . . . [6], 306
Sall (M.) et Durieux (C.). — Nouvelles recherches sur l'index du paludisme à Dakar durant la saison fraîche . [22], 618
Salm (A.-J.). — Deux Nématodes de Java . . . . . [11], 705
—. La maladie des œdèmes à Java . . . . . [14], 333
—. Quelques notes sur le Pian et son traitement à Java [16], 580
—. Sur quelques parasites du dindon dans les îles de la Sonde . . . . . [16], 594
—. Sur un nouveau Trombidiide, *Schöngastia salmi* (N. sp.) . . . . . [16], 336
Salmon (Paul). — L'antimoine dans les spirilloses pathogènes . . . . . [1], 613
—. Présentation de lettres provenant de pays contaminés et soumises à la désinfection . . . . . [2], 327
—. Le sérum humain dans le Nagana des souris . . [3], 726
Salomon et Lebœuf (A.). — Note sur la lèpre des rats en Nouvelle-Calédonie . . . . [6], 484
— et —. La lèpre en Nouvelle-Calédonie. I. Nombre et distribution géographique des lépreux . . . . . [7], 218
— et —. II. Marche de la maladie . . . . . [7], 222
— et —. III. Organisation de la prophylaxie . . . . . [7], 226
Salord (Ch.) et Donatien (A.). — Inoculation expérimentale de *Trypanosoma berberum* à l'âne . . . . . [17], 887
Salvat (P.) et Fontoynont (M.). — Contribution à l'étude des mycoses malgaches. Abcès sous-dermiques dus à *Endomyces molardi* n. sp. . . [15], 311
— et —. Sur une actinomycose du rat à Madagascar . [15], 596
Salvestroni et Croveri. — Rogna demodettica nel cavallo [12], 388
Sambon (L.). — Photographies concernant les maladies exotiques des Antilles, en particulier la pellagre. . . . [7], 367
Sani (Luigi) et Lanfranchi (Alessandro). — L'intrapalpebroreazzione nella diagnosi del Morbo Coltale Maligno . [14], 374
Sanjurjo (D. et M.). — La réaction de Vernes chez quelques lépreux et quelques témoins . . . . . [25], 127
Sanlorenzo (F.). — Coccidiose intestinale, « dysenterie rouge » du bœuf au Piémont . . . . . [10], 446
Sant'Ana Barrets (J.). — La maladie du sommeil dans la Guinée portugaise. . . . [19], 313
—. Index endémique du paludisme en Guinée portugaise . . . . . [20], 280
Santarelli (P.). — Note sur le paludisme à Dakar . . [15], 315
Sanz (B.) et Matte (B.). — Quelques essais de vaccination préventive contre la fièvre aphteuse . . . . . [14], 523

SAPHRONOWITCH (Mlle R.-A.) et YAKIMOFF (W.-L.). — *Theileria* chez le campagnol du Caucase . . . . . [10], 99
SAPORTE (F.). — Traitement de l'ulcère phagédénique par le pansement de Vincent (pl. XIII) . . . . . [11], 827
SARRAILHÉ (A.). — Notes sur la toxoplasmose expérimentale . . . . . [7], 232
—. Dengue et fièvre de trois jours . . . . . [9], 778
SAUJEON (M.). — Troubles urogénitaux guéris par l'émétine, origine amibienne vraisemblable . . . . . [21], 883
SAUNÉ (L.) et CHAILLOT (L.). — Observation d'un cas de leishmaniose canine cutanée rappelant le Bouton d'Orient . . . . . [24], 535
SAUTET (J.). — L'iode dans le traitement des diarrhées fonctionnelles des pays chauds . . . . . [22], 916
—. A propos de l'emploi des hypochlorites dans la lutte contre la fièvre jaune . [23], 202
—. Parasitisme intestinal et éosinophilie sanguine chez les indochinois. . . . . [23], 792
— et COULON (G.). — Diverses formes de paludisme en Corse. Apparition des gamètes. [24], 811
—. Quelques remarques sur la fièvre ondulante en Corse. . . . . [25], 863
—. Traitement du paludisme par le 710 et le 574 associés ou non à la quinine ou au quiniostovarsol. . . . . [25], 1074
SAUVET (Ch.) et LEGER (M.). — Helminthiase de la Guadeloupe . . . . . [7], 71
SCHAUMANN (H.). — Le Béribéri, maladie de nutrition . [5], 125
SCHEIN. — Rôle probable des Ruminants comme réservoir de virus du Surra dans l'Indochine . . . . . [1], 575
—. Spirillose des bovidés dans le Sud-Annam . . . . [3], 73
—. Piroplasmose du cheval dans le Sud-Annam . . . . [4], 39
—. Prophylaxie du Surra en Indochine. . . . . [4], 56
—. Piroplasme du cheval dans le Sud-Annam . . . . [10], 871
—. Charbon symptomatique en Annam . . . . . [13], 98
—. Vaccination contre la peste bovine . . . . . [13], 338
—. Coccidiose des Ruminants dans le Sud-Annam . . [14], 380
—. Vaccination contre la peste bovine. . . . . [14], 361
—. Piroplasmoses d'Indochine . . . . . [16], 30
—. Expériences sur la peste bovine . . . . . [19], 945
SCHIESS (J.-R.) et SWELLENGREBEL (N.-H.). — Quelques remarques sur la morphologie de l'*Entamœba histolytica* et la valeur diagnostique de l'injection rectale des chats . . . . [10], 13
SCHILLING. — Immunisation des rats contre le Nagana . [6], 555
SCHINGAREW (N.). — La révision des Anophèles de Russie . . . . . [19], 896
SCHIRWIND (S.), YAKIMOFF (W.-L.) et JOUKOWSKY (A.). — Epidémie d'angine de Vincent. . [14], 631
—, — et —. A propos de l'angine de Vincent . . . [16], 236
—, — et —. Au sujet de l'angine de Vincent . . . [18], 304
SCHMOULEWITSCH (A.-I.), NEZWETAÏEFF (N.-W.), GADSCHIEFF (S.) et YAKIMOFF (W.-L.). — L'influence du virus de la peste bovine sur les piroplasmoses latentes des bovidés . . [25], 728
—, —, — et —. La coccidiose des reins des oies en Russie. . . . . [25], 1044
SCHMOURLO (S.). — Au sujet de la Dengue au Soudan . [21], 577
SCHNEIDER (J.-E.-J.). — A propos de la dysenterie amibienne . . . . . [1], 77
—. La lutte antipaludique en Tunisie (Discussion) . . [1], 389
—. Existence de la « Fièvre des Tiques » en Abyssinie. Quelques mots sur la biologie de l'*Ornithodorus moubata*, Acarien qui détermine cette spirochétose (Discussion) . [1], 437
—. Bouton d'Orient (Discussion. . . . . [2], 94
—. Lèpre (Discussion) . . [2], 179
SCHNEIDER (G.). — Courbes thermiques dans la Dourine . . . . . [2], 213
—. La dyspnée tropicale (Discussion) . . . . . [2], 444
—. Ponction de la rate (Discussion) . . . . . [2], 445
—. La lèpre à Madagascar (Discussion) . . . . . [3], 261
SCHOKHOR (N.-J.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Recherches faites au Turkestan : I. Répartition de la leishmaniose canine. . . . . [7], 185
— et —. II. Leishmaniose cutanée spontanée du chien. [7], 186
— et —. III. Les trypanosomiases des chameaux et des ânes. . . . . [7], 187

— et —. IV. Les Microfilaires des animaux domestiques . . . . . [7], 188
—, Kohl-Yakimoff (Nina) et Yakimoff (W.-L.). — Leishmaniose canine à Taschkent. . . . . [6], 432
—, — et —. Le Trypanosome des bovidés au Turkestan . . . . . [6], 434
—, Koselkine (P.-M.), Winogradoff (W.-W.), Demidoff (A.-P.) et Yakimoff (W.-L.). — La microfilariose des chevaux au Turkestan . . . . . [7], 189
—, — et Yakimoff (W.-L.). — Spirochétose des poules au Turkestan russe . . . [9], 227
—, —, — et coll. — Microfilaire des bovidés au Turkestan russe . . . . . [10], 104
— et —. A propos du *Trypanosoma theileri* au Turkestan russe . . . . . [9], 229
— et —. *Leucocytogregarina musculi* A. Porter à Pétrograd . . . . . [10], 100
— et —. Microfilaires des grenouilles au Turkestan russe . . . . . [10], 105
— et —. Leucocytogrégarine des chiens au Turkestan russe . . . . . [10], 293
—, — et coll. — Microfilaires des chiens au Turkestan russe . . . . . [10], 102
Schourenkova (A.-I.) et Demina (N.-A.). — Sur les relations entre l'*Enteromonas* da Fonseca 1915 et le *Tricercomonas intestinalis* Wenyon et O'Connor, 1917. . . . . [22], 645
— et Lissovsky (L.-L.). — Contribution à la question de la culture des *Trichomonas* . . . . . [21], 651
— et Nossina (V.). — La culture de *Balantidium coli* Malm. d'origine humaine . . [23], 780
Schwetz (J.). — La maladie du sommeil dans le Nord-Katanga (Congo belge) en 1913-1918. . . . . [12], 671
—. L'identité des conditions géobotaniques des gîtes à pupes de la *Gl. palpalis*, de la *Gl. fusca*, de la *Gl. brevipalpis*, de la *Gl. pallidipes* et de la *Gl. morsitans* (Congo belge) (Note préliminaire) . . . . [12], 234
—. A propos du diagnostic le plus expéditif de la maladie du sommeil dans la pratique ambulatoire de la brousse. [12], 726
—. La maladie du sommeil dans le Moyen-Kwilu (district du Kwango, Congo belge) en 1918 . . . . . [12], 798
—. La lutte contre la maladie du sommeil dans les districts du Kwango et du Kasaï (Congo belge), en 1920-1923 . . [17], 76
—. La limite actuelle de la *Gl. morsitans* autour d'Elisabethville (Katanga) avec quelques considérations sur les causes du recul progressif de cette mouche . . . . . [20], 78
—. Contribution à l'étude des moustiques d'Elisabethville et de quelques autres localités du Katanga (Congo belge) . [20], 170
—. Contribution à une future étude sur la tuberculose au Congo . . . . . [23], 283
—. A propos des *Grahamella* et des *Bartonella* des rats splénectomisés de Stanleyville . . . . . [23], 914
—. Sur quelques Diptères hématophages du Congo . . [23], 987
—. La présence de pupes de *Glossina palpalis* à 1.500 mètres de l'eau . . . . [15], 23
— et Cabu (F.). — Note préliminaire sur les *Grahamella* et *Bartonella* des rats splénectomisés de Stanleyville (Congo belge) . . . . . [23], 464
—, — et Baumann (H.). — Note sur la cuti-réaction à la tuberculine chez les jeunes Noirs de l'âge scolaire à Stanleyville (Congo belge) . . . . [23], 279
— et Collart (A.). — Notes protozoologiques. Spirochètes sanguicoles chez *Cobus vardoni* et *Gonderia mutans*, chez *Cobus ellipsyprimnus* et chez *Ourebia hastata* . . . [22], 651
— et Fornara (L.). — Y a-t-il des formes d'évolution des Trypanosomes chez l'hôte vertébré ? . . . . . [22], 862
— et Geerinck (Mlle). — Sur quelques parasites sanguicoles des Rongeurs de Stanleyville (Congo belge) . . . . [22], 657
—. Peel et Droeshaut (Mlles) et Baumann (H.). — Sur l'infection malarienne trouvée chez les enfants d'Angumu (district de Stanleyville, Congo belge) . . . . . [25], 883
—, —, — et —. Sur la trypanosomiase virulente du porc . . . . . [25], 906
—, —, — et —. Le « mystère » de la fièvre quarte et de la tierce bénigne en Afrique Equatoriale et Centrale . . . . . [25], 1062
— et Storck (N.). — *Theileria* (*Gonderia*) *mutans* et corps bleus de Koch . . . . [23], 377
Scordo (F.) et Rizzuti (G.). — Recherches bactériologiques et

séro-diagnostiques à propos du typhus exanthématique . . . . . [5], 778

Scott (W.-M.). — Persistance des Trypanosomes du Nagana dans la circulation pendant le choc anaphylactique. . [4], 671

Sebenzow et Adova. — Biologie et constitution physico-chimique des tourbières et conditions qui y règlent le stationnement des larves d'Anophèles . . . . . [20], 811

— et —. La réaction actuelle du milieu dans l'écologie d'*Anopheles maculipennis* Mg . . . . . [22], 384

—. Nikitinsky et Adova. — Biologie et constitution physico-chimique des tourbières et conditions qui y règlent le stationnement des larves d'Anophèles . . . . . [20], 192

—, — et —. *Id.* (*Suite*) . [20], 271

Sédad et Akil Moukhtar. — Sur l'existence de l'ankylostomiase en Turquie . . . . . [18], 265

Séguin (T.). — Du traitement du paludisme, maladie essentiellement curable . . . . [14], 199

—. Du traitement du paludisme, maladie essentiellement curable (Deuxième communication) . . . . . [15], 23

—. Du traitement du paludisme, maladie essentiellement curable (Troisième communication) . . . . . [17], 660

—. A propos du traitement du paludisme. . . . . [17], 874

—. Note sur la prophylaxie quinique du paludisme . . [18], 153

—. Du traitement du paludisme, maladie essentiellement curable (Quatrième communication) . . . . . [19], 26

Séguinaud (J.) et Leger (M.). — Fièvre de pappataci en Corse. . . . . [5], 710

Séguy (E.). — Note sur la détermination de nos Culicides indigènes . . . . . [14], 179

—. L'*Aedes jugorum* Will. et les larves de moustiques à branchies très développées . [15], 28

—. Étude sur quelques Muscidés exotiques à larves parasites . . . . . [18], 732

Seidelin (H.). — Photographies et préparations de *Paraplasma flavigenum* (Présentation) . . . . . [8], 562

—. Au sujet des comprimés de quinine . . . . . [15], 686

Seizo Katsunuma. — Présence de *Trichomonas vaginalis* dans l'urine d'un jeune garçon . . . . . [17], 216

Sellards (A.-W.). — La lutte contre la fièvre jaune . [21], 70

Sénevet (G.). — Sur la fréquence de la leishmaniose canine à Alger et ses variations saisonnières. . . . . [5], 89

—. Note sur un procédé de coloration de l'Hématozoaire du paludisme . . . . . [10], 540

—. Contribution à l'étude des Ixodes . . . . . [13], 147

—. Note sur quelques Ixodes parasites des animaux domestiques recueillis à Mytilène de février à juin 1916 . . [13], 260

—. Un test pratique en parasitologie clinique . . . [24], 284

— et Abrami (P.). — A propos des gamètes du *Plasmodium præcox* . . . . . [13], 167

— et —. Paludisme et novarsénobenzol. . . . . [13], 264

— et Champagne (R.). — Troisième cas algérien de distomatose humaine à *Fasciola hepatica*. Bons effets du stovarsol. . . . . [21], 222

— et Ebert (G.). — Contribution à l'étude des myiases nord-africaines. Deux cas de myiase cutanée dus à des Sarcophaginés . . . . . [16], 413

— et Lapin (J.). — La réaction de Weil-Felix dans le typhus exanthématique. Faible pouvoir agglutinant du liquide céphalo-rachidien . . [12], 592

— et Martial (R.). — Présence à Fez d'*Ornithodorus Tajale* (Guérin-Méville, 1849). Action pathogène sur l'homme . . . . . [14], 24

— et Prunnelle (M.). — A propos de la larve de *Culex hortensis*. . . . . [20], 419

— et Rossi (P.). — *Ixodes ricinus*. Tique des régions froides ou tempérées . . . . [19], 558

— et Sergent (Ed. et Et.). — Présence d'*Hæmogr. canis* en Algérie . . . . . [5], 781

—, — et Lemaire (G.). — Insecte transmetteur et réservoir du virus du Clou de Biskra . . . . . [7], 577

— et Trenz (A.). — A propos de l'*Aedes mariæ* (Sergent, 1903) . . . . . [25], 702

— et Vialatte (Ch.). — A propos d'*Ornithodorus marocanus*, Velu, 1919 . . . [14], 331

— et Witas (P.). — Évolution spontanée de l'infection à *Hæmoproteus columbæ*, chez un pigeon isolé à partir du premier mois de son existence . . . . . [15], 787

Sergent (Edmond). — La fièvre

méditerranéenne en Algérie. Note préliminaire. . . [1], 18
—. Destruction des Moustiques par le procédé des trous-pièges (Discussion) . . . [1], 103
—. Un cas de réveil d'infection à Hémocytozoaires chez un singe . . . . . [1], 187
—. La quinisation en Algérie. . . . . [1], 534
—. Index paludéen (Discussion) . . . . . [2], 38
—. Le Bouton d'Orient à Alger (Discussion). . . . . [2], 390
—. Campagne antipaludique de 1908 . . . . . [3], 6
—. Première note sur les Phlébotomes algériens . . [7], 660
—. Infections expérimentales de la souris par des cultures de la *Leishmania tropica* . . [8], 22
—. Hypothèse émise en 1821 sur la nature infectieuse de la fièvre jaune et sur sa transmission par les insectes . [8], 467
—. A propos des macules des globules rouges dans la tierce maligne . . . . . [11], 366
—. Au sujet de l'expression « paludisme de première invasion » . . . . . [15], 292
—. De l'association des différentes piroplasmoses entre elles, à propos du prétendu *Piroplasma annulatum* Dschunkowsky et Luhs, 1904 . [16], 23
—. Esquisse de l'organisation d'une campagne antipaludique . . . . . [18], 300
—. La Bilharziose au Portugal (Discussion). . . . . [20], 350
—. De la prémunition. . [22], 887
— et Beguet (M.). — Anaplasmose chez les bœufs d'Algérie . . . . . [6], 573
—, Belleval (G.) et Lhéritier. — Sur le *Tryp. marocanum*, n. sp., agent d'une épizootie équine à Casablanca en 1911. . . . . [8], 433
—, Boquet (A.) et Lhéritier (A.). — Étude sur les piroplasmoses en Algérie. Essai de traitement par le trypanbleu . . . . . [6], 618
—, — et —. Études sur les piroplasmoses en Algérie. Infection par les Piroplasmes de bovins arrivant de France en Algérie pendant l'hiver . . . [7], 699
—, Borifs (L.) et Nègre (L.). — Épidémie de fièvre ondulante à Arzew et Saint-Leu (département d'Oran) en 1915. . . . . [9], 351
— et Deguillaume (A.). — Tableau généalogique d'un Trypanosome du dromadaire conservé quatre ans par passage sur cobayes. Augmentation de sa virulence. . . . . [15], 947
—, Denarnaud (P.), Lhéritier (A.) et Boquet (H.). — Épizootie de peste porcine avec présence de *Salmonella* à Alger. Transmission expérimentale par virus filtré. . . . [5], 781
— et Donatien. — Infection expérimentale des dromadaires par le *Trypanosoma berberum* du Débab. . . . . [13], 521
—, — et Lhéritier (A.). — Des étalons guéris cliniquement de Dourine peuvent rester des porteurs sains de germes pathogènes . . . . . [13], 515
—, — et Parrot (L.). — Une question de terminologie : *Immuniser* et *Prémunir* [17], 37
—, —, — et Lestoquard (F.). — Prémunition et protozooses sanguines . . . . . [19], 532
—, —, — et —. Tiques et piroplasmoses bovines d'Algérie. *Première note* . . . . [21], 846
—, —, — et —. Sur l'existence de corps en grenade dans le cycle évolutif de *Gonderia mutans*. . . . . [22], 542
—, —, — et —. Transmission héréditaire de *Piroplasma bigeminum* chez *Rhipicephalus bursa*. Persistance du parasite chez les tiques nourries sur des chevaux . . . . [24], 195
—, —, — et —. Le traitement de la babésiellose bovine à *Babesiella berbera* par l'ichtargan. . . . . [24], 939
—, —, —, —, Plantureux (Edm.) et Rougebieff (H.). — Inoculation au mouton de l'Anaplasme du bœuf . . . [17], 295
—, —, Plantureux (E.) et Deguillaume (A.). — Notes sur les trypanosomiases (1921-1923) . . . . . [17], 130
— et Espérandieu. — Études sur les piroplasmoses et les jaunisses en Algérie . . [13], 779
— et Foley. — Fièvre récurrente du Sud-Oranais et *Pediculus vestimenti* . . . . . [1], 174
— et —. Existence de *Filaria perstans* chez un indigène de l'Afrique du Nord . . [1], 472
— et —. Exploration scientifique dans les vallées de l'extrême Sud-Oranais . . . [3], 471
— et —. Exploration scientifique du Sahara constantinois. . . . . [7], 416
— et —. Destruction par l'essence d'Eucalyptus des poux de corps ; agents transmetteurs de la fièvre récurrente

et du typhus exanthématique . . . . . [8], 378
— et —. Fièvre récurrente à ictère. . . . . [14], 632
—, — et MESLIN (R.). — Le trachome dans les régions sahariennes. Immunité relative des races nègres . . . . [6], 634
—, — et NÈGRE (L.). — Le rôle des bacilles pseudo-dysentériques dans les affections intestinales en Algérie . . [9], 204
— et GILLOT (V.). — Traitement de la spirillose nord-africaine et sa transmission par les poux . . . . . [4], 440
—, ISMERT (R.) et LHÉRITIER (A.). — Piroplasmose en Algérie. . . . . [6], 371
— et LHÉRITIER (A.). — Études sur les piroplasmoses en Algérie. Infection piroplasmique intense chez les bovidés sans symptômes morbides . [6], 622
— et —. Longue incubation ou latence d'infections à Trypanosomes chez des chiens inoculés avec des virus provenant de chèvres . . . . . [8], 653
— et —. Gale du dromadaire (Première note) . . . [12], 94
—, — et LEMAIRE (G.). — Leishmaniose du chien en Algérie. . . . . [6], 579
—, — et —. Spécificité de la kératite observée chez les chiens atteints de leishmaniose naturelle. . . . [7], 193
— et PARROT (L.). — Sur la répartition géographique de l'*Ornithodorus marocanus* Velu, en Algérie . . . . [22], 436
— et —. Sur l'existence de *Phlebotomus papatasi* (Scop.) et de *Phlebotomus minutus* Rondani, en rase campagne. . . . . [22], 344
—, — et HILBERT (D.-N.). — Morphologie de Piroplasmes observés en Algérie chez le mouton (*Gonderia ovis*) . . . . . [15], 789
— et POUJOL (Jean). — L'infection tuberculeuse chez les indigènes de la région d'Ain-Bessem (Tell Algérois) . [8], 230
— et RAYNAUD (L.). — Multiplication intraganglionnaire d'un staphylocoque dans un cas rapidement mortel rappelant le bubon climatique. . [11], 137
— et ROIG (G.). — Sur l'existence de l'agalaxie contagieuse des chèvres en Algérie, et sur une infection surajoutée . . . . . [10], 575
SERGENT (Edm. et Et.). — A propos des « corps en demi-lune » et des « corps en pessaire » . . . . . [1], 251
—. Kala-azar. Existence de leishmaniose chez les chiens d'Alger . . . . . [3], 510
—. Présence de Trypanosomes sur les bovidés en Algérie. . . . . [4], 40
—. La « Tamné », myiase humaine des montagnes sahariennes Touareg, due à *Œstrus ovis* . . . . . [6], 487
—. Expérience de lutte antiophtalmique en milieu indigène algérien (1914) . . [10], 486
—. Disparition de la virulence de *Plasmodium relictum* chez le moustique après plusieurs mois d'hibernation . . [11], 281
—. Deuxième campagne antiophtalmique en milieu indigène algérien (1917) . . [11], 304
—. La prophylaxie antipaludique d'une armée en campagne (Armée d'Orient, 1917). [11], 641
—. Étude expérimentale du paludisme. Paludisme chez les oiseaux . . . . . [14], 72
—. Quininisation préventive (Discussion). . . . . [18], 7
—, BÉGUET (M.) et LHÉRITIER (A.). — Comparaison entre le *Trypanosoma soudanense* et le *Tryp. berberum* . . . [8], 650
—, BÉGUET (M.) et PLANTIER (H.). — Observations microscopiques au cours d'un accès pernicieux paludéen . . . [6], 615
—, BRÉGEAT, NÈGRE (L.) et VIVIEN. — Notes bactériologiques relevées pendant l'épidémie cholérique en 1911 en Oranie . . . . . [3], 790
— et CATANEI (A.). — Étude expérimentale comparée des *Plasmodium relictum* et *rouxi* du moineau du Vieux Continent et du *Pl. cathemerium* du moineau du Nouveau Continent. . . . . [24], 327
— et DONATIEN (A.). — Deuxième note sur l'hérédité de l'infection et de l'immunité dans la trypanosomiase des dromadaires . . . . . [13], 525
— et LEDOUX. — Le Débab dans la région de Zousfana (Sud-Oranais) . . . . . [1], 25
—, LEMAIRE (G.) et SÉNEVET (G.). — Insecte transmetteur et réservoir du clou de Biskra. . . . . [7], 277
— et LHÉRITIER (A.). — Étude comparative du Débab et de quelques autres trypanosomiases . . . . . [5], 274
— et —. Dromadaires immuni-

sés contre la trypanosomiase « Débab » . . . . . [12], 86
— et —. Fièvre bilieuse hémoglobinurique du bœuf d'Algérie, maladie distincte des piroplasmoses . . . . [12], 108
— et —. Passage de Trypanosomes de la mère au fœtus dans le « Débab » . . [12], 177
—, — et FOLEY (H.). — De la mortalité dans le Débab, trypanosomiase des dromadaires. . . . . [11], 568
—, — et LEMAIRE (G.). — Transmission de la leishmaniose canine par la puce . . [5], 595
—, LOMBARD, et QUILICHINI. — La leishmaniose à Alger. Infection d'un enfant, d'un chien et d'un chat dans la même habitation . . . . . [5], 93
— et MOUZON (DE). — 4e observation algérienne de Kala-azar . . . . . [9], 694
— et PARROT (L.). — Sur une hémogrégarine de l'homme observée en Corse . . . [15], 193
—, — et DONATIEN (A.). — Le paludisme en Corse. Étude épidémiologique . . . . [14], 685
—, — et FOLEY (H.). — L'armature maxillaire des *Anopheles maculipennis* en pays paludéen. . . . . [15], 29
— et SÉNEVET (G.). — Présence d'*Hæmogr. canis* en Algérie . . . . . [5], 781
SERGENT (Et.). — L'acariose due à *Pediculoides ventricosus* en Algérie . . . . . [3], 39
—. Distribution géographique du goitre endémique en Algérie . . . . . [5], 112
—. A propos de la distribution géographique du goitre en Algérie . . . . . [9], 344
—. Assainissement antipaludique et amélioration agricole simultanés et rapides d'une région infectée par un ancien lit de rivière (Oued Djer, Algérie) (avec la pl. XIII). [9], 504
—. Sur des formes sans pigment ou à pigment très fin apparues chez le *Proteosoma* (*Plasmodium relictum* Grassi et Feletti) au cours de passages par canaris. . . . . [10], 448
—. Les enseignements d'une année d'épidémie foudroyante de paludisme dans le Mitidja (Algérie) . . . . . [10], 548
—. Sur le Leucocytozoon de la perdrix rouge d'Algérie (*Perdrix rubra* Brisson) . . [10], 701
—. A propos du *Pyretophorus chaudoyei* . . . . . [12], 182
—. Influence du froid sur le développement du *Plasmodium relictum* chez le moustique . . . . . [12], 174
—. Le *Plasmodium relictum*, agent pathogène du paludisme des oiseaux, ne donne pas une maladie mortelle au moustique transmetteur. . . [12], 601
—. Dans le paludisme des oiseaux (dû au *Protéosoma*), il n'y a pas de parallélisme entre l'infection sanguine de l'oiseau et l'infection consécutive du moustique contaminé par l'oiseau. . . [12], 603
—. Les épidémies de paludisme et la météorologie en Algérie. . . . . [25], 133
—, BÉGUET (M.) et MUSSO (L.). — Troisième campagne contre les Acridiens (*Schistocerca peregrina* Ol.) en Algérie au moyen du *Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle. . . . . [8], 634
— et BERGEVIN (E. DE). — A propos de l'hypothèse de la transmission du goitre endémique par un insecte piqueur . . . . . [9], 345
— et CATANEI (A.). — Sur l'action de la quinine, de la cinchonidine et de la cinchonine données à de faibles doses quotidiennes aux indigènes paludéens en Algérie . . . [19], 185
— et —. Influence de la température extérieure sur l'évolution du *Plasmodium relictum* chez l'oiseau . . [25], 416
—, —, GUÉDON (E.) et BOUGUET (A.). — Existence de la leishmaniose cutanée chez le chien dans une localité du Tell algérien où le Bouton d'Orient est endémique chez l'homme . . . . . [17], 360
—, FOLEY (H.) et CATANEI (A.). — Au sujet de l'élimination de la quinine absorbée sous forme de comprimés dragéifiés . . . . . [16], 21
— et HEMPL (Miss H.). — Sur l'immunité dans le paludisme des oiseaux (*Proteosoma vel Plasmodium relictum* Grassi Feletti) . . . . . [10], 550
— et MOUZON (DE). — Ankylostomiase endémique dans une localité d'Algérie . . . [3], 449
SICÉ (A.). — Notes résumées sur l'évolution, le pronostic, le traitement de la trypanosomiase chez les indigènes du Gabon. . . . . [17], 179
—. Considérations sur l'évolution de la peste dans la province de Fort-Dauphin (Mada-

gascar Méridional) de 1924-1926. . . . . [20], 106
—. Notes sur la lymphangite endémique dans le Sud de Madagascar . . . . . [20], 122
—. Le parasitisme intestinal dans le Sud de Madagascar . . . . . [20], 464
—. Alternance de l'infection sanguine chez quelques trypanosomés. . . . . [22], 666
—. Recherches sur le pouvoir floculant du sérum des trypanosomés . . . . . [22], 942
—. Contribution à l'étude de l'évolution de la trypanosomiase humaine. Renseignements fournis par la rachicentèse . . . . . [22], 962
—. Cinq ans et demi de pratique de la ponction lombaire appliquée à la trypanosomiase humaine. . . . . [23], 23
—. La rachicentèse dans la trypanosomiase humaine. Ses indications, sa valeur . . . . . [23], 77, 222, 307
—. Recherches sur le pouvoir floculant du sérum des trypanosomés . . . . . [23], 439
—. La rachicentèse dans la trypanosomiase humaine. A propos de la note de A. Dubois. . . . . [23], 582
—. Chlororachie et glycorachie dans la trypanosomiase humaine. . . . . [23], 640
—. Remarques sur les conceptions actuelles du traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [23], 721
—. A propos de la « cure-standard » appliquée en Afrique Équatoriale Française, aux trypanosomés (Discussion) . . . . . [23], 920
—. L'Institut Pasteur de Brazzaville et la trypanosomiase humaine. . . . . [24], 8
—. Considérations sur le traitement de la syphilis chez les Indigènes de nos colonies (Discussion). . . . . [24], 439
—. Résultats éloignés du traitement de la trypanosomiase humaine à forme méningée par la tryparsamide (Discussion) . . . . . [24], 530
—. A propos de quelques échecs de l'action trypanocide des composés arsenicaux . [24], 660
— et Boisseau (R.). — Quelques résultats obtenus avec la technique nouvelle de dosage des albumines rachidiennes [22], 679
— et —. Note sur une épizootie de typhose aviaire à Brazzaville . . . . . [23], 353
— et —. Notes sur la dysenterie bacillaire en Afrique Equatoriale Française. Bacilles dysentériques. Bacilles pseudo-dysentériques . . . . [23], 385
—. Contribution à l'étude de la rage canine (virus des rues) en Afrique Equatoriale Française . . . . . [23], 703
—. Trypanosomiase humaine associée à différentes infections . . . . . [23], 1011
— et —. Infection à paratyphique A présentée par un nourrisson à Brazzaville . . [24], 518
—, —, Provost (J.) et Daniel. — Le quotient albumineux du sérum chez quelques trypanosomés . . . . . [24], 181
— et Leger (M.). — Note complémentaire sur le début de l'évolution nerveuse de la trypanosomiase humaine . . . . . [24], 828
— et —. Considérations sur les modifications pathologiques tardives du liquide céphalo-rachidien dans la trypanosomiase humaine . . . [25], 340
— et Malbrant (R.). — Nouveaux essais de préservation des bovidés contre les Trypanosomes par le 309 Fourneau. . . . . [22], 776
— et Vaucel (M.). — Étude des gîtes à larves de moustiques à Brazzaville. Présence du *Stegomyia fasciata* . . [21], 768
Silva Araujo (Oscar da). — Le Pian au Brésil. . . . [21], 387
Silva et Utra (O. d'). — Quelques caractères des leishmanioses tégumentaires brésiliennes . . . . . [21], 846
Simon. — Parasites intestinaux du Cambodge . . . . [18], 61
—. Lèpre et réaction de Wassermann . . . . . [18], 378
Simond (P.-L.). — Lèpre de recrues coloniales (Discussion) . . . . . [9], 687
—, Aubert, Blanchard et Arlo. — La fièvre de Malte à Marseille . . . . . [2], 364
—, — et Noc (A.). — Filariose à la Martinique . . . [2], 319
— et Pasteur Vallery-Radot avec la collaboration de Kiamil Bey et Asseo (Raphaël). — Notes sur le choléra à Constantinople et en Thrace, de 1910 à 1913 . . . . [7], 313
Simonin. — Pratiques chirurgicales des Canaques des îles Loyalty (Discussion). . [1], 589
—. Un cas de diarrhée de Cochinchine guéri par le radia-

teur photothermique de Miramond de la Roquette . [4], 135
SKRJABIN (Prof. K. J.). — La stéphanurose des porcs et son agent . . . . . [14], 47
SLATINEANO (A.) et CIUCA (M.). — Recherches sur les vibrions isolés dans la récente épidémie de choléra en Roumanie. . . . . [5], 265
SMILLIE (Wilson G.). — The prevalence of *Leptospira icterohemorragica* in the wild rats of São Paulo, Brazil . . [13], 561
SMORODINZEW (I.-A.) et ADOVA (A.-N.). — Le rôle du calcium dans l'écologie des larves d'Anophèles. . . . . [23], 34
— et —. Sur le rôle de la réaction du milieu dans l'écologie des larves d'*Anopheles maculipennis* . . . . . [23], 38
SOLOWZOFF (A.-S.) et YAKIMOFF (W.-L.). — Le *Chilomastix mesnili* Wenyon en Russie. . . . . [14], 356
— et —. *Monas* sp. dans les selles de l'homme . . [14], 537
— et —. Traitement de la fièvre récurrente par le Luargol de Danysz . . . . . [14], 633
— et —. Un cas de lambliose guéri par le Luargol. . [14], 652
— et —. Essais de traitement de la fièvre récurrente par l'émétique . . . . . [16], 303
—, — et WASSILIEWSKY (Mlle W.-L.). — *Oicomonas granulata* n. sp., parasite de l'intestin de l'homme. . . . . [14], 846
SOREL. — Cas de myiase intestinale simulant une maladie typhoïde . . . . . [1], 374
—. Notes sur une épidémie de Béribéri à la Côte d'Ivoire. . . . . [3], 742
—. L'hygiène à Grand-Bassam . . . . . [3], 785
—. Les voies de propagation de la fièvre jaune. . . . [4], 103
—. Le paludisme à la Côte d'Ivoire . . . . . [4], 108
—. Parasites intestinaux chez les indigènes de la Côte d'Ivoire . . . . . [4], 117
—. Absence d'éosinophilie dans un cas de *Filaria loa* . [4], 203
—. L'hygiène à la Côte d'Ivoire en 1911 . . . . . [5], 150
—. Recherche du bacille de Hansen dans les ganglions de personnes saines vivant dans l'entourage des lépreux . . . . . [5], 698
—. Tuberculose et alcoolisme à la Côte d'Ivoire . . . [5], 855
—. L'hygiène à Bassam en 1912 . . . . . [6], 645
—. Relation d'un voyage de Dabola à Kankan-Kissidougou. Rives du Milo et du Niger et région de Dalaba (Fouta-Djallon). . . . . [16], 496
—. Quininisation préventive (Discussion). . . . . [18], 13
—. Épidémie de fièvre jaune à Dakar en 1927. . . . [21], 503
—. La fièvre jaune chez les indigènes à Dakar en 1927 . [21], 509
—. L'œuvre sanitaire de la Circonscription de Dakar et Dépendances pour la protection de la santé publique (1927-1928) . . . . . [22], 368
— et ARMSTRONG. — Désinfection des immeubles de Dakar à la suite de l'épidémie de fièvre jaune de 1927 . . . . [21], 808
SORIA (P.). — Note sur le traitement de l'hématurie dans la bilharziose . . . . . [7], 722
SOUCHARD (L.), MARNEFFE (H.) et LIROU. — Étude expérimentale d'un virus exanthématique isolé d'un cas de typhus, présentant la symptomatologie de la fièvre fluviale du Japon . . . . . [24], 678
—, MARTIN et LETONTURIER. — Un nouveau cas de mélioïde observé en Cochinchine . . . . . [23], 273
— et VIELLE (E.). — Sur un cas de typhus exanthématique observé en Cochinchine . . . . . [24], 32
— et VITTOZ (R.). — Bacille tuberculeux bovin en Cochinchine. . . . . [25], 1026
SOULIÉ (H.). — Lutte antipaludique en Algérie . . . [2], 162
—. Sixième cas de Kala-azar en Algérie . . . . . [17], 778
— et DERRIEU (G.). — Parasitisme intestinal des enfants des écoles maternelles d'Algérie. Détermination d'un indice parasitaire. Application de cet indice à la mesure de la pureté des eaux de boisson . . . . . [9], 795
SOULLIER et BABLET (J.). — Sur deux cas de cancer primitif du poumon observés au Tonkin. . . . . [25], 85
SPAGNUOLO (V.), RUSSO (C.) et CASTELLANI (A.). — Quelques observations sur le *Spirobacillus zeylanicus* Cast. . . [11], 271
SPENCER. — Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dans l'Inde. . . . . [1], 548
SPLENDORE (A.). — Sur un nouveau Protozoaire parasite du lapin, 2e note . . . . [2], 462

—. Trypanosomes de poissons brésiliens. . . . . [3], 521
—. Zymomematosi con loccalizazione nella cavita della bocca, osservata in Brasile (Avec résumé français). . . . [5], 411
—. Des formes flagellées et des gamètes dans le *Toxoplasma cuniculi* . . . . . [6], 318
Stanesco et Levaditi (C.). — Immunisation des Spirilles par action des anticorps *in vitro*. . . . . [3], 333
Staub (A.). — Au sujet de l'intradermo-vaccination contre le charbon bactéridien en milieu profondément infecté (A propos de la communication de M. Velu) . . . . . [18], 16
Stefani, Bablet (J.) et Mesnard. — Note sur un cas d'abcès amibien du poumon gauche . . . . . [19], 884
—, Le Meillour et Mesnard. — Un cas d'affection pulmonaire subaiguë simulant la tuberculose guéri par la quinine. . . . . [20], 113
Stefanopoulo (G.). — Sur les rapports étiologiques de la Dengue et de la fièvre jaune. . . . . [22], 538
—. Sur le virus amaril d'origine murine inoculé à *Macacus rhesus* . . . . . [25], 866
— et S. Hosoya. — Recherches sur les Spirochètes ictérogènes. Les Spirochètes du « Akiyami » ou fièvre d'automne du Japon . . . . . [22], 923
Stefko (W.). — La filariose des oiseaux de la Russie Centrale. . . . . [6], 592
—. Piroplasmose et anaplasmose en Turquie (1916) . . [10], 723
—. Dengue à Trébizonde (Turquie) en 1916 . . . . [10], 724
—. Deux cas de bubon climatérique . . . . . [10], 724
— et Botchkaréff (P.-V.). — Sur quelques propriétés morphologiques du sang dans le paludisme . . . . . [17], 631
Stein (A.-R.) et Pawlowsky (E.-N.). — Des causes de l'apparition des taches bleues chez l'homme. . . . . [15], 558
— et —. Nouveau cas de *Creeping desease* (*Myiasis linearis*) et Russie . . . . [15], 555
— et —. Taches bleues et glandes salivaires du *Phtirius inguinalis* . . . . . [15], 826
— et —. Sur les causes de l'action des Insectes du genre *Pediculus* sur le derme de l'homme. . . . . [17], 143
Stévenel. — Les Cro-Cro de la région de Zinder et leur identification avec l'ulcère phagédénique des pays chauds et le Bouton d'Orient . . . [4], 180
—. Quelques observations et examens microbiologiques faits à Pointe-à-Pitre. . . . [6], 356
—. Présence à la Martinique d'ulcérations de la peau dues à *Leishmania americana* . . . . . [10], 379
—. Essais de traitement de la lèpre par des *injections intraveineuses* d'émulsion d'huile de Chaulmoogra . . . [10], 684
—. Le traitement de la lèpre par injections intraveineuses et par ingestion d'émulsions d'huile de Chaulmoogra . . . [13], 490
—. Contribution à l'étude des pyomyosites observées à la Côte d'Ivoire. Action thérapeutique de l'Iodure de Potassium . . . . . [16], 710
—. Spirochétose ressemblant cliniquement à la fièvre jaune observée dans la Haute-Côte d'Ivoire . . . . . [16], 238
—. Note préliminaire sur la découverte d'un principe actif dans l'huile de Chaulmoogra. . . . . [17], 108
—. Essais de traitement des parasitoses intestinales par le tétrachlorure de carbone en capsules (Recherches faites dans un bataillon d'Indochinois) . . . . . [18], 460
—. Le principe actif de l'huile de Chaulmoogra . . . [22], 338
— et Noc (F.). — Présence à la Martinique de *Leptomonas davidi* Lafont . . . . . [4], 461
— et —. Masque léonin d'origine syphilitique . . . [5], 170
— et —. Filariose, lymphangite et éléphantiasis à la Martinique. . . . . [6], 708
—, — et Iman (T.). — Prophylaxie et traitement de la syphilis et du Pian à la Martinique par le 606 . . . [4], 563
Storck (N.) et Schwetz (J.). — *Theileria* (*Gonderia*) *mutans* et corps bleus de Koch. [23], 377
Strong (R.-P.) et Crowell (P.-C.). — The etiology of beriberi . . . . . [6], 195
Strurgess (G.-W.). — Le Surra existe à Ceylan . . . [5], 161
Styliapanopoulo (M.). — La spirochétose des poules en Grèce . . . . . [18], 701
Stylianopoulo et Ananiadès. — Contribution à l'étude des piroplasmoses en Grèce . [25], 889
—, Blanc (Georges) et Melanidi

(C.). — La variole des chèvres en Grèce . . . . . [20], 583
SUCTANCAR (Crisna). — Voir CRISNA SUCTANCAR.
SUDLEY (E.-W.). — Procédé simple de culture du bacille diphtérique et diagnostic rapide . . . . . [6], 303
—. Nouveau procédé de culture et de diagnostic bactériologique du tétanos . . . [6], 605
—. Filaire et Microfilaire chez le caméléon de Madagascar . . . . . [7], 70
—. La fièvre récurrente malgache. Origine. Mode de propagation. Extension. . . [9], 688
—. Épidémie de méningite cérébro-spinale à méningocoques (?) à Madagascar . . [10], 689
—. Index endémique du paludisme à Madagascar. Valeur de la formule leucocytaire dans l'évaluation de l'index, comparativement à la splénomégalie, l'hématozoaire et les mélanifères . . . . . [10], 915
—. Traitement des accès pernicieux par l'abcès thérébenthiné . . . . . [11], 179
—. Lèpre et maladies endémiques à Mohéli (Comores) . . . . . [11], 61
—. Évolution de la formule leucocytaire et altérations sanguines de la fièvre récurrente. . . . . [13], 63
—. Procédé simple de préparation d'un éosinate de bleu Borrel pour les colorations hématologiques . . . . . [13], 205
—. L'étiologie du Béribéri et ses rapports avec les vitamines. . . . . [15], 476
—. Le parasitisme intestinal au Gabon. . . . . [15], 574
—. Diagnostic *post-mortem* de la fièvre récurrente par la ponction hépatique . . [17], 475
—. Dysenterie amibienne spontanée chez le Chimpanzé (*Troglodytes niger*). . . . [17], 771
—. Infection double mixte par *Schistosomum mansoni* et *S. hæmatobium* chez un dysentérique amibien . . . . [18], 458
—. Du traitement du paludisme par la *Smalarina cremonese* . . . . . [19], 431
—. La fièvre jaune au Soudan (Toukoto, 1925) . . . [19], 604
—. Méthode de coloration rapide pour recherches hématologiques . . . . . [19], 723
—. La Dengue au Soudan [19], 881
SURCOUF (J.). — Tabanides d'Afrique. . . . . [2], 519
— et ARIAS (J.). — Note sur les Diptères piqueurs recueillis au Dahomey par M. PÉCAUD . . . . . [3], 559
— et —. Notes sur les Diptères piqueurs du Niger-Tchad . . . . . [3], 754
— et GEDOELTS (L.). — Description d'un Œstride nouveau parasite de l'hippopotame . . . . . [2], 615
— et —. Note sur les Diptères du genre *Stomoxys* en Abyssinie. . . . . [1], 195
SWAMINATH (G.-S.). — « Charlatans et pseudo-parasites ». Les « Vers des yeux ». . . [13], 261
SWELLENGREBEL (N.-H.). — Présence de Trypanosomes chez les bovidés en Hollande. [4], 536
—. Méthode de recherche de rares parasites du paludisme dans le sang périphérique. . . . . [13], 20
—. Fréquence saisonnière des Anophèles impaludés aux environs d'Amsterdam . . [15], 116
—. *Myzomyia ludlowi* Théob. parvient-elle à ressembler à *Myzomyia rossii* Giles quand elle vit en rapport intime avec cette dernière espèce ? . [15], 120
—. Considérations sur la prophylaxie du paludisme par la déviation des Anophèles . . . . . [18], 725
—. La signification du nombre relatif des mâles dans les abris des Anophèles adultes . [20], 121
— et ROOK (H.). — Effets comparés du « Vert de Paris » et de la paraffine liquide, comme larvicides. . . . . [20], 123
— et —. Effet comparé de quelques larvicides . . . . [21], 109
— et SCHIESS (J.-R.). — Quelques remarques sur la morphologie de l'*Entamœba histolytica* et la valeur diagnostique de l'injection rectale des chats . . . . . [10], 13
—, SWELLENGREBEL DE GRAAF (J.-M.-H.) et DE BUCK (A.). — Le paludisme aux Pays-Bas, contracté en automne, ne se manifeste que pendant l'été suivant . . . . . [22], 642
SWIRSKY (Mlle S.-A.), AFANASSIEFF (Mlle J.-A.), YAKIMOFF (W.-L.), KÉDRINSKY (A.-J.) et IWANOFF (Mlle P.-S.). — Le traitement de la babésiellose des bovidés par les sels d'argent. . [19], 887

T

TAILLANDIER (O.) et DESCHIENS (R.). — Présence de larves rhab-

ditoïdes de *Strongyloïdes stercoralis* (Bavay, 1877) dans le liquide duodénal recueilli par tubage (considérations cliniques sur l'anguillulose). [18], 525

TARASSÉVITCH (L.). — Expansion pandemique de la malaria en Russie . . . . . [16], 71

TASHIM-IBRAHIM. — Sur l'existence en Tripolitaine du Kala-azar et de la fièvre méditerranéenne . . . . . [3], 511

—. Existence de spirillose humaine à Tripoli de Barbarie . . . . . [4], 369

TEISSONNIÈRE (M.), BÉGUET (M.) et JOLLY (R.). — Remarques sur les hémocultures pratiquées au Laboratoire de Bactériologie de l'Armée d'Orient du mois de juin au mois de décembre 1917. . . . . [11], 154

—, — et —. Observation d'une épidémie de grippe à l'Armée d'Orient (mai-juin 1918) . . . . . [11], 738

TEJERA (Enrique). — La trypanosomose américaine ou maladie de Chagas au Vénézuéla [12], 509

—. La leishmaniose américaine au Vénézuéla . . . . [13], 238

—. Trypanosomiases animales au Vénézuéla. . . . . [13], 297

—. Un nouveau Flagellé de *Rhodnius prolixus*, *Trypanosoma* (ou *Crithidia*) *rangeli* n. sp. . . . . [13], 527

—. Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique [13], 338

— et LEGER (M.). — Contribution à l'étude de *Trypanosoma venezuelense*, Mesnil, 1910. . . . . [13], 376

— et PHISALIX (Mme M.). — Sur une hémogrégarine et ses kystes de multiplication chez un lézard iguanidé *Tropidurus torquatus*. . . . . [13], 783

TENDRON (E.). — Recherches sur l'élimination d'arsenic après injections sous-cutanées d'atoxyl par le dosage d'As dans les urines et les fèces . [2], 140

—. Recherches sur l'élimination de l'arsenic après injection sous-cutanée d'arsénophénylglycine . . . . . [2], 625

TEPPAZ (L.). — Un cas de rage du chien au Sénégal. . [3], 351

—. Essai de traitement de la lymphangite épizootique du Sénégal . . . . . [3], 430

—. Un nouveau cas de rage du chien au Sénégal . . . [13], 16

—. La tuberculose bovine à l'abattoir de Dakar . . [15], 356

—. La tuberculose bovine à l'abattoir de Dakar (2e note). . . . . [16], 381

—, LEGER (Marcel) et REMLINGER (P.). — Contribution à l'étude de la rage au Sénégal . [16], 4

—, THIROUX et WURTZ. — Sur la maladie du sommeil et les trypanosomiases animales à la Petite Côte et dans la région des Niayes au Sénégal . [1], 269

TERRIEN (É.) et BIZARD. — Cas de leishmaniose interne chez un adulte, contracté en France . . . . . [16], 89

THEILER (Sir Arnold). — The influence of cold on ticks and *Piroplasma parvum* . . [1], 451

—. Quelques observations concernant la transmission du *Piroplasma bigeminum* par les tiques. . . . . [2], 384

—. Sur l'existence de *Trypanosoma dimorphon* ou d'une espèce voisine au Mozambique ou au Zoulouland . . . . [2], 39

—. Sur un nouveau Trypanosome de l'Afrique du Sud . . . . . [2], 392

—. Transmission des Spirilles et des Piroplasmes par différentes espèces de tiques . . . [2], 293

—. *Anaplasma marginale*. Un nouveau Protozoaire du bétail. . . . . [3], 135

—. Un nouveau médicament pour le traitement des piroplasmoses. . . . . [23], 506

—. Sur la piroplasmose vraie du cheval et son traitement spécifique par une petite dose de trypanobleu (Discussion) . . . . . [25], 20

— et DU TOIT (J.-P.). — La transmission des maladies, dont les tiques sont les vecteurs, par injection intrajugulaire d'une émulsion de l'hôte intermédiaire . . . . . [19], 725

— et —. Theilériose sud-africaine expérimentale transmise par le sang . . . . . [21], 121

THÉZÉ (J.). — Un cas de fièvre récurrente à Madagascar . . . . . [4], 509

—. Pathologie de la Guyane (paludisme ; affections intestinales). . . . . [9], 376

—. Pathologie de la Guyane (lèpre, filariose, etc.) . . [9], 449

THIBOUT (A.), FLEURY (A.) et LHÉRITIER (A.). — Moutons algériens et bactéridie charbonneuse . . . . . [5], 336

THIEL (P.-H. VAN). — Voir VAN THIEL (P.-H.).

THIROUX (A.). — De l'absence fréquente de *Trypanosoma gambiense* dans le sang et les

ganglions des malades du sommeil à la troisième période. . . . . [2], 135
—. De la cause des attaques épileptoïdes que l'on observe lors des rechutes tardives chez les malades du sommeil traités par l'atoxyl seul ou associé à d'autres médicaments . [2], 314
—. De la conception et de la grossesse au cours de la trypanosomiase humaine . . [2], 51
—. De l'émétique d'aniline associé à l'atoxyl dans le traitement de la maladie du sommeil . . . . . [3], 194
—. De l'action de l'émétique d'aniline sur la filariose . . . . . [3], 202
—. Un petit foyer de maladie du sommeil à côté d'un gîte de *Gl. palpalis* dans le delta du fleuve Sénégal . . . . [3], 239
—. Sur l'examen des tirailleurs sénégalais envoyés en Algérie. . . . . [3], 409
—. De l'emploi au Sénégal du tannate de quinine en poudre pour la prophylaxie du paludisme chez les enfants . . . . . [3], 541
—. De la présence de *Cercopithecus patas pyrrhonotus* au Sénégal . . . . . [3], 453
—. Prophylaxie de la maladie du sommeil (Discussion) [3], 561
—. L'éducation des colons et des indigènes à la prophylaxie individuelle dans la maladie du sommeil . . . . . [3], 586
—. Hémogrégarine de *Trionyx triunguis*. . . . . [4], 522
—. *Halteridium* d'une mouette, *Larus cirrhocephalus* . [4], 524
—. Filaire d'une mouette, *L. cirrhocephalus* . . . . [4], 525
—. Les Filaires embryonnaires du sang des indigènes de l'Afrique Occidentale Française . . . . . [5], 438
—. Destruction des moustiques dans les locaux mal clos [5], 633
—. Le N'diank, choléra du Sénégal ; son agent pathogène. . . . . [5], 753
—. Grains rouges (Discussion) . . . . . [6], 293
—. Les formes de reproduction par schizogonie et sporogonie d'*Hæmogregarina pettiti*. . . . . [6], 327
—. Emétine (Discussion) . . . . . [6], 566
—. Le tabès chez les indigènes dans les colonies françaises . . . . . [16], 475
—. Sur un procédé destiné à empêcher l'infestation du sol par les larves d'Ankylostomes dans les pays chauds . . . [17], 303
—. Au sujet de la prophylaxie de la maladie du sommeil . . . . . [19], 701
—. Résultats très favorables du traitement par la gonacrine dans trois cas de complications blennorragiques (Discussion) . . . . . [21], 489
—. Les vaccinations contre la peste à Madagascar. Les résultats obtenus . . . . [22], 412
—. Quelques considérations sur le peu de densité de la population et sur la natalité des indigènes à Madagascar . . . . . [22], 444
—. Recherches sur les causes de l'existence de la peste pulmonaire dans les régions froides ou tempérées et de son absence dans les zones à température élevée, à Madagascar . [22], 704
—. Considérations sur l'épidémiologie du béribéri dans la province de Tanan en 1927 (Discussion). . . . . [22], 996
—. Les dangers de l'abus des arsénobenzènes dans les colonies françaises. . . . [24], 266
—. De divers types d'arséno-résistance dans les traitements actuels (A. E. F.) de la trypanosomiase humaine (Discussion) . . . . . [25], 279
—. Fautes d'alimentation par modification des habitudes des indigènes dans nos colonies . . . . . [25], 963
—. A propos de la communication de MM. Lauzeral et Millischer . . . . . [25], 1024
—, Aguessy (D.) et Ratsimamanga. — Sur l'existence de tuberculoses externes ou larvées chez les indigènes africains, et sur leur diagnostic par la résorcino-réaction de Vernes . . . . . [24], 793
— et d'Anfreville (L.). — De l'acné varioliforme ou *molluscum contagiosum* au Sénégal. . . . . [2], 434
— et —. De l'emploi du *Cercopithecus ruber* ou *patas* comme animal témoin dans la maladie du sommeil . . . . . [2], 129
— et —. De l'hypertrophie des ganglions dans la trypanosomiase humaine . . . [2], 397
— et —. Quelques considérations sur la thérapeutique dans la trypanosomiase humaine . . . . . [2], 51
— et —. L'émétique d'aniline dans la filariose . . . . [3], 546
— et Dufougeré (W.). — Per-

sistance de l'infection des méninges chez un singe guéri naturellement de spirillose. . . . . [3], 23
—- et —. De la contagion de la fièvre jaune bénigne . [3]. 65
— et —. Sur un cas de *Filaria loa*. . . . . [3], 309
— et Laveran. — Sur le traitement des trypanosomiases . . . . . [1], 28
— et —. Traitement de la trypanosomiase humaine . [1], 617
— et —. Prophylaxie de la maladie du sommeil. . . [6], 381
— et Pelletier (J.). — De la méningite aiguë dans la trypanosomiase humaine . . . [2], 400
— et —. Mycétome à grains rouges de la paroi thoracique . . . . . [5], 585
Thomas (W.). — Plaquettes de vulgarisation . . . . [3], 418
Thomson (D.-B.) et Balfour (A.). — Two cases of non ulcerating « Oriental sore » better termed Leishman nodules . . . . . [2], 628
Thoulon (L.). — Sur quelques accidents consécutifs à l'infestation filarienne observés au Gabon (1929-1931). . . [25], 234
Tichenko (O.-D.). — Emploi de préparations arsenicales dans la lutte contre les larves d'Anophélines . . . . [21], 655
Tisseuil (J.). — Du traitement de la lèpre par ionisation . . . . . [20], 57
—. Les parasites intestinaux en Nouvelle-Calédonie . . [21], 241
—. Prophylaxie de la lèpre en 1927 à l'Institut « Gaston Bourret » (Nouvelle-Calédonie) . . . . . [24], 288
—. La javellisation des eaux de la ville de Nouméa . . [21], 663
—. Les léproseries partielles en Nouvelle-Calédonie . . [22], 95
—. Index du parasitisme intestinal à Nouméa . . . . [22], 334
—. La lèpre aux îles de la Loyauté : Lifou . . . [22], 362
—. Forme familiale de la lèpre. . . . . [22], 631
—. Réaction chez l'homme du tissu cellulaire sous-cutané et du derme, au bacille lépreux tué par la chaleur . . [23], 20
—. Quel a été, à ce jour, l'avenir des guérisons cliniques de la lèpre, en Nouvelle-Calédonie . . . . . [23], 63
—. Sur l'origine de la lèpre en Nouvelle-Calédonie . . . [23], 357
—. Camouflage des symptômes de la lèpre par les indigènes. . . . . [23], 574
—. Sur un cas de lèpre ganglionnaire . . . . . [23], 692
—. Lèpre tuberculoïde primitive en Nouvelle-Calédonie . [23], 772
—. Splénomégalies subaiguës de la lèpre . . . . . [23], 941
—. Sur un cas de lèpre nodulaire à évolution tuberculoïde secondaire . . . . . [24], 17
—. Contribution à l'étude d'un test thermique de guérison clinique de la lèpre . . [24], 272
—. Au sujet d'un cas de léprides à forme d'érythème noueux . . . . . [24], 366
—. Stade tuberculoïde intermédiaire dans l'évolution d'un cas de lèpre . . . . [24], 453
—. De la diffusion du bacille lépreux dans un milieu à lèpre endémique . . . . . [24], 458
—. Contribution à l'étude des léprоïdes. Léprоïdes en aire. . . . . [24], 763
—. Contribution à l'étude de l'allergie et de l'anergie dans la lèpre . . . . . [24], 766
—. Contribution à l'étude des tuberculoïdes de la lèpre. Stade tuberculoïde inachevé . [24], 898
—. Observation d'un sujet réfractaire à la lèpre; mort du cancer. . . . . [25], 124
—. Syndrome paroxystique de rythme synchrome cardio-pulmonaire . . . . . [25], 964
—. Première série d'essais de traitement de la lèpre chez le rat . . . . . [25], 969
Todd (J.-L.). — A note on the occurrence of auto-agglutination of the red cells in human trypanosomiasis (avec résumé français) . . . [3], 438
—. Plague treated with anti-pest serum (avec résumé français) . . . . . [5], 459
—. Allocution de bienvenue du Président et réponse de —. . . . . [9], 121
—. Goitre en Gambie (Discussion) . . . . . [9], 167
—. The granules of *Spirochæta duttoni* . . . . . [12], 593
—. Tiques et spirochétoses dans le bassin du Congo . [12], 290
Theiler (A.) et Toit (J.-P. du). — La transmission des maladies, dont les tiques sont les vecteurs, par injection intrajugulaire d'une émulsion de l'hôte intermédiaire . . [19], 725
— et —. Theiériose sud-africaine expérimentale transmise par le sang . . . . . [21], 121
Tolstoff (Mme A.-N.), Rastégaïeff (Mlle E.-F.), Yakimoff (W.-L.) et Nikolsky (S.-N.). — L'ana-

plasmose des bovidés en Russie . . . . . [21], 642
Touin, Heckenroth (F.) et Nattan-Larrier. — Sur un cas de pian-bois de la Guyane. Ulcère à *Leishmania* de la Guyane. . . . . [2], 587
Toullec (F.). — A propos de la lambliose. . . . . [22], 163
—. Essai nosographique des fièvres typho-exanthématiques . . . . . [23], 152
—, Alain et Jolly. — Anémie pernicieuse paludéenne. [24], 912
— et Blanchard (M.). — Sur le traitement de la mélitococcie par la protéine de *Br. abortus* . . . . . [22], 150
—, Guyomarc'h et Alain. — Episode démentiel et gangrène symétrique des extrémités au cours d'une infestation palustre à *Plasmodium præcox* . . . . . [23], 307
— et Jolly. — Le dépistage de la tuberculose chez les Noirs par la séro-floculation à la résorcine . . . . . [25], 549
— et —. Note sur la tuberculose en Côte d'Ivoire . . . [25], 679
— et Riou (M.). — Le tubage duodénal dans les affections à *Clonorchis sinensis* . . . [24], 286
— et —. Le tubage duodénal dans les distomatoses hépatiques à *Clonorchis sinensis*. Essais thérapeutiques . [25], 147
Toumanoff (C.). — Quelques observations sur la durée d'évolution larvaire des Anophèles au Tonkin . . . . . [24], 923
—. Sur la présence d'une variété d'*Anopheles jeyporiensis* James au Tonkin et son rôle dans la transmission locale du paludisme . . . . . [24], 958
—. Sur les gîtes larvaires types des Anophèles au Tonkin . . . . . [25], 639
—. Contribution à l'étude de la faune anophélienne d'altitude au Tonkin . . . . . [25], 770
—. La transmission du paludisme au Tonkin en fonction de la physiographie des lieux. . . . . [25], 976
— et Farinaud (E.). — Note sur une prospection entomologique à Chapa. Présence de deux espèces anophéliennes jusqu'ici méconnues en Indochine : *T. Lindesaii* Giles et *A. gigas* var. *baileyi* Edw. . . . . [25], 245
— et Roubaud (E.). — Sur une race physiologique suractive du moustique commun, *Culex pipiens* L. . . . . [23], 196
— et —. Intoxication d'encombrement, chez les larves de *Culex* vivant en milieu non renouvelé . . . . . [23], 978
— et —. Essais d'infection expérimentale de larves de Culicides par quelques champignons entomophytes . . . [23], 1025
Tournaire (P.) et Petit (G.). — Sur la répartition des gîtes d'Anophèles dans l'arrondissement de Bergerac (Dordogne) . . . . . [12], 332
Tournier (Elie). — Note sur un cas de Kala-azar infantile observé au Gabon . . . [13], 175
—. Le traitement de l'ulcère phagédénique des pays chauds par des injections sous-cutanées de novarsénobenzol . . . . . [15], 926
—. Le traitement du Pian par les injections sous-cutanées de novarsénobenzol . . . [15], 489
—. Le traitement du Ver de Guinée par les sels d'antimoine. . . . . [15], 809
—. Un cas de tumeur à *Filaria volvulus* simulant un kyste synovial de la région du poignet, à Anécho (Togo) . [15], 499
—. De l'emploi du kermès dans le traitement de la lèpre. . . . . [17], 761
—. Le secteur de prophylaxie du paludisme de l'Itasy (Madagascar) . . . . . [18], 809
—. Les affections pulmonaires à Spirochètes de Madagascar . . . . . [19], 261
—. La peste dans la province d'Itasy . . . . . [19], 410
—. Sur la gravité de la peste pulmonaire à Madagascar . . . . . [19], 667
—. Remarques sur des cas de choléra observés au camp de l'arsenal de l'Est (Chine du Nord) . . . . . [21], 293
—. Le traitement de la lèpre par l'iode . . . . . [22], 762
— et Guénolé (A.). — Epidémie de Dengue hivernale en Chine du Nord . . . . . [21], 617
Toyoichi Ohtawara. — Recherches sur une fièvre endémique accompagnée de lymphadénite généralisée (Premier rapport). . . . . [17], 819
Tran-Dinh-Qué, Pham-Quang-Anh et Joyeux (Ch.). — Volumineux fibrome périostique intrathoracique et tuberculose pulmonaire concomitante . . [22], 778
Tran-van-An, Dang van Cuong et Montel (L.-R.) (de Saïgon). — Adénopathies iliaques primitives chez des Annamites de

Cochinchine. Guérison par le chlorhydrate d'émétine . . . . . [17], 67
—, — et —. Tension artérielle et viscosité sanguine dans le paludisme chez les Annamites de Cochinchine. . . . [17], 799
—, — et —. Tension artérielle et viscosité sanguine dans le Béribéri chez les Annamites de Cochinchine. . . . [18], 475
Trautmann. — Alcoolisme (Discussion) . . . . . [2], 352
—. Maladie du sommeil en Guinée française . . . . [5], 614
—. Inoculation positive de *Tryp. cazalboui* à un *Cercopithecus patas* . . . . . [7], 118
Trautmann et Allain. — Trypanosomiase humaine et pneumonie. . . . . [3], 25
Treillard (J.). — Répartition annuelle de *Myzomyia minima*, *M. aconita* et *Anopheles hircanus*, Anophèles porteurs de *Plasmodium* malarien en Cochinchine et au Cambodge Oriental . . . . . [25], 920
Trentz (F.). — Recherches sur l'index maxillaire de *Anopheles maculipennis* . . . [23], 43
—. Le rôle du pH des réactifs dans la séro-floculation du paludisme (Réaction de Henry) . . . . . [25], 221
—. La « séro-floculation palustre » de Henry dans la trypanosomiase caméline et la leishmaniose canine expérimentales . . . . . [25], 230
—. Essai d'application de la réaction de Henry à l'étude épidémiologique du paludisme. . . . . [25], 310
—. La réaction de Henry (« séro-floculation palustre ») et la « surfloculation » de certains sérums de paludéens. . [25], 314
Trentz (A.) et Sénevet (G.). — A propos de l'*Aedes mariæ* (Sergent, 1903). . . . [25], 702
Tribaudeau (J.) et Conseil (A.). — Application du 606 au traitement de la syphilis en pays arabe . . . . . [3], 337
Tribondeau (L.). — Sur la recherche de l'Hématozoaire de Laveran . . . . . [11], 196
—. Sur la coloration de l'Hématozoaire de Laveran . . [11], 440
Tribondeau (L.) et Roux (G.). — Action de l'émétine dans quelques formes spéciales d'amibiase et dans la syphilis . . . . . [6], 424
Tricoire (R.). — Essai sur l'intradermo-réaction du trachome. Contribution au diagnostic et à la prophylaxie de la conjonctivite granuleuse . [16], 718
—. Étude de l'association de l'amibiase et du paludisme . . . . . [16], 304
—. Accès palustres à forme pulmonaire . . . . . [17], 368
Trillat et Legendre (J.). — Étude sur la toxicité des vapeurs de quelques substances chimiques sur les moustiques . . [1], 605
— et —. Sur la destruction des mouches par le formol . [1], 610
Trinh-van-Dam et Bédier (E.). — Au sujet du traitement du Pian par le salicylate de bismuth en émulsion huileuse gaïacolée . . . . . [20], 6
Troisier (P.), Delorme (M.), Deschiens (R.) et Limousin (H.). — L'infestation du chimpanzé par un Nématode du genre *Hepaticola* . . . . . [21], 221
—, Deschiens (R.) et Limousin (H.). — Eléments présentant les caractères d'un Protozoaire sanguicole observés chez le chimpanzé . . . . . [20], 597
Trouette (G.), Bridré (J.) et Nègre (J.). — Essai de traitement de la lymphangite épizootique par le 606 . . [4], 380
Turikoff (Mlle M.-F.), Markoff-Petraschewsky (Mme E.-N.), Yakimoff (W.-L.), Gnédine (Mlle A.-N.), Rastégaïeff (Mlle M.-F.) et Roumiantzeff (Mlle E.-W.). — L'arrhénal dans le traitement de la babésiellose bovine (Note préliminaire) . . . . . [19], 534

U

Ukil (A.). — Observations sur le paludisme pernicieux et la fièvre bilieuse hémoglobinurique au Bengale (Indes anglaises). . . . . [15], 962
—. Épidémiologie de la tuberculose aux Indes . . . . [23], 5
Ulrich. — Manifestations inflammatoires chorio-rétiniennes provoquées par l'inoculation intravortiqueuse de Trypanosomes . . . . . [3], 303
Urbain (G.). — Encéphalo-myélite pseudo-épizootique du cheval . . . . . [9], 557
—. Méningo - encéphalo - myélite des poules (? spirillose) . . . . . [9], 561
—. Un cas de gale démodectique du cheval. Contagion à l'homme . . . . . [9], 576
—, Bourdelle (E.) et Davesne (J.). — Deux cas de gingivo-stomatite gangréneuse (Noma)

due à *B. perfringens* chez le chimpanzé (*Pan chimpanze* Meyer). . . . . [24], 787
—, GUILLOT (G.), GORET (P.) et ROUX (G. LE). — Sur un germe diphtériforme et chromogène isolé du castor. . . . . [24], 450
UTRA (O. D') et SILVA. — Quelques caractères des leishmanioses tégumentaires brésiliennes . . . . . [21], 846

V

VAILLANT (Louis). — L'examen du sang des paludéens par la méthode de la goutte épaisse . . . . . [12], 375
—. Note sur le Dispensaire antipaludique du Gouvernement Militaire de Paris . . . [12], 549
VAILLARD (L.). — Trachome (Discussion) . . . . . [10], 272
VAISSEAU (G.) et MURAZ (G.). — De divers types d'arséno-résistance dans les traitements actuels (A. E. F.) de la trypanosomiase humaine . [25], 260
VALADE (P.). — L'échinococcose en Syrie . . . . . [20], 1004
VALLANDRÉ (H. DE) et COMMES (Ch.). — Myxo-sarcome du bras chez un Bambara . . . . . [9], 702
VALLET et RODET. — Sur le pouvoir bactéricide du sang dans le Nagana expérimental. [1], 136
VALLIN. — Chocolatine et prophylaxie du paludisme (Discussion) . . . . . [3], 544
—. Troupes noires du Sénégal en Algérie (Discussion) . . . . . [3], 289
—. La peste en Mandchourie (Discussion) . . . . . [4], 356
—. Surra d'Indochine. . [4], 411
VAN DEN BRANDEN (F.). — Réaction méningée de la syphilis chez un Noir du Congo. [8], 570
—. Le sel sodique du salvarsan cuprique dans le traitement de la trypanose humaine, le Pian et la syphilis . . . [8], 582
—. Valeur moyenne de la durée de stérilisation sanguine chez les trypanosés par une dose de salvarsan, néosalvarsan, salvarsan cuprique . . . [9], 13
—. Fistule stercorale de la région inguinale droite chez un Noir. . . . . [9], 310
—. Chéloïdes géantes chez une négresse . . . . . [10], 39
—. Syphilides psoriasiformes confluentes chez un Noir . . . . . [10], 688
—. La roussette, *Cynonycteris straminea*, animal de laboratoire . . . . . [10], 731
—. Essais de traitement de la trypanosomiase humaine par l'émétique huileux . . [11], 379
—. Action de la combinaison atoxyl, émétique, tryparosan, sur le *Trypanosoma congolense* . . . . . [12], 514
—. Le salvarsan cuprique et son sel sodique dans le traitement de la trypanosomiase humaine. . . . . [12], 680
—. Recherches et expériences sur la lymphangite ulcéreuse des équidés. . . . . [12], 9
—. Essai de traitement de la trypanosomiase humaine par la collobiase d'antimoine . . . . . [13], 27
—. Gliome du cerveau chez un Nègre . . . . . [13], 34
—. Sur un essai de vaccination antiméningococcique au Congo belge . . . . . [18], 241
—. L'Éparséno ou préparation 132 du Dr Pomaret dans le traitement de la lèpre . [18], 514
—. Le tryparsanide chez les trypanosés chroniques (Communication préliminaire) . . [18], 645
—. L'action du tryparsamide chez les trypanosés chroniques (deuxième note préliminaire). . . . . [19], 8
—. Le « Heyden 661 » ou Antimosan dans le traitement de la malaria . . . . . [19], 182
—. Le Stibosan « préparation Heyden n° 471 » dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [19], 193
—. Le « Heyden 661 » ou Antimosan dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [19], 688
—. Note préliminaire sur les essais de traitement de la trypanosomiase humaine chronique par l'acétylarsan . [20], 248
—. Recherches sur la malaria congénitale, faites au Congo belge (Léopoldville) . . [20], 338
—. Le « 269 » et le « 417 » Fourneau dans le traitement de la trypanosomiase humaine . . . . . [21], 646
—. Quelques mots sur la fièvre typhoïde au Stanley-Pool (Congo belge) . . . . . [21], 776
—. Essai de traitement de la trypanosomiase humaine chronique par le novatoxyl. [22], 431
—. Au sujet de l'arséno-résistance dans le traitement de la trypanosomiase humaine par le tryponarsyl . . . . [22], 540
—, BEQUAERT (J.), PONS et RODHAIN

(J.). — *Leptomonas* dans l'intestin de divers insectes de Katanga . . . . . [4], 528
—, Clevers (Mlle) et Morelas (M.). — Essai de traitement de la trypanosomiase humaine et des infections animales à *T. congolense* par le « 2754 » Hœchst (Note préliminaire) . . . . . [20], 734
— et Dubois (A.). — La réaction de Boveri dans la trypanosomiase humaine. . . . [8], 261
— et —. Amibiase et son traitement par l'émétine à l'hôpital des Noirs à Léopoldville. . . . . [8], 332
— et —. Contribution à l'étude de l'étiologie du Béribéri. . . . . [10], 123
— et Henry (Mlle E.). — Nouvelle médication du paludisme par la plasmoquine . . [20], 728
—, Pons (C.), Béquaert (J.) et Rodhain (J.). — Note sur les Trypanosomides intestinaux d'*Hæmatopota* au Congo belge . . . . . [6], 182
— et Rodhain (J.). — Recherches diverses sur le *Filaria* (*Onchocerca*) *volvulus* . . . [9], 186
— et —. Sur la réceptivité de la roussette, *Cynonycteris straminea*, aux différents virus de Trypanosomes africains [9], 234
— et —. Action comparative des matières colorantes : tryparosan et trypanobleu et des arsenicaux : salvarsan cuprique sur les Trypanosomes animaux africains du groupe *congolense* et du groupe *angolense* (*cazalboui-vivax*) . . . . . [9], 236
— et —. Essais de transmission des parasites de la malaria à la roussette, *Cynonycteris straminea* (Note préliminaire). . . . . [10], 704
— et —. Essais sur la pluralité des espèces flagellées parasitant le tube digestif des Invertébrés (Note préliminaire) . . . . . [10], 811
— et Van Hoof (L.). — Un cas de « maladie de dépigmentation » chez un indigène du Congo belge. . . . . [11], 867
— et —. Le « Trépol » ou tartro-bismuthate de potassium et de sodium dans la trypanosomiase humaine . . [15], 692
— et —. Recherches sur la fièvre récurrente africaine . . [15], 220
— et —. Résultats d'observations de malades trypanosomés traités au Tryparsamide « A 63 ». . . . . [16], 606
Van Hoof (L.). — Note préliminaire sur la fièvre récurrente parmi les troupes belges dans l'Est Africain allemand. [10], 786
—. Essais de traitement au moyen de l'émétine dans des affections autres que la dysenterie amibienne . . . [11], 401
—. Spirochètes dans les accès de fièvre bilieuse hémoglobinurique chez des Européens au Congo belge . . . [17], 291
—. Conservation du pouvoir infectieux de l'*Ornithodorus moubata* nourri sur reptiles et sauriens . . . . . [17], 376
—. Au sujet d'une épidémie de dysenterie bacillaire dans le Mayombe (Congo belge) . . . . . [18], 532
— et Van den Branden (F.). — Un cas de « maladie de dépigmentation » chez un indigène du Congo belge . . . [11], 867
— et —. Le « Trépol » ou tartrobismuthate de potassium et de sodium dans la trypanosomiase humaine . . . . . [15], 692
— et —. Recherches sur la fièvre récurrente africaine . . [15], 220
— et —. Résultats de l'observation de malades trypanosomés traités au Tryparsamide « A 63 ». . . . . [16], 606
Van Nitzen (R.). — L'action du stovarsolate de quinine sur les infections à *Plasmodium falciparum*. . . . . [20], 727
Van Saceghem (R.). — Expériences sur le traitement des trypanosomiases animales . . . . . [8], 339
—. Dermatose contagieuse (Impétigo contageux) . . [8], 354
—. Étude sur une épizootie parmi les gorets de la station d'élevage de Zambi . . [8], 360
—. Observations sur la dermite granuleuse . . . . . [8], 362
—. Études complémentaires sur la dermatose contagieuse (Impétigo contageux) . . [9], 290
—. Observations sur des infections naturelles par *Toxoplasma cuniculi* . . . [9], 432
—. Contribution à l'étude de la transmission de *Trypanosoma cazalboui* . . . . . [9], 569
—. Étude sur des cas de dermite ulcéreuse des Equidés observés au Congo belge . . [9], 675
—. Cylicostomose et cachexie osseuse des Equidés (Discussion) . . . . . [9], 633
—. Morphologie du *Trypanosoma brucei* (Discussion) . . [9], 738
—. Dermatose et gale démodectique des bovidés . . [10], 117

—. Cas suspects d'*East coast fever* au Congo . . . [10], 172
—. Étude de tumeurs d'une génisse de race zébu . . [10], 182
—. Contribution à l'étude de la dermite granuleuse des Equidés. . . . . [10], 726
—. Contribution à l'étude du *Gastrodiscus ægyptiacus* (Cobbold, 1876) . . . . . [11], 396
—. La peste du cheval ou *horse sikness* au Congo belge. [11], 423
—. Cause étiologique et traitement de la dermite granuleuse. . . . . [11], 575
—. Traitement de la lymphangite ulcéreuse . . . . [11], 683
—. Procédé pour la production rapide du sérum contre la peste bovine. . . . . [14], 367
—. Le pouvoir attachant de *Tryp. congolense-pecorum*, var. *ruandæ* pour les hématies . . . . . [15], 203
—. Action des composés de bismuth dans la trypanosomiase. . . . . [16], 587
—. Le pouvoir empêchant dans les trypanosomiases . . [16], 733
—. L'œstre du mouton au Ruanda (Afrique Orientale) . [16], 17
—. Les theilérioses. Note préliminaire . . . . . [17], 637
—. Contribution à l'étude du 309 Fourneau dans les trypanosomiases animales. . [18], 453
— et Nicolas (E.). — L'émétique dans le traitement des trypanosomiases . . . . . [9], 813
— et Roubaud (E.). — Observations sur quelques insectes et acariens parasites du bétail au Congo belge . . . [9], 763
Van Thiel (P.-H.). — Sur l'origine des variations de taille de l'*Anopheles maculipennis* dans les Pays-Bas . . . . [20], 366
—. La nourriture des larves de l'*Anopheles maculipennis* en rapport avec le problème de l'existence de la variété *atroparvus* . . . . . [21], 551
—. *Id.* (*Suite*). . . . . [21], 687
—. *Id.* (*Suite et fin*). . [21], 797
—. Hibernation et semi-hibernation de l'*Anopheles maculipennis* et de la variété *atroparvus* ; un problème de l'anophélisme sans paludisme. . . . . [23], 836
Varnencar (H.-M.-P.) et Mello (Froilano de). — Effets du traitement par la *Smalarina cremonese* sur 6 malades atteints de malaria chronique avec récidives fébriles (1re communication) . . . . [20], 323
— et —. Nouvelles études sur les résultats de la *Smalarina cremonese* . . . . . [20], 966
Vasconcellos (F. de). — Anaphylaxie . . . . . [2], 163
Vassal. — L'Atoxyl dans le traitement de la fièvre paludéenne . . . . . [1], 539
—. Bovidés et buffalidés, réservoirs de virus pour le Surra d'Indochine . . . . . [2], 65
—. Études sur la maladie du sommeil (Alima, Likouala, Bas-Oubanghi) . . . . [17], 234
—. La maladie du sommeil en Afrique Équatoriale Française . . . . . [17], 727
Vassal (P.), Leger (M.) et Fauconnier. — Teneur du sérum sanguin des paludéens en matières minérales, en matières azotées et en cholestérine. . . . . [24], 34
—, — et —. Modification du chimisme sanguin sous l'influence de la cure hydro-minérale d'Encausse-les-Thermes. . . . . [24], 222
— et Yersin. — Une maladie rappelant le typhus exanthématique observée en Indo-Chine. . . . . [1], 156
Vaucel (M.). — Différenciation immunologique de deux races de *Bartonella muris*. . [22], 771
—. Identification du Trypanosome d'une infection humaine de laboratoire . . . . [23], 715
— et Boisseau (R.). — Premiers essais de vaccination antituberculeuse par le B. C. G. à Brazzaville . . . . . [24], 173
— et —. La dysenterie bacillaire à Brazzaville pendant l'année 1930 . . . . . [24], 267
— et —. L'action du moranyl dans l'arséno-résistance de la trypanosomiase humaine. . . . . [24], 374
— et —. Résultats éloignés du traitement de la trypanosomiase humaine à forme méningée par la tryparsamide. . . . . [24], 528
—, — et Salaün (C.). — Streptothrix pathogène, isolé au cours d'essais de transmission au lapin du virus d'un « chien fou » . . . . . [24], 631
—, — et —. Rage canine en Afrique Équatoriale Française. . . . . [25], 191
—, Dupuy (H.) et Sicé (A.). — Un cas de charbon humain en Afrique Équatoriale Française. . . . . [22], 307
— et Ledentu (G.). — Répartition actuelle de la trypanosomiase humaine en Afrique Équatoriale Française . [20], 511

— et —. L'acétylarsan dans la trypanosomiase humaine . . . . . [20], 524
— et —. La formol-gélification dans la trypanosomiase humaine . . . . . [20], 601
— et —. L'index du paludisme à Brazzaville . . . . [20], 722
— et —. Sur la valeur comparée de la réaction de Gaté et de l'auto-agglutination des hématies, comme signes de présomption de la maladie du sommeil . . . . . [20], 737
— et —. La réaction du benjoin colloïdal dans la trypanosomiase humaine. . . . [20], 865
— et —. Contributions aux essais du traitement de la trypanosomiase humaine par le « Tryponarsyl » (*Paraglycinamidephénylarsinate de soude*). . . . . [20], 875
—, — et Sicé (A.). — Formes schizogoniques d'un Sporozoaire du cobaye . . . [22], 323
— et Salaün (G.). — Thérapeutique et prophylaxie de la trypanosomiase en Afrique Equatoriale Française . [24], 834
— et —. Contribution à l'étude du pneumocoque en Afrique Equatoriale Française . [25], 58
— et —. Rage canine en Afrique Equatoriale Française . . . . . [25], 1018
—, — et Pales (L.). — Premiers cas de fièvre typhoïde à Brazzaville. . . . . [24], 902
— et Sicé (A.). — Étude des gîtes à larves de moustiques à Brazzaville. Présence du *Stegomyia fasciata* . . . [21], 768
Vaysse et Velu (H.). — Durée de l'immunité consécutive à la vaccination intradermique en un temps contre le charbon bactéridien . . . . . [24], 294
Veillon (A.) et Lagane (L.). — Action défavorable de l'arsénobenzol dans la lèpre . [6], 415
Velez (L.-R.). — La fièvre de Malte existe au Pérou . [5], 434
—. Uta et Espundia . . [6], 555
Velu. — La maladie de Fez, trypanosomiase des chevaux du Maroc . . . . . [8], 115
—. La trypanosomiase des chevaux du Maroc (Étude clinique) . . . . . [8], 646
—. La lutte contre *Schistocerca peregrina*, au Maroc en 1916, par la méthode biologique . . . . . [9], 682
—. La trypanosomiase des chevaux au Maroc. Étude expérimentale . . . . . [10], 253
—. Nouvelles recherches sur la pyothérapie de la lymphangite épizootique . . . . [10], 681
—. La pyothérapie dans le traitement des blessures de harnachement aux Colonies [10], 901
—. Au sujet de la préparation du pyo-vaccin contre la lymphangite épizootique . [11], 10
—. Quelques considérations sur l'efficacité et la non-spécificité absolue de la pyothérapie anticryptococcique chez le cheval. . . . . [11], 12
—. Les affections du cheval à parasites endoglobulaires au Maroc . . . . . [11], 26
—. La septicémie contagieuse du porc au Maroc. . . [11], 117
—. Spirochétose au Maroc . . . . . [11], 261
—. Quelques observations relatives à l'étiologie de la lymphangite épizootique. . [11], 351
—. Les variations leucocytaires dans le traitement de la lymphangite épizootique par la pyothérapie polyvalente [11], 416
—. La trypanosomiase des chevaux au Maroc. Essais de traitement. . . . . [11], 448
—. Les troubles oculaires et locomoteurs dans la trypanosomiase des chevaux au Maroc . . . . . [11], 566
—. La coccidiose de la chèvre au Maroc et le parasitisme latent de *Eimeria arloingi* [12], 298
—. La lutte contre les Acridiens au Maroc. 3e campagne d'expérimentation de la méthode biologique . . . . . [12], 362
—. Le charbon bactéridien au Maroc . . . . . [12], 126
—. Trypanosomiase des chevaux au Maroc. Guérison de la maladie expérimentale du chien par l'osarsan . . . . [12], 220
—. Une affection non décrite du chien observée au Maroc . . . . . [12], 132
—. Comment il convient d'organiser la lutte contre la gale des animaux domestiques aux Colonies . . . . . [13], 186
—. La fièvre aphteuse au Maroc. . . . . [13], 726
—. Quelques observations relatives aux pasteurelloses au Maroc. . . . . [13], 493
—. Infection spontanée du chien à *Tr. marocanum* (Discussion) . . . . . [13], 234
—. Rapidité de l'immunisation du mouton contre le charbon bactéridien par intradermoréaction en un temps : possibilité de l'intervention chez les animaux en période d'incubation . . . . . [17], 467

—. La blastomycose des voies lacrymales de l'âne et son inoculabilité . . . . . [17], 545
—. Essai concluant d'intradermo-vaccination contre le charbon bactéridien en milieu profondément infecté . [17], 767
—. Au sujet de l'intradermo-vaccination en un temps contre le charbon bactéridien . [18], 243
—. Conséquences économiques possibles de l'intoxication par les eaux des zones phosphatées . . . . . [24], 927
—, Ayraud (E.) et Petitdidier. Recherches sur la leishmaniose canine dans la région de Casablanca et sur la valeur de la formol-gélification comme méthode de diagnostic . [25], 227
— et Balozet (L.). — Darmous (dystrophie dentaire) du mouton et solubilité du principe actif des phosphates naturels qui le provoque . . . [24], 848
—, — et Barotte (J.). — Notes sur la valeur de la ponction du testicule dans le diagnostic de la Dourine . . . . [17], 298
— et Barotte (J.). — Essais d'isolement en cultures du cryptocoque de la lymphangite épizootique du cheval, par l'emploi de milieux à l'acide citrique . . . . . [17], 540
— et Bigot (A.). — Blastomycose des voies lacrymales de l'âne (Anatomie pathologique) . . . . . [17], 551
— et —. Isolement rapide de *Cryptococcus mirandei* en culture pure. . . . . [18], 127
— et —. Étude biologique de *Cr. mirandei*, agent de la blastomycose des voies lacrymales de l'âne. . . . [18], 231
— et Bossavy (F.). — Deux cas de méningite cérébro-spinale chez la chèvre . . . . [13], 497
— et Bouin (A.). — Essais de destruction de *Schistocerca peregrina* Olivier, au Maroc, par l'emploi des cultures microbiennes (*Coccobacillus acridiorum* d'Hérelle) . . [8], 638
— et Eyraud (A.). — Observations sur les diverses formes de Piroplasmes, rencontrées sur des bovins indigènes de la Chaouïa . . . . . [8], 643
— et —. Trypanosomiase des chevaux du Maroc. Infestation d'un jeune chien par l'allaitement . . . . . [9], 567
— et Jalabert (H.). — Toxicité des jus de férule pour le lapin et le porc . . . . . [19], 22
— et Monod (Th.). — Quelques faits relatifs à la prophylaxie vaccinale contre le charbon bactéridien du Maroc . [13], 14
— et Vaysse. — Durée de l'immunité consécutive à la vaccination intradermique en un temps contre le charbon bactéridien. . . . . [21], 294
—, Zottner (G.) et Irousteguy. — Essais de traitement de la theilériose bovine nord-africaine par l'antimosane . [25], 136
Verdun (P.) et Bruyant (L.). — Quelques documents pour servir à l'étude de *Filaria loa* . . . . . [5], 506
Vernes (A.) et Jeanselme (E.). — Réaction de Wassermann et réaction d'Eitner chez les syphilitiques et les lépreux . . . . . [8], 259
Vernon et Jamot. — Nouvel essai de la tryparsamide dans le traitement des formes avancées de la trypanosomiase humaine. . . . . [20], 689
Vialatte (Ch.). — Rapport sur le fonctionnement du laboratoire de microscopie de Béni Abbès en 1914 . . . [8], 66
—. Au sujet d'un Trypanosome du chien observé dans le Sahara Oranais . . . [8], 70
—. Rapport sur le fonctionnement du laboratoire de microscopie de Béni-Abbès (Sahara Oranais) en 1915 . . . [9], 469
—. Syndrome bilieux hémoglobinurique au cours d'un accès de paludisme . . . . [18], 715
—. Sur le traitement du paludisme à *Pl. vivax* par le stovarsol. . . . . [19], 359
—, Adde (R.) et Foley (H.). — Existence dans le Sud-Marocain (Haut-Guir) du Bouton d'Orient à l'état endémique . . . . . [7], 114
— et Foley (H.). — Traitement de la fièvre récurrente nord-africaine par le néosalvarsan et l'olarsol . . . . . [7], 569
— et Flye Sainte-Marie (P.-E.). — Autour du « mystère » de la fièvre quarte (Remarques épidémiologiques). . . [24], 280
— et Raynal (H.). — Du contrôle de la quininisation préventive au moyen du réactif de Tanret. . . . . [19], 190
— et Remontet (E.). — Paludisme viscéral, prémunition et réaction de floculation d'Henry . . . . . [23], 590
— et —. Guérison par l'émétine d'un abcès du foie constitué. . . . . [25], 421
Vielle (A.) et Montel (L.-R.). —

Un cas d'amibiase cérébrale . . . . . [21], 231
— et Souchard. — Sur un cas de typhus exanthématique observé en Cochinchine [24], 232
Vielle (Mlle G.). — Cuti-réactions tuberculiniques chez les enfants de 2 à 5 ans à Tananarive. . . . . [21], 878
Vienne (M.) et Leger (M.). — Épizootie à Trypanosomes chez les bovidés de la Guyane Française . . . . . [12], 258
Viguier (A.) et Brault (J.). — Les champignons des teignes à Alger. . . . . [7], 554
Villain (G.). — Le Tokelau (*Tinea imbricata*) dans la province chinoise du Honan . . . . . [18], 618
—. Note sur le Kala-azar du Honan (Chine centrale) . . . . . [18], 669
Villeneuve et Broquet. — Contribution à l'étude des maladies des vers à soie . . [3], 766
Villeneuve de Janti (J.). — Sur une forme inédite des *Calliphorinæ testaceæ* de Robineau-Desvoidy (*Bengalini* de Tyler-Townsend) . . . . . [22], 437
Villeneuve (J.) et Rodhain (J.). — *Passeromyia*, genre nouveau du groupe des *Anthomyidæ* (Dipt.), à larve hématophage parasite des jeunes oiseaux . . . . . [8], 591
Vincent. — Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dans l'Inde (Discussion). . . . . [1], 552
—. Emploi de l'hypochlorite de soude pour le traitement de la dysenterie amibienne chronique. . . . . [2], 80
—. Note sur la latence prolongée de l'Amibe dysentérique dans l'intestin humain. Les « porteurs d'Amibes » . [2], 78
—. Béribéri (Discussion) . [3], 19
—. La fièvre de Malte en Corse (Discussion). . . . . [3], 773
—. Eléphantiasis (Discussion) . . . . . [6], 668
—. Mélitococcie (Discussion) . . . . . [6], 672
—. Le Pied de Madura (Discussion) . . . . . [5], 709
—. L'alcoolisme au Maroc (Discussion) . . . . . [5], 751
—. Ulcère phagédénique et pourriture d'hôpital (Discussion) . . . . . [7], 99, 266, 471
—. Dysenterie et quinine (Discussion) . . . . . [7], 152
—. Sprue (Discussion) . . [7], 270
—. Le traitement de l'ulcère phagédénique par le pansement sec hypochloré [12], 64
—. Le traitement du pian par les injections sous-cutanées de novarsénobenzol (Discussion) . . . . . [15], 490
Violle (H.). — Sur un nouveau milieu de culture et de séparation pour le vibrion cholérique (milieu sodo-glycériné) . . . . . [8], 52
—. *Anopheles bifurcatus* capturé dans la Côte d'Or. . . [10], 679
—. Sur un cas de Pian observé en France. . . . . [10], 784
—. Spirochétose pulmonaire (bronchite sanglante) . [11], 39
— et Pottevin (H.). — Transmission du choléra aux singes par la voie gastro-intestinale. . . . . [6], 482
Violle (R.) et Commes (Ch.). — Création du centre vaccinogène de Tombouctou. . . . [11], 301
Visentini (A.). — Mécanisme de l'immunité naturelle du rat et du cobaye à l'égard des cultures de *Leishmania infantum* . . . . . [5], 358
Vittoz (R.) et Souchard (L.). — Bacille tuberculeux bovin en Cochinchine. . . . . [25], 1026
Vivien, Nègre (L.), Sergent (Edm. et Et.) et Brégeat. — Notes bactériologiques relevées pendant l'épidémie cholérique de 1911 en Oranie . . . [5], 790
Vogel (M.-W.-T.). — La lutte contre le *Granuloma venereum* dans la tribu des Marandinois (Nouvelle-Guinée hollandaise) . . . . . [21], 354
Voizard (Fr.). — Paludisme autochtone et somnambulique. . . . . [19], 675
— et Leroy (D.). — Un cas de pied de Madura traité avec succès par des injections intraveineuses de lugol . [21], 511

W

Wagner (J.) et Roubaud (E.). — Sur un Pulicide nouveau, parasite des rats domestiques à Madagascar . . . . . [25], 327
— et —. Sur un Pulicide nouveau parasite des Rongeurs et Insectivores de Madagascar . . . . . [25], 962
Wagon. — La tuberculose chez les Noirs en Guinée française. . . . . [3], 21
—. Un cas de leishmaniose cutanée traitée avec succès par l'arsénobenzol . . . . [6], 624
—. Deuxième cas de leishmaniose cutanée au Dahomey.

Traitement par l'arsénobenzol en lavements . . . . [7], 46
Walravens (P.). — Traitement de la maladie du sommeil. . . . . [18], 312
—. Le traitement de la maladie du sommeil par le 205 Bayer. . . . . [18], 641
Wassilieff (A.). — Observations sur les puces de la région du Cayor . . . . . [23], 474
—. Recherches sur l'épidémiologie pesteuse au Sénégal en 1929. Les réservoirs de virus. . . . . [23], 737
Wassiliewsky (Mlle W.-J.), Markoff (Mme E.-N.), Yakimoff (W.-L.) et Rastégaïeff (Mme E.-F.). — La coccidiose des porcs en Russie . . . [19], 263
—, Oulassévitch (J.-S.), Rastégaïeff (Mlle E.-F.), Zawialoff (B.-W.), Iwantchikoff (M.-F.) et Yakimoff (W.-L.). — Action de l'Ichtargol et du Luargol dans la piroplasmose bovine . . . . . [18], 51
— et Yakimoff (W.-L.). — Au sujet de la blastomycose [18], 130
— et —. Les Protozoaires de l'intestin de l'homme pendant les épidémies de Pétrograde (1919-1921) . . . . . [18], 183
— et —. *Oicoma granulata* dans l'intestin des souris blanches. . . . . [18], 310
— et —. Le traitement de la trypanosomiase des chameaux du Turkestan russe . . [9], 230
—, Zawialoff (B.) et Yakimoff (W.-L.). — La piroplasmose des bovidés dans le Gouvernement de Pétrograde en 1923 (Note préliminaire) . . [18], 48
—, Zwietkoff (Mlle N.-A.) et Yakimoff (W.-L.). — Sur la culture des Protozoaires de l'intestin. . . . . [18], 260
—, — et —. Influence du chlorure de sodium sur les cultures de Protozoaires . . [18], 261
Weinberg. — A propos du procès-verbal. Émanations des selles et des putréfactions . . . . . [1], 384
—. Sur la présence du pigment ocre dans les organes des sujets morts de Béribéri (Discussion) . . . . . [1], 428
—. Un cas d'appendicite chez le gorille. . . . . [1], 556
—. Éosinophilie dans la dysenterie amibienne (Discussion) . . . . . [2], 32
—. Les lésions osseuses du Goundou . . . . . [2], 220
—. Nodules aberrants à Œsophagostome chez le singe . [2], 611
—. Un cas de méningite cérébrospinale chez le chimpanzé . . . . . [2], 202
—. Formules et numérations leucocytaires aux Colonies. Leur importance pour le diagnostic des suppurations profondes et particulièrement des abcès du foie (Discussion) . . . [16], 701
—. Enquête sur les traumatoses et, en particulier, sur la gangrène gazeuse chez les blessés du front marocain . [19], 106
— et Brimont (E.). — Lésions de l'intestin produites par un *Gnathostome* . . . . [2], 104
— et Leger (M.). — Recherches cliniques et expérimentales sur l'ankylostomiase. Ankylostomés et ankylostomiasiques . . . . . [1], 229
— et Mello. — Recherches expérimentales sur l'origine de l'éosinophilie dans les helminthiases. . . . . [1], 463
— et —. Un cas de paratyphoïde avec lésions d'aspect typique chez le chimpanzé . . [2], 11
— et Moore. — Quelques données sur l'éosinophilie dans les helminthiases . . . [1], 459
— et Romanowitch. — Helminthiases de l'intestin grêle du chimpanzé et des singes inférieurs . . . . . [1], 181
Werblunski (S.) et Brumpt (E.). — Présentation de pièces . . . . . [21], 8
Wetterlé (Louis) et Nicolle (Ch.). — A propos de trois naissances dans la singerie de l'Institut Pasteur de Tunis . . . . . [23], 596
Wilbert (R.), Blondin et Delorme (M.). — Contribution à l'étude de la rage en Afrique Occidentale Française . . . . [20], 404
— et Delorme (M.). — « Pastoria », centre de recherches biologiques et d'élevage de singes. . . . . [24], 131
Winogradoff (W.-W.), Demidoff (A.-P.), Yakimoff (W.-L.), Schokhor (N.-I.) et Koselkine (P.-M.). — La Microfilaire des chevaux au Turkestan . [7], 189
—, Kohl-Yakimoff (Nian) et Yakimoff (W.-L.). — *Argas persicus persicus* Fischer-Waldheim en Russie d'Europe . . [5], 39
Witas (P.) et Sénevet (G.). — Évolution spontanée de l'infection à l'*Hæmoproteus columbæ*, chez un pigeon isolé à partir du premier mois de son existence . . . . . [15], 787
With, Bourret et Ehlers. — Recherches sur le mode de pro-

pagation et les procédés de diagnostic bactériologique de la lèpre . . . . . [4], 239
WOÏTZEKHOWSKY (Mlle A.-M.), LOUKIANOFF (W.-L.), YAKIMOFF (W.-L.), MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.), GALOUZO (J.-P.), RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.) et ROUMIANTZEFF (Mlle E.-W.). — Essais de traitement de la piroplasmose bovine par le protargol . . . . . [19], 41
— et YAKIMOFF (W.-L.). — La résistance des érythrocytes au cours de la babésiellose bovine . . . . . [19], 548
WOLLMAN. — *Bacillus asthenogenes* (Discussion). . . [15], 587
—. Avitaminose et infection dans la maladie expérimentale du porcelet due à *Bacillus asthenogenes* (Recherches sur le Béribéri) (Discussion . [18], 76
WOLTZ (H.). — Constitution chimique de quelques calculs urinaires chez les Malgaches . . . . . [24], 416
—. Note sur le perborate de soude . . . . . [24], 624
—. Taux normal de l'urée du sang chez les Malgaches de Tananarive . . . . . [25], 376
—, GIRARD (G.) et FONTOYNONT (M.). — Nouvelle conception pathogénique des » nodosités juxta-articulaires » avec les déductions qu'elle comporte. . . . . [24], 209
WOSKRESSENSKI (B.) et ZDRODOWSKI (P.). — Essai du séro-diagnostic et de l'analyse sérologique de la leishmaniose viscérale humaine et canine au moyen de la réaction de la fixation de l'alexine . . . . . [23], 1028
— et —. Sur la sérologie comparée du groupe *Leishmania* d'origine humaine et canine. . . . . [24], 37
WURTZ, TEPPAZ et THIROUX. — Sur la maladie du sommeil et les trypanosomiases animales à la Petite Côte et dans la région des Niayes au Sénégal. . . . . [1], 269
WYDOOGHE (J.). — Le Béribéri dans la vallée de la Lukuga. . . . . [11], 239

Y

YAKIMOFF (W.-L.). — Sur la question de la décomposition de l'arsénobenzol 606. . . [3], 616
—. La piroplasmose des chiens en Russie. . . . . [4], 110
—. Traitement de la Dourine par le trypanroth et par des préparations arsenicales . [4], 116
—. La formule leucocytaire du sang des malades de *Filaria medinensis* . . . . . [7], 192
—. De la période d'incubation chez les animaux infectés par les *Leishmania*. . . . [8], 430
—. A propos du *Tryp. wrublewskyi*. . . . . [8], 431
—. Contribution à l'étude des leishmanioses de l'homme et du chien dans le Turkestan russe . . . . . [8], 474
—. A propos de la note de M. RODHAIN sur *Theileria oris*. . . . . [9], 201
—. Leishmanioses du Turkestan (Présentation) . . . . [9], 202
—. Un cas intéressant de typhus exanthématique . . . [10], 94
—. *Grahamella* chez les Rongeurs du Caucase. . . [10], 98
—. *Leucocytogregarina* d'un poisson . . . . . [10], 99
—. *Prowazekia ninæ kohl-yakimovi* n. sp. . . . . [10], 101
—. La dysenterie amibienne en Russie. . . . . [10], 125
—. Les tiques des animaux domestiques au Turkestan russe . . . . . [10], 281
—. *Trichomonas* de l'intestin de la sangsue du Turkestan, *Limnatis turkestanica* . [10], 298
—. Contribution à l'étude des Ixodidés en Russie . . [15], 41
—. L'examen des eaux courantes à Pétrograd . . . [15], 12
—. Au sujet de la trypanosomiase des chameaux russes . . . . . [16], 314
—. Au sujet de *Trypanosoma ninæ kohl-yakimovi* . . [16], 249
—. La fièvre ondulante au Turkestan russe. . . . . [16], 227
—. Note sur la technique bactériologique. Procédé d'Orticoni. . . . . [16], 226
—. Sur la question des *Blastocystis* . . . . . [16], 326
—. La lutte antipiroplasmique dans le Gouvernement de Pétrograd en 1924 (Note préliminaire) . . . . . [18], 50
—. A propos du traitement de la dourine des chevaux par l'atoxyl . . . . . [18], 55
—. La campagne antipiroplasmique dans le Gouvernement de Pétrograd en 1925 (Note préliminaire) . . . . . [19], 14
—. L'ichtargan dans le traitement de la babésiellose bovine dans le Nord-Ouest de la Russie (Note préliminaire) . [19], 16
—. Sur la question de l'*Eymeria stiedæ* du Lapin . . . [19], 269

—. L'hématurie au cours des épizooties de piroplasmose . . . . . [19], 686
—. Le trypanobleu agit-il sur les babésielloses ? . . . . . [19], 783
—. Le traitement de la coccidiose des bovidés par l'ichtargan. . . . . [20], 588
—. La lutte antipiroplasmique dans le Gouvernement de Pétrograd (Léningrad) en 1926 (Note préliminaire) . . [20], 595
—. Un cas de lambliose du chien en Russie. . . . . [22], 80
—. La spirochétose des lapins en Russie. . . . . [22], 906
—. Les Coccidies du zébu . . . . . [24], 644
—. A propos de l'infection du zébu par les Piroplasmes . . . . . [24], 756
— et collaborateurs. — Microfilaires des animaux au Turkestan russe. . . . . [9], 229
—, Amanschouloff (S.-A.), Arbousoff et Schourawleff. — L'anaplasmose des moutons en Russie (U. R. S. S.) . [22], 423
— et Bassilia. — L'anaplasmose des chèvres en Russie . [23], 382
—, Bekensky (P.-W.) et Kohl-Yakimoff (Nina). — Le Trypanosome des bovidés en Russie d'Europe. . . . . [6], 433
—, Bélitzer (A.-W.) et Kohl-Yakimoff (Nina). — *Trypanosoma equiperdum* en Russie d'Europe. . . . . [5], 822
—, Davydoff (A.-M.) et Markoff-Petraschewsky (Mme E.-N.). — Modifications du sang au cours de la coccidiose des animaux. . . . . [19], 427
—, Gadschieff (S.), Nezwetaieff (N.-W.) et Schmoulewitsch (A.-I.). — L'influence du virus de la peste bovine sur les piroplasmoses latentes des bovidés . . . . . [25], 728
—, —, — et —. La coccidiose des reins des oies en Russie . . . . . [25], 1044
—, Galouzo (J.-G.), Loukianoff (W.-A.) et Fourikoff (Mlle M.-J.). — L'apiroplasmose dans le traitement de la piroplasmose bovine. . . . . [19], 18
—, Gousseff (W.) et Nezwetaieff (N.). — Infection du zébu par les Theiléries . . . . [25], 1049
—, Iwanoff (Mlle P.-S.), Kédrinsky (A.-J.), Afanassieff (Mlle J.-A.) et Swirssky (S.-A.). — Le traitement de la babésiellose des bovidés par les sels d'argent . . . . . [19], 887
—, Iwantchikoff (M.-F.), Wassiliewsky (Mlle W.-J.), Rastégaïeff (Mlle E.-F.), Oulassewitch (J.-S.) et Zawialoff (B.-W.). — Action de l'Ichtargan et du Luargol dans la piroplasmose bovine . . . [18], 51
—, Joukowsky (A.) et Schirwind (S.). — A propos de l'angine de Vincent . . . . . [16], 236
—, — et —. Au sujet de l'angine de Vincent . . . [18], 304
— et Kohl-Yakimoff (Nina). — Action du 606 sur la maladie du sommeil expérimentale . . . . . [3], 526
— et —. Emploi de l'arsénobenzol 606 sous forme d'onguent . . . . . [3], 618
— et —. Nouvelle communication relative au traitement de la maladie du sommeil et de la tick-fever par le 606 . [4], 141
— et —. Présence de Trypanosomes dans le sang des bovidés à Tunis . . . . . [4], 309
— et —. Piroplasmose des zébus en Tunisie . . . . . [4], 451
— et —. Leishmaniose canine à Tunis . . . . . [4], 432
— et —. Un cas de toxoplasmose canine en Allemagne . [4], 617
— et —. Sur la question des Ixodidés de Russie . . [5], 194
— et —. Infection des souris blanches par les cultures de *Leishmania infantum* Nicolle (Ch.) . . . . . [5], 218
— et —. L'infection des animaux de laboratoire par *Leishmania infantum* . . . [5], 353
—, — et Winogradoff (A.-A.). — *Argas persicus persicus* Fischer-Waldheim, en Russie d'Europe . . . . . [5], 39
—, — et Schokhor (N.-J.). — Leishmaniose canine à Taschkent. . . . . [6], 432
—, — et —. Le Trypanosome des bovidés au Turkestan . . . . . [6], 434
—, Koselkine (P.-M.), Winogradoff (W.-W.), Démidoff (A.-P.) et Schohkor (N.-I.). — La microfilariose des chevaux au Turkestan . . . . . [7], 189
—, Loukianoff (W.-A.), Galouzo (J.-G.) et Rastégaïeff (Mlle E.-F.). — A propos de la coccidiose des porcs en Russie. . . . . [20], 215
—, — et Markoff-Petraschewsky (Mme E.-N.). — A propos de l'immunisation des bovidés vis-à-vis de *Babesiella bovis* en Russie . . . . . [19], 550
—, —, —, Galouzo (J.-P.), Woitzekhowsky (Mlle A.-M.) et Yakowleff (S.-P.). — Le traitement de la piroplasmose bo-

vine par le salvarsan à l'argent (Silbersalvarsan) . [19], 34
—, MANCEAUX (L.) et YAKIMOFF (N.-K.). — Culture et morphologie du Trypanosome du type *Tr. theileri*, des bœufs tunisiens . . . . . [4], 378
— et MATIKASCHWITI (I.). — La Coccidie du hibou . . [25], 1045
— et —. Sur la Coccidie du porc sauvage . . . . . [25], 1046
— et —. La Coccidiose du daim. . . . . [25], 1048
— et MATWEIEFF (W.-N.). — Distribution de la Dourine en Russie. . . . . [18], 54
— et METELKINE (A.-J.). — Sur la question de l'isotonie des solutions des remèdes chimio-thérapeutiques. . . . . [19], 584
— et MILLER (G.-A.). — Les Protozoaires de l'intestin de l'homme en dehors de l'organisme de l'homme. L'examen de l'intestin de *Periplaneta orientalis* . . . . . [18], 8
— et —. Les Protozoaires de l'intestin de l'homme en dehors de l'organisme de l'homme (L'examen de l'intestin des grenouilles de Pétrograd) . . . . . [18], 306
— et —. Les Protozoaires de l'intestin des rats d'égout. . . . . [18], 311
—, NIKOLSKY (S.-N.), BELAWINE (W.-S.) et RASTÉGAÏEFF (Mme E.-F.). — La répartition géographique des Piroplasmes et des tiques au Nord du Caucase. . . . . [21], 644
—, —, RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.) et TOLSTOFF (Mme A.-N.). — L'anaplasmose des bovidés en Russie . . . . . [21], 642
— et RASTÉGAÏEFF (Mlle E.-F.). — Sur la question des leucocytes des chameaux . . . . [19], 582
— et —. Les maladies à Protozoaires des animaux domestiques en Crimée . . . [20], 418
— et —. Épizootie de spirochétose des poules à Piatigorsk (Nord du Caucase) . . [22], 764
— et —. Sur la question des variations cytologiques du sang des poules . . . [22], 766
— et —. Sur les Coccidies des poules en Russie (U. R. S. S.). . . . . [23], 714
— et —. Sur la bartonellose des chiens en Russie (U. R. S. S.). . . . . [24], 471
—, — et MARKOFF-PETRASCHEWSKY (Mme E.-N.). — Sur l'hémoglobinurie au cours de la babésiellose bovine . . . . [20], 413
—, —, —, GALOUZO (J.-C.), LOUKIANOFF (W.-L.), ROUMIANTZEFF (Mlle E.-W.) et WOITZEKHOWSKY (Mlle A.-M.). — Essais de traitement de la piroplasmose bovine par le protargol . [19], 41
—, —, —, GNÉDINE (Mlle A.-N.), ROUMIANTZEFF (Mlle E.-W.) et TURIKOFF (Mlle M.-F.). — L'arrhénal dans le traitement de la babésiellose bovine (Note préliminaire) . . . . [19], 554
—, —, WASSILIEWSKY (Mlle W.-J.) et MARKOFF (Mme E.-N.). — La coccidiose des porcs en Russie . . . . . [19], 263
— et SAPHRONOWITSCH (Mlle R.-A.). — *Theileria* chez le campagnol du Caucase . . [10], 99
— et SCHOKHOR. — Recherches faites au Turkestan :
I. Répartition de la leishmaniose canine. . . . . [7], 185
II. Leishmaniose cutanée spontanée du chien . . . [7], 186
III. — Les trypanosomiases des chameaux et des ânes . [7], 187
IV. Les Microfilaires des animaux domestiques. . . . . [7], 188
— et —. A propos du *Trypanosoma theileri* au Turkestan russe . . . . . [9], 229
— et —. *Leucocytogregarina musculi* A. Porter à Pétrograd . . . . . [10], 100
— et —. Microfilaires des grenouilles au Turkestan russe. . . . . [10], 105
— et —. Leucocytogrégarine des chiens du Turkestan russe . . . . . [10], 293
—, — et collaborateurs. — Maladies intestinales du Turkestan à parasites endoglobulaires. . . . . [10], 302
—, — et —. Microfilaires des chiens au Turkestan russe . . . . . [10], 102
—, —, KOSELKINE et collaborateurs. — Microfilaire des bovidés au Turkestan russe . . . . . [10], 104
— et SOLOWZOFF (Mme A.-S.). — Essais de traitement de la fièvre récurrente par l'émétique. . . . . [16], 303
— et WASSILIEWSKY (Mlle W.-L.). — Le traitement de la trypanosomiase des chameaux du Turkestan russe . . . [9], 230
— et —. Au sujet de la blastomycose. . . . . [18], 130
— et —. Les Protozoaires de l'intestin de l'homme pendant les épidémies de Pétrograd (1919-1921) . . . . . [18], 183
— et —. *Oicoma granulata* dans l'intestin des souris blanches . . . . . [18], 310

—, —, Korniloff (M.-T.) et Zwietkoff (N.-A.). — Flagellés de l'intestin des animaux de laboratoire . . . . . [14], 538
—, — et Zawialoff (B.). — La piroplasmose des bovidés dans le Gouvernement de Pétrograd en 1923 (Note préliminaire) . . . . . [18], 48
—, — et Zwietkoff (Mlle N.-A.). — Sur la culture des Protozoaires de l'intestin . . [18], 260
—, — et —. Influence du chlorure de sodium sur la culture des Protozoaires . . . [18], 261
— et Woitzekhowsky (Mlle A.-M.). — La résistance des érythrocytes au cours de la babésiellose bovine . . . . . [19], 548
—, Yakowleff (S.-P.), Markoff-Petraschewsky (Mme E.-N.), Galouzo (J.-P.), Loukianoff (W.-A.), et Woitzekhowsky (Mlle A.-M.). — Le traitement de la piroplasmose bovine par le salvarsan à l'argent (Silbersalvarsan) . . . . . [19], 160
Yakovlew, Zabolotny, Zlatogoroff et Koulecha. — Epidémie actuelle de choléra à Saint-Pétersbourg, d'après les renseignements des laboratoires municipaux . . . [2], 276
Yamanouchi et Levaditi. — La réaction de la déviation du complément dans la maladie du sommeil . . . . . [1], 26
— et —. La réaction des lipoïdes dans les trypanosomiases et les spirilloses expérimentales. . . . . [1], 140
— et —. Transmission des spirilloses humaines aux poussins et aux embryons de poulet . . . . . [1], 415
Yersin et Vassal. — Une maladie rappelant le typhus exanthématique observée en Indo-Chine . . . . . [1], 156
Yoffé (Hillel). — A propos de la fièvre bilieuse hémoglobinurique en Palestine . . . [7], 512
—. Traitement des cachexies paludéennes. . . . . [7], 678
Yvernault et Foley. — Anophélines dans l'eau salée . [1], 172
Yvon. — Toxicité de l'orpiment. . . . . [1], 619
—. Rapport sur la quinine . . . . . [2], 225

Z

Zabolotny (D.). — Les épidémies de peste en Russie au cours de ces dernières années . [16], 467
—, Koulecha, Yakovlew et Zlatogoreff. — Epidémie actuelle de choléra à Saint-Pétersbourg d'après les renseignements des laboratoires municipaux. . . . . [2], 276
Zammit (Th.). — Vibrions cholériques de l'eau de mer [6], 9
Zawialoff (B.-W.), Rastégaïeff (Mlle E.-F.), Oulassévitch (J.-S.), Iwantschikoff (M.-F.), Wassilewsky (Mlle W.-J.) et Yakimoff (W.-L.). — Action de l'Ichtargol et du Luargol dans la piroplasmose bovine. [18], 51
—, Wassiliewsky (Mlle W.-Z.) et Yakimoff (W.-L.). — La piroplasmose des bovidés dans le Gouvernement de Pétrograd en 1923 . . . . . [18], 48
Zdrodowski (P.) et Woskressenski (B.). — Essai du séro-diagnostic et de l'analyse sérologique de la leishmaniose viscérale humaine et canine au moyen de la réaction de la fixation de l'alexine . . . . . [23], 1028
— et —. Sérologie comparée du groupe *Leishmania* d'origine humaine et canine . . [24], 37
Ziemann. — Culture de l'Hématozoaire du paludisme . [6], 140
Zlatogoroff, Yakovlew, Zabolotny et Koulecha. — Epidémie actuelle de choléra à Saint-Pétersbourg, d'après les renseignements des laboratoires municipaux . . . . [2], 276
Zotta (G.). — Considérations sur l'anophélisme du delta du Danube . . . . . [20], 801
Zottner (G.). — Toxicité du tourteau d'Argan . . . [22], 341
—, Velu (H.) et Irousteguy. — Essais de traitement de la theilériose bovine nord-africaine par l'antimosane . . . [25], 136
Zoux (L.-L. O'). — Voir : O'Zoux.
Zuccarelli. — Fièvre méditerranéenne en Corse . . . [5], 566
—. Paludisme aigu ; complications méningitiques . . [5], 713
Zwietkoff (Mlle N.-A.), Wassiliewsky (Mlle W.-J.) et Yakimoff (W.-L.). — Culture des Protozoaires de l'intestin . . . . . [18], 260
—, — et —. Influence du chlorure de sodium sur les cultures de Protozoaires. . [18], 261
—, Yakimoff (W.-L.), Wassiliewsky (Mlle W.-J.) et Korniloff (M. T.). — Flagellés de l'intestin des animaux de laboratoire . . . . . [14], 538

SORTI DES PRESSES DE
L'IMPRIMERIE BARNÉOUD
A LAVAL (FRANCE)

IMP. INST. EN
— LIBRARY —
21 MAY 1935
SERIAL Eu. 59
SEPARATE

BULLETINS de la Société DE Pathologie Exotique

ET DE SES FILIALES

de l'Ouest-Africain et de Madagascar

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : INSTITUT PASTEUR, PARIS

TABLES DES TOMES I-XXV (1908-1932)

PARIS

MASSON & Cie, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, Boulevard Saint-Germain (6e)

Le Bulletin de la Société de Pathologie exotique paraît 10 fois par an 3 semaines après chaque séance, qui a lieu le 2e mercredi du mois, sauf en août et septembre. Il forme tous les ans un volume de 1.000 pages environ.